





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu



12
13
G
26

10-11-16

70 70
C C
15th 15

EDOARDI VVOTTO-
NI OXONIENSIS DE
DIFFERENTIIS ANI-
MALIVM LIBRI
DECEM.

AD SERENISS. ANGLIAE REGEM
EDOARDVM VI.

Cum amplissimis indicibus, in quibus primùm authorum nomina,
unde quæquæ desumpta sunt, singulis capitibus sunt notata & desi-
gnata: deinde omnium animalium nomenclatura, itémque singu-
larum partes recensentur, tam græcè, quàm latinè.

*M. Antonius Muretus emi Romæ. ann. MDLXX. mense Octobri
Jul. xv.*



LVTETIAE PARISIORVM
APVD VASCOSANVM.
M. D. LII.

Cum priuilegio Regis.

1231418

DIFFERENTIALS

— 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1891

IN LIBRVM DE ANIMALIVM DIFFERENTIIIS, Edoardi Vvottoni Oxoniensis præfatio, Ad serenissimum Angliæ Regem Edoardum, eius nominis sextum.



QVONIAM uel temeritate quadā inductus, uel ingenij confidentia ad hoc inflammatus uideri possum, Edoarde Rex illustrissime, ut de animalium differentiis scriberem: hac præfatione apud tuam Maiestatem, qua studiorum meorum conatus aduersus illius culpæ iniuriam defenderem, ac tuerer, utendum esse iudicaui. Quod equidem ed libentius faciendum putauī, quod alius nemo occurreret, cui iustius otij mei rationem redderem: quem & natura mihi principem, uitæque rectorem, & uoluntas mearum actionum moderatorem constituerunt. Simulque etiam expetebat animus hoc modo literarum studiosis hominibus cognitum & perspectum esse, primò quis fuerit huius laboris initio conatus meus: deinde, quæ causæ me huius ingenij tenuitatis non inscium ad hoc opus suscipiendum impulerint: denique quidnam id sit, quod in hac re præstare, & perficere uoluerim. Id uniuersum quicquid sit, si minus, quàm pro dignitate tantæ rei effectum esse uidebitur: spero bonos uiros, non uoluntatem mihi, sed uires defuisse cognituros. Quo nomine maiorem in illis iudiciorum æquitatem mihi promitto, si quid forte in istis uel erratum, uel non satis accurate tractatum inuenerint, rei in qua operam studiūque posuimus difficultate perspecta, & noluntate communia studia iuuandi considerata.

Equidem cum ante multos annos, quoscunque nancisci licuit authores, qua tum legendi & studendi mira auiditate tenebar, antiquissimos optimosque euoluissim: quicunque eam doctrinæ partem scriptis illustrassent, quæ ad rem medicam pertinerent, præclare quidem omnia à plerisque descripta & exulta animaduertiscius tamen generis esse uidebantur, quæ lectorem requirerent attentum, literarum meditationi uehementer deditum, in omni scriptorum uarietate uersatum, præstanti quadam memoriæ ui, naturæque bonitate singulari præditum: si cuncta illa parata ac præsentia habere uellet, quæ usui forent: præsertim quæ illa non uno loco, aut intra unius scriptoris operum septa, sed passim & uelut in medio posita, maxime uero in latissimis illis philosophorum & historicorum campis inuenirentur. Hæc res usque adeo animum meum commouit, ut commentarios quosdam subseciuis operis mihi cōficiendos proponerem, quorum ueluti indicio ad authores ipsos, si usus postulare, in re dubia consilij capiendi gratia facile deduci possem. Qua in re quum diu multumque laborassim, & non nihil assecutus mihi uide-

P R A E F A T I O.

rer, posteaquam doctissimorum uirotum commentatia Ioânis primùm Ruellij, deinde Georgij Agrieolæ amici quôdam & familiaris mei scripta & in lucem edita uidissem: maxima tandem me laboris parte leuatum sanè intelligebam. Nam hic de iis omnibus, quæ intra terræ uiscera nasci, animæque earere natura uoluit, cuiusmodi sunt metallici terrarum lapides, atque id genus alia. Ille de iis quæ super terram aluntur, quales sunt stirpes omnes, deque earum rerû natura uniuersa, (quæ omnem ferè medicam materiam in se complectuntur) ueterum in hoc genere scriptis adiuti, tanta eruditione, iudicio, copia, & orationis lucè scripserunt, ut frustra in iis postea operam studiûmque ponendum existimaui. Illam itaque Venerem tam feliciter exorsam, & egregiè perfectam probandam & suspiciendam, non aliqua noua audacia attingendam esse censui. Vnum tamen hoc restare uidebatur, quòd nimirum intellexerim, quæ de natura eorû, quæ in aëre, aut sub aquis uitam agât, hoc est de animalium generibus uariè & fusè à ueteribus scripta fuere, qui collegerit adhuc extitisse neminem. Quamobrem in huius operis meditationem, si quando per negotia liebat, & quidpiam subseciui temporis incidebat, omni cura & conatu incumbendum esse duxi. Res uerò tandem eò perducta est, ut cùm ipse mihi satisfecissem, & hanc studiorum meorum partem cum quem animo finem constitueram assecutam uidissem: uehementer à me contenderint ex amicis doctissimi quidam uiri, quibus labores meos communicaueram, ut quod mihi in hac re studiorum ueluti compendium parassem, id studiosis omnibus publicarem. Hic hæsisse me fateor, mihiq; ipse iam omni consilio destitutus uidebar. Nam neque amicorum flagitationi, ne ingratus: neque publico commodo, ne ingratisissimus existimarer, deesse potui. Cum uero mecum cogitarem, quàm ab eo alienum esset uitæ meæ institutum, & omnis studiorum ratio, ut editis aliquando libris iudicium orbis subire uellem, quàm nihil temporis scriptioni, nihil humanioribus literis, quibus styli uirtus dignitasque aliqua parari posset, dedissem: contrà quàm omne tempus in eorum scriptis, qui philosophiam, aut medicinam ingeniorum monumentis græcis aut latinis iuuerunt consumpsissem, nec alium laboris mei finem mihi proposuissem, quàm ut ea solùm intelligerem: inclinatam ferè uoluntatem reuocaui, nec illi animi mei inductioni locum dare uolui, senex in eam arenam ut descenderem. Verum enim uero magnæ istæ causæ non erant, erant tamen, sed ad amicorum studia non erant magnæ satis. Itaque quid istuc inquam? Si isthunc animum induxistis uestrum esse utile: nolo reip. ullum cōmodum in me claudier. Ergo ne amicorum uoluntates contemnere tam arduas, neque publicum commodum morari uideremur, publicâda hæc nostra recepimus, non tamen quoquo modo, sed quæ inter nos conuenerunt, ea si seruarentur. Sunt autem illa huiusmodi, Ioannes est Mafonus, amicus meus singularis & patronus, uir præter fortunæ splendorem, quo

P R A E F A T I O.

uirtus illum extulit, omnibus cum naturæ, tum industriæ adiumentis
eximie ornatus. Is tuo iussu ac uoluntate in Galliam proficiscēs, ut apud
Henricum regem legatione fungeretur, accepto à me libro, uel extorto
potius, pactus est curaturū se, si facta legendi copia excellenti illic do-
ctrina ac iudicio præditis hominibus probaretur, & cum allaturus fru-
ctum uideretur, qui hic à plerisque sperabatur, eum ut typographo da-
ret, sin aliter eueniret, mihi meum redderet, ipse ne hoc amplius expo-
sceret. Quibus rebus ad exitum huius cōsiliij non omnino temerarij, aut
arrogantis adductus sum, habes illustrissime Rex. Quid uerò in hoc ge-
nere effecerim, atque utinam aliquid effecissem: sed quid efficere uolue-
rim, nunc accipies. Cū in animo mihi esset animalium rationem quo
possimum modo dignosci possent, excutere atque explicare: cū alios
nonnullos, tum uel maxime Aristotelem proponēdum putauī, quem in
ea re imitater, scriptorem certē in omni doctrinarum genere excellen-
tem, & propē singularem, quo uel Cicerone teste, nihil acutius, nihil po-
litius. Hoc igitur ceu itineris duce usus, (explicata tamen prius & decla-
rata ratione qua animalium differentia inueniri possint) initium paulò
altius ab ipso Animali repetere institui, & ita repetere, ut si quæ non il-
lius propria, sed superiorum generum communia occurrerint, ea ipsa
suo, hoc est primo loco, plana fecerim. Multa enim in pluribus etiam ge-
nere diuersis eadem reperiuntur. In sequentibus deinde, si quæ species
sub se non multum inter se differētes, sed in eodem genere positas com-
plectebantur: ea ita tractaui, ut communis ipsorum natura postulabat.
Post hæc species ipsas ad sua quasque genera reduxi, quæque propria ip-
sarum essent, easque ab aliis rebus omnibus separarent, ea statim adiun-
xi. Sic etenim probaturum me omnibus hanc docendi uiam arbitrabar,
si ea quæ generis natura ad species pertinebāt, in speciebus nō reperiren-
tur, sed ita orationem formarem, ut neque rebus obscura fieret, neque
uerbis superuacaneis redundaret. Iam ~~uix~~ ad marginem & in fine ca-
pitum apposui, earum rerum, quas, quòd scitu digna erāt, impeditas re-
linquere consultum non fuit: neque tamen contextui ea inferere uolui,
quòd uerebar ne tedium lectori, non uoluptatē essent allatura. Quid,
quòd multa ex iis ne inferi quidem possent? nisi forte quibus de rebus
uariæ sunt authorum sententiæ, uariæ codicū lectiones, eas res à propo-
siti serie non putes seiungendas. Quid, quòd sæpe sola certorū animalium
nomina inueniuntur, sæpe, licet præter nomina uim eorum propriam
descriptam uideris, ignorabis tamen, quo pertineant, aut ferātur. Omit-
to græcæ linguæ phrasēs, quæ subinde tales sunt, ut latina eas lingua
non assequatur. Omitto uersiones hominum doctissimorum, in quibus
uel primas tenebat Theodorus Gaza, quæ si quando à græcorum au-
thorum mente aberrabant, in uiam ut redirent curauī. Neque uerò un-
quam cuiusquam errores dissimulandos, sed semper & sine conuitij su-
spicione prodendos, & sine ostentatione ingenij corrigendos esse iudi-

P R A E F A T I O.

caui. Cum igitur latina græcæ lectionis ope facta texta præstarentur, si græca ipsa uitio afficiebantur, nec occurreret ulla ratio corrigendi, coniectura apta & idonea utendum censui. quod à nobis factum est, cum in aliis quibusdam, tum etiam in Athenæo & Oribasio, quod horum authorum exemplaria minus multa suppetebant. Atque ut nostræ cōiecturæ intra sententiarum contextum locum habere non debent: sic si quæ breuiter à nobis ideoque obscure tractata fuere, (quoniam in utrobque uitatis studiosi fuimus, ita & obscuritatem quantum licuit, uitauimus) eadem fusius & maiore luce ab aliis explicata cognouimus, id iudicauimus in uoluminum marginibus magna diligentia adnotandum. Postremo si quid forte occurrebat, quod uel propter rei obscuritatem intelligi non poterat, uel propter meam incitiam à me intellectum non erat, id à me non est dissimulatum: sed in marginum quoque spatiis ascriptum, quod alij cum in ea loca inciderint, facilius per otium quid sit, uniuersum poterunt inuestigare. Atque hæc quidem hætenus. Illud ab omnibus uehementer peto, cum plerisque non minor, bonis certe maior etiā existimationis, quàm uitæ cura sit: si quæ sint in hoc opere, cuiusmodi multa esse scio, non ea circumscriptione cōclusa, qua debet: si sermo minus elegans, & politus, si dicendi genus scabrum & inæquabile cuiquam uideatur: ut hæc à me institutam fuisse commentandi rationem perpendat: ut quæ in singulis authoribus repererim, ea uerbis non meis, sed ipsorum reddiderim, si quidem latinè fuissent scripta. Nam è græcis, quæ fuerunt translata, in iis interpretum uerba assumere uolui, ea quæ à græcis non discrepare animaduerti. Neque hic ferè quicquā inuenies, quod è meo capite natum statuatur. Veterum scriptorum sententias in unum quasi cumulum coaceruauī, de meo nihil addidi. Atque illis ipsis ueteribus, ne in furci crimen fortè uocaret, singulis sua reddidi, descriptis nō solum ad finem huius præfationis authorum nominibus, unde quæque desumpta sunt, uerum etiam cuique capiti præfixis. Iam ne uniuersa tibi euoluere necesse sit, in aliis studiis occupatissimo, cum pauca fortassis desiderentur, indices quosdam rerum omnium, qui non modo quid in quoque libro, sed etiam quid in singulis cuiusque libri capitibus tractetur, admoneant, conficiendos, & uniuerso operi præponendos putauī. Quo fiet ut & temporis rationi in his legendis consulatur, & ad id quod quaesierit aliquis, ueluti manu quadam ductus in eo solo legendi labore ponat. Quia in re si unius labor, multorum otio consuluit, non est hoc committendum, ut multorum otium unius laboris conuiuium faciat.

Tuæ itaque Maiestati, princeps optime, hoc quicquid est laboris dicere idcirco æquissimum putauī: quandoquidem si qui fructus ex his percipi posse uideantur, eorum primitias tibi offerēdas iure existimauerim, cui uni me meaque dedo, prout omnia debeo. Christus seruet tuam feruentatē diutissime incolumem.

Londini. XXII. Octobris M. D. LI.

ΕΙΣ ΤὸΝ ΙΟΦΘΝ ΚΑΙ ΓΕΡΙΦΑΝΗ

Εὐδοκίου τοῦ ὁμοῦ, πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ Ἰωάννου
ἐπιγραφῆς καὶ τῆς ἐκείνου ἐπιγραφῆς.

நிதிமொழி பேசுகின்றார்களே; இது உண்மையானது.

Ὁν γὰρ μὲν θεοὶ καὶ ἐκείνους φέρει.

हृत्कमलपुष्पपत्रिणो हृत्कमलपुष्पपत्रिणो

Εἰμὶ ἐφ' ὅσον ἐρῶ ἐν ἡμετέροις καὶ ταῖς.

Καὶ τοὺς ἀποστόλους ἐκείνους ἐπέλεξε ὁ Κύριος.

Ὁν παρὰ πᾶσι γὰρ ἐπὶ τῇ φροσύμῳ καὶ τῇ

Πολλὰ καὶ ἴσως ἀπείροισι, ὅσα μὴ ἀποκαταστάσει.

καὶ ἡ μὴ ἐκ σελίδος, πᾶσαν ἐνφρονίσαι.

Χρῆμα δ' πικρὸν ἐστὶ καὶ σῆθοσι κακόν.

Καὶ τοῖς ἀποστόλοις ἐξήγγισται ὅτι οὕτως ἔσται.

தருமத்தின் மீது இவ்வாறு நடந்ததால்

உயர் பரிசீலனையிலே சீரமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ΓΕΛΛΕΊΣ ΔΕ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΛΕΤ' ΕΠΙΜΕΛΕΩΣ ΚΑΤΑΤΙΣ.

உயர்வுகூட்டுதல்

Γάρτοι Α' τῶν τε ἱερῶν καλῶς καὶ μὴ οὐκ ὀρθῶς

καὶ ὁμοῦς ἰσχυροῦς, ἀνέθεός ἔστιν ἐμῶν.

ὁ γὰρ ἰσχυρὸς καὶ ἡ μεσότης ἀνδράνων

012. 1001 012. 1001 012. 1001 012. 1001 012. 1001

Τὸ ἐκτενέστερον ἀνεκδοκίματον καὶ ὁδοῦται ἀπὸ τῆς

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΕ ΜΕΤΕ ΤΑΙΣ ΙΝΙΣ ΠΥΡΡΕΙΟ

Ερμηνεύει ο Δ. Βίτλας, επικεφαλής του τμήματος.

Ἰσχυρὸς καὶ ἰσχυροῦς καὶ ἰσχυροῦς

καὶ ἡ ἐκ τῆς πύλης ἐξέρχεται. ὁ δὲ ἀντίπαλος

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೨೫೫೨೨/೨೦೧೭

மேலும், கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றித் தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது.

Declaratoria em nome do Sr. Dr. J. J. de Almeida

PRIVILEGII SENTENTIA.

CAVTVM est auctoritate regia, ne quis alius præter Vascofanum, hos decem libros Edoardi Vvotoni philosophi & medici clarissimi, De differentiis animalium, ante sexennium in hoc Francorum regno imprimat, nèue uendat. Qui secus fecerit, libris & pœna in sanctione æstimata, mulctabitur. Datum Lutetia Parisiorum IIII Nonas Ianuarij M. D. LII.

Guyot.

V

M. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

SYMMATIM HÆC INSUNT LIBRIS
SINGVLIS, ATQVE EX IIS AV-
THORIBVS EXCERPTA.

In primo libro generatim explicatur, quibus modis constituuntur animalium Differentiæ: & præterea animalium partes recensentur.

ANIMAL quid sit, & quo differat ab iis quæ non sunt animalia. Ex authoribus. Platone in Timæo. Aristotele in historia animalium.

De partibus animalium. De generatione animalium. De Anima. De sensu & sens. De Iuuent. & senect. De somno & uigil. De Respiratione. Et Plinio. Cap. i. Fol. 1.

Quibus modis constitui debeant animalium Differentiæ. Ex Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. De sensu & sens. ca. ii. fol. 1. b. Animalium genera amplissima. Ex Aristotele in historia animalium. cap. iiii. fol. 2. b.

De partibus animalium. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Galenus in li. De placitis Hippocratis & Platonis. In Methodo medendi. De inæquali insensu. De facultatibus naturalibus. De usu partium. cap. iiii. fol. 3.

De partibus exterioribus dissimulatis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. cap. v. ibid.

De capite & eius partibus. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Cicero de natura Deorum. Cornel. Celsus. Plinio. Galenus De ossibus. De Alimentorum facultatibus. De compositione medicamentorum per loca. In Commentariis in Aphorismos. Ex libro qui Introductorius inscribitur. Ex Iulio Polluce. cap. vi. fol. 3. b.

De Collo & eius partibus. Ex Aristotele in animalium historia. De partibus animalium. Ex Galeno De Sanitate tuenda. In Anatomicis. De usu partium. De locis affectis. De uenarum sectione. Ex Cornel. Celsus. Plinio. & Iulio Polluce. modus. cap. vii. fol. 3.

De Thorace & eius partibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus in lib. Anatomicis. De usu partium. In Methodo medendi. De Motu musculorum.

De ossibus. In Commentariis de fracturis. Et iis qui inscribuntur. Ex Hippocrate in Aphorismis. Et Galenus in eundem librum. cap. viii. fol. 5. b.

De Brachiis & eorum partibus. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno de motu musculorum. De ossibus. De usu partium. In Commentario. Ex lib. qui Introductorius inscribitur. Cornel. Celsus. Plinio. Festo Pompeio. Iulio Polluce. cap. ix. fol. 6. b.

De Cruribus & eorum partibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Galenus De usu partium. De ossibus. In Commentariis. Lib. qui Introductorius inscribitur. Cornel. Celsus. Iulius Pollux. Fest. Pompeius. cap. x. fol. 7.

De Situ partium uariis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Animalium incesu. De Cælo & mundo. Plato in Timæo. Cornel. Celsus. cap. xi. fol. 7. b.

De Capitis partibus interioribus. De Cerebri & eius partibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De Somno & Vigil. Galenus in Anatomicis. De nervorum dissectione. De olfactus instrumento. Lib. Introductorius. Iul. Pollux. ca. xii. fol. 8.

De Oculi partibus interioribus. Authores. Galenus De nervorum dissectione. De usu partium. De Placitis Hippocratis & Platonis. In Methodo medendi. Author libelli qui De Anatomia oculorum inscribitur. Galeno adscripti. Iul. Pollux. cap. xiii. fol. 8. b.

De Colli & Pectoris partibus interioribus. Ex Authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De usu partium. Iulio Polluce. cap. xiiii. fol. 9. b.

De uisceribus & Septo transuerso. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De Temperamentis. De pla-

CAPITA X LIBRORVM

citis Hippocratis & Platonis. De uenarū sectione. Iul. Polluce, Plinio. cap. xv. fol. 10.
De uentris partibus interioribus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. Cornel. Celsus. Galenus in Anatomicis. De uenarum sectione. De usu partium. De ossibus. In Commentariis in libros Aphorism. Iul. Pollux. Plinius. cap. xvi. fol. 11.
De partibus similibus. Ex Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. cap. xvii. fol. 11. b
De Sanguine. Venis, & Arteriis: & quæ his proportionē respōdent. Ex Authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in libris quibus est inscriptio, Quod animi mores temperaturam corporis sequuntur. An sanguis natura contineatur in uenis. De placitis Hippocratis & Platonis. De uenarum sectione. De fectus formatione. De usu partium. De Atra bile. c. xviii. f. 12.
De Neruis. Ligamentis. & Tendinibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. Galenus. In Methodo medendi. De usu partium. De placitis Hippocratis & Platonis. De Nervorum dissectione. De Motu musculorum. In Anatomicis. De ossibus. Plinius. c. xix. f. 12. b
De Fibris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Galeno De temperamentis. cap. xx. fol. 13
De Ossibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De Generatione animalium. De Partibus animalium. Galenus De Temperamentis. De ossibus. De usu partium. In Anatomicis. De uenarum sectione. De motu musculorum. Lib. Introductorum. Cornel. Celsus. Plinius. Iul. Pollux. cap. xxi. ibid.
De Cartilagine. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De Temperamentis. Iulio Polluce. cap. xxii. fol. 16
De Unguibus. Ungulis. Chelis. Cornibus. & Rostris. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. cap. xxiii. fol. 16. b
De Pilis & cute, & quæ iis proportionē respondent. S. Cortice. Squama. Testa. Crusta. Ex authoribus, Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De Temperamentis. In Methodo medendi. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. cap. xxiiii. ibidem
De Membris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De

Motu musculorum. De dissectione uulnæ. De Semine. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. Ex lib. Introductor. Corn. Celsus. Plinio. Aetio. Iul. Polluce. cap. xxv. fol. 17
De Carne. Authores. Aristoteles in historia animalium. Galenus De Temperamentis. De Alimentorum facultatibus. In Anatomicis. Iul. Pollux. cap. xxvi. fol. 18.
De Glandulis. Authores. Galenus in Anatomicis. De usu partium. De semine. De Alimentorum facultatibus. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. De Definitionibus. Plinius. cap. xxvii. fol. 18. b
De Adipe & Sebo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Galenus De Alimentorum uiribus. De Temperamentis. De usu partium. De simplicium medicamentorum facultatibus. cap. xxviii. ibid.
De Medulla. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De Motu musculorum. De Alimentis. Plinio. cap. xxix. fol. 19.
De Lacte & Coagulo. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De generatione animalium. Galenus De Alimentis. De simplicium medicamentorum facultatibus. De locis affectis. Orbasius. Plinius. cap. xxx. fol. 19. b
De Semine. Ex Aristotele in animalium historia. cap. xxxi. fol. 20
De Excrementis. Authores. Aristoteles De partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus De Sanitate rusticæ. De Naturalibus facultatibus. De locis affectis. De Atra bile. De simplicibus medicamentis. Iul. Pollux. cap. xxxii. ibid.

Liber secundus ea speciatim docet
à quibus colligi debent animalium differentie.

PER quæ inueniri constituque possint animalium differentie, Authores Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De sensu & sensibus. Galenus De usu partium. cap. xxxiii. fol. 20. b
De Differentiis animalium quæ à partium discrimine oriuntur. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. Plinius. cap. xxxiiii. fol. 21
De Differentiis quæ ab animalium actionibus oriuntur. ut Loci mutatione. latitacione atq;

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

Id genus alius. Author Aristoteles in animalium historia. cap. xxxv. fo. 21. b

Ab animalium incessu quæ constituantur differentie. Ex Aristotele in animalium historia. & lib. De animalium incessu. ca. xxxvi. fo. 22

A Generatione quæ oriuntur differentie. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De Generatione animalium. Plinio. cap. xxxvii. fo. 22. b

A locis in quibus gignuntur animalia, & in quibus degunt, colliguntur differentie. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De longitudine & breuitate uitæ. Porphyrio. Corn. Celsus. Plinio. cap. xxxviii. fo. 24. b

De Differentiis sexuum, masculini scilicet & foemini. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. & Oppiano De uenatione. cap. xxxix. fol. 25.

A Viçtus ratione diuersa, oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in animalium historia. cap. xli. fol. 25. b

De Differentiis quæ à sensibus in animalibus colliguntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Alexander Aphrodisius in problemat Plinius. Cicero de Natura Deorum. & in Questionibus Academicis. cap. xli. fol. 26. b

A Respiratione & uoce animalium differentie. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. cap. xlii. fol. 27.

Quæ à Somno & uigilia oriuntur animalium discrimina aut ab ætate, Iuuenta scilicet & Senectute aut à uitæ prolixitate & breuitate. Ex Aristotele in animalium histor. De sensu & sensu. De longitudine & breuitate uitæ. cap. xliii. ibidem.

Differentie quæ à moribus constituuntur. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. cap. xliiii. fol. 27. b

Ab Affectibus quorundam immutatione quæ oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in historia animalium. cap. xlv. fol. 28. b

A Valetudine prospera aut aduersa differentie. Author Aristoteles in historia animalium. cap. xlv. fol. 29.

Animalium discrimina eò quòd commoda magis minusue aut incommoda nobis sint. Ex authoribus. L. Columella. M. Varrone. Plinio. Galeno De Alimentis. De simplic. medicament. facult. cap. xlvii. ibidem

Ab alimentis quæ ex animalibus nobis supplicantur, differentie quibus modis constituuntur. Authores. Galenus De Alimentis. De cibo. bo. malique succi. De tenui uictus

tionem. In Methodo medendi. Orbasius. Corn. Celsus. cap. xlviii. fol. 29. b

Alia quædam ab alimentis quæ nobis præstant animalium discrimina. Ex iisdem authoribus. Et præterea Ex Aristotele in Lib. Meteorolog. Actio. Athenæo. & Plinio. cap. xlix. fol. 30.

A medicamentis quæ nobis præstant animalia, quibus modis constituuntur animalium differentie. Authores. Galenus De simplic. medic. facultatibus. Dioscorides. Plinius. Orbasius. Actius. & Aristoteles in historia animalium. cap. l. fol. 31. b

Liber tertius continet animalium sanguine præditorum differentias.

PARTIUM exteriorum differentie in animalibus sanguine præditis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Salustius. Et ex Theocriti Scholiaste nonnulla. cap. li. fol. 32.

Interiorum partium discrimina in animalibus quæ sanguine prædita sunt. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. De Iuuent. & Senect. De Respiratione. Galenus in Anatomic. De formatione fectus. De uulux dissectione. Solinus. cap. lii. fol. 34. b.

Similarium partium differentie in animalibus sanguineis. Ex authoribus. Aristotele in animalium histor. De Generatione animalium. Galeno De Temperamentis. Plinio. cap. liii. fol. 36. b

Eorum quæ ad generationem pertinent discrimina in iis quæ sanguine prædita sunt animalibus. Ex Authoribus. Aristotele in historia animalium. De Generatione animalium. Galeno de uenarum & artierarum dissectione. De uulux dissectione. cap. liiii. fol. 38.

Morum actionumque & affectionum quarundam aliarum differentie. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Theophrastus De causis stirpium. Lucretius. cap. lv. fol. 39

Eorum quæ in huiusce generis animalibus alimentum aut medicamentum rationem obtinent discrimina. Ex authoribus. Galeno De Ali-

CAPITA X LIBRORVM

- mentis. De cib. bo. malique succi. In Metho
do medendi. De simplic. medicament. facul-
tate. Oribasio. cap. lvi. ibid.
- Ex animalium sanguineorum partibus, alimē-
torum medicaminūque vires diuersæ. Autho-
res. Galenus De Alimentis. De cib. bo.
malique succi. De renui uictus ratione. De
simplic. medic. facultatib. Dioscorides. Pli-
nius. Oribasius. Aetius. Paulus Aegineta.
cap. lvii. fol. 39. b
- De Excrementorum quæ in animalibus sangui-
neis teperiuntur differentiis. Authores. Ga-
lenus De simplic. medic. facultatib. De locis
affectis. Dioscorides. Plinius. Oribasius. Ae-
tius. cap. lviii. fol. 40. b
- De Lacte & iis quæ ex lacte fiunt. ut Caseo. Bu-
tyro. & aliis. Ex authoribus. Galeno De Ali-
mentorum facultat. De cib. bo. malique succi.
De Sanitate tuenda. In Methodo medendi.
De simplic. medic. Dioscoride. Plinio. Ori-
basio. Actio. Paulo Aegineta. Achenço. Con-
stantino Cæsare. Columella. Hippocrates.
cap. lix. fol. 41
- Liber quartus continet Homi-
nis differentias.
- D**E Homine. Authores. Aristoteles in hi-
storia animalium. De partibus animalium.
De Generatione animalium. De Iuuen-
tute & Senect. De Memoria & Reminiscen-
tia. De Respiratione. De animalium incessu.
De Anima. De Sensu & Sens. Plato. Solinus.
Iul. Pollux. Cicero De natura Deorum. De
Academicis Questionibus. cap. lx. fol. 36. b
- De partibus Hominis exterioribus. Authores.
Aristoteles in historia animalium. De parti-
bus animalium. De Generatione animalium.
De animalium incessu. De Somno & Vigilia.
Galenus De Sanitate tuenda. In arte parua.
In Commentariis in sextum librum De mor-
bis vulgaribus. lib. qui Introductorius inscri-
bitur. Ex De Definitionibus. Plinius. Solinus.
Aetius. Iul. Pollux. cap. lxi. ibidem
- De partibus Hominis interioribus, & similari-
bus. Ex authoribus Aristotele in historia ani-
malium. De partibus animalium. De Gene-
ratione animalium. Galeno De Tempera-
mentis. In Anatomicis. De usu partium. De
ossibus. De Alimento. facultatib. De sanitate
tuenda. Plinio. Theophilo. cap. lxii. fol. 46
- De uoce Hominis & Somno Authores. Aristo-
teles in historia animalium. Plin. ca. lxiii. fo. 47
- De Hominis Generatione & Partu: atque de iis
quæ ad hæc pertineant. Authores. Aristote-
les in historia animalium. In problematis. Ga-
leno De Homine. Plin. Solino. c. lxi. f. 47. b
- De Hominis Vita, Aetate, & Statura. Autho-
res. Aristoteles De Generatione animalium.
In problematibus. Mar. Varro. Plinius. Soli-
nus. cap. lxv. fol. 49. b
- Multiformes Hominum effigies. & mira quæ-
dam de Hominibus alia. Ex authoribus. He-
rodoto. Plinio. Solino. Pausania. Aeliano.
cap. lxvi. ibid.
- Homini quæ ex Homine aut eius partibus o-
riuntur commoda. Authores. Dioscorides.
Plinius. Galenus De simplic. medic. facultat.
Aetius. Solinus. cap. lxvii. fol. 50. b
- Liber quintus continet anima-
lium quadrupedum uiuiperarum differentias.
- D**E Quadrupedum uiuiperarum partibus
exterioribus. Authores. Aristoteles in hi-
storia animalium. De partibus animalium.
De Generatione animalium. Galenus in A-
natomicis. Plinius. cap. lxviii. fol. 52
- Interiorum quarundam partium discrimina in
quadrupedibus uiuiperis. Ex Aristotele in hi-
storia animalium. De partibus animalium. &
Galenus in Anatomicis. cap. lxix. fol. 53. b
- Pilorum colorūque discrimina & uocum in
Quadrupedibus uiuiperis. Ex authoribus.
Aristotele in historia animalium. De parti-
bus animalium. Plinio. cap. lxx. fo. 54. b
- De Coitu Partūque & aliis quæ ad generatio-
ne pertinet in quadrupedibus uiuiperis. Au-
thores. Aristoteles in historia animalium. De
Generatione animalium. Plin. ca. lxxi. ibid.
- De Quadrupedum uictu & etate. Authores. A-
ristoteles in historia animalium. Plinius. L.
Columella. cap. lxxii. fo. 55
- De Quadrupedū ruminacione. Latitatione &
aliis quibusdam actionibus affectibusque. Ex
Animalium historia Aristotelis. & Plinio.
cap. lxxiii. fo. 55
- Alimenta ex quadrupedibus & earum partibus
uaria. Authores. Aristoteles in historia ani-
malium. Galenus De Alimentis. De cib. bo-
tis malique succi. Oribasius. Plin. ca. lxxiiii. ibid.
- MULTIFIDA.
- De Quadrupedibus Multifidis. Ex primo De E-
lephanto. Ex authoribus. Aristotele in histo-
ria

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

- ria animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Galeno De usu partium. In Anatomic. Plinio. Solino. Dioscoride. Strabone. Pausania. Philostrato. Oppiano De Venatione. Aeliano. cap. lxxv. fo. 56. b
- De Simiarum generibus. Ex Aristotele in historia animalium. Plinio. Solino. Galeno in Anatomicis. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Strabone. Aeliano. Arthianus in rubri maris navigatione. Diodoro Siculo. cap. lxxvi. fo. 57. b
- De Canibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus in Anatomicis. De simplic. medic. facultatibus. Dioscorides. Alexander Aphrodisius in problemat. Plinius. Oppianus de pisc. & De uenatione. Iul. Pollux. M. Varro. L. Columella. Gratius poeta. M. Aurelius Olympius. Vergilius in Georgic. cap. lxxvii. fo. 58. b
- De Lupis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De uenatione. Galenus De compositione medic. per loca. Aetius. Gratius. Vergilius in Georg. Iul. Pollux. Aelianus. cap. lxxviii. fo. 62
- De Hyena & Crocuta. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Oppiano De Venatione. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Aetio. cap. lxxix. fo. 63
- De Leonibus. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Strabone. Herodoto. Solino. Galeno De usu partium. De simplicibus medic. cap. lxxx. fo. 63. b
- De Tigride. Authores. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Strabo. Arthianus. cap. lxxxi. fo. 65
- De Panthera. Pardo. & Cepo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Pausanias. Solinus. Oppianus De Venatione. cap. lxxxii. ibid.
- De Ursis. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Dioscorides. cap. lxxxiii. fo. 65. b
- De Hystrice. Erinaceo. & Scyuro. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. Plutarchus in libello cui titulus est. Solentiorane sint animalia aquatilia an terrestria. Oppianus De Venatione. Galenus De simpl. medic. facultat. Dioscorides. cap. lxxxiii. fo. 66
- De Vulpes & Leporibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Oppianus De Venatione. Galenus De simplicibus medicamentis. De Alimentorum facultatibus. De tenui victus ratione. Aetius. Paulus Aegineta. Dioscorides. Athenaeus. M. Varro. Herodotus. Xenophon De Venat. Strabo. Moses in Leuitic. cap. lxxxv. fo. 66. b
- De Viueris. Mustelarum generibus. & De Fele. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. Strabo. Galenus De simplicibus medicamentorum facultat. Dioscorides. Aetius. Oppianus De Venatione. Aelianus. Ouidius in Metamorph. M. Aurelius. Martialis. cap. lxxxvi. fo. 67. b
- De Mure & Murium generibus. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Plinio. Dioscoride. Galeno De Aliment. De simplic. medic. Ouidio in Metamorph. Herodoto. Oppiano De Venatione. M. Varrone. L. Columella. Aetio. Nicandro. Aeliano. D. Hieron. ca. lxxxvii. fo. 68. b
- De Quadrupedibus aquaticis. Vt De Fibro. Lutra. & quibusdam aliis. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Nicander in Theriac. Aelianus. M. Aurelius. cap. lxxxviii. fo. 70
- De Vitulo marino. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Dioscorides. Oppianus De pisc. Galenus De simplic. medic. cap. lxxxix. fo. 70. b
- De Talpa & Vespertulione. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. Plinio. Strabone. Iul. Polluce. Herodoto. Ouidio in Metamorph. cap. xc. fo. 71
- De Monitrosis quibusdam aliis animalibus in India aut Aethiopia prognatis. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Aelianus. cap. xci. fo. 71. b

BISVLCA.

- De Quadrupedibus Bisulcis. & primo De Boue, & Boum generibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. M. Varro. L. Columella. Palladius. Strabo. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Caesar in Commentariis. Pausanias. Herodotus. Athenaeus. Galenus De Aliment. De sanitatu eunda. De cib. bo. malique succi.

CAPITA X LIBRORVM

- De simplic. medic. facultat. Dioscorides. Paulus Aeginetes. cap. xcii. fol. 72.
- De Ouibus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinius. M. Varro. Columella. Palladius. Galenus de Alimentor. facultat. De constitutione artis. De cib. bo. malique succi. De sanitate tuenda. De simplic. medic. Dioscorides. Oribasius. Aetius. Paulus Aeginetes. Michael Sethus. Oppianus De uenat. Herodotus. Athenus. Aelianus. cap. xciii. fol. 75.
- De Capris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. M. Varro. Plinio. Columella. Dioscoride. Palladio. Galeno De alimēt. De tenui uictus ratione. De cib. bo. malique succi. De Sanitate tuenda. De simplic. medic. Oribasius. Aetio. Oppiano De uenatione. Herodoto. Aeliano. Ex Lib. Regū. ca. xciii. f. 77. b
- De Ceruis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. Plinius. Solinus. Ouidius in Metamorph. Iul. Pollux. Galenus De alimēt. De tenui uictus ratione. De Sanitate tuenda. De simplic. medic. Dioscorides. Herodotus. Nicander. Pausanias. Strabo. Gratius. Aelianus. cap. xciv. fol. 79. b
- De Tragelapho. Tarando. Ophio. Leucocruta. & Colo. Ex authoribus. Solino. Plinio. Strabone. cap. xcvi. fol. 81. b
- De Hippelapho. Hippardio. Hippagro. Hippopotamo. & Eale. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De uenatione. Herodotus. Pausanias. Dioscorides. cap. xcvi. fol. 81. b
- De Camelo & Camelopardali. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Herodoto. Heliodoro. Strabone. Mose in Leuitico. cap. xcvi. ibidem
- De Suibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Galenus in Anatomic. De uteri dissect. De cib. bo. malique succi. De tenui uictus ratione. De Sanitate tuenda. M. Varro. Columella. Palladius. Oribasius. Dioscorides. Aelianus. cap. xcix. fol. 82. b

SOLIPEDES.

- De Solipedibus. Plinio authore. cap. c. fo. 84. b
- De Equo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. M. Varro. L. Columella. Palladius. Galenus De usu partium. Abfyrus. Vergilius in Georgic. Oppianus De uenatione. Iul. Pollux. Vegetius De re ueterinaria. Herodotus.

- Strabo. Aelianus. Caesar in Commentariis. cap. ci. fol. 87.
- De Asino. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generat. animalium. M. Varro. Columella. Palladius. Plinius. Galenus De alimēt. facultat. De cib. bo. malique succi. In Methodo medendi. De simplic. medic. Dioscorides. Abfyrus. Aelianus. Oppianus De uenat. cap. cii. fol. 87.
- De Mulis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Generatione animalium. M. Varro. Columella. Palladius. Plinius. cap. ciii. fo. 88. b

Liber sextus continet ea quæ cortice integuntur *Quadrupes* à Græcis dicta, *Quadrupes* scilicet ouiparas, & serpētes.

- D**E Quadrupedibus ouiparis. Author Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De animalium incesu. De Generatione animalium. De Respiratione. c. ciii. f. 89. b
- De Crocodilis & Scinco. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De animalium incesu. Herodotus. Dioscorides. Plinius. Pausanias. Aelianus. cap. cv. fol. 90.
- De Testudinū generibus. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalium. De partibus animalium. De animalium incesu. De Iuēt. & Senect. Plinio. Solino. Strabone. Oppiano De pisc. Paulo Aegineta. Arthiano. Martiale. c. cvi. fo. 91.
- De Ranarū generibus. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. Plinio. Dioscoride. Nicandro. Galeno De simplic. medicam. Paulo Aegineta. Aetio. Aeliano. cap. cvii. fol. 92. b
- De Lacertis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinio. Dioscoride. Strabone. Galeno De simplic. medic. facult. cap. cviii. fo. 93. b
- De Salamandra & Sepe quadrupede. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. Dioscoride. Plinio. Galeno De Tēperamēt. De simplic. medic. Aetio. Nicandro. Lucano. c. cix. f. 94
- De Steltione. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Nicander. Aetius. Paulus Aegineta. Ouidius in Metamorph. Galenus De simplic. medic. facultat. cap. cx. fol. 94. b
- De Chameleone. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Plinius. Solinus. Dioscorides. cap. cx. fol. 95.

SERPENTES.

- De Serpētib. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De animalium

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

- malium incesso. De Generatione animaliu.
De longitudine & uitae breuitate. Cornel. Cel
sus. Plinius. Galenus De Theriaca ad Pisonē.
De Aliment. D. Basilius magnus. Oppianus
De pisc. Dioscorides. Pausanias. ca. cxii. f. 95. b
De Hydro. & aliis quibusdam serpētibz aqua
tibus. Authores. Aristoteles in histor. anima
lium. Plinius. Nicander. Aetius. Solinus. Ver
gilius in Georgic. Dioscorides. Pausanias. Ar
rianus. Galenus De Theriaca ad Pisonē. Pau
lus Aeginetes. Aelianus. cap. cxiii. fol. 97. b
De Serpētibz terrestribz. Et primo de Aspi
dū generibus. Authores Aristoteles in histo
riam. Solinus. Aetius. Strabo. Plinius. Lucanus.
Plinius. Strabo. Dioscorides. Galenus
De Theriaca ad Pisonem. Paulus Aegineta.
cap. cxiii. fol. 98. b
De Vipera, Dipside, Ceraſte, & Hammodyte.
Authores. Aristoteles in historia animaliu.
De partibz animalium. De Generatione ani
malium. Nicander. Aetius. Strabo. Plinius.
Solinus. Lucanus. Aelianus. Dioscorides. Ga
lenus De Alimentis. De simplic. medicamēt.
De Theriaca ad Pisonem. In Antidotis. Pau
lus Aeginetes. Suidas. cap. cxv. fol. 99
De Hamorrh. Sepe done. Sepe. Cēchri. & Cē
chrite. Authores. Nicander. Aetius. Galenus
De Theriaca ad Pisonem. Dioscorides. Pau
lus Aeginetes. Aelianus. Pausanias. Luca
nus. cap. cxvi. fol. 100. b
De Basilisco. & aliis quibusdā serpētibz, quo
rum uenenum remedio caret. Authores. Ari
stoteles in histor. animalium. Plinius. Soli
nus. Galenus De Theriaca ad Pisonē. Nican
der. Dioscorides. Diodorus Siculus. Aelia
nus. cap. cxvii. fol. 101.
De Dracone. Amphibena. & aliis quibusdā ser
pētibz, quorum morsus minus affert peri
culi. Authores. Aristoteles in histor. anima
lium. Plinius. Solinus. Nicander. Pausanias.
Strabo. Aetius. Lucanus. Herodotus. Philo
stratus in uita Apollonii Tyranei. Aelia
nus. cap. cxviii. fol. 101. b

Liber septimus continet auium differentias.

- D**E Partibus Auium exterioribus. Autho
res. Aristoteles in histor. animalium. De
partibz animalium. De incesso animaliu.
Plinius. cap. cxix. fol. 103.
De Partibus Auium interioribus. Authores. Ari
stoteles in histor. animalium. De partibus
animalium. De Generatione animalium. De

- Respiratione. Galenus De usu partium.
cap. cxx. fol. 104
De Coitu Auium, & aliis quae de earum gene
rationem pertinent. Authores. Aristoteles in
histor. animalium. De partibus animalium.
De Generat. animaliu. Plinius. ca. cxxi. f. 105.
De uictu Auium & loci mutatione. Authores.
Aristoteles in histor. animalium. & Plinius.
cap. cxxii. fol. 106. b
De uocis discriminibus & coloris in Auibus.
Ex Aristotele in histor. animalium. Et de par
tibz animalium. cap. cxxiii. fol. 107. b
Ex ingressu auium & uolatu differentie. Atque
ex ualitudine moribzque. Authores. Aristo
teles in histor. animalium. De partibz anima
lium. Plinius. cap. cxxiii. ibidem.
Eorum quae in auibus alimenti medicamentue
rationem obtinent, discrimina. Ex authori
bus Galeno De aliment. De tenui uictus ra
tione. De cib. bo. malique succi. De Sanitate
tuenda. De simplic. medic. De ratione uictus
in morb. acutis. In methodo medendi. Dio
scoride. Plinio. Paulo Aegineta. c. cxxv. f. 108

FIDIPEDES.

- De auium generibus quae fissos habent pedes. Et
primo de Gallinaceo genere. Authores. Ari
stoteles in histor. animalium. De partibz ani
malium. De generatione animaliu. Plinius.
Columella. M. Varro. Palladius. Dioscorti
des. Galenus De aliment. De cib. bo. malique
succi. De simplic. medic. facultat. Oribasius.
Aetius. cap. cxxvi. fol. 109. b
De Gallinis Rusticis. Africanis. Meleagridae, &
Pauone. Authores. Aristoteles in histor. ani
malium. De animalium incesso. M. Varro.
Columella. Plinius. Athenaeus. Palladius.
Oppianus de Venatione. Galenus De alimen
to. facultat. Aelianus. cap. cxxvii. fol. 112.
De Columbaceo genere. Authores. Aristoteles
in histor. animalium. De partibus animaliu.
De generat. animaliu. L. Columella. M. Var
ro. Palladius. Plinius. Athenaeus. Dioscorti
des. Galenus De tenui uictustatione. De cib.
bo. malique succi. De simplic. medic. De atra
bile. cap. cxxviii. fol. 113.
De Palumbe. Oenade. Peliade. & Turture. Ex
authoribus Aristotele in histor. animalium.
De generatione animaliu. Alexandro Myri
dio. Athenaeo. Dioscoride. Plinio. Galeno.
De aliment. De tenui uictus ratione. Oriba
sio. Aeliano. Martiale. cap. cxxix. fol. 114.
De Phasiana. Tetrace. Erythrotaone. Otide. &
Oto. Authores. Aristoteles in histor. anima

- lium. Plinius. Athenęus. Strabo. Galenus De alimentis. & De tenui uictus ratione. cap. cxxx. fol. 115.
- De Coturnice. Perdice. Galerita, & aliis id genus quibusdam terrenis grauioribusque. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. Plinio. Athenęo. M. Varrone. Ouidio in Metamorph. Solino. Strabone. Dioscoride. Galeno De aliment. De cib. bo. malig. succi. De tenui uictus ratione. De simplic. medic. Orbasio. Actio. Iul. Polluce. Aeliano. Vergilio in Georgic. Suida. cap. cxxxi. fol. 116.
- De Turdorum Merularumque generibus, & aliis quibusdam que cum his similitudine quadam iunguntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. M. Varro. Columella. Plinius. Athenęus. Dioscorides. Galenus De aliment. De tenui uictus rati. De simplic. medic. Pausanias. Aelianus. cap. cxxxii. fol. 117. b

AVES CARNIVORAE.

- De Aquilarum generibus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Generatione animalium. Plinius. Aelianus. Galenus De usu partium. De simplic. medic. faculrat. Pausanias. cap. cxxxiii. fol. 118. b
- De Accipitrum generibus. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. Ouidio in Metamorph. Plinio. Strabone. Galeno De usu partium. De simplic. medic. Oppiano De uenatione. Columella. cap. cxxxiiii. fol. 120.
- De Cuculo. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Generatione animalium. Plinius. cap. cxxxv. fol. 121.
- De Nocturnis Auibus, que uniūgues sunt. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Aristophanes. Ouidius in Metamorph. Athenęus. Aelianus cxxxvi. fol. 122.
- De Hirundinum generibus. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Ouidio in Metamorph. Columella. Vergilio in Georgic. Aeliano. Galeno. De simplic. medic. De cōpositione medicamentorum per loca. Paulo Aegineta. Actio. cap. cxxxvii. fol. 123.
- De Coruino genere. I. Coruo. Cornice. & Monedula. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De admirando auditu. Plinius. Apuleius. Athenęus. Lucretius. Ouidius in Fastis. & in Metamorph. Oppianus de Venatione. Vergilius in Georgic. Cicero de Diuinatione. & Hesichius. Suidas. ca. cxxxviii.
- De Pico Martio. Psittaco. Pica. & quibusdam id genus aliis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinius. Solinus. Aelianus. Ouidius in Metamorph. cap. cxxxix. fol. 124.
- De aliis quibusdam auibus, que uictus causa arbores & ligna feriunt contunduntque. Ex Aristotele in histor. animalium. Aeliano & Plinio. cap. cxi. fol. 126.
- De iis auiculis que maxima ex parte uermiculis aliisque id genus animalculis uiuunt. *σκαλανεφίς* dicuntur. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. De longitudine & breuitate uitę. Plinio. Actio. Athenęo. c. cxlii. b.

AQUATICAE VOLACES.

- De Auibus que circa aquam uictitat. Primo De uolacibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Athenęus. Herodotus. Actius. Galenus De simplic. medic. Aristophanes. Aelianus. cap. cxliii. fol. 128.
- De Laro. Charadrio. Fulica. Aethya & Catarta. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. Plinio. Athenęo. Aristophane. Heliodoro. Cicero De Diuinatione. Arato. Vergilio. Nicandro. Lucretio. Ouidio in Metamorph. Suida. cap. cxliiii. fol. 129. b
- De Elorio. Crece. Ortigometra & Glotide. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Athenęus. Aristophanes. Herodotus. Suidas. cap. cxlv. fol. 130. b
- De Ardeolarum generibus. De Porphyrione, & Hematopode. Ex Authoribus. Aristotele in histor. animalium. De animalium incessu. Plinio. Ouidio in Metamorph. Arato. Athenęo. Aeliano. cap. cxlvi. ibid.
- De Grue. Plataea. Ciconia, & Ibide. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Cicero De natura Deorum. Aristophanes. Galenus De Aliment. facul. Solinus. Strabo. Herodotus. Aelian. cap. cxlvii. fol. 131

Aquaticę aues grauiores.

- De Aquaticis grauioribus, que omnes palmitibus sunt. De Anserum generibus. De Olore & Onocrotalo. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. Plinio. Columella. M. Varrone. Galeno De Aliment. De cib. bo. malig. succi. De simplic. medic. Dioscoride. Michael Setho.

CAPITA X LIBRORVM

le Setho . Aeliano. Ouidio in Metamorpho.
D . Hieronymo in Sophoniam . Solino .
cap.cxlvi.
De Anasino genere.& aliis quæ Anatibus simi-
les sunt.Ex authoribus . Aristotele in histor.
animalium.Plinio . Athenæo.Galeno De ali-
mēt.M.Varrone & Columel.ca.cxliv.f.133.b
De Coruis aquatilibus.Ex Aristotele in histor.
animalium.& Plinio . c.cl.fol.134.
De Brintho & Vpupa.Ex authoribus. Aristote-
le in histor.animalium.Plinio.Ouidio in Me-
tamorph.Pausania.Aelianus . cap.cli.ibid.
De Aibus partim peregrinis, partim mōstro-
sis. Authores.Aristoteles in histor. animalū.
Plinius. Solinus . Galenus De locis affectis.
Plutarchus . D Ambrosius in Hexahemer .
Ouidius in Fastis . & in Metamorph . Clau-
dianus . Aelianus . Pausanias . Lactantius .
cap.clii. ibidem.
De Struthiocamelo . Ex authoribus. Aristotele
in histor.animalium. De partib. animalium.
De Generatione animalium. Diodoro Siculo.
Plinio.Strabone.Galeno De aliment. De
cib.bo.malique succi. Aetio. c.cliii.fol.136.

Liber octauus continet quæ in sangui-
ne præditis sunt aquatilia : quæ scilicet
in aqua uictum querunt & in a-
qua quoque pariunt: uidelicet pisciū
& Cetorum genera.

DE Piscibus & eorum partibus exteriori-
bus.Ex authoribus.Aristotele in historia
animalium.De partibus animalium. De
Generatione animalium . De animalū in-
cessu . De Respiratione. Plinio . Galeno De
usu partium. cap.cliiii.fol.136.b
De Piscium interioribus partibus.Ex Aristote-
le in histor.animalium. De partibus anima-
lium.De Generatione animalium.De Respi-
ratione.Oppiano De pisc. cap.clv.fol.137.b
De Sexus discrimine in piscibus . Deq; eorum
coitu & aliis quæ ad generationē pertinent.
Ex Aristotele in histor. animalium. De par-
tibus animalū . De Generatione animalū.
Plinio.Oppiano De piscip.cap.clv.fol.138.b
De Ratione uictus piscium . Author Aristote-
les in historia animalium . De partibus ani-
malium. cap.clvii.fol.140.
Quod loca mutant pisces uarie atque latent.
Ex Aristotele in historia animalium . & Plinio .
cap.clviii.fol.140.b
De Coloris mutatione in piscibus uocæque &
somo . Ex Aristotele in histor. animalium

cap.clix. ibidem.
De Valetudinis piscium Differentiis, tum ex lo-
cis,tum ex temporibus . Ex authoribus Ari-
stotele in histor. animalium. Columella. &
Plinio. cap.clix.fol.141.
In Alimentis medicamentisque ratione piscium
discrimina . Authores. Galenus Lib. De ali-
ment.De cib.bo.malique succi.In Methodo
medēdi.Oribasius.Paulus Aegineta. Aetius.
Athenæus, cap.clxii.fol.141.b

Chartilaginei Pisces. & Plani.

De Chartilagineis piscib. Authores. Aristote-
les in histor.animalium . De partib. anima-
lium. De Generatione animalium . Plinius.
Galenus De aliment.facultatib. De tenui ui-
ctus ratione.De Sanitate tuenda.Athenæus.
cap.clxii. fol.143.
De Planis piscibus Chartilagineis . Authores.
Aristoteles in histor. animalium. De partib.
animalium. De Generatione animalium . Plinius.
Athenæus.Galenus De aliment. De tenui
uictus ratione.De simplic.medicament. Oppianus
De piscib.Dioscorides. Nicander
in Theriac. Paulus Aeginetes. Aelianus. O-
uidius in Halieuticis. cap.clxiii.fol.144.
De Chartilagineis oblongis . ut de Galeis ex iis
quæ γαλατταῖς dicuntur. Authores. Aristote-
les in histor.animalium. Plinius.Oppianus
De piscib. Athenæus. Strabo.Galenus. De ali-
mentor. facultat. Oribasius . Theophrastus
in plantarum historia. Pausanias . Aelianus.
Herodotus. Columel . Apuleius. Ausonius.
cap.clxiii. fol.146.
De Piscib. Longis . Ex Aristotele in histor. ani-
malium. cap.clxv.fol.147.
De Murena. Anguilla . & aliis quibusdam lon-
gis. Authores. Aristoteles in histor. anima-
lium. De partib. animalium. De animalium
incessu. Plinius. Athenæus . Ouidius in Ha-
lieutic. Oppianus De piscib. Galenus De Ali-
ment. De cib.bo.malique succi. De tenui ui-
ctus ratione. Columella . Nicander in The-
riac . Macrobius . Oribasius . Aelianus.
cap.clxvi. fol.147.b
De planis piscib. qui γαλατταῖς dicuntur , id est
qui passerina sunt specie. Authores. Aristote-
les in histor. animalium. De animalium in-
cessu. Plinius . Columella. Athenæus. Gale-
nus De alimēt. De tenui uictus ratione. De
cib.bo. malique succi. Oribasius . Oppianus
De piscib. Aelianus . Ouidius in Halieutic.
cap.clxvii. fol.150.

SAXATILES.

CAPITA X LIBRORVM

- De piscibus quibuscūq; litoralibus saxatilibūque.
De Scaro. Ex authoribus Aristotele in histo.
animaliū. De partib. animalū. Plinio. Gale-
no De aliment. Oribasio. Athenæo. Oppia-
no De piscib. Columella. cap. clxxviii. fo. 151.
- De Mullo. Coccyge. & aliis quibuscūq; similibus.
Authores. Aristoteles in histor. animalū. De
Generatione animalū. Oppianus De piscib.
Athenæus. Plinius. Dioscorides. Ovidius in
Haliëutic. Columella. Galenus De aliment.
Oribasius. Strabo. Aelianus. ca. clxix. fo. 151. b
- De Synodōte. Synagri. Charace. Chromi. & Cā-
charo. Ex authorib. Aristotele in histor. ani-
malū. Plinio. Athenæo. Galeno De potētis
Naturalib. De alimēt. Oribasio. Oppiano De
pisc. Aeliano. Ouidio ī Haliëuti. c. clxx. f. 153. b
- De Anthiarū generibus. Authores. Aristoteles
in histor. animalū. Oppianus De piscib. A-
thenæus. Plinius. Ovidius in Haliëutic. Gale-
nus De usū partū. Oribasius. Paulus Aegine-
tia. Columel. Hefychi². Aelian². c. clxxi. f. 154.
- De Lupo & Afellis. Ex authorib. Aristotele in
histor. animalium. Plinio. Columella. Athe-
næo. Oppiano De pisc. Ouidio in Haliëutic.
Plutarcho. Galeno De alimēt. De cib. bo. ma-
lique succi. De tenui uiēt² ratione. Oribasio.
Aeliano. Apuleio ī Apolog. Varrone De lin-
gua Latina. cap. clxxii. fo. 155.
- De Vmbra. & Glauco. Authores. Aristoteles in
histor. animalū. Plinius. Athenæus. Galenus
De aliment. Oribasius. Oppianus De piscib.
Ausonius. Ouidius ī Haliëutic. c. clxxiii. f. 156
- De Sparo. & Aurata. Authores. Aristoteles in hi-
stor. animalū. Plinius. Oribasius. Athenæus.
Oppian² De pisc. Columella. c. clxxiii. f. 156. b
- De Turdo. Merula. & aliis quibuscūq; saxatilib².
Authores. Aristoteles in histor. animalū. Ga-
lenus De aliment. De potētis Naturalib. Pli-
nius. Athenæus. Ovidius in Haliëutic. Op-
pianus De piscib. Oribasius. Columella. Au-
sōnius. cap. clxxv. ibid.
- De Melanuro. Coracino. & aliis quibuscūq;. Au-
thores. Aristoteles in histor. animalū. Colu-
mella. Plinius. Oppianus De pisc. Athenæus.
Galenus De alimēt. Oribasi². c. clxxvi. f. 157. b
- De Exocæto & Cordulo. Authores. Aristote-
les in histo. animalū. De partib. animalium.
De Respiratione. Plinius. Athenæus. Oppia-
nus De piscib. cap. clxxvii. fo. 158.
- De Dracone marino. & Scorpione. Authores.
Aristoteles in histor. animalū. Plinius. Op-
pianus De piscib. Aelianus. Dioscorides. A-
thenæus. Galenus De aliment. De tenui ui-
ēt² ratione. Oribasius. Paulus Aegineta. cap. clxxviii. fo. 158. b
- De Mugilum generibus. Authores. Aristoteles
in histor. animalium. De partib. animalium.
De Generatione animalium. De animalium
incessu. Oppianus De piscib. Athenæus. Pli-
nius. Strabo. Oribasius. Galenus De aliment.
De cib. bo. malique succi. Pausanias. Auso-
nius. cap. clxxx. fo. 159.
- De Dasquillo. Salpa. & quibuscūq; aliis. Autho-
res. Aristoteles in histor. animalū. Plinius.
Oppianus De piscib. Athenæus. Oribasius.
Columella. cap. clxxx. fo. 160. b
- De Gobione. Authores. Aristoteles in histor. a-
nimalium. Oppianus De piscib. Athenæus.
Ovidius in Haliëutic. Galenus De aliment.
De cib. bo. malique succi. Aelianus. Diosco-
rides. Plinius. cap. clxxxi. ibid.
- De Apuarū generibus. & similibus quibuscūq; a-
liis. Authores. Aristoteles in histo. animalū.
Plinius. Athenæus. Oppianus De pisc. Oriba-
sius. Iul. Pollux. Aelianus. cap. clxxxii. fo. 161.
- De Trichide. Thrissa. & similibus quibuscūq; a-
liis. Authores. Aristoteles in histo. animalū.
De Generatione animalium. Plinius. Athe-
næus. Oppianus De pisc. Strabo. Apuleius in
Apolog. Columella. Galenus De aliment.
Suidas. cap. clxxxiii. fo. 162.
- De Halecula. Meua. Smaride. & Boce. Autho-
res. Aristoteles in histo. animalium. Plinius.
Athenæus. Columella. Oppianus De piscib.
Dioscorides. Galenus De simplic. medic. O-
ribasius. cap. clxxxiii. fo. 162. b
- De aliis quibuscūq; piscibus qui uocales dicun-
tur. Authores. Aristoteles in histor. anima-
lium. Plinius. Pausanias. Athenæus. Strabo.
cap. clxxxv. fo. 163.
- De Thynno. Thymnide. Pelamide. & huiusce
generis aliis. Ex authorib. Aristotele ī histor.
animalium. Plinio. Athenæo. Oribasio. Op-
piano De pisc. Strabone. Ouidio ī Haliëutic.
Galenus De Sanitate tuenda. De aliment. De
cibo. bo. malique succi. De simplic. medica.
Dioscoride. cap. clxxxvi. fo. 163. b
- De Sallamētus. Ex authoribus. Plinio. Columel-
la. Dioscoride. Galeno De aliment. De sim-
plic. medic. Athenæus. Oribasius. Aetius.
cap. clxxxvii. fo. 165. b
- De Scombro. Colia. Amia. & aliis quibuscūq; qui
sale seruantur. Ex authoribus. Aristotele in
histor. animalū. Plinio. Galeno De alimēt.
Oribasio. Aetio. Athenæo. Oppiano De pi-
scib. Aeliano. Columella. Cornel. Celfo.
cap. clxxxviii. fo. 166. b
- De prægrandibus aliis quibuscūq; piscib. quo-
rum

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

rū nōnullos etiā *177. Ate*, id est cetaccos vocat quiddā. Ex authorib. Aristotele in histo. animalū. Strabone. Plinio. Plutarcho. Oppiano De pisc. Athenęo. Orisasio. Aufonio. Dioscoride. Galeno De simpl. medic. Paulo Aegineta. Herodoro. Aeliano. ca. clxxxix. f. 167. De aliis quibuscūq. fluuatilibus & lacustribus piscib. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalū. De partib. animalium. Plinio. Plutarcho De fluminibus. Aufonio. Aeliano. Athenz. Oppiano De piscib. cap. cxc. fol. 169. De Niloticis piscib. & aliis quibuscūq. ignotis. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalū. Plinio. Strabone. Athenęo. Oppiano De piscib. Onidio in Halieutic. Paulo Aegineta. Iul. Polluce. Aeliano. cap. cxxi. fo. 170. De Piscibus mira. Ex authoribus. Aristotele De Respiratione. Theophrasto De piscibus. Plinio. Athenęo. Columella. Philostrato in uita Apollonij. Aeliano. cap. cxcii. fo. 170. b

C E T E.

De Cetis. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De Respiratione. Plinio. Oppiano De piscib. Galeno De Alimēt. De Sanitate tuēda. c. xcii. f. 171. De Delphino & Phocęna. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De piscib. Ouidius in Metamorph. Aelianus. cap. cxciii. fo. 171. b. De Balena. Orca. & Phycetere. Ex authoribus. Plinio. Oppiano De Pisc. Strabone. Festo P6peio. Solino. cap. cxcv. fo. 172. b. De Aliis quibuscūq. marinis beluis. Ex authorib. Aristotele in histo. animalū. Plinio. Oppiano De pisc. Ouidio in Metamorpho. Pausania. Aeliano. Vergilio in Aeneide. c. xcvi. f. 173. Liber nonus continet animalium Exanguium Differentias: & priuatim, insectorum.

DE Animalibus Exanguibus. Ex Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De animalium ingressu. & Columella. cap. cxcvii. fo. 173. b. De insectis & eorum partibus exterioribus. Ex Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De animalium ingressu. De sensu & sens. Plinio. cap. cxcviii. fol. 175. De Partibus Insectorū interioribus. Ex Aristotele in histo. animalū. De Partibus animalium. De Generatione animalium. & Plinio. cap. cxcix. fol. 175. b. De Insectorum generatione & intentu. Ex Ari-

stotele in histo. animalium. & De Generatione animalium. cap. cc. fo. 176. De Viscu Insectorum. Voce. Valentinęque. & aliis quibuscūq. affectibus. Ex Aristotele in histo. animalium. & De partib. animalium. cap. cci. fo. 177. De Insectorum generibus quę fauos sibi extruunt. ut De Apibus. atque id genus aliis. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. Columella. Vergilius i Georg. c. ccii. f. 177. b. Ratio operis & uita Apū. Authores. Aristoteles in histo. animalū. Plinius. M. Varro. Dioscorides. Columella. cap. ccii. fo. 179. De Generatione Apum. Ex Aristotele in histo. animalium. De Generatione animalium & Plinio. cap. cciii. fo. 180. b. De Morbis Apum & iis quę alias inimica sunt apibus. Ex authoribus Aristotele in histo. animalium. Plinio. Columella. Vergilio in Georgic. cap. ccv. fo. 181. De Melle. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Plinio. Seneca. in Lib. Epistol. Dioscoride. Galeno De Naturalib. potētis. De alimēt. De sanitat. tuēda. In Methodo Medendi. De Antidot. M. Varrone. L. Columella. Palladio. cap. ccvi. fo. 181. De Cera & Propoli. Ex authorib. Plinio. Dioscoride. & Galeno. De simplic. medic. facultat. cap. ccvii. fo. 183. De Vespis. Crabronibus. & Teuthredone. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. cap. ccviii. fo. 183. De Sirene. Bombylio. & Bombycio. Authores Aristoteles in histo. animalium. Nicāder in Theriac. Plinius. cccix. fo. 184. De Formicis & Scorpionibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De sensu & sens. Plinius. Solinus. Galenus De simplic. medic. Nicāder. Ouidius in Metamorph. Pausanias. Strabo. Dioscorides. Suidas. Aelianus. cap. ccc. fo. 185. De Araneis & Phalangijs. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Actius. Paulus Aeginetes. Nicāder in Theriac. Dioscorides. cap. cccxi. fo. 186. De Scolopēdra, & aliis quę multipedē dicuntur. Ex authoribus. Aristotele in historia animalū. De partibus animalū. De Respiratione. Nicādro in Theriac. Plinio. Dioscoride. Oppiano. De pisc. Paulo Aegineta. Galeno De

CAPITA X LIBRORVM

simplic. medic. Aelianus. cap. ccxii. fo. 188
 De iis quæ promiscuè & ueluti aculeum in ore gerūt. Vt de Muscis & Culicibus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinius. Columella. Vergilius in Georg. Strabo. Theophrastus in plantarum histor. Suidas. Aristophanes. Aelianus. cap. ccxiii. fo. 189
 De Cicadis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Respiratione. Plinius. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Athenæus. Aelianus. cap. ccxiii. fo. 190
 De Locustis. Ex authoribus. Aristotele In historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Aeliano. Dioscoride. Mose in Leuitic. cap. ccxv. fo. 190
 De Vaginipennibus, quæ græci περιπτερες uocant. Ex Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. de animalium ingressu. De Respiratione. Theophrasto De causis plantarum. Plinio. Dioscoride. Galeno De simplic. medicam. Nicandro. cap. ccxvi. fo. 191
 De Erucis, & iis quæ ex iis gignuntur, ut papilionum generibus. Et de pennatis quibusdā aliis quæ ex uermibus gignuntur. Ex authoribus Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Ouidio in Metamorphosi. Dioscoride. Nicandro in Theriac. cap. ccxvii. fo. 193
 De Bestiolis quibusdā quæ in lignis aut arboribus nascuntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Theophrastus in Plantarū histor. De causis plantarum. Plinius. Plautus in Castellaria. Columella. Strabo. Suetonius in Sergio Galba. cap. ccxviii. fo. 193
 De nonnullis quæ in aliis stirpibus aut fructibus creantur bestiolis. Authores. Theophrastus in histor. plantarum. De Causis plantarum. Plinius. M. Varro. Palladius. Paufanias. Phociō Grammaticus. cap. ccxix. fo. 194
 De Bestiolis quibusdā quæ in igne, niue, aut terra ipsa gignuntur. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De animalium incessu. De Generatione animalium. Plinio. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. Athenæo. Aeliano. cap. ccxx. fo. 195
 De Bestiolis quibusdā quæ intra aut eorum partes generantur. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. Plinio. Galeno in Commentariis in Aphorism. In Methodo medendi. Ex lib. qui Introductorius inscribitur. Aetio. Paulo Aegineta. Columella. cap. ccxxi. fo. 195

De iis quæ carnis uiuæ humore aluntur. Vt Pulice. Pediculo. Ricino, & similibus. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinio. Q. Sereno. Galeno De compositione medic. per loca. De simplic. medica. Dioscoride. Paulo Aegineta. c. ccxxii. fo. 196
 De Blattis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. cap. ccxxiii. fo. 197

Liber decimus continet Exanguium Aquatilium Differentias, scilicet Mollium, Crustaceorū, & Testatorū quæ Zoophyta appellantur: quæ & à nonnullis pisces uocantur.

MOLLIA.

DE iis quæ Mollia dicuntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De Respiratione. Galenus De Aliment. De cib. bo. malique fucci. Oribasius. Athenæus. cap. ccxxiii. fo. 198
 De Polypo. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Oppiano De pisc. & de Venatione. Athenæo. Iul. Polluce. & Oribasio. cap. ccxxv. fo. 199
 De Sepia. Ex Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinio. Athenæo. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. facultat. Paul. Aegineta. cap. ccxxvi. fo. 201
 De Lolligine & Lollio. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinius. Oppianus De pisc. Athenæus. cap. ccxxvii. fo. 202
 De Lepore marino. Ex authoribus. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. facultat. Aetio. Plinio. Nicandro in Alexipharmac. Apuleio in Apolog. Athenæo. Aeliano. cap. ccxxviii. fo. 202.

CRVSTAT A.

De Crustatis. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De Respiratione. Galeno De Aliment. Plinio. Athenæo. Oribasio. Aetio. cap. ccxxix. fo. 203
 De Locustis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De animalium incessu. De Generatione animalium. Athenæus

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

Athenæus . Plinius . Oppianus De pisci.
cap.cccxxx. fol.204
De Aftaco siue Cammaro . Ex Aristotele in histo-
ria animalium . De partib . animalium.
cap.cccxxxi. fol.205
De Cancrorum generibus . Authores.Aristotele
les in historia animalium.De partib . anima-
lium.De animalium ingressu . Plinius . Op-
pianus de piscib . Athenæus . Dioscorides . Ga-
lenus De cib.bo. malique succi . De simplic.
medic . Paulus Aegineta . Actius . Aelianus .
cap.cccxxxii. fol.205.b
De Squillarum generibus . Et Camaro . Leone .
& Arcto.Ex authoribus . Aristotele in histor.
animalium . De partibus animalium . Plinio .
Athenæo . Aeliano . cap.cccxxxiii. fol.206.b

TESTATA.

De Testaceis . Authores . Aristoteles in histor.a-
nimaliũ . De partib . animalium . De anima-
lium ingressu . De Generatione animalium .
Galenus De Alimentis . De cib . bo.malique
succi . De tenui uictus ratione . De sanitate
tuenda . Oribasius . Plinius . Athenæus .
cap.cccxxxiiii. fol.207.b
De Turbinatis . Author Aristoteles in histor.a-
nimaliũ . De partib . animalium . c.cccxxxv . f.210
De Cochleis . Ex authoribus . Aristotele in histo-
ria animalium . De partibus animalium . De
Generatione animalium . Plinio . Dioscori-
de . Oribasio . Athenæo . M.Varrone . Galeno
De cib.bo.malique succi . De Alimēt . De sim-
plic.medic . De compositione medic . per lo-
ca . Actio . Paulo Aegineta . Cornelio . Celso .
Cicerone De Diuinatione . Strabone .
ca.cccxxvi. fol.210.
De Muricum generibus . ut Purpura . Buccino .
& reliquis . Authores . Aristoteles in historia
animalium . De Generatione animalium . Pli-
nius . Athenæus . Dioscorides . Strabo . Gale-
nus De Aliment . De cib.bo. malique succi .
De simplic.medic . Oribasius . Paulus Aegine-
tes . Ouidius i Metamorph . ca.cccxxvii . f.212
De Strabelo . & Nerite . Ex authoribus . Aristote-
le i histor.animaliũ . De partib . animalium . Pli-
nio . Aeliano & Athenæo . ca.cccxxviii . f.213
De Echinis . Ex authoribus . Aristotele in histor.
animalium . De partib . animalium . De Gene-
ratione animalium . Plinio . Dioscoride . Gale-
no De Aliment . De simplic . medicamen .
cap.cccxxix. fol.213
De Balano . Authores . Aristoteles in histor.ani-
malium . Plinius . Athenæus . Galenus . De Ali-
ment . Onbasius . cap.ccxli . fo.214.

De Vniualibus . ut De Lepade . & Aure mari-
na . Ex authorib . Aristotele in histor. anima-
lium . De partib . animalium . Athenæo . Ori-
basio . cap.ccxli . fol.214
De Bialuib . Et primo De Ostreis . Authores .
Aristoteles in histor.animalium . De Genera-
tione animalium . Plinius . Athenæus . Oriba-
sius . Corn . Celsus . Galenus De Aliment . De
cib.bo.malique succi . De simplic.medic . Pau-
lus Aegineta . cap.ccxlii . fo.214.b
De Chamis seu Conchis . Ex authoribus . Aristo-
tele in historia animalium . Dioscoride . Pli-
nio . Oribasio . Athenæo . Pomponio . Mela .
cap.ccxliii. fol.215
De Mitulis siue Musculis & Tellinis . Ex autho-
ribus . Aristotele in histor. animalium . De Ge-
neratione animalium . Corn . Celsus . Plauto .
Plinio . Dioscoride . Athenæo . Oribasio . Gale-
no De simplic.Medic . cap.ccxliiii . fol.215.b
De Pinna . Ex authoribus . Aristotele in historia
animaliũ . Plinio . Cicerone De natura Deo-
rum . Athenæo . Oribasio . Theophrasto De
Lapidibus . Solino . cap.ccxlv . fol.216
De Pectũculo . Authores . Aristoteles in histor.
animalium . De Generatione animalium . Pli-
nius . Athenæus . Oribasius . ca.ccxlvi . fo.216.b
De Dactylis siue unguibus & pernis . Ex autho-
ribus . Aristotele in histor.animaliũ . Plinio .
Athenæo . Oribasio . cap.ccxlvii . fol.217.

ZOOPHYTA.

De Zoophytis . Et primo De Tethyis Verticillis
ue . Authores . Aristoteles i histor. animalium .
De partib . animalium . De Generatione ani-
malium . Athenæus . Oribasius . Plinius .
cap.ccxlviii. fol.217.b
De Holothurio . Stella . & Pulmone marino . Au-
thores . Aristoteles in histor. animalium . De
partib . animalium . Plinius . Dioscorides . Op-
pianus De pisc . cap.ccxlix . fol.218
De Vrica . Ex authoribus . Aristotele in histor.
animalium . De partib . animalium . Plinio .
Athenæo . Galeno De simplic.medic . Oriba-
sio . cap.ccl . fol.218.
De Spongia . Authores . Aristoteles in histor.a-
nimalium . Dioscorides . Plinius . Oppianus
De piscib . Galenus De simplic.medic . facul-
tat . Paulus Aegineta . cap.ccli . fol.218.b
Epilogus . seu caput ultimum . Ex authoribus .
Aristotele in Histor.animalium . Plinio . A-
lexandro Aphrodisico in problemat . Iul.
Polluce . Galeno De Naturalib . facultat .
cap.cclii. fol.219.b

FINIS.

LOCORVM, QVAE IN HOC OPERE AB

Edoardo Vuottono uel citantur uel exponuntur, catalogus.



Aliani. 57. h. 55. g. 72. g.
75. b. 77. h. 81. b. g. 82. g.
99. a. 102. f. 115. c. 120. d.
e. 129. d. 131. b. 134. d. 150
c. h. 133. a. 155. b. 157. b.
161. a. 167. d. 169. a. b.
170. d. 172. c. h. 195. f. 202. f. 20. b. d.
Acti. 72. b. 93. c. f. 99. g. 100. a. c. g. 101.
c. f. 109. f. 117. g. 127. b. 187. g. g. 188. a. c. d.
Agatharfidia. 83. e.
Acharni. 160. e.
Achyli. 11. g. c. 133. c.
Aldi Menuti. 118. g.
Alex. Aphrodisi. 93. b.
Alex. Myndi. 77. f. 115. d. 116. a. 125. a.
127. e. 131. a. 133. e.
D. Ambrosij. 120. e. 169. a. b.
Amynta. 68. h. 69. b.
Andree. 147. g. 148. a. 200. e.
Andromachi. 114. b.
Androscriti. 216. f.
Anigoni. 128. f. 214. d.
Antoni Maf. 59. b. 197. e.
Appellu. 91. e.
Apti. 129. b.
Apollodori. 102. f. 351. a. 185. f. 186. a.
Apollonides. 95. d.
Appionis. 154. b. 163. e.
Apfiri. 85. e. 88. g.
Aptili. 87. c. 115. a. 129. f. 147. d. 152. g.
156. e. 162. f. 202. g.
Arati. 124. a. 129. g. h. 130. g. 133. b.
Arati Scholiaste. 124. a.
Archeoftrati. 144. c. 146. c. h. 150. a. 153. a.
155. h. 156. c. d. 157. h. 160. f. g. 162. a.
167. d. 168. h. 205. a.
Archelai. 50. h. 78. d.
Aristotelu fol. 4. g. 5. d. 6. a. c. g. h. 8. e. 11.
a. 13. a. 18. e. 19. c. g. 22. g. 26. f. 27. e. 31.
f. 34. e. g. 35. d. 36. h. 38. f. 45. g. 46. a. d.
f. 49. d. f. 50. b. 52. c. 54. a. 57. c. h. 58.
g. 59. c. 63. g. 64. c. 67. a. b. 73. b. d. 79.
d. h. 80. b. 81. a. b. 82. b. 84. g. 85. d. g.
86. g. 87. b. c. e. 91. d. g. 2. c. 94. a. 95.
c. 97. a. 99. d. 100. d. e. 101. d. 103. b.
106. g. h. 112. a. g. 114. d. g. 115. b. 116. f.
g. 117. g. 118. g. 120. d. e. h. 121. e. 123.
a. 124. a. h. 126. d. e. 127. g. h. 128. f. 129.
d. 130. d. 132. b. e. 133. c. 135. d. 136. a. g.
138. e. 139. g. 140. a. 142. d. 143. a. c. 144.
c. g. 145. b. h. 146. a. 147. d. f. g. 148. f. h.
150. a. f. 151. a. b. d. e. g. 152. h. 153. a. e.
154. b. d. 155. a. b. d. g. 156. c. 157. e. 158.
a. f. g. 159. a. b. c. 160. d. 161. a. f. 162. b.
f. 163. e. g. h. 164. a. 165. c. e. 167. a. c. h.
168. d. 169. b. 170. f. 171. e. h. 173. a. e.
175. h. 176. c. 177. d. h. 178. c. e. g. 179.
d. f. h. 180. d. e. h. 181. d. 184. f. h. 185. a.
c. 187. b. 188. a. 189. a. g. 190. a. g. 192.
b. e. c. h. 195. c. 199. d. g. 200. f. 201. b.

202. e. 203. b. f. 204. b. h. 205. e. 206. b.
208. h. 211. h. 212. e. 213. a. 214. d. 215. e.
216. g. 217. b. 218. b. d. 220. a.
Aristotelu interpres Arabicus. 127. e.
Aristotelu netus interpres. 98. d. 112. a.
117. g. 126. c. 151. e.
Aristoboli. 162. d.
Aristophanis. 111. h. 126. e. 130. d. 133. h.
134. d. 158. c. 190. a. 200. a.
Aristophanis interpres. 125. c. 132. e. 133.
c. 191. f.
Aristophanu Byzanti. 163. b.
Arriani. 65. e. 92. d. 98. d. f. 130. d. 134. a.
Aniani. 153. a.
Artemidori. 102. a. 159. f. 162. b.
Asclepiadi. 9. g. 124. b.
Athena. 113. b. 114. d. h. 115. h. 117. f. g. 123.
a. 124. h. 126. h. 128. a. 130. d. 131. c. 143.
h. 150. a. h. 151. b. e. g. 152. a. e. 153. e. 154.
b. c. f. 156. a. c. 157. e. f. 158. b. c. f. 159. a.
160. d. g. 162. f. 163. f. g. 164. c. 165. e. d.
e. 167. f. g. h. 169. a. b. 170. b. d. 190. g.
199. d. 201. b. 205. e. 207. b. d. 211. f. h.
212. a. 203. a. c. 214. b. d. e. f. 215. h. 216.
b. g.
Attali. 164. f.
Aufoni. 147. a. 156. d. 157. d. 160. c. h. 162.
d. 168. d. 169. b. d. e. g.
D. Bassili Magni. 97. f.
Blondi. 115. g. 117. f. 157. b.
Boeti. 119. e.
Calliphani. 50. b.
Callimachi. 124. d.
Catonu. 166. f.
Charu Mitylenaei. 216. f.
Chrysippi. 161. h. 219. g.
Claudiani. 136. a.
Clearchi. 124. h. 162. a.
Clyarchi. 131. e. 135. f. 191. e.
Clytus. 111. d. e.
Colomelle. 41. c. 44. b. c. 45. d. 59. c. 60. d.
61. b. 69. g. h. 76. b. d. 79. d. 181. e. 189.
b. 194. b. g. 196. c. 197. g. d. 205. a. 207.
d. 224. b. 225. f.
Corneli Celsi. 4. f. g. 1. a. b. d. 6. d. f. h. 7. a.
d. e. 11. g. 12. f. 16. a. b. c. 29. f. 30. b. c. e.
99. e. f. 112. a. 129. d. 148. b. 167. f. d.
Corneli Nepoti. 131. f. 135. e.
Ciceroni. 5. d. 11. g. 18. c. 26. b. 24. h. 28. a.
124. g. 129. g. 185. d. 194. b. 212. a. 215. f.
Constantini Caesaris. 44. b. 225. e.
Crans Bergamensis. 72. a.
Cremuti. 134. e.
Cresci Gaudi. 50. b. 70. h. 83. e. 88. f. 98.
f. 149. g. 171. a.
Demosirii. 48. e. 187. a. 195. e.

Dineis. 135. b.
Dieclu. 36. f. 62. g. 153. b. 161. b. 166. f.
199. d.
Diodori Siculi. 58. g. 101. f. 196. e. 197. f.
Dionysij. 89. a.
Dioscoridi. 20. a. 40. e. g. 41. e. g. 42. e.
43. f. h. 44. a. b. c. d. e. f. 47. g. 51. g.
69. g. 70. c. 75. e. 77. a. c. 80. f. 84. f.
91. a. b. 93. f. g. h. 94. c. e. 99. g. h. 100.
e. 109. f. 111. e. 112. b. 117. d. 124. b. 130.
a. 145. a. 151. c. h. 164. h. 166. f. 199. e.
179. e. 182. h. 183. c. d. 187. b. 188. d. b.
189. a. f. 190. f. 192. c. f. h. 195. e. 196. a.
197. e. 201. h. 202. b. f. h. 211. f. 112. g.
215. e. h. 216. c. 219. a. e. f. 220. a.
Diphili. 142. d. 144. c. 145. d. 148. e. 149.
a. 150. b. 152. b. 154. f. 156. b. f. 157.
c. 160. d. 161. d. 164. b. 165. a. b. f. 165.
b. d. h. 166. a. b. g. 167. a. 200. h. 201.
a. 202. h. 203. b. 205. a. 215. e. d.
216. f. 218. f.
Dionysii. 147. f. 151. a. 154. e. 155. h. 158.
c. 160. d. 161. f. 162. b. c. 165. a. d. 167.
e. 169. g. 170. b.
E. 147. d. 151. g. 155. e. 162. f.
Epenei. 111. d.
Epicharmi. 127. c. 152. f. 153. g. 156. b.
158. c. h. 161. c. 220. a.
Ephippi. 159. a.
Eraphrati. 10. b. 18. d. 101. b. e.
Esaie proph. interpres. 82. f.
Eudemi. 106. f.
Eudoxi. 50. e. 148. f.
Euphemi. 50. e.
Euphronii. 219. b.
Euphrasi. 129. f.
Euthydemii. 155. h. 156. c. 159. e. 160. d.
167. e.
F. 73. 172. h.
F. 73. 172. h.
F. 73. 172. h.
G. 73. 172. h.
Galenus. 1. a. d. 6. c. g. h. 7. a. e. 8. c. f. 9. g.
11. a. 12. f. 13. a. 16. a. b. 17. b. 18. e. h.
19. b. f. g. 20. a. 21. f. 22. g. 23. d. 25. g. 28.
g. 40. c. d. 42. e. 43. f. 44. a. b. 45.
g. 46. c. f. 47. c. 48. a. 49. h. 50. e. 7. b. 61.
f. 67. a. 69. g. 70. c. 77. a. c. 80. e.
97. e. 98. g. 99. f. 100. e. 101. g. 106.
g. 109. f. 111. c. 112. f. 114. e. 119. g.
h. 117. d. 124. b. 127. h. 128. h. 129. a.
130. a. 131. f. 132. h. 133. e. 145. c. 145. e.
h. 148. b. 150. a. c. d. e. f. 151. b. 152. c.
153. b. 155. f. 156. a. b. 157. a. f. 159.
h. 160. b. 161. a. 162. f. 164. h. 165. b.
h. 166. d. f. 167. d. 169. c. 172. d. g.
183. b. 185. e. 188. h. h. 189. a. 192. a. h.
194. f. 197. a. d. 201. a. b. 203. b.
206. f. 209. f. 211. e. h. 213. h. 214. h.
215. b. 220. a.

CATALOGVS.

XL

A. Gellij. 11. g. 110. d.
 Cullij. 63. a. 65. g. 70. h. 75. c. 81. b. g.
 207. d.
 Cratij. 60. f. h. 71. h. 87. e.
 H
 Hegefaudri. 153. b.
 Heliodori. 82. f. 112. g.
 Hermolai Barberi. 63. a. 69. b. 70. g. 81.
 a. 89. c. 91. g. 93. g. 100. c. d. e. 103. a. 112.
 a. 113. b. 117. g. h. 120. e. 124. b. 136. b.
 141. b. 143. b. 145. b. 146. c. 147. d. 163.
 c. d. 165. e. 166. f. 167. f. 168. a. g. 187. f.
 188. e. 191. e. 197. e. 198. h. 111. a. 113.
 a. h. 116. e. 120. a.
 Herodoti Halicarnassij. 50. a. 64. a. e. 91.
 d. 112. b. 136. a. 168. h. 169. b. c.
 Herodoti Heracleote. 63. g. 81. h. 90. h.
 213. d.
 Hierophili. 8. f. 112. a. 6. e.
 Hieronymi. 130. a. 134. a. 191. f.
 Hieronij. 47. g. 49. e. 81. a. 111. h.
 69. g.
 Hippocrati. 6. h. 12. b. 14. b. 15. b. 43. f.
 117. a. 181. e. 192. f. 193. b.
 Homeri. 5. d. e. 11. g. 16. a. 14. f. 49. g.
 119. e. 121. a. 122. h.
 Horatii Flacci. 108. g. 109. f. 113. e. 163. e.
 I
 Ia. Claymondi. 75. d. 95. f. 112. b. 130. d.
 180. e. 181. d.
 I Cefij. 145. e. 146. d. 148. b. e. 146. b. f. 158.
 h. 159. c. 161. b. 165. d. 166. e. 167. a.
 d. f. 215. e.
 Ioni. 15. b.
 Iphicrati. 77. h.
 Iphicij. 69. h.
 Isegoni. 49. g. 50. c.
 Isidori. 71. h. 100. h. 133. e. 171. e. 115. g.
 Isidori Cefarij. 71. a. 77. a.
 Isidori Pellicij. 4. g. 5. a. b. c. d. e. h. 8. h. 9.
 e. g. 11. a. b. c. 18. h. 44. h. 63. a. 67.
 c. 115. h. 116. h. 118. a. 131. f. 161. f. 171. e.
 100. e.
 Iuuenalij. 119. d. 107. d.
 L
 Labienij. 135.
 Labrij. 155. e.
 Lactantij. 9. h. 134. b. 135. a.
 Leonici. 100. a.
 Leonidij Syriacij. 170. h. 171. a. 196. h.
 Lucanij Manian. 153. e.
 Lippij. 158. e.
 T. Liuij. 82. f.
 Lucanij. 97. e. 98. e. 99. c. 100. e. 103. a.
 181. 192. h.
 Lucetij. 9. c. 113. b. 114. c. 124. e. 130. b.
 Lyneij Samij. 162. b.
 M
 L. Macri. 147. f. 102. h.
 Magou. 89. a.
 Maculij. 134. f. g.
 Marcellij Virgilij. 191. f. g.
 Martialis. 63. e. 75. d. 84. g. 92. g. 114. h.
 115. h. 117. a. c. 128. b. 128. a. 129. b. 130.
 a. f. 135. b. 156. g. 153. c. 205. e. 207. d.

Massenij. 145. h. 146. a. 147. c. d. 150. h. 151.
 b. 153. d.
 Massari. 40. e. 110. c.
 Martini Smyrni. 51. d.
 Megastheni. 50. a. b. e. 58. d. 65. e. 96. e.
 186. b.
 Menecrati. 177. h.
 Masfrij Pratenfij. 163. e.
 Mesfiohij Athenienfij. 141. a. 168. a.
 209. h.
 Masfij. 119. a.
 Masiani. 214. f.
 N
 Neodiz. 93. e.
 Nicandri. 69. f. h. 93. c. f. g. h. 98. a. 99. f.
 101. b. c. 102. g. h. 103. a. 130. d. 146. e.
 184. g. h. 185. g. 186. a. 187. d. g. 188. c.
 189. a. 191. e. 192. f. 193. c. h. 210. a.
 Nicandri Thetierani. 191. f.
 Nicandri interpretij. 94. f. 100. e.
 P. Nigidij. 69. a. 122. c. 135. e. 190. a. g.
 192. b.
 Nonij Marcellij. 136. b. 163. e.
 Numenij. 152. f. 158. f. 166. f. 170. h.
 195. f.
 O
 Onifcorij. 49. g.
 Oppianij. 57. h. 58. g. 65. g. 66. e. 69. h. 70.
 b. 75. b. c. 79. d. 81. b. 97. f. 100. d. 115.
 c. 136. d. 138. e. 144. g. 145. b. f. 146. a.
 147. c. d. 148. f. 149. a. b. 149. a. b. d.
 150. b. 151. e. 153. c. d. 154. a. b. d. 154.
 c. 155. h. 156. c. d. h. 157. a. b. c. f. 158. f.
 159. c. 160. g. 161. h. 162. c. 163. d. g.
 164. e. 165. c. c. 166. f. 167. h. 169. g.
 a. b. g. 173. a. e. f. 188. f. 199. g. 200. d. h.
 201. a. 202. b. 205. a. 206. f. 218. c. h.
 219. f.
 Oribafij. 109. f. 117. g. 150. c. 153. e. 156. b.
 161. h. 211. f. h. 212. g. 215. e.
 Ophulij. 51. d.
 Omelij. 7. a. 68. h. 97. g. 109. f. 117. g. 120.
 e. 122. e. 123. a. b. 125. b. h. 126. a. 128. g.
 130. b. f. 133. d. 134. f. 135. g. h. 136. a.
 147. e. f. h. 148. b. c. f. 149. b. g. 154. a. b.
 d. g. 155. b. c. 156. a. b. h. 157. f. 158. f.
 160. c. 163. g. 164. e. 165. c. 171. f. 172.
 e. 173. f. 185. h. 193. h. 200. c.
 P
 Palladij. 75. e. 83. b. 85. a. c. d. 86. d. 87. h.
 112. b. 116. a. 166. g. 183. a. 194. h.
 Pamphilij. 165. a. d.
 Parmenonij Rhodij. 157. h.
 Pauli Aeginete. 45. g. 69. h. 93. h. 99. g.
 100. e. 110. h. 169. e. 183. b. 191. e.
 Paulianis. 50. c. 57. h. 72. f. 71. d. 81. a. 90.
 h. 98. f. 100. h. 101. h. 103. a. 116. a. 135.
 g. 160. b. 163. e. f. 169. a. b. 173. d. 191.
 f. 211. h.
 Pelopij. 92. f.
 Penandrij. 98. f. 213. c.
 Phaeonij. 162. f.
 Philofophanij Cyrenenfij. 163. e.
 Philoftrati. 57. h. 88. e. 103. a.
 Philoftrati. 36. f. 142. c. 145. h. 148. h. 166. f.

Phocionij. 130. d. 195. b.
 Phomonei. 119. e.
 Phylou. 197. e.
 Pifandri Camirei. 135. f.
 Phibie. 154. d.
 Platonij. 16. 12. f. 44. f. 145. e.
 Plautij. 113. a. 151. b. 194. b. 219. g.
 Plinij. 4. e. f. 5. d. 6. a. c. e. h. 11. 312. f. 313.
 a. 16. c. d. 17. d. 16. c. 19. e. h. 20. a. 46.
 h. 34. e. f. 37. d. 38. h. 40. e. g. 41. c. d. 42.
 c. d. 43. f. 44. c. 45. e. 46. e. c. e. 48. b.
 49. d. f. g. h. 50. d. 56. d. f. 57. a. b.
 c. f. g. h. 58. g. 59. f. 61. g. 62. e. g. 64.
 a. b. 65. e. f. g. 67. a. c. 68. a. c. 69. g. h.
 70. h. 72. a. b. 73. d. 74. c. 75. c. f. g.
 77. g. 78. a. d. 79. d. h. 80. a. b. d. 81. g.
 h. 82. h. 83. a. 84. g. 85. e. 86. g. 87. h.
 c. 88. g. 89. c. 91. d. 92. c. e. f. 93. d. f.
 94. d. 96. f. h. 97. d. f. g. 98. b. f. g. 99.
 b. f. 100. e. 101. b. f. h. 102. h. 103. a. b.
 105. e. 106. b. h. 108. f. 109. d. f. 110. d.
 g. 111. c. d. e. h. 112. a. b. d. g. 113. b. d. e.
 114. f. 115. c. a. 117. d. h. 118. c. g. 119. e.
 h. 120. d. g. h. 121. e. 122. d. h. 123. c. e.
 h. 124. b. 125. d. 126. a. c. h. 127. e. f.
 128. a. d. f. h. 129. a. c. d. f. g. 130. a. d. 131.
 a. 132. d. 133. e. 135. d. e. h. 136. a. 138. e.
 140. h. 142. e. 145. a. f. 146. a. 147. c. d.
 f. 148. a. 149. g. 150. a. b. c. 150. f. g.
 151. b. d. e. g. 152. h. 153. b. d. e. h. 154.
 d. h. 155. a. b. e. g. 156. b. c. f. g. 157. a. g.
 158. a. b. c. 159. a. 160. c. e. 161. c. 165. a.
 b. 163. a. c. g. h. 164. a. b. g. 165. c. d. e.
 166. e. f. g. 167. a. c. h. 168. d. g. 169.
 c. h. 171. a. 172. a. e. g. h. 173. e. f. 175. f.
 176. a. 178. a. b. c. d. f. 179. d. g. h. 180.
 d. g. h. 181. a. c. g. 182. a. h. 183. a. c. d. e.
 184. b. d. e. f. h. 185. a. c. h. 186. e. 187. e.
 g. 188. a. h. e. g. 189. d. 190. a. f. g. 191. b.
 h. 192. a. c. f. h. 193. a. c. e. g. h. 194. c. f.
 h. 195. c. g. 197. a. b. c. d. 199. b. d. 200.
 a. e. f. g. h. 201. a. b. 202. b. f. 203. b.
 204. b. h. 205. a. e. 206. e. h. 207. e. c.
 209. b. c. 210. a. g. 211. f. g. h. 212. c. 213.
 a. c. e. f. h. 214. a. b. f. 215. a. c. g. h. 216. b. c. g.
 217. c. d. h. 218. a. c. d. g. 219. a. d. f.
 220. a.
 Plutarchij. 97. g. 115. e. 132. e.
 Polemonij. 131. b.
 Polij. 163. f.
 Praxagora. 36. f.
 Praxagorij. 44. c.
 Pifceppij. 152. f. g. 163. a. 167. g. 190. f.
 Pifthegore. 71. a.
 R
 Rajij. 114. d.
 Rucellij. 191. e.
 Ruffij. 31. f. 40. c. 78. f.
 S
 Santra. 135. e.
 Seneca. 113. c. 181. e.
 Serenij. 156. d.
 Serrij. 214. g.
 Serruj. 93. f.
 Soffij. 70. b. 86. f. 91. c. 94. d.

CATALOGVS.

Sehi.	109.f
Salm.	36.f.49.d.f.100.c.156.h.177.b.c.f.158. g.64.a.65.g.72.b.74.e.71.c.91.f.97. e.99.c.101.f.104.a.135.g.126.a.131.d. 136.a.b.150.c.171.e.172.c.186.c.216.g
Sophocles.	4.h.
Sophroneus.	145.h.152.b.
Sorani.	196.g
Soraniq.	149.g
Sorfrani.	163.b
Stath Setof.	149.g
Strabon.	10.f.17.h.18.g.70.h.87.c. 99.d.115.c.112.h.131.a.136.d.146. a.149.d.156.b.164.a.167.c.f.168. h.169.a.b.172.h.194.b.210.f.
Sueton.	119.d
Suide.	121.c.125.c.126.h.130.a.134.a. 186.h.

T

Taurus.	52.c
Telephus Cretensis.	185.d
Terpichus.	117.a
Tetrus.	212.a
Theocriti.	79.d.87.b.124.a
Theocriti interpretis.	75.b.94.b.97.f. 124.a.125.a.

Theodori Gazæ.	5.a.6.c.d.h.38.b.46.f. 47.a.54.b.57.d.68.e.75.c.81.b.h.84. g.98.g.100.c.103.b.104.d.112.a.114. d.117.f.g.h.118.a.g.110.e.121.c.123. a.b.g.124.h.126.a.d.e.h.127.h.128. a.c.129.c.d.130.d.136.a.b.137.f.140. c.f.147.c.d.150.a.b.d.151.b.c.g.152.c. d.154.b.155.b.156.b.158.b.c.156.c.d. 162.a.b.f.162.g.163.c.d.h.164.c.167. f.169.a.b.170.b.172.c.173.c.174.h. 175.g.179.b.180.d.184.g.185.a.186. c.188.a.b.189.h.190.a.f.g.191.a.h. 193.h.194.c.f.197.c.g.199.d.205.c. 206.h.207.c.d.211.f.g.h.214.d.216. g.217.b.218.c
Theonius interpretis Arati.	130.d.189.a
Theophrastus.	195.d
Theophrastus.	46.c
Theophrastus.	44.h.62.g.89.a.94.g.103. h.110.c.145.b.146.c.170.c.171.d.195. b.194.c.f.216.a.
Theopompus.	114.d
Timæi.	93.c
Trebæ Nigri.	125.c.149.b.d.152.h.167. h.200.c
Trogæ.	48.d.67.c

V

Valerij Maximi.	110.d
Venerij.	87.c
Varrenij.	49.e.59.d.e.60.d.67.d.68.e. 70.h.73.b.g.75.c.f.76.e.g.77.g.78. e.79.d.83.a.b.84.f.85.g.86.a.89.a. 99.b.110.b.111.b.112.b.c.d.113.b.c. 117.f.121.b.128.a.132.d.133.h.152.b. 156.b.160.c.177.h.178.f.179.c.179. e.g.180.d.182.a.184.f.g.210.f.
Virgilij.	76.b.77.h.86.d.93.g.97.h.99. b.c.114.g.126.h.129.h.130.b.173.a. d.178.h.179.a.180.h.189.c.195.c.
Vitruij.	12.f
Vipiani.	72.g
Vmbrij.	110.c

X

Xenocrati.	50.b.142.c.f.143.a.c.146.d. 148.h.149.a.150.c.f.g.151.g.152.b.h. 153.b.g.154.f.h.155.c.f.156.a.d.c.f. 157.a.g.158.b.160.c.f.164.c.g.165.a. d.166.a.f.g.167.a.194.b.201.a.210. a.214.b.216.h.218.f.
------------	---

Z

Zenodoti.	62.b
Zoroastri.	43

FINIS

Edoardi Vuottoni Oxoniensis

DE DIFFERENTIIS ANIMALIUM LIBER I.

Ad serenissimum regem Angliæ Edoardum eius nominis sextum.

Animal quid sit, & quo differat ab iis quæ non sunt animalia.

Caput I.



Nimal undique absolutum atq; *ἀπὸ παντός*, id est mente præditum esse mundum, cuius circum flexu teguntur cuncta, Plato nobis author est idemque quatuor in eo animalium genera contineri prodidit. Vnum scilicet deorum celestium, & igneum hoc quidem atque rotundum: alterum *πτερόν* *ἢ* *ἀέρος* *ἢ* *ἰσχυρὸν*, id est uo lucre & æriuagum: *ὑδροπότης*, tertium, hoc est aquatile: quartum *ἰσχυρὸν* *ἢ* *ἰσχυρὸν*, id est ter restre, aut in terra uictitans. Verum cū sub-

stantiæ, quæ natura constant, partim ingenitæ immortalesque seculis omnibus à sapiētiæ professoribus putentur, partim ortus participes atque interitus intelligantur: nos partem illam nobilem ac diuinam minus cōtemplari propterea possumus, quòd admodum pauca sensui patent, quorū ope de iis, quæ in illis rebus nosse cupimus, facultas nobis cogitandi, indagandique suppeditetur. Reliqua autem illa animantium genera, quæ nos quoque animalia appellamus, quòd eas nobis socias familiarēque habemus, nosse uberius possumus. De harum itaque differentiis differamus, nullum genus pro uiribus omittentes, uel uilius uel nobilius: cum nulla res sit naturæ, quanuis uel uilissima appareat, in qua non mirandum aliquid habeatur. In animantium genere uniuerso, primum genus plantarum est: earumque alia ab alia differt, eò quòd perfectioris uitæ particeps esse uidetur. Vniuersum autem earum genus, si ad cætera respicias, quæ anima uacant, ipsum quasi animal est: at respectu animalis, inanime esse uidetur.

Sed enim digressus hinc ad animalia cōtinuus procedit. Natura enim cōtinue ab inanimatis ad animalia transit, per ea quæ uiuant quidem, sed non sunt animalia: ita ut parum admodum alterum ab altero differre uideatur, propter suam propinquitatem. Viuunt enim principio, & quæ in ouis, & quæ in animalibus gignuntur uita plantæ. adhærendo enim capiunt primum & incrementum & alimentum. Sunt item in mari nonnulla quæ ambigas animāl ne sint an planta. Spongiæ enim natura simillima plantis est. Cæterum paruo quodam discrimine subinde alia præ aliis iam adipisci uitam sensumque uidentur. Quin & sentiendi uim ita habent nonnulla, ut

DE DIFFERENTIIS

Animal.

leuiter & perobscure sentire uideantur. Quandoquidem itaque anima-
lia ab iis quæ uiuunt tantum, parte animæ sensuali, sentiendiue facultate om-
nino separari constet, eò præcipue quòd sensum habeat, desinietur ani-
mal. Erit itaque animal corpus animatum, quod sensu præditum est. Non
tamen in omnibus animalibus par inest sentiendi uis: sed aliis sensus om-
nes, aliis pauciores dedit natura. Sunt enim quinque numero: uisus scilicet,
auditus, olfactus, gustus, & tactus: Quorum tactus omnibus animantibus
adeo necessarius censetur, ut nisi hunc habeat sensum, non poterit animal
quæ uiuant, nocentue, hæc quidem uitare, illa uero amplecti. Est uero & gu-
stus tactus quidam, qui & alimenti causa non minus necessarius habetur.
his igitur si priuetur, ut animal seruetur, uiuatque, minime erit possibile.

περὶ τῆς

Omnibus itaque quæ animalis nomine censentur, tactus inest & gustus, **F**
& maxima etiam ex parte olfactus: nisi quod forte imperfectum animal fue-
rit. Horum enim quibusdam solum tactus inest; reliqui autem sensus non
ex necessitate, sed salutis potius gratia dati sunt. Neque enim omnibus ne-
cessario insunt, sed iis tantum quæ locum mutare nata sunt, *περὶ τῆς* uocant
hoc nanque genus non tangendo solum, sed eminus etiam sentire oportet,
si permanere animal debeat. Quando igitur sentiendi facultate conue-
niunt omnia, quo pacto unumquodque ab alio discrepet, explicandum iam
nobis est.

Quibus modis constitui debeant animalium differentia. Cap. II.

A partibus.

Non sensus solum, sed & alia nonnulla sunt, quæ partim multis, partim **G**
omnibus animalibus insunt cõmunia: uiuendi nimirum ratio, mo-
res animalium, alique affectus actionesque, & præterea partes. Actiones
autem & affectus intelligi uolo, incessum, generationem, incrementum,
coitum uenerem, uitamque ac mortem, uigiliam & somnum, respiratio-
nem, iuuentam & senectam, ualeitudinem prosperam aduersamue, sexum
masculinum aut foemineum, atque uocem, & quæcunque id genus alia pos-
sunt generi animalium tribui. Per hæc potissimum & quæcunque huius-
modi alia, differentias animalium constitui dignum est. Quibus de rebus
primum ueluti formula quadam agendum: deinde generatim discussione
diligentiore disserendum censemus. Profecto differentia quæ in partiū,
morum, aliorumque affectuum, & uictuum actionumque ratione uersan-
tur, colligi debent: partium quidem, eò quòd animalium alia sanguine ha-
bent, ut homo, equus: alia exanguia sunt, ut apes, uespæ. Item aliis pedes na-
tura dedit, aliis negauit. Et quæ obtinent pedes, aut binos habent, ut homi-
nes atque aues, duo hæc tantummodo genera: aut quaternos, ut lacerti, ut
canes: aut plures, ut centipedes & apes. Per uictus rationem differunt ani-
malia, eò quòd alia carne uescuntur, alia frugibus: alia omnia attingunt, ut
cornices, alia cibo sui generis proprio utuntur, ut apes, melle, & paucis qui-
busdam aliis aluntur. aranei uenatu muscarum uiuunt. Differunt præterea
& moribus animantes: aliisq; affectionibus: ut alia fera, alia cicures in-
ueniantur. Atque harum utriusque, aliæ perpetuo cicures, ut homo, mulus:
alia

A uictus rat.
ἡρεσέσθαι.
καρποφάγα.
πυροφάγα.
θιόφονα.
Ab affectibus
A moribus.

A alia perpetuo fera, ut panthera, lupus: alia cū sint ferae, facile mansuescunt, ut elephantus. Item alia mites sunt, animoque remissa minimeque peruicaces repugnantē suae, ut boues: alia animosae, peruicaces, & omnino indociles, ut lūs syluestris: alia ingeniosae ac tūnidae, ut cerui, lepores, cuniculi: alia illiberales, perfidae, infidiosaeque, ut serpentes: alia liberales, fortes, nobiles, ut leones: alia feroces & infidiosae, ut lupi: alia astutae, malitiosae, callidae, ut uulpes: alia animosae, amatrices & assentatrices, ut canes: alia mites, & mansuetudini addictae, ut elephantes: alia uerecūdae & cautae, ut anseres: alia inuidae, & ornatus, polituraeque studiosae, ut pāuones. Colore etiam differūt animalia: alia nāque unicolora sunt (appello unicolora, quod unum genus totum unum habet colorem: quomodo leones fului sunt omnes: B idēque in auiibus & piscibus & reliquis animalibus intelligi uolo: alia uersicolora sunt: sed toticolora (ea autem dico toticolora, quorum corpus totum quidem eundem habet colorem, sed non omnium eiusdem generis corpora eundem, ut bos totus albus est, aut totus est niger:) alia uaria sunt, idque dupliciter: aut enim genere toto, ut panthera, ut pāuo, & pisciū nonnulli, ut quae thrasae uocantur: aut non genere toto, sed parte, ut boues, ut caprae: interdum uariae generantur: in auium etiam genere, columbae, & alia pleraque. Sunt uero & per actiones animalium differentiae, ut alia locum per tempora mutant, alia iuuenem in cōsuetis sibi locis comperiunt. Item animalium alia uolatilia sunt, ut aues, apes: alia gressilia, ut quadrupedes: alia natant, ut pisces: alia reptilia sunt, ut angues: alia tractilia, ut hirundines. His uero modis uariae colliguntur & aliae animalium differentiae: ut animalium alia aquatilia sunt, alia terrestria. Et aquatiliū ordo triplex: alia enim in aqua degunt, uictumque petunt ex humore, quae etiam per uices recipiunt & reddunt, nec uiuere possunt nisi uersentur in humore, ut pisces. Alia degunt quidem in fluido, uictumque inde emoluiuntur: sed aerē non humore recipiunt, id est spirant, & foris parere solent. Complura huius generis sunt, partim gressilia, ut lutris, latæ, crocodilus: partim uolucres, ut mergi & urinatrices: partim etiam quae nullis pedibus innitantur, ut natix: nonnulla cum uictū in humore exerceāt, nec foris uiuere queāt, nihil uel aeris uel humoris recipiunt, ut urticae, ostrea. Aquatiliū item aliis nandi uis tributa est, ut piscibus: quaedam ambulare possunt, ut canorum genus. Sunt & quae sede stabili degunt: ut quae saxi affixa omnem uitam traducunt, ut concharum genera nonnulla. Aquatilis item generis, alia marina, alia fluuialia, alia lacustria, alia palustria, ut ranæ. Terrestriū uero animantium, alia spirant, ut homo, & quaecunque terrestria habent pulmonem: alia quantuis non spirant, tamen sedem in terra perpetuo tenent, & uictum inde capiunt, ut uespæ, apes. Terrestrium etiam alia uolucres sunt, ut aues, ut apes: alia pedestria, quorum alia gressilia, alia tractilia sunt. Animal autem quod uolucere tantum sit, ut pilcis, natatile solummodo est, nullum nouimus. Necnon differentias illas uite, actionesque animantium continent. Sunt enim aliae gregales, aliae solitariae, aliae uitam ancipitem degunt: ut eadem modo societate, modo solitudine gaudeant: tū

*Civiles animan-
tes, πωλιτικὰ
ζῷα.*

uolucres, tum nantes, tum etiam pedestres. Item aliae civiles, aliae inciviles. E
Civiles appello animantes, quae labori communicant: id est, quarum opus
communi efficitur opera, munusque idem omni est, quod non omnibus gre-
galibus competit. Civilis generis est homo, apes, uespa, formica, grus: qua-
rum aliae sub duce degunt, ut apes: aliae nulli subditae imperio sunt, ut for-
micae. Sunt item tam ex gregalibus quam ex solitariis aliae quae sedem nun-
quam mutant, nec peregrinentur: aliae quae mutare statuto tempore soleant.
Et aliae uim habent uenandi, aut ingenio recondendi sibi dotatae sunt: aliae
nec ad uenandum aptae, nec ad recondendum. Item aliae domicilia sibi pa-
rant, ut talpa, mus, formica, apis: aliae nullis se includere casis patiuntur, ut
plures tam insecti generis, quam quadrupedis. Quinetiam locis discernunt
aliud existit: quippe cum aliae cauernas subeant, ut lacerti, serpentes: aliae
per summa telluris degant, ut canis, ut equus, ac alia foramina sibi exca-
uant: aliae nunquam eo munere funguntur. Et aliae noctu sibi uictum qua-
runt, ut noctua, uespertilio: aliae interdiu tantum. Item aliae muta omnino
sunt: aliae strepitum tantum elidunt: aliae uocem etiam formant. Quarum
aliae loqui possunt: aliae uocem solam nullis exprimendam literis reddunt.
atque aliae loquaces, aliae taciturnae: aliae oscines, aliae non canunt. Aliae
praeterea camporum incolae sunt, ut palumbes: aliae montis, ut upuae: aliae
cum hominibus degere solent, ut columbi. Item aliae copia libidinis gau-
dent, ut perdicum genus, & gallinaceorum: aliae minus uenere ualent, ut
quae coruinam speciem gerunt: quippe quae raro soleant coire. Adhaec aliis
data est uis dimicandi: aliis ingenium cauendi & euitandi. Praeterea quae
natant, alia pedibus carent: & haec aut pinnis natant, ut pisces, aut etiam abs-
que pinnis, sed ita mari utuntur, ut terra serpentes, modoque simili repunt
in humore: aut sua ipsa latitudine natant, ut cartilaginei generis, quae pla-
na sunt, & caudam habent, ut raia, pastinaca: alia uero quae pedes habere
uidentur, ut mollia, tum pedibus ipsis, tum pinnis natant. Quae crusta inte-
cta sunt, suis caudis natant, celerrimeque retrorsum, pinnarum caudae ad-
iunctarum beneficio. Cordulus etiam pedibus natat & cauda. Voluorum
autem aliae penna uolant, ut aquila, accipiter: aliae membrana sicca, ut apes, sca-
rabei: aliae cute, ut uespertilio. Sunt porro quae uel penis uel cute uolant, om-
nia bipeda aut apeda. Angues enim circa Aethiopia tales uolare narratur.

*A strepitum &
uocem.*

Animalium genera amplissima.

Cap. III.

H

Amplissima uero animalium genera, in quae alia digerantur redigantur
que animalia, quae saltem nominibus distincta reperiuntur, haec sunt,
avis, piscis, cetus: quae quidem omnia habent sanguinem. Et terrestre quod
sanguinem habet & pedibus caret, genus serpentum est. Adhaec genus tes-
ta interitum est, ὀστρεκίδιον Graeci uocant, & ὄστρεα: nos ostreum siue cocham.
Et crusta inclusum aliud, μαλακίον uocant: nec aliud nomen habet com-
mune, ut locustarum & cancrorum genera. Aliud item μαλακίον, id est molle,
ut loligines, sepia. Adde iis insectorum genus, quae omnia genera sangui-
ne carent. Reliquorum animantium genera nulla praeterea ampla nume-
rantur:

A rantur : unum enim quod plura genera contineat nullum est : sed aut simplex est, nullis ipsum specificis euarians discriminibus, ut homo: aut diuidi quidem in alia genera potest, sed nullis nominibus distincta. Quæ enim in genere quadrupede non pennato continentur, sanguinem quidem omnia habent : sed alia animal pariunt, alia ouû : dixerim hæc *de rebus*, id est ouipara, illa *zoem'ia*, id est uiuipara. Hæc ita impræsentiarum formula exposuisse quadam prægustandi gratia placuit. Reliquum iam est ut ad alia trāscamus.

De partibus animalium.

Cap. IIII.

A Nte omnia partes animalium ex quibus constant, explicandæ sunt. **B** iis enim potissimum, atque in primis, tota quoque ipsa inter se differunt. Sunt porro animalium partes, aut similes, aut organice siue instrumentales. Similes Græci *ὁμοιομεγῆς* uocant, quòd undique in similes diuidantur particulas, id est quòd omnes earum partes tum sibi mutuo, tum toti similes habeantur: quæ & simplices etiam, & primæ, & inpositæ nonnunquam appellantur : quandoquidem ex illis constitutæ sunt particulae, quæ organice siue instrumentales, atque etiam officiales uocantur. Similes autē numerantur hæc, os, cartilago, uena, arteria, neruus, ligamentum, cædo, membrana, caro, adeps, unguis, cutis : his adduntur humores, ut sanguis, & qui in oculo sunt, cristallinus & vitreus humor. Instrumentales uero partes sunt, quæ aptæ secari in partes, ipsi toti dissimiles sunt: ut manus, non in manus secatur, aut facies in facies, aut pes in pedes: quapropter & dissimiles etiam uocantur. Ex hoc partium genere sunt, quæ non modo partes particulae uel, græcè *μέρος ἢ μέρος*, (pars enim cuiuspiam dicitur quicquid totum complet atque integrat) uerum etiam *μέλη*, id est membra appellantur: uidelicet quæ cum ipse totius integritate describantur, habeant tamen in se partes diuersas, ut caput, ut pes, ut manus, ut totum brachium, aut pectus: quippe quæ & ipsæ partes sunt totæ, & ex partibus consistunt diuersis dissimilaribusque. Has uero partes totas uoco, & integras: quemadmodum animal aut totū aliud quoduis, unum esse dicitur, & totum quoddam integrū uel, eò quòd suis conspiciatur finibus circumscriptum, nec ulla sui parte alij coniunctum: ita & ipse pars, cuiusmodi est oculus; lingua, nalis, una esse dicitur: totaque & integra, eò quòd appareat suis quibusdam finibus contineri: quòd si non esset ulla ex parte reliquo corpori annexa, sed omnino separata persisteret, tūc sane neque pars, neque membrum diceretur omnino, sed absolute unum & totum integrūque.

De partibus exterioribus dissimilaribus.

Cap. V.

V T uero nummos ad id quod sibi quisque certum exploratūque habeat probare solet, ita & in animalium partibus agendum nobis est. Homo itaq; cum sit omnium maxime animalium nobis familiare, & exteriorum partium eius forma per usum quotidianum sit notissima, reliquorum proinde animalium exteriores partes, tam similes, quàm instru-

DE DIFFERENTIIS

mentales ita dignoscendæ sunt, eò quòd humanis partim easdem habent, E
partim similes, dissimilæsue sint, sed proportionè conueniant. At uero in-
teriores contra sunt enim hominum in primis incertæ atque incognitæ.
Quamobrem ad cæterorum animalium parteis, quarum similes sunt hu-
manæ, referentes eas, contemplari debemus. Hominis autem partes, & si
sensu facile percipi possint, describendæ tamen sunt: ut & sensum ratio co-
mitteretur, atque etiam ut series commentandi seruetur perpetua, dum ordi-
nem persequimur omnium: quò minus lateant ea quæ non eodem modo
quo homines, cætera animalia possident. Partes itaque primum enumera-
bimus officiales, quæ externæ sunt, utpote quæ sunt per usum quotidianū
præcipue nobis notæ: deinde interiorum ordinem prosequemur: postremo F
quæ similes sunt, explicare conabimur.

De capite & eius partibus.

Cap. VI.

Maximæ igitur partes, in quas primas diuiditur corpus, hæ sunt, ca-
put, collū, thorax, brachium duplex, crus duplex. Caput in animali-
bus omnibus superiorē obtinet situm, corporis sui ratione. Capitis autem
pars quæ capillis intercta est, calua appellatur: cuius pars prior sinciput, pos-
terior occiput est. Quod uero inter sinciput & occiput est, *κράνιον* dicunt,
id est coronam. Extremus etiam capillorum ambitus *κράνιον* uocatur. Caluæ
medium illud discrimen & æquamentum capillorum, uerticem uocamus,
Græci *κενφω* dicūt, unde & *διεφω*, id est biuertices dicti, quibus discrimē G
illud geminum est: uerum non osse, sed æquamento. Faciem partem eam
nominamus duntaxat in homine, quæ in priore parte caluæ subiacer. Pars
faciei frons, quæ sub sincipite posita, inter idipsum & oculos est: huic quæ
prætenditur cutis, *πρὸς τὸ πρόσωπον* dicitur: in qua rugæ, *ρὺναι* dicunt. Ab utra-
que frontis parte, tempora sita sunt. Supercilia sub fronte bipartito distin-
cta. inter ea quod medium est, *μεσσηριον*: at eorum partes quæ naribus pro-
ximæ sunt, *ἰσθμια* καὶ *κλάδι*, id est superciliorum capita dicuntur: & *ὄφθαλμοι*, id est
caudæ, quæ ad tempora accedunt. pilos uero ipsos medici nonnulli *τόλιν* uo-
carunt. Superciliis oculi subiacent duo: quorum partes superius inferiusq;
oculos tegentes, palpebræ appellantur. Pilos, qui extremo palpebrarum am-
bitui adhærent, cilia nominamus. extremus uero palpebrarum ambitus,
unde excrescūt cilia, *παρὰ* uocatur. Humor oculi quo uidemus, pars uideli-
cet illa quæ in medio est, pupilla, quod eam ambit, nigrū oculi dicitur: quod
postremo nigrū circūdat, cadidū oculi uocatur. Pars etiā cōmunis superio-
ris inferiorisq; palpebræ angulus est, quæ duplicē uterq; oculus habet: alterū
iuxta nares, alterum iuxta tempora. Auris pars capitis qua audimus est.
huius pars exterior, quæ plana patulāque manet, Latinis auricula, Græcis
πτερυγιον est, (quasi alam dixeris aut pinnā) quæ solum chartilagine & cute
constat. Qua uero parte sui extrema ab anteriore in posterius uertitur, &
quasi reflectitur, *καρπιδις* dicitur. sub hoc, quod ueluti dimidiū circuli est,
ad rotunditatē uergens, & in mucronē exurgens, *συσφίς* appellatur. quod uero
huius acumini subest concauū, *καρχηδον*. rotundū quod in mediō est foramen,
meatus

* *κενφω*, *κλάδι*.

A meatus auditorius uocatur. Suprema autem pars pinna dicitur: inferior fibra. Pars illa interior anfractui cochleæ similis, desinit in os quod auriculâ plane imitatur. Partem inter utrunlibet oculum, & aurem, & uerticem positam, tempora appellamus. Item pars faciei inter oculos sita, nasus est: cuius partes concavæ utrinq; posita, nares dicuntur, græcè *μῆτις*, quæ meatum præbent spiritui. his nanque aërem reddimus, & accipimus. Olfactus quoque, id est sensus odoris, hac eadem parte sumministratur. Mobiles esse nares natura uoluit, nec sicut aures sua compage immobiles. Pars nasi cartilaginea quæ nares discriminat, interseptû uocatur: externas uero nanariû partes, *πτερυγία*. In utraq; nasi parte, loca illa quæ sub oculis caua cernuntur, priuatim etiâ *κείλα*, id est caua dicuntur: quæ ex morbo aut aliàs interdû ex cruditate laborantibus facile attolluntur. Quæ uero sub iis inter nasum & aures ueluti margines leuiter eminent, oculolôq; ab inferiore parte tutantur, malæ & genæ dicuntur. Sub iis laxiores partes, quæ iratis, aut spiritu à pulmone reuocato cōpressis adhuc labiis inflatur, buccæ sunt, hilaritatē risumque indicâtes, ut inquit Plinius. Est deinde maxilla duplex: cuius pars prior (quæ scilicet labro subiaceret inferiori, atq; in rotundû quoddâ acumen tendit) mentum, posterior mādibula est. Labra mox à naso habentur, caro permobilis. Quod supra labra est, & infra nares, *μῆτις* dicitur, & *ὐρλή*, id est mustax. Quod autem sub mento est carneum, *κίχρηλον* uocatur. Quod autem intra labra & maxillas describitur, os est, quo scilicet cibus recipitur: cuius partes, palatum, & fauces siue guttur. Fauces autem & guttur appello partē illam oris uniuersam, quæ gulæ prætenditur. Inest & pars sentiens sapore, lingua: cuius pars prior quæ acuta est, *πτερυγία* dicitur: caro uero qua inferiorem attingit maxillam, *κίχρηλον*. Ea linguæ pars quæ ad fauces est, & quæ (ut nonnullis uidetur) gustus sensum habet acutiorem, *μῆτις* nominatur, & *κίχρηλον*. utrosque uero linguæ cauos sinus, *κίχρηλον* uocant. carne rara & fungosa lingua constat: eius pars quædam ligula est, quæ pluribus infra explicabitur. Quod in ore bifidum cernitur, tonsillæ: multifidum uero, gingiua appellatur. Carne hæ constant; intusque dentes offci coherant, utraq; maxilla sexdecim, in homine saltem. primores quaterni lati & acuti, eod quod secant, *μῆτις* appellantur: ij omnes singulis radicibus inniuntur. Hos utrinque sequuntur qui *κίχρηλον*, id est canini uocantur: quibus singulæ quoque radices insunt, ij partim acuti sunt, partim lati: quippe qui infra latiusculi, supra arctiusculi sunt. ultra hos sunt maxillares, qui & molares dicuntur, quini ab utroque latere: nonnullis uero non quini, sed quaterni sensue oriuntur. Ex his, qui in intimo ore sunt, *μῆτις* appellantur: quibus utrinque iunguntur qui *κίχρηλον*, id est serotini uocantur, post uicesimum demum annum excrecentes: nonnullis etiam senescētib; prodierunt: multis & octogesimo. Molares, qui maxillæ superiori insunt, ternis fere, qui inferiori binis radicibus adhaerescunt, nonnullis tamen exceptis, qui supra sæpe cum quaternis, infra cum ternis radicibus depræhendantur: præsertim duo primi interiores, qui & intimi. Totus uero dentiu ordo *μῆτις* dicitur, id est dentiu acies. Parte autem oris penitiore, parti-

DE DIFFERENTIIS

cula pendet carnea, columella nomine: quæ si immodicè humecta intus mefcatur inflammaturque, uux nomine uocatur.

F. Caput, græce καψή dicitur, πῖλος, κρηνίος, κέγχρς, σκαθίος. ποτὶ καὶ αὐτὸ uocant, à paraueris capite hoc nomen detinuit. Calua, quæ & caluarin, κρηνίος. Sinciput, ἐρῖμα, ἐρῖνός. Occiput & occipitium, ἰσθ. πρὸς τὸν pro extremò capillorum ambitu, etiam πρὸς ἄκρας dicitur. Vertex capitis, κερνός. Orpheus μαστράταιν uocauit. G. Faciem, & πρὸς τὸν eam partem nominamus, inquit Aristoteles, duntaxat in homine. Nam piscis aut bouis πρὸς τὸν faciém uocare non solemus, sed πρὸς τὸν Græci dicunt: ut in aubus ἐρμφορ, & ῥύγχος. πρὸς τὸν in homine, à re ipsa nomen accepisse uidetur: quodd enim unus animalium homo erectus est, solus prospicit ante uersus, uocè- que ante uersus mittit. Frons, μέτωπος ἢ μετώπιον. μετὰ φρον etiam dicere quidam. Tem- pora, ἀντεφροί. Supercilia, ἰσθρῖνς, ἀμαρυνά, σκυῖα. Oculi, ὀφθαλμοί, ὀμματ. Pal- pebræ, ἀλφειες. Plinius genas dixit. Cilia βαλκονίδες. Celsus ferè pilos palpebra- rum uocauit: eosdem Plinius palpebras dixit. H. Extremum ambitum genæ su- perioris, inquit Plinius, antiqui cilium uocauerunt, unde & supercilia. τὸ ῥοσὶ dicuntur & ὕψος, ἰσθρῖνς, ἰσθρῖνς, ἰσθρῖνς. Pupilla, κέρη. Nigrum oculi, πῖ μὲλιν καὶ ῥύς. Candidum oculi totum (quidam albuginem uocant) πῖ λανέρ. σφαιλῆς etiam dicitur & λος. An- gulus oculi κερνός. Oculorum pars illa, quæ in medio est, quam pupillam uocant, κέρη est, uti modo diximus. Ambiens autem hanc circulus, ῥηρῖν uocatur. Huius nero par- tes, quæ pupillæ proximæ sunt nigræ, πικρῖ. Circulus qui candido proximus est, αἰος. Quæ ultima pars candidi totius est, πρῖν uocatur. Torus oculorum ambi- tus, ἰσθρῖν. Angulorum oculi radices, ἰσθρῖνς, ἢ ἰσθρῖνς. Quatum quæ nālò pro- ximæ sunt, ῥηρῖνς dicuntur & πῖν: quæ uero tempora spectant, πρὸς πῖν. Concauæ altitudines quibus oculi continentur, quæ palpebras circumdant, κέγχρς appellantur, & γλῶσσας à nonnullis. Auris, οὐς, αἰνῆ, ἀκροῖα. Auriculam, Celsus etiam aurem uocat, πῖν ῥηρῖνς, πῖν ῥηρῖνς. Meatus auditorius, ἀκροῖα πῖν. Pinna, ἀκροῖα. Fibra λῖος. Aristotelis ætare, inquit Pollux, omnes auriculæ partes præterquā λῖος, id est fibra, nomine carebant: uerum medici postea hæc imponere uocabula. Auricularum ipsa- rum exterior ambitus, κερνός, interior uero σκαθῖος est. Pars quæ ad tempora nergit, πῖν ῥηρῖνς, inferior aut λῖος. i. fibra uocatur: & interior κερνός, unde & auris fœdus idem nomen quod concauū est, ἀκροῖα, quod ueluti fundamentū est aut pauimentum, κρῖν. Ipsi aut cōcaui sinus, quod in ea parte est quæ ad tempora uergit, & ad aurs interiora reflectitur, σκαθῖος: opposita uero pars ἀκροῖα dicitur: sicuti & eius partis, quæ fibra dicta est, quod prominet, πρῖν: quod κερνός proximum est, πῖν: quod super hanc est acutū in superiore fibræ ambitu, ἀκροῖα. Eius aut partis quæ σκαθῖος dice- batur, quod tēpora spectat κερνός dicitur. Cōcauū uero quod iuxta κερνός est, ῥηρῖνς: quod ad foratē est, κερνός: quod autē intus est, κέρη uocatur. quod deinde ad auriculæ radicē est fibræ subiectū, μῖκιν dicitur. Illius aut auriculæ partis, quæ sub eo quod πῖ- ῥηρῖνς diuidū est, habetur, ἰσθρῖν: & huic opposita pars ἀκροῖα: quodq; sub hac est, κέγχρς nōcu- ratur. A. Tēpora, κρῖν. nōnulli & κέρη uocant, & κέρη. Nasus, ῥῖς. Nares, μαντῖ- ρες, μαντῖρ. Torū etiā mēbrū à medicis quādoq; μαντῖρ uocatur, & μαντῖρ, & ῥῖς. Es nares Sophocles etiā μῖνς appellauit. Ectofantina ipsa quidā διελόμενος dixere, & ἰ- χθῖν. Interseptum, κερνός. Quidā uero ita diuidūt. Nālī ea pars quæ supercilii proxime subiacer, ἰσθρῖν, per quem scilicet spiritus transmittitur. media uero γλῶσσας, id est cartilago, uocatur. Partes uero quæ utrinque genas spectant ossē, ῥηρῖν, id est nālī spina. At ea quæ nares diuidit, κερνός ἀκροῖα, uel ut aliis placet, quod in- tus meatus ipsos diuidit, ἀκροῖα ῥηρῖν uocant; id est septum narium. Quæ uero su- per eam partem est cāro ad labra uergens κερνός, & totam nālī summmitatem, σκαθῖος. Quæ autem extrinsecus ex utraq; sphærij parte sunt, ἰσθρῖν ἢ πῖν ῥηρῖν: intrinsecus au- tem μῖνς ἢ διελόμενος: & quod illis tanquam fundamentum subest, κερνός ἢ κερνός. Max- illæ & genæ, μῖνς dicuntur, & πρῖν, & γλῶσσας, uerum πρῖν & γλῶσσας buccæ potius dicun- tur. Maxilla κερνός, ῥηρῖν, γλῶσσας. Mētūm, ῥηρῖν, ἰσθρῖν. Mandibula, γλῶσσας. Labra, κερνός,

ueteres

A veteres comici *χαλιδες* uocauerunt. *Ανδριανός* etiā *λανγκερία* dicitur. C. Os, *στόμα*, à nonnullis etiam *λίγαν* dicitur, & *μύσας*. Palatū dicitur & cælum oris, *ὀπίσθια*, *ὄρεγος*, *ὄρεγος*. Fauces Celsus lib. 4. Fauces, & spiritum & cibum capiunt, *ἑρπεφένγυς*, *φάρυγξ*, *φάρυγξ* etiam à quibusdam & *ἰσμός*, ob loci angustiam. Significat & *φάρυγξ* gulæ summam partem atque initium, sicuti *ἀσπέρη* asperæ arteriæ: uerum Plinius partem hanc quam Celsus & Theodorus fauces uocant, guttur appellat: fauces uero summam gulæ partem, sicuti postremam stomachum dixit. Lingua *γλῶττις*, ἢ *γλῶσσα*, à nonnullis *γλῶττις* uocatur, aut *πλῆκτρον γλῶττις*: & totum membrum significat & membri partem, ut dictum est. Sed quod hic diximus (Pollucis auctoritate) gustus sensum acutiorem illi linguae parti inesse quæ ad fauces est: contra Aristotelesem, sentiendi istam uim præcipue obtinere scribit, parte sui primore. Nam si interiore tangatur, minus eam sentire existimat. Ligula, à Plinio minor lingua uocatur: Græci *ἐπιγλωττίδα* uocant. Tonsillæ *παρίσθια* & *ἀρτιόδοντες* dicuntur. Galenus *παρίσθια* inflammationem earum, quæ prope tonsillas sunt, partium, & *ἀρτιόδοντες* priuam tonsillarum ipsarum inflammationem esse ait. At Celsus *ἀρτιόδοντες*, tonsillas, quæ post inflammationes induruerit, à Græcis uocari scribit. Tonsillæ in intimo ore quatuor cōspiciuntur: binæ ad lingue radicem, singulæ utrinque conspicuæ: & binæ penitiores, quas Pollux *μῦλα* uocari tradit. Ginguæ *ἔλα*: ut uero Polluci placent, carnes quæ dentes continent, quæ quidem externæ sunt, *ἔλα*: quæ uero internæ, *ὕλα*: & quæ inter dentes ipsos continentur, *ἡμῶν* dicuntur. Deutes, *ἰδόντες*, *τεμνῆ*. Dentes primores acuti, etiam *δυσσῆς* dicuntur, & *ἀνίς* & *χλιδῆς*. D. Maxillares, *γυμφοί*. Molares, *μύλα*, *ἐμφυγεῖν* etiā, *κερατίζεις*, & latine genuini. Columella, *κίον*, ἢ *κισίον*, ἢ *γαργαρίον*. Vna *παφλή*.

De collo & eius partibus.

Cap. VII.

Collum deinde id appellamus quod inter caput & artus humeros uel interiacet. Quantum uero colli ipsius cartilagineum, priorem obtinens situm, uocem transmittit & halitum, id arteria, & aspera arteria nominatum est. Hæc autem accipiendi reddendique tantummodo spiritus officio fungitur. Nihil enim aliud nec siccum uel humidum pari ipsa uidetur: sed ubi in eam tale quid decrauerit, tandiu torquetur, dum excutiat quod dilapsum est. At uero quantum interius carncum spinæ præiacet, gula dicitur: qua cibis atque potus deuoratur. Ipsius autem asperæ arteriæ pars summa, quæ uocis instrumentum est primuni ac præcipuum, larynx dicitur: apparetque in collo tangenti durum: & inter transglutendum sus deq; moueri cernitur. Ultima autē colli anterioris pars, cui proxime subest iugulum, *ἐπιπρωρίς* dicitur. Pars uero posterior colli, extrema ceruix appellata est. Partes thorace tenus dispositæ hæc sunt.

D B. Collum, idem & ceruix, græce *κνίσιον*, *κνίσιον*, (utranque simul posuit Aristoteles 4. de partibus animalium, *καὶ τὴν πρὸς τὴν κεφαλὴν κνίσιον καὶ τὴν πρὸς τὸν λαιμὸν*) dicitur & *ἀσπέρη*: hinc ultima colli anterioris pars, *ἐπιπρωρίς* dicta est. Plinius ceruicem à collo distinguit. C. Ceruix, inquit, nulli nisi quibus utraque hæc arteria & gula, cæteris collum, quibus tantum gula. Ceruix flexilis est ad circumspectum. Arteria, & aspera arteria, *ἀρτηρία*, καὶ *τρεσχαῖα ἀρτηρία*, & *βρόγχος* quoque dicitur. Gula, *στόμαχος*, *ἐνδοφάρυγξ*, *λαιμός*, & *λανγκερία* Homero. Stomachum etiam uocant Latini, ut Cicero 1. De natura deorum, lib. 4. Plinius tamen stomacho abutitur pro ore uentriculi. Galenus utrunque significare tradit, gulam scilicet & os uentriculi, quod *καρδίον*, id est cor ueteres nominare solebant. Larynx, *ἀσπέρη*, quandoque etiam *φάρυγξ* & *βρόγχος* καφάλα. Extima ceruix, *ἐπιπρωρίς* dicitur & hæc colli pars *πρωρίς*. Epipρωρίς Galeno est musculus superiorem humeri partem occupans, & præterea ea dorſi pars quæ humeri articulo proxima est.

DE DIFFERENTIIS

De Thorace & eius partibus.

Cap. VIII.

8

THoracem eam partem appellamus, quæ à collo ad pudenda usque trā-
ca pertendit. Finem enim thoracis faciunt partes quæ ostium ex-
tremi tum humidi tum sicci continent. Thorax ipse parte priore postero-
reque constat. In priore huius parte, mox à collo communis colli & pecto-
ris pars, iugulū est, quod ossibus continetur, quæ & iuguli dicitur, & *κλῆις*.
Deinde pectus, priorem thoracis obtinet situm: cuius media pars *παιδίον*
uocatur, quasi pectusculum dixeris, & *σῆμα*. Pectus ipsum bipartitum est,
in mammam parte sui utraque extuberans. Mammis laxior cōtextus cor-
poris est. Iuncta illis papilla, per quam lac transmissum elicitur. Qui papil-
las ambit circulus subniger, *σῆμα* dicitur. Quod sub mammillis est, *παρασῆμα*,
ac si præcordia dicas. Communis pars costar, brachij, & humeri, ala est, quæ
& axilla, & subalis latera. Venter infra pectus est parte corporis priorē
totum scilicet quod ab ea parte est, quæ *σῆμα* uocatur, ad pudenda usque, una
etiam connumeratis iliis. Huius pars tota exterior musculosa, quæ inter-
na obtegit, abdomen est: cuius ueluti radix umbilicus est. Huic radici pars
subiecta in latus utrunque ilia dicitur: quæ autem recte subiungitur, aqua-
liculus: cuius postremum, pubes est: qua scilicet pili nascuntur. Sed super
umbilicum, sub ore ventriculi, hypochondrium est. Cauum autem com-
mune hypochondrij, & ilium cholago est. Pudenda his proxima sunt.
Pars fœminę propria, uterus aut uulua est: maris penis colūe, foras postre-
mo thorace propedens, parte sui prima carne propemodū constans, æqua-
bili facie turbinata: nomen à glande pars hæc mutuata est, glans dicta. Hæc
glandem quę tegit cutis, *πρόσθιον* dicitur: & totum quod ex ea cute glandēque
constat, præputium est. Reliqua pars cartilaginea est, & augeri ampliter
potest. Huius membri quod minime dependet, *ισχίον*: foramen uero quā
humor excernitur, *ὀφρῦον* dicitur: & id quo cuticula cum glande adnecti-
tur, *υποσῆμα*. Quod in inferiore penis parte, suture simile est, per scrotum
ad podicem usque pertedens, *πρόσθιον* est. Subiacet membro genitali testes
gemini, cute obducti, quod scrotum & scrotum nominamus. Mulieris au-
tem genitale contra quā uiri formatum est. Cauum enim subditum pu-
bi est, non sicut maris propensum ac prominens: cuius pars interior, loci,
& uterus appellatur. Ostium uero & ceruix, matrix est: quæ ab utero effertur,
accessum prolifico maris semini præbens, & exitum humido ex-
cremento. Fœmoris & imi uentris pars communis est inguen. Pars
item interior fœmoris & natis communis, coles: exterior, subnatales.
pars uero excretoria, podex est. Huic quod subditum quasi stragulum
est, nates appellant: in quo autem fœmur uersatur, coxa & acetabu-
lum. Thoracis iam partes omnes primores diximus. Dorsum item sub
ceruice, sed pone pectus est: cuius pars, quæ collo proxime subiaceret,
gibba, & *κλῆις*: quæ autem utrinque hęc prominent, scapulae humerique
summi uertices *ἀκρόμια* dicuntur. Ab iis in anteriōra protendunt *κλῆις*, iu-
guli scilicet ossa, inter quæ iugulum situm est. Quæ uero ab scapulīs ad
spinam tendunt, *ὀμωπλάταις* Græci, nostri scoptula uocāt: inter quæ *μῆστρον*
situm

DE DIFFERENTIIS

uero scapulas uocat, quas Græci *ἀμφοτέρω* dicunt, & Celsus scoptula, (scoptula operata E legunt nonnulli apud Celsum.) A. Humerus etiā in hoc significato pro articulo ipso apud Pliniū cū aliis, tum apertissime lib. 11. sed apud Celsum pro ea brachij parte accipitur, quam lacertum uocamus. *ἄμω* item apud Aristotelem fere pro humeri articulo accipitur. Lumbi *ὀσφύς ἢ ἴψος ἢ πέλτα* dicuntur lumborum musculi interni: qui & *πνευμῶνας* & *ἀλόπυγος* etiam à quibusdam uocantur. Quæquam sunt & qui externos spinæ musculos, *ψῆς* uocent. Clunes *ἰχίς* quæ & *σαφίς* uocantur, ut ante dictum est. Harum partes sunt, nates, quas Græci *χρόντος* uocat & *ἰσθμῶν*: & *ὕπερ-πῆξ*, quæ carnes sunt infra nates, ad fœmora uergentes. Spina *ῥάχης*, *κλίσης* *γῆς*. Spinæ partem mediam illam quæ inter metaphrenum & lumbos est, Homerus *ἀκχῆς* uocauit: uerum *ἄκχῆς*, ut tradit Pollux, proprie in solis quadrupedibus est.

De Brachiis & eorum partibus.

Cap. IX.

Membri uero superioris bipartitam compactionem à thorace dependentem, brachium siue ulnam uocamus: cuius partes sunt, scapula, humerus, lacertus (qui & humerus Celfo) gibber, cubitus (Celsus brachiū uocat) & manus. Lacertus totius brachij pars maxima est, terminos habens, inferne quidem gibberum, superne autem humeri articulum: gibberum uocamus cui innitimur. est autem ea pars quæ totum brachium flectitur. Altera brachij pars non minima, imo secundum lacertum maxima, quam cubitum uocamus, inter gibberū sita est, & articulum, quo eū cubito manus iungitur, *κῦβις* Græci uocat, nos brachiale. Cubiti pars superior, *ὑπὲρ πῆγος*, inferior, *ὑπὸ πῆγος* dicitur. Manus partes, palma, & digiti quinque. In manu prima palmæ pars, quæ ex multis minutisque ossibus constat, *κῦβος* græce dicitur: altera quam *μυτερόχειρος* uocant, pars manus lata *G* est, quæ ex rectis quinque ossibus constat ad digitos tendentibus, à quibus digiti oriuntur. Digiti quinque numero: quorum qui maximus est, pollex uocatur, à latere metacarpi adiunctus, breuis crassusque huic proximus est index: medius deinde, qui longissimus omnium est: illum sequitur qui medicinæ dicatus est, *τρυφίλος* dictus: postremus omnium minimus est. Hæret summis digitis unguis. Digiti pars qua inflectitur, nodus siue articulus est: quæ rigida constat, internodium dicitur. Pars interior manus, quæ carnosa est, & scissuris uitæ indicibus distinguitur, uola est. Exterior uero manus pars neruosa est, *ἐπιδακτύλιος* à Græcis dicta.

Aliter sentit Galenus ut in fra uidebitur in ossibus.

F. Membri superioris. *κῶλον* Aristoteli & Galeno membra significat exteriora (ni fallor) à thorace separata, & quasi dependentia, ut brachia & crura: uerum, ut sentit Pollux, *κῶλον*, quod & *κῶλον* dicitur, ex femore tantum & crure constat. Brachium *βραχίον ἢ χῶλον*: totum hoc mēbrum Aristoteles *βραχίον*, Galenus *χῶλον* uocat, nonnunquam & *βραχίον*, Celsus brachium, Theodorus brachium siue ulnam: ita forsitan & Plinius, lib. 11. uni homini ulnæ. Scapula, humerus, lacertus, hanc partem Aristoteles *ἐγκῶλον* uocat, Galenus *βραχίον*, Celsus humerum: alij lacertum, Theodorus, nisi euodices sint mendosi, lacertum agilem. Gibberum, *ἐλίσσων*: articulum hunc totum ubi cubitus lacerto iungitur, *ἐγκῶλον* uocant alij: huius quod ab exteriori parte prominet, *ἐλίσσων*. Galenus in osse, inquit, brachij, quod cubitus appellatur, in extremo eius sine, illo qui cum lacerto inngitur, duo extant tubercula, alterum mains quod & posterius, & inferius est: alterum minus, quod superius est & in parte anteriore. hos processus siue tubercula uulgo *καρῶνες* uocat: sed proprie illum, qui maior & posterior est, Attici *ἐλίσσων*, Hippocrates *ἐγκῶλον* uocat. hæc Galenus.

Cubitus

- A Cubitus, *πῦξ ἢ ὄλκω*, Celsus hanc partem brachium uocat, eodem scilicet cum toto nomine. Maous *χεῖρ ἢ ἄρσξ χεῖρ*, ita enim fere uocat Galenus: nam *χεῖρ* apud illum totum brachium significat. Nomina ista brachij noo inconcinne expressit Ouidius lib. 1 Metamorph. Laudat digitorumque, manúsque, Brachiaque & nodos media plus parte lacertos. Palma *ῥίπα*: partes habet palma (ex Aristotele & Cello) *καρπὸς* & *μικτὰ καρπὸς*. Celsus has partes nominibus propriis non appellat, sed tantum primā palmæ partem, & alteram palmæ partem. Tertiā palmæ partē addit Pollux *καρπὸς*, quod aote carpi est. G. Digni, *δὲκτυλιν*. Pollex *ἀρτχέιρ ἢ μίγξ*, index, *λίγξ*, medius, *μίσξ*, anioimus, *μικρὸς*. Nodus siue articulus *κνίδωλος*. Inter nodiū, *φάλαγγξ* *ἢ σφυγμὸς*. Vola, *ῥίπα*, ut utroque significet *ῥίπα* Aristoteli, totum scilicet & partem: uola etiam pedis pars concaua dicitur ex Plinio & Fest. Pōp. Manus partes oarie ab aliis explicantur: nam quibuldam *ῥίπα* ea pars dicitur cariosa, quæ in parte manus supioa iuxta pollicem assurgit, & ad indicem usque: quæ uero illi opposita est in eadem maous parte, *κατὰ ῥίπα*: pars uero exterior, *ἐπιδύμα*: quæ uero pars digitis pōxime subest, *σῖδξ*: *χεῖρ* dicitur, & oonnullis hæc pars *ὑπὸ ῥίπα* uocatur, & *σῖδξ* *χεῖρ* (quod & *ἀρσξ*) quoque dicitur) ea pars nominatur, quæ postcauam manus partē ante metacarpium iacet: concauam uero maous partem *καὶ ὅλκω* *χεῖρ* uocant: alij *κατὰ ῥίπα*, quæ scilicet inter *ῥίπα* & *σῖδξ* *χεῖρ* sita est. Alij uero maoum ita diuiduor: Totam uolam, id est partem manus internam, *ῥίπα* uocant, autoritate ficti Hippocratis arque Hometi: externam uero, *ἐπιδύμα*, *ἢ κῖμα*, *ἢ πρὸς ῥίπα*, *ἢ ὀδῶξ*: partem uero quæ iuxta carpi sita *σῖδξ* *χεῖρ* dicunt: quæ uero sub digitis, *πρὸς*, *κατὰ*.

De cruribus & earum partibus.

Cap. X.

- Inferioris autem membri quod *καὶ* uocant, bipartita compactio, utrinque à coxa dependens, crus est. Huius quod inter coxam & genu interiacet, fœmur & fœmen. Commune deinde fœmori & tibiæ, quod articulum constituit genu est: cuius pars posterior, poples uocatur. Quod foris orbiculatū adiectū est, contegens eam quæ ad genu est commissuram, patella uocatur & mola: tibiā, quod gemino ossē subiacet, cuius pars prior quæ carnis expers est, crea, posterior iura appellatur: quæ caro est neruosa. Postremum tibiæ, quod utrinque extat, malleolus geminus in utroque crure est. Quod deinde multiplici ossē constat, pes est: cuius pars posterior, calx: prior discreta in digitos quinque est: media, plantæ nomine explicatur. Reliquæ partes ad earum quæ in manu sunt similitudinem instructæ sunt: plantæ scilicet palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondent. Partes exteriores hæc sunt.

- D C. Crus, *καὶ*: ita uocatur hoc totum, quod ex fœmote, genu, tibiā, malleolis & pede constat. Fœmor fœmen uocat Celsus, *καρπὸς*: unde fœmoris interor partes *πρὸς μῖν* dicuntur: & qoz ioter fœmora sunt *μυστῆρια*. Genu *γῖν*. Poples, *κατὰ*, *ἢ ἰστία*, *ἢ ἑγκῖλα*. Patella *μῖλα*: alij *ὑπὸ νῖδα*, *ἢ ἐπιγαστρίδα* dicunt, uocatur & *μυκαρπὸς*, *ἢ ὑπὸ κλῖς*, *ἢ κῖρξ*, *ἢ κῖρξ*. *ἢ κῖρξ* etiam musculum significat qui in genu reperitur. Tibia (crus uocatur à Cello) *κατὰ*, eodem scilicet cum toto membro oomine. Crea, *κατὰ μῖν*, tibiā uocat hanc partē Celsus. Sura, *κατὰ σῖμα*, *κατὰ σῖμα*: quidā priorē partē *κατὰ*, posteriore *κατὰ μῖν* uocāt. Malleolus, *σφῖνξ*, *ἢ σφῖνξ* quidā uocor, & latine talos. Sunt autē *ἑστῶν* *ὅδ* partes illæ extaotes, sed qui intus à malleolis occultantur, ut inter ossā dicimus. Pes, *πῦξ*, *ἢ πῦξ*. Quod post malleolos & talū est, id totū pes uocatur. Calx *πῖξ*. Pedis partes uariē distinguuotur: etenim ut quibulcā placet, prior pedis pars à malleolis ad digitos usque *πρὸς* uocatur: interiora malleolis ad magnum usque digitem pedibus scē quasi aspicientibus *πρὸς* *ὅδ*: quod sub hoc statim in imi pedis medio habetur, *κατὰ* *πῖξ*, id est pedis cōcauam dicitur, latioe uola. Iosimum autem, quo terra

DE DIFFERENTIIS

contingimus & calcamus, ἄλμα est. Pars uero ea quæ post cauum pedis iuxta digitos extollitur, ἄδης ποδός, ἢ πρὸς ἄδης dicitur. Sequuntur deinde δάκτυλοι, id est digiti pedis quinque numero. Alij uero superiorem pedis partem totā, quæ ante digitos est, quæ scilicet ex nervis & ossibus constat, πρῶτος uocant: ἢ ἄρ' ὅτι πρῶτος, cuius priorem partem, quæ digitis proxima est, τέρσιον uocant: posteriore pedis partem πρῶτον, id est ealem: inferior pars tota, πλάμα, id est uestigium, quod scilicet carnosum est & inferius solum attingit. Galenus uero τέρσιον eam pedis partem uocat, quæ malleolis proxima est: quæ ex septem ossibus constat, uti infra apertius explicabitur: inter ossa & illi manus parti respondet, quæ καρπός dicitur: πρῶτος uero, quæ illi proxima est, quæ ex quinque ossibus constructa est: quibus adiunguntur pedis digiti, & metacarpio in manu respondet. Itaque constat à Celso plantam uocari, quæ ex utraque hac parte constat: sicut in manu palmam, quæ & καρπὸς continet, & μετακαρπῶν, ut modo dictū est.

De situ partium uario.

Cap. XI.

F

Habet sane homo (sicuti & cætera fere animalia) suas partes ita dispositas, ut & in eo superius sit & inferius: & prius & posterius: & dextrū & sinistrum. Et dextrum quidem & sinistrum ex similibus fere constat partibus, nisi quod sinistra omnia imbecilliora. At posteriora prioribus, & superiora inferioribus discrepant: præterquam quod inferiora similitudinē superiorum præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus respondere assolet faciei in corpulentia uel gracilitate: & crura cum brachiis communem ineunt rationem. Ita quibus lacerti breues, iis etiā fœmora magna ex parte breuia sunt. Et quibus pedes exigui, iis manus quoque paræ habentur.

*De sex istis differentiis situs
plura uideas libro de animalium egressu Aristotelis.*

Partium itaque situs, quemadmodum ad superius & inferius, prius posterius, sinistrum dextrum se habeat, paucis explicandus est: sex namque hisce differentiis moueri hominem liquido apparet. Superius autem intelligi uolo in animalibus, non ut idem sit quod in orbis uniuersi situ, sed quemadmodum supremam partem in omnibus eam esse dicimus, non animalibus tantum, sed quæcunque uita prædita sunt, per quam cibus recipitur. infimam autem ad quam postremo accedit. Partē quoque priorem eam uoco, in qua sensus præcipue comprehenduntur, & unde sensus emanant exordia: opposita uero illi pars posterior est. Dextrum autem, (quemadmodū & in uniuerso est) unde primus motus orditur. Ergo superiora inferioraque hominem omnium maximè animalium habere ad rationem differentiamque locorum naturalium intelligimus: eius etenim partes tam superiores quàm inferiores, ad situm orbis uniuersi superiorem inferioremque dispositæ sunt. Itidemque priores posterioresque, atque etiam dextræ sinistræque habentur: cum cæterorum animalium genus, uel respectu huiusmodi careat, uel confusus habeat. Caput itaque cum in cæteris etiam omnibus animalibus superiorem obtinet situm, corporis sui ratione: at homo potissimum, quoniam solus (ut modo diximus) ad uniuersū orbis habitum institutus est: (solus enim animalium crectus uiuit) idcirco partē etiā istam habet respondentem parti sublimi uniuersi. Caput collum excipit, tum pectus & dorsum: alterum prius, alterum posterius est. Subiacent iis uenter & lumbi, genitale & nates: mox fœmur & tibia: postremo pedes. Crura uero ante flectunt, eodem scilicet quo & incedunt. Calx è tergo positus

A situs est. Malleoli situm imitantur aurium: quippe qui latera teneant imi cruris, quomodo aures iunctæ lateribus capitis habentur. Brachia è latere corporis dextro sinistroque dependent, atque se intro flectunt: ita ut homini potissimum crurum & brachiorum deuexa, (*αυρη* Græci uocant) aduersa inter se sint. Et brachiorum prior ea pars sit, quæ à pectore est: posterior uero, quæ ab scapulis: sicuti interior quæ ad latus tendit: exterior quæ ab eo recedit: quod ad omnes articulos pertinere etiam patet. Sensuum autem partes sensorias, oculos dico, nares & linguam, eodem scilicet in priorem partem spectantes habemus. Auditus uero sensoriam partem, id est aures, à latere, eodem in orbe quo oculos. Ita partes exteriores collocatæ atque dispositæ sunt, nominanturque præcipuæ: & cognitæ per usum situmque B euidentiorem habentur.

De partibus interioribus, & primo de capitis partibus. Cap. XII.

Nunc interiorum ordinem persequemur. Primum igitur cerebrum capitis priorem obtinet partem: non modo in homine, uerum in cæteris etiam animalibus, quibus ea pars data est: omnibus autem in iis est, quæ sanguinem obtinet, & ob eam rem *σπαιμα*, id est sanguinea appellantur: ex cæteris fere nullum habet, nisi per proportionem, ut ea quæ *μαλακία*, id est mollia nomine speciali nuncupantur: ipsum ambiunt membranæ duæ quas *μυώσας* Græci dicunt: altera crassior & solidior, ossi caluæ adhaerens, quam *σκληρὴ*, id est duram uocant: altera *λεπὴ* dicta, quæ interior est: & cerebrum ipsum attingens, infirmior & rubicundior. Bipartitum omnium animalium cerebrum est, postremumque iungitur, quod cerebellum uocatur, quod spinali medullæ continuum est: duriusculum, hoc est & colore sufflaui. Cerebrum omnibus priuatum sanguine est, nec uenam intra se ullam continet: omniumque corporis partium frigidissimum sentitur, uel ad tactum, ait Aristoteles, Galenus pernegat: cute tamen frigidius ipsum asserit, quæ omnium animalis partium, quod ad caloris frigorisque sensum attinet, ueluti norma est. Ex cerebro ipso paria neruorum oriuntur septem, quas *συνεχῶς* uocant, qui in sæcūdi arte periti sunt. (iis quæ ad nares feruntur minime connumeratis: neque enim hæc neruorum more producuntur, nec extra caluam exeunt.) Et primi quidem passis nerui prodeunt, unus dextra, & alter sinistra, crassitudine notatu digna, & fere omnium neruorum mollissimi. Hi ueluti radices quædam oculorum uidentur: uterque enim ex priore cerebri parte prodians, atque in aduersum sibi oculum subiens, in latum sese explicat: ipsumque qui in oculo est, uitreum humorem in orbem sphaere modo ambit: membranamque (siue tunicam dicere malis) efficit, quæ *αυτὸσκληρὴ* dicitur, id est retiformis. Solis hisce neruis antequam in oculos inferantur, sensibilibus quidam meatus inest: unde ipsos quidam non neruos, sed *πρωὴ*, id est meatus appellauerunt, alij neruos opticos, quasi dixeris uisus. Alterum post hoc neruorum par est, in musculos qui oculos mouet distributum: puriores multo sunt hi, tenuioresque iis quos modo memorauimus. His adiacet tertium par. hos autem neruos molles uocant: molliores enim sunt, tum

DE DIFFERENTIIS

secūdi paris neruis, de quibus modo diximus, tum uero eius quod mox se- E
quatur, quarti, & item aliorum. oritur autem hoc neruorum par, ubi pars
cerebri anterior cum posteriore connectitur. Quarti uero paris nerui, his
posterius paulo siti sunt, à cerebri basi emergentes. Quinti quoque paris ner-
ui proximi iis oriuntur, sed ad capitis latera magis, ad ossa quæ λυθιδῆς, id est
lapidea dicuntur, uergentes. Hi uero cum statim bifidi fiant, in ipso scilicet
per ossa transitu, utrinque deinde prodeunt, altera quidem pars (ἀκρωτιακὴ, id
est auditorium neruum uocat) in priorem magis partem ad auditus mea-
tum: altera in partem magis aures, in ossis eius quod λυθιδῆς dicitur, fo-

*Quot quibusque
modis à capite
stergatur ner-
ui in alias cor-
poris partes, su-
sum ostendit Ga-
lenus lib. De
diffect. neruo-
rum. Cap. lib. 9
De usu part.
λῡωσις ὁ λυ-
χλωῦσις dicitur*


ramen quoddam, quod τρυβλῖς appellatur: id enim ueteres anatomici no-
men illi indidēre, cum utique penitus anfractum illum perforare non po-
tuissent, per quem neruus post aures foras emergit. Sextum neruorum par F
à cerebri basi producit per foramē quoddam, quod ad inferiorem illius
commisuræ partem, quam λαυεὶδιδῆς uocat, à λ litteræ similitudine, conspi-
citur. Nec dum etiam nerui isti duri apparent: prædictis tamē omnibus eò
duriore sunt, quo iā spinali medullæ sunt propinquiore. hæc nanq; eorū
qui duri sunt, neruorum, principium est. Vbi autem cerebrum desinit, illic
oritur septimum neruorum par: quod unā cum sexto pari è caluaria se ex-
erit. Habet in se cerebrum, plerisque omnibus, cauum quoddam exiguum
ueluti lacunam λῡωσις ab Herophilo dictum, id est torcular. habet & uētri-
culos (περικλῖες uocant) in priore quidem parte, hoc est in cerebro ipso, binos:
in posteriore uero, quod cerebellum uocatur, unum. Et præterea à priori-
bus in posteriorem meatus quidam transire cernitur, quem sane quartum G
totius cerebri uentriculum nonnulli anatomici uocant. A prioribus illis
utrinque exoritur processus quidam oblōgus & concavus, in narium usq;
principium protensus, à uentriculorum illorum natura nihil prope muta-
tus: soltactus instrumentū primum hoc esse medici tradunt. Et cerebri qui-
dem partes, & quæ ex his oriuntur, hoc se habere modo cernuntur: quæ
uero in oculis sunt partes, iam explicandæ à nobis sunt.

De oculi partibus interioribus.

Cap. XIII.

Molles illi, quos primi paris neruos, & à priore itē cerebri parte ori-
diximus, cum primum è caluaria egressi ad oculos peruenerint, in
latum sese (ut modo expositum est) explicātes in orbem sphaeræ modo, ui- H
treum humorem, quem ὑαλοειδῆς uocant, amplectuntur: efficiuntq; mēbra-
nam illam, siue tunicā, quæ ἡμετερονειδῆς dicitur, eò quod ἡμετερον, id est
reti similis sit. Quæ tamen tunicam membranæ uel neq; colore, neq; sub-
stantia refert penitus: sed si exemptā ab oculo eam seponas, atque in unum
colligas, apparebit plane ceu cerebri portio quædam. Inscritur autē hæc in
humorē oculi, qui κρυσταλλινὸς dicitur, id est crystallinus aut glacialis, quod
primum uisus est instrumentum, estq; affectuum crystallini certus ad ce-
rebrum nuntius. Sunt autem in oculo intus sub tunicis humores orbicula-
res duo: mollis alter perinde ac uitrum, quod modice solutum ac fufum sit:
alter ita durus, ut glaciem mediocriter concretam imiteretur: nec corporis
habitu

*ἡ ἐγγυστεῖδῆς
quoque hanc no-
cat Iulius Pol-
lux libro 2.*

- A habitu solum, sed colore etiam tum vitrum tum glaciem referunt: vocanturq; à medicis, hic quidem qui mollior est, *υαλοειδης*, id est vitreus: ille uero durior, *κερυνειοειδης*. Est autē crystallinus, candidus, splendescens, perspicuus, & ut dictum est, duriusculus, figura globuli leuiter cōpressi: at vitreus (qui in hoc à natura institutus est, ut sit crystallino familiare alimentum) liquidus est instar uitri ab igne liquefacti: albi uero coloris tantum habet, quantum si intellexeris exiguum nigrum multo albo permixtum, ut sit albedinis perfectio adulterata. Tunicam *αμυειδαν* continet alia *ρεοειδης* dicta, (quæ reuera tunica est, & corporibus subiectis operculum) orta à tenuiore cerebri membrana illi cognomine. Vasa hæc plurima, arterias scilicet & uenas in se habere conspicitur, quæ & alimentum *αμυειδαν* præstent: & uincula illi seu sustentacula fiant. Cærulea hæc multis in partibus est, tum fusca, tum etiam nigra. Circundat hanc, & tuctur tertia quædam membrana durior, & quæ subiectam sibi tunicam ab ossium duritie tueri possit. A crassiore cerebri membrana hæc producta est, & apud iridis circum alteri membranae inferiori coniuncta. Porro iridis circulus ita se habet. Crystallinus ille humor (quem primum uidendi instrumentum esse diximus) in vitreum humorem inseritur: & medius in ipso, quasi in aqua uehitur, eodem prope modo quo sphaera globusue, cuius dimidiū extra aquā promineat. Hæc humorum connexio in crystallini medio hemisphærio, in utroque humore circulum unum efficit. Locus hic terminus est, finisq; *αμυειδαν* tunicae atque *ρεοειδης*: efficitq; eodem loco suum utraque circulum. Ad eundem hunc circularum locum prope accedunt aliunde membranae præterea duæ, altera *αφθηράσις*, finisue est musculorū oculos mouentium, in duriores illam tunicam inserta: altera à membrana caluariæ ambiente (*ωκυαροειδης* Graeci uocāt) producta est. Hæc colore alba est, & totum oculum cum ossibus contegit: definit autem ad circulum eundem, ubi & reliquæ oculi membranae: & ubi nigro oculi iungitur album. Locus hic si probe omnia dissecueris, diligentérque omnia perspexeris, circulos ostendet plures (nempe septem) sibi mutuo coherentes, & crassitudine, & colore uarios: ut appositissime à ueteribus harum rerum peritis, iridis nomen datum illi sit. nonnulli autem & *στέφανος*, id est coronam uocarunt. At tunica illa tertia duriore, quam  crassa cerebri membrana oriri diximus, & quæ
- D *ρεοειδης* tunicam proxime circundat, ex iridis circulo producit membrana alia, quæ & dura est, ut sit crystallino humori operimentum, & ueluti propugnaculum aduersus ea quæ extrinsecus occurrere solent: & prætenuis simul atque alba, ne ullo pacto uisum impediatur: densa adeo ac tenuis, (præsertim in media sui parte) ut non aliter quàm cornu prætenue, & quam accuratissime derafum, splendore transmittere possit: unde & nomen illi impositum est *ωγενειδης*, id est cornea. Est uero hæc membrana quauis aranea tenuior candidiorq;, & quouis speculo leuior magisq; pellucida pariter ac dura. Quæ proxima illi subest mollis est, uenosa, nigricans, & in medio pertusa. Oritur hæc una cū cornea ex iridis circulis, à tenuiore illa tunica, quæ *ρεοειδης* dicta est: corneamq; sibi uicinam alit, ac eadem ne in crystallinum

DE DIFFERENTIIS

humorem concidat, prohibet. Membrana hæc intus qua uitreo humori **E** proxima est, asperitatem quādam habet: extra uero qua corneum attingit, densior est: in medio autem sui qua pupilla est, perforatur. Atque hoc in loco, ubi scilicet foramen est, nulla tunica inter corneam & crystallinum humorem media est: sed ueluti per tenuem admodum & album cornu, splendor internus cum externo cōmunicat, & commiscetur. Cæruleam hanc tunicam in medio perforatam, ab acini uuæ similitudine quadā (quod scilicet intus aspera non aliter sit, foris leuis) *ἐκταλὸς* uocarunt. Cuius substantia, ea parte qua humori crystallino coniungitur, spongiæ madidæ similis est. Et corneæ tunica qua quidem parte unā cum ea quæ *ἐκταλὸς* dicitur, ab iride exoritur, humori crystallino propinquā est. membranæ enim oculi omnes pariter atque humores, eo in loco cohærent. Exterius uero magis magisque à crystallino abscedit: adeo ut qua pupillæ locus est, plurimū ab eo distet. Porro hoc ipso interuallo quod est inter humore crystallinū & *ἐκταλὸς*, humor quidam prætenuis reperitur & limpidus, ouorum albumini haudquaquam dissimilis, quo unā cum spiritu quodam æreo splendido prohibetur cornea, ne eo in loco crystallinum humorem comprimat aut contingat. Si enim pertundatur pungaturue cornea, confestim & humor ille per uulnus effluere cernitur: oculūque rugosus efficitur, contractus atque laxus. Inter hunc humorem & crystallinum, membranula quædam, in modū cepæ corticis aut aranæ prætenuis est, quo crystallinus humor ab rhagoidæ membrana sepatatur. Quod autem reliquum in oculo est, pupillam ambiens, (exceptis qui oculum mouent musculis) non in hōmine solum, sed omnibus animalibus quibus oculi duri non sunt, sebi naturam imitatur. Et oculi quidem partes, tot numerantur: quanquam crystallinus humor primum uisus instrumentum est, ut sapius iam dictū est: reliquæ uero eius causæ factæ sunt.

E. Nulla tunica, nullam forsitan tunicam conspicuam intellexit Galenus. Nam *ἀραχνοειδής*: membranula quonammodo prætenditur crystallino humori, statim explicabitur ex eodem Galeno. **F.** Humor prætenuis, humorem aqueum uocauit hūc Asclepiades: hic in suffusionibus coagulatur. Membranula, hanc membranulam tenuem adeo ut ægre conspici possit, ex *ἀμυδαντοειδῆ* natā, non distinxit Pollux (ut arbitor) ab illa, sed quasi eandem membranam duplici nomine insigniuit, ut antea notauimus, scilicet *ἀμυδαντοειδής*, & *ἀραχνοειδής*.

H

De colli & pectoris partibus interioribus,

Cap. XIII.

Asperam arteriā Læti antiqui gurgulionem uocat, & spiritalē fistulam.
Larinx, λάρυγξ.

Collum capiti subiacer proximum, ut ante dictū est. Intra collū gula est, cui comes aspera arteria iungitur, priorē obtinēs situm in omnibus iis quæ eam habent: habent autē omnia quibus pulmo est. Huius summa pars larinx dicitur, ut ante diximus: in cuius meatu particula quædam linguæ quæ in fistulis est, non absimilis cernitur, cui in uoce formanda primæ partes tribuuntur, nomine *γλωττίς* (quasi lingulam dicas) & *παρὰ τὴν λάρυγγα*, id est lingua laringis. Iungitur postremæ linguæ parti minor lingua, quæ *ὑπογλωττίς*, & ligula nominata est, posita inter principia gulæ & laringis, cartilaginea

Alaginea, prætenuis, forma hederæ folio per simili: cuius pars latior ad ipsam linguam: mucro uero ad interiores oris partes uergit, uidelicet apta quæ per uices arteriæ foramentum quod ad os spectat, operiat. respirantibus enim crecta est, at deglutientibus prona. Arteria ipsa multis cartilaginibus constat: & altero sui extremo cum lingua ima coniungitur: altero ad pulmonem descendit: tum in utraq; finditur pulmonis partem. esse nanque bipartitus pulmo omnium cõsuevit. Hinc arteriæ partes illæ binæ in multos uoluti ramos sparguntur, *σπέρμας* uocant. Gula ab ore & ipsa dependet, continua tum spinæ tum asperæ arteriæ, nexu fibrarum, & per septum transversum descendens, in os uentriculi finit, nervo carneq; cõstans: & pariter distendi in longum latumq; habilis. Quæ intra pectus continetur omnia, *σπέρμας* dicuntur. Spatium uero ipsum pectoris totum, *πὸν σπέρμας*.

De uisceribus & septo transverso.

Cap. XV.

Sequitur ut de uisceribus doceamus. Naturam habent omnia uiscera, carnem quidem, sed sibi consimilem, cæteris dissimile. Sunt enim carnosissimi generis species plures: primo quidem quæ proprie caro appellatur, deinde cuiusque uiscerum propria substantia est. Eam Erasistratus paræchyma uocauit: quandoquidem posita sit ad meatus uenarum, & intercapedines: proinde quasi sex aquæ profluentis, ita sanguinis per uenas fluentis, uiscera illa, ueluti *σπέρμας*, id est profusiones consistunt. Sunt autem uiscerum, quædam supra septum transversum, quædam infra. Cor situm in pectore **C** est opertum inuolucro pingui & corpulento, quæ uenæ maiori annectitur, & arteriæ quæ aorta nominatur. & cæteris quidem animalibus in medio pectore situm est, homini tantum paulo uergit ad leuam. Extremum eius (*πυλὸς* Græci uocant) turbinatur in mucronem curuosum & firmissimum, & omnino parti corporis priori commissum est: at parti sui ampliore superiora corporis spectat, præterquam in piscibus. solis enim iis cordis mucro ad caput spectat. Cordis pars illa amplior qua membranæ connectitur, *καλλιπύκναις* uocatur. Nervi quosdam suis in cauis continet: sed cor sine osse est omnium quæ nos nouerimus, præterquam maximorum quorundam animalium: ossi tamen quiddam simile omnibus inest: cuius substantia non in omnibus æque dura est. in minutis enim animalibus, ad cartilaginis **D** duritiem prope accedit. quod enim in iis nascitur, non omnino cartilaginis, sed corporis ex nervo & cartilagine conflati naturam habet. In maiusculis perfecta cartilago est: in iis uero quæ grandiora sunt, cartilago ossea est: at in maximis animalibus, os cartilagineum potius dicendum est. Quo namque uastiore corpore fuerit animalis genus, eo propius ad ossis duritiem accedit cartilago illa. In corde, uentriculi siue sinus fere bini inueniuntur, unus in latere cordis dextro, in sinistro alter. Non tamen idem in omnibus est uentriculorum numerus. quibus enim pulmo deest, hæc neque dextrum cordis uentriculum habent. Inter utrunque cordis uentriculum, medium quoddam est quasi septum. Auriculas item habet cor binas, uentriculis adhærentes, quæ concauæ sunt, & substantia constant cutanea, au-

DE DIFFERENTIIS

riculas eas dixere ueteres, ob similitudinem quandam earum quę in capite E sunt: utrinque enim cordi, sicuti aures capiti adhærent. Sed de corde hæc nus: reliqua etiam uiscerum iam consideranda sunt. Pulmo spirandi officina est, attrahens ac reddens animam: idcirco spongiosus ac fistulis inanibus cauus. Bifidus consuevit esse omnium pulmo, quanquam partium distinctio in omnibus nõ æque cernitur. Est enim hominis pulmo simplicior, atque à singulari arteria partes in utrumque latus duę dependēt: uenę quoque maiori, atque arteriæ, quæ aorta ab Aristotele uocatur, pulmo connectitur. Sub pulmone septum pectoris est, quę præcordia & septū transversum appellant: determinat enim hoc à reliquis pulmonem & cor. Costis hoc & hypochondriis & spinæ, parte sui carnosiore, ualidiorque annexum est: parte uero media tenue est, membraneaque exilitate contextū. F

Iecur sub septo positum, à dextro latere est: Lien à læuo in omnibus, quæ membra ista disposita habent per naturam non prodigiose. Iam enim legitimum illum locum in nonnullis quadrupedum, lienem cum iecinore permixtassem uisum est. Iecinoris pars, quæ ad septum transversum & peritonæum est, conuexa uel gibba: quæ autem inferne uentriculum tangit, caua uocatur. In iis animalibus quę lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum esse uidetur: adeo ut Plato lienem iecinoris *ιμαγρον*, id est effigiem dixerit. Quæ autem lienem non habere necesse est, sed exiguus admodum lien ueluti notæ gratia habetur, iis iecur bipartitum aperte est: & pars altera ad dextram, altera (quæ minor est) ad sinistram situm habere solet. Et in nonnullis adeo diuisum patet, ut locis quibusdam lepores bina G iecinora habere uideantur: quemadmodum in genere piscium, tum alij, tū cartilaginei iecur duplicatum habere uidentur. Fibras habet iecur, *λεβν*, *ιπατιου* græce uocantur. est enim iecur, aliis multifidum, aliis simplicius.

Iecur magna ex parte maximoque animalium numero, felle caret: uerum in nonnullis id habere in uesica sibi adnexum cernitur. Quæ enim sanguinem habent animalium, maior pars fel habet, aut iecori aut intestinis annexum: ut piscium plurimi, necnon serpentum maxima pars. Renes post hæc iuxta spinam ipsam adhærent in illis: ex uisceribus ij maxime pinguescunt: & quanuis uehementer fuerint pingues, mediis tamen fere aliquid deest. Dexter in omnibus quibus sunt renes animalibus, superiorem obtinet locum, (nonnunquam iecoris fibram aliquā attingens) minúsque pingui obducitur, & squalidior est, quod uel in omnibus æque liquido manifestatur. Porro à spinæ uasis, arteria scilicet & uena magna, inferuntur in eos haud exiguæ magnitudinis uasæ: aliis utrinque singula, aliis quibusdā bina. Figura iis sima fere est, qua parte arteria & uena ipsis inferuntur, & qua se mutuo respiciunt: opposita uero parte, gibba. In omnium fere renibus sinus inest concauus, (quibusdā amplior, ut in maioribus animantibus, quibusdā uero arctior, ut minoribus) corpore quodam membraneo circumdatus. Ex hoc utrinque sinu haud procul à locis quibus inferuntur, quæ diximus uasæ, meatus duo insignes concaui atque prælongi, ad uescam feruntur singuli ex singulis renibus, *νεφροεις* à Græcis dicti. Et de uisceribus

In illis, *αυτῶν*
λεβν.

νεφροεις, *νεφροεις*
αυτῶν.

A scribis quidem, hoc est de pulmone, corde, iecore, liene & renibus, dictum iam est.

B. Viscera, *σπλάγχνα*. Intecapedines, *σπλάγχνος*, uetus Aristotelis interpres uacuitates dixit. C. Cor, *καρδίη*. D. Ventriculi siue sinus, *κοιλίαι*, & *κλίμαται*, res in maiori animalium corde esse uentriculos sentit Aristoteles: uerum tertiam illam cauernam partem esse dextri uentriculi asserit Galenus. Auriculæ, *ὠτίαι*. E. Pulmo, *πνεύμων*, & *πλήμων*. Septum pectoris, *φρένες*, & *σφραγίς*, præcordia appellantur, quia cordi prætenduntur: alias præcordia uocamus uno nomine, exta in homine. F. Iecur, *ἥπαρ*. Lien, *σπλήν*. Conuexa, *κυρτά*. Caua, *σμά*. G. Fel, *χολή*: nomen hoc commune est, & humori ipsi, & uesiculæ humorem continenti. Renes, *νεφροί*.

De uentris partibus interioribus.

Cap. XVI.

Ventriculum appellamus eam partem, in quam cibis deuoratur: uentriculi os sub media pectoris cartilagine, quæ *σφαλάνης* dicitur: reliqua pars infra sub septo transuerso sita est. fundum habet uentriculus amplior, & in homine certe ad dextram potius inclinatum: pars uero superior, quæ ad gulam tendit, arctior est. In aliis fere animalibus, in anteriora ad hypochondrium tendit uentriculus. huius ostium inferius, quo cibo exitus patet, in intestinum, ad dextram prope iecur situm est: *πύλωσις* hanc partem Græci uocant, quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emittit. Pyloron intestina excipiunt, flexuosis orbibus conuoluta: quorum natura, quatenus intestina sunt, eadem in omnibus animalibus est: magnitudine autem, & anfractuum (quas *ελίξεις* dicunt) numero, discrimen habetur. In his ab egressu ipso ex pyloro, est quod *τετράδικοι* & *Ακαδικὸς ὄλος* ab Herophilo (quod duodecim digitorum longitudinē habeat) dictum est. Hoc principium est intestini, prius quàm in anfractus orbisq; conuoluatur. Quod autem sequitur flexuosis orbibus conuolutum, nō ita tamen implicitum, ieiunum intestinum uocatur: cui tale uocabulum est, quia nunquā quod accipit, continet, sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenuius intestinum est, in sinus uehemēter implicitum: orbis uero eius in dexteriores partem conuersi, & è regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transuerso cōmittitur, quod à dextra parte incipiens, in sinisteriore peruium est, in dexteriores non est: ideoq; cæcum nominatur, tumidum quoddam existēs. Ad id quod peruium est, *κόλον* appellatum, late fusum atque sinuatum, ab utraque parte huc atque illuc uolutum, magis tamen sinisteriores inferioresq; partes tenens, contingit iecur, atque uetriculum: deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atque hinc dextra recuruatum, ad exitum usque excrementi rectum pertēdit: ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur: breue id, corpulentumq; huius finis est musculus, *σφιγκτηρ* Græci dicunt: quo cohibetur alui excrementa, ne inuitis nobis effluant. Contegit uero uniuersa hæc omētum, quod non nisi membrana præpinguis est, Græci *ἐπιπλην* dicunt. oritur id de medio uentre, statimq; à septo transuerso dependet. Quod autem lateñs uocant, membrana & ipsum est duplex pertendēs continua de intesti-

DE DIFFERENTIIS

nis ipsis ad uenam usque maiorem, quæ in iecoris porta est, atque illi adiunctam arteriam, plena uenarum multarum, quibus alimentum iam probe in uentriculo concoctum perfertur ad iecoris portas, Græci πύλας uocant. Venis ipsis atque arteriis quæ prope iecoris portam in ramos finduntur, substernitur caro quædam glandulosa πύλινος aut χαλάρης à Græcis nominata. Vesica ultimo uentris loco, sub ossibus latis, quæ ilium ossa dicuntur, posita est, meatibus annexa illis, qui ὑποπύρις dicti sunt, porrectis à renibus ad uescicam: & ipsa quidem nervosa, tenuis atq; exanguis est, collum uero habet carnosum. Genitale huic ceruici uescicæ adnectitur, foramine uno foras directo (quod ὑπερπύρις nominari diximus) peruiam, sed quod hoc loco bifariam diuisum sit: quorum foraminum alterum ad testes, alterum ad uescicam tendit. Testes ex genituali maribus pendent. Atque hæc eodem modo uel in sexu fœmineo omnia natura cōformauit, atque disposuit: nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero: cuius forma qualisnam sit, ex cōsecutionum descriptione petendum expectandumq; est: situs eius super intestina, & infra uescicam est. Ostium autem uteri, quasi ceruix carnosæ admodum, cartilagineæq; parti animantium plurimæ æuētissimæq; tributum est, diciturq; μήτρα, id est matrix. Pars uero interior, siue spatium internum, loci & uterus appellatur in homine: hoc in reliquis animalibus uulua. Prominent utrinque ad superiores eius partes, exortus, alij λάρπες dicunt, alij ωλικαπύλας, quali cornicula dixeris, & flagella cirrōsue. Sed de uteris generum omnium differendū postea est: neque enim similes dati omnibus sunt, nec forma simili constituti. Partes animalium dissimilares interiores exteriorēque hunc in modum haberi cognitum est.

B Ventriculus, κελεύς, ἡ γαστήρ, ἢ ἡ αἰὼν κελεύς: aluum dixit Cic. lib. 2. de natura deorū. Intestina, ὑποπύρις, ἡ λεικός. de his ita prodit Plinius. Ab hoc uētriculō laetēs in homine & oue per quas labitur cibus: in cæteris illæ à quibus capaciōra intestina, hominūq; flexuosissimis orbibus ad aluum. De intestinis lege Pollucē lib. 2. C leiuum intestinum, πύρις. Tenuius intestinū, λεπτότερον, ἢ ἀπλοῦν. Cæcum, ποφύλον. D uulua, ἡ κατώ κελεύς, καίριος Homero: Celsus etiam intestinum plenius uocat, & aluum: & Plinius quoque aluum: & Gellius aluum colon uocari tradit. Rectum intestinum, ἀπλωδισμάριον, ἢ ἀπὸ γαστρός. Σφιγγαστήρ, σφιγγαστήρ, ἢ σφιγγαστήρ, ἢ σφιγγαστήρ, Laetēs, μεσεντερίας, ἢ μεσεντερίας, hoc Cicero, ni fallor, medium intestinum uocauit. lib. 2. de nat. deorū. Laetēs Plinio aliud significat, ut modo dictum est. Vesica, κύστις. Collum uescicæ, χαλάρης, ἢ κύστιος ἡ χαλάρης, uescicæ ceruix. Ostium uteri, στήμα, ἢ ὑπερπύρις. μήτρα, ἢ ὁ κατωλός, ἢ ὁ στήμα, ἢ ὑπερπύρις, id est ceruix, & ostium uteri, πύλινος ἢ ἡ χαλάρης. Loci & uterus, ὑπερπύρις καὶ μήτρα, ἢ ὁ γυναικῶν καλός.

De partibus similiaribus.

Cap. XVII.

Similium autem alia molles & humide sunt, alia sicce & solide. Molles inquam uel omnino, uel quandiu secundum naturam manent, id est in sede & cōcoctione naturali, ut sanguis, sanies, adeps, sebum, medulla, semē genitale, fel, lac, caro, & quæ iis proportionē respondent. Non enim omnia animalia partes has obtinent: sed sunt quæ ad proportionem nonnullarum ex his constet. item excrementa omnia similiaria uidetur: pituitam dico & bilem, tum flauam, tum etiam atram, & sedimēta alui atque uescicæ. Siccas ac solidas

A ac solidas intelligi uolo neruum, cutem, membranam, uenam, pilum, os: item & quod uice fungitur ossis: ut spinam, *ἀγκύρα* Græci dicunt, & cartilaginem, unguem, cornu: item quæ iis proportionē respondent.

De sanguine, uenis atque arteriis: & quæ iis proportionē respondent. Cap. XVIII.

E Similariū numero humorem quēdam genus unum quodq; animalium continet, quo si aut per uim, aut per naturam ipsam priuetur, in perniciem agatur necesse est: habet etiā diuersum quoddā, id scilicet in quo humor ille cōtineatur. Sunt hæc in aliis sanguis & uena: aliis quod iis proportionē respondeat, ut fibra & sanies. Hinc sanē animalia alia dicuntur, id est sanguine prædita & sanguinea, alia *ἀναιμα*, id est exanguia. Et sanguineis quidem omnibus, similariū sanguis potissimum communis est: nec min⁹ communis ea pars est, qua sanguis continetur, quæ uena dicitur: exanguibus autem, proportionē illis respondēt, sanies & fibra. Cū itaque natura sanguineæ uenarumq; corporis principiū esse uideatur, primum de iis differendum est. Sedenim natura uenarum ita se habet. Duæ intra thōracem uenæ continentur: uenarum enim nomine etiā uas illa pulsantia, quas modo arterias uocamus, à uetustissimis, tum medicis, tum philosophis appellari uideo: altera earū maior, quàm uenam cauiam ob insignem eius cavitatem uocant. Hippocrates *ἡνὶ τῇδε*, id est iecorariā dixit. Altera minor quàm aortam uocant nōnulli, arteriam medici posteriores: eodem etiā nomine uas singula, quæ pulsū habeant nuncupantes. Sūt etenim arteriæ spirituum semitæ, quarum certe pulsus in cacumine membrorum euident est. Vtraque ueluti caudex est, seu truncus omnium quæ per totum corpus sparguntur uasorum: uenarum altera, quam scilicet cauiam uocari diximus: altera uero, quæ & arteria dicta est, arteriarum. Neq; uenæ fere deest arteria: & quacunque corporis parte arteriam uideris, eadē & uena conspicietur, paucis quibuscūdam exceptis uenis. Quanquam qui ab arteria oriuntur rami, minores multo sunt, quàm qui à uena maiori proficiuntur. Sed qui diligētius nosse uelit, quemadmodum uenæ arteriæque inter se habeant, spectare id tum per dissectionem, tum etiā per commentationem, hoc est historiā animalium debet. In iis uasīs qui continentur humor, qualiscunque is sit, una sanguinis appellatione censetur. Sanguis si integer sit, rubet & dulcis saporis est: salsum nanque sanguinem, sicuti & falsam pituitam, morbosos humores esse perspicuum est. Verū qui in arteriis reperitur, tenuior simul & calidior, magisq; flauus est, quàm qui in uenis atque purior: ut qui spiritui animali nutrimentum præstet. Et qui in sinistro cordis uentriculo reperitur, fere tenuior est, atq; magis flauus, quàm qui in dextro: quanquam nonnūquam etiā crassior atque atrior, uerum semper calidior. Qui uero in dextro sinu est, eandē speciem habet cum eo, qui in iecore, & in omnibus totius corporis uenis reperitur. Solus omnium humorum sparsus per totum corpus animalium sanguis est: effluitq; sanguis quancunque partem incideris carnis uiuæ atque incorruptæ. Venæq;

ipse in prætenuis postremo fibras subter totam cutē disperſit, adeo in anguſtata ſubtilitate tenuantur, ut penetrare ſanguis nō poſſit, aliōdne quā exilis humor ab illo, qui cacuminiſus innumeris ſudor appellatur. Sanguis in primis neceſſarius communisq; omnibus animalibus ſanguineis eſt. eſt enim his ultimum alimentum. Atque deſicit ſanguis quoties cibus nō ingeritur: quoties uero ingeritur, augetur: et ſi alimenta bona aſſumuntur, ſanguis integer eſt, ſi praua uicioſus. Liquidus & calidus ſemper eſt, quādiu in animalis corpore continetur: at ubi effluerit, & creſcit ſere omnium ſanguis, niſi fibræ, quibus reſertus eſt, eximantur: ſi uero fibræ detraxeris, ſanguis non cogetur. Sanguis incoctus ſanies eſt: incoctus autem, antequā concoctus nondū eſt, aut quia in ſerum degenerauerit. Fit enim per concoctionem ex ſanie ſanguis.

A. Sanguis, αἷμα, uena, φλέβα: fibræ, τριβ: ſanies, ἰσχυρ. B. Hippocrates in libro ε' *ἀμφὶ τῶν αἰμάτων*. Cum naſcitur infans cui uena quæ in cubito eſt, pullauerit, fuſioſus ille & iracundus euadet: cui ſenſim mota fuerit, lētus. Plato etiā in Timæo: cor uero ſimul & uenarū fontem, & eius ſanguinis, qui per omne corpus cū impetu fertur, &c. Celſus quoque in proœmio, Neque quid uenas moueat, inquit, ſed quid quæque genera morbus ſignificent, &c. Plinius lib. 3. Nullo uino æque uenæ excitantur, & alijs item plerique locis. Vitruuius lib. 1. richmos uenarū appellauit. C. Arteria. Quemadmodū à maximis hiſce caudicibus exeunt radices atque rami, id eſt uenæ arceſcitq; minores paſſi per uniuerſum ſparguntur corpus, accurate docuit Galenus, cū in alijs, tum utro breuiſſime ſimul ac apertiſſime in eo libro, quem de Diſſectione uenarū & articularum inſcripſit. D. Sanguis, αἷμα. E. Sudor, ἰσχυρ. Sanies, ἰσχυρ, ſignificat etiā id quod in exanguiſus uicem ſanguinis præſtat: ſicuti & in quibuſdā itid eſt uirus.

De neruis, ligamentis, & tendinibus.

Cap. XIX.

Alijs oſſe & quinquaginta.

Neruorum mox ordinē perſequemur. His ceu canalibus quibuſdā traſmittitur ſenſus, & motus à cerebro in uniuerſas animalis partes: Aut enim à cerebro manifeſte oriuntur, aut per mediā dorſi medullam tranſmittuntur: ex qua prodeunt circiter ſexaginta. Nullus à cerebro aut ſpinali medulla producitur neruus, αἰσθητὴς, id eſt non coniugatus, ſed ſemper alter ad dextram, ad ſiniſtram alter: eadē prorfus utrinque magnitudine, ſuum obtinent. Nerui omnes ſua ſubſtātia cerebro ſunt duriores: uerum qui ſenſum oculis præſtant, denſiores omnino conſpiciuntur, haud magnopere tam duriores: atque hi omnium ſoli ſenſibiles meatus in ſe habere cernuntur. Sunt nerui alij molles, alij duriores: molles nerui, ſenſus ſunt inſtrumenta, quemadmodum duri, motionis. Ex parte cerebri poſteriori: mollis neruus penitus nullus producitur: ex anteriore autem duros quosdam neruos oriri fuit neceſſe: in quibus, opinor, ſunt ij quibus oculi mouentur. Quicunque uero neruorum molliores ſunt, ij nihil à medulla ſpinali diſſerre uidebuntur, quod ſcilicet ad mollietatem attinet. Nerui non ſolidantur incifi: mirūmq; uulneratis ſummus dolor, præſectis nullus. E neruorum genere cenſentur ligamenta & tendines: ligamentum proprie & non communiter appellatum corpus eſt neruoſum, album, exangue, ſolidum, ſine ſenſu, ſimilit̃er quæ neruo concauitatis experts: ex oſſe quidem omnino ortum

A tum habens: insertum autem in os aut musciculum: ut scilicet os ossi, aut musciculum ossi coniungat, & tanquam uinculū contineat. Musculorum *ἐκπερισσῶς* tendines nominantur, in quos scilicet musculi desinunt: mista autē eorū natura est, & media inter ligamentū & neruum. Horū quidam adeo efficiuntur tenues, ut mēbranę potius uideantur. Facile autē dignoscuntur: nā si hos clara luce penitus inspicias, fibras quasidā intercurrentes ostendēt.

G Nervus, *νεῦρον*, horum scētionem in uniuersa corporis membra ostendit accuratissime Galenus lib. de usu partium, & de neruorum dissectione. Notat Aristoteles ē cerebro exoriri meatus duos neruosos ualidos, qui per ipsas oculorum sedes, pertendentes in superiores *χειρὶδες* finiunt: cum alioqui sentiat neruorū originem à corde, non à cerebro duci. **H** Ligamentum, *σύνδεσμος*: hæc uel neruorum nomine uocant Aristoteles & Plinius. Sunt & alij ligamentorum usus, ut uidere est apud Galenum libro Anatomices primo. **A** Tendines, *τένοντες*, ἢ *ἐκπερισσῶς*, tendones.

De fibris.

Cap. XX.

Fibrę inter neruum & uenam suam habent naturam: & nonnullę humorem, saniem appellatum continent. tendunt à neruis ad uenas, ac inde ad neruos. In corde item fibrę sunt, quales in musculis cernimus, quibus caro circumhæret: cæterum item fibrarum non est idem fibrarum genus, sed quę in musculis habentur, neruorum ac ligamentorū sunt particulę. Cordis propria quędam est fibrarum species, æque scilicet ac uenarum tunicę atque arteriarum: itēque intestinorum, uentriculi, uteri, & uesicę utriusque licet enim in iis membris, propriam quandam uidere carnem suis ipsorum **C** fibris circunnaſcentem. Aliud item genus fibrarum est, quod consistere in sanguine solet, quanquam non cuiusque animalis: spissari autem sanguis non potest, si id genus fibrarum detrahatur, ut dictum est: spissatur uero si non detrahatur. Genus id ergo fibrarum, tametsi maiore ex parte in sanguine animalium inest, tamen cerui, procis & bubali, & aliorum quorundam sanguini deest: quocirca eorum sanguis nō similiter atque cæterorum concreſcit, sed ceruorum perinde ut leporū solet spissari: uidelicet non coitu firmiore, ut cæterorū, sed fluído, quale lac est quod iniecto coagulo coierit. Sanguis, uena, arteria, neruus, ligamentū, tēdo & fibra, ita se habēt.

De ossibus.

Cap. XXI.

Ossa omnium animalis partium sunt durissima, maximęq; terrestria. **H**ęc tanquam fundamētum quoddam ad uniuersi corporis molem sustentandam subiiciuntur: iis nanque membra omnia firmantur: magnitudinis quoque animalium meta atque terminus iis describitur. Ossium quędam grandia & ampliter concava sunt ac medullosa: quędam minora, solida, ac sine medulla. In iis quę imbecilliora sunt animalibus, ossa sunt laxiora ac caua magis: fortioribus uero densiora ac conferta magis: ac proinde canis, lupus, panthera, reliquęque omnia, quę musculis ac neruis sunt robustioribus, densiorem multo ac duriorem habēt ossium compaginem, quàm oues, caprę, & id genus alia: quin & leo qui omnium est ferocissimus, ossa in cæteris quidem membris omnia habet medullę expertia: in fœmoribus uero & si quis alius id genus artus, admodum exiguum ac te-

nuem . hominis uero ossa, quæ in ipso uel maxima sunt, caua & laxa inueniuntur: ut qui leone mulculos habeat longe imbecilliores. Atque hæc quidem in omni animalium genere adeo seruat natura, ut nō modo gressile nullum, sed ne uolucres quidem aut aquatile aliter habeat. quandoquidem aquilis dēssima ac durissima sunt ossa: deinceps & accipitrum ferocioribus, circo, palumbario & similibus: gallinaceo uero, anatis atque anseribus, laxa simul ac caua, leuissq; ossium est substantia. Ossa uni tanquā principio sunt connexa, & omnia inter se aptata, unam continuat feriem, modo uenarum: nec est ullum os, (quod effatu dignum sit) quod scorsum ipsum per se maneat. Initiū uero omnibus spina est: quæ compacta ex uertebreis, a capite ad coxas porrigitur. Extat huic continuum capitis os rarum & rotundum, summis superimpositum uertebreis: quod calua dicitur & caluaria, ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque levis: cuius pars prior sinciput est, tenuissimum, infirmissimumq; omnium capitis ossium, nouissimēq; consistere solitum. Omnium enim ossium corporis, ultimum id conerescit & induratur, in homine duntaxat: cum tamen in cæteris animalibus discrimen ossium nullum sit, sed omnia perfecta iam inde à natiuitate proueniant. Caluaria ipsa nō simili modo in quoquo genere animalium habetur: aliis enim osse continuo calua perficitur, *μὲν πρὸν* dicunt, ut canis: aliis compacto, ut homini. sex enim numerantur caluariæ ossa, excepto etiam illo quod à cunei similitudine *σπλῶν & s* dicitur. Sunt autē hæc ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, mollia. Caluariæ pars serrata, suturæ nomine significatur. Inueniuntur autem suturæ in plerisque quinque: prima ad sinciput, *πρὸναικ* dicta: altera per uerticem, *ὀρθοῦς*: tertia per occipitium, *ὀπίσθιος*: quæ magna ex parte coniunguntur. Duæ quas *κρίσθιναι* nomināt, in utroque temporum singulæ: hæc super aures, tempora à superiore capitis parte discedunt. quæ *λαμβδῶς* dicitur, ad inferiora per uerticem tendens, occipitium à summo capite diducit. *ὀβελῶς* uero ab eodem uertice per medium caput ad frontem procedit: eaq; modo sub imo capillo definit, modo frontem ipsam secans, inter supercilia finitur. Os deinde est, cuius posterior pars cum caluariæ osse, quod iuxta aurem habetur, anterior cum parte supercilij extrema ad paruum oculi angulum coniungitur: iugale appellari potest, Græci *σφελ* dicunt. Inter caluariam, & ea quæ superiorē maxillam

Septem numerantur in libello, qui a πειγῶν & inscribitur: πειγῶν & πειγῶν in priore caluariæ parte.

constituunt, os est quod à cunei similitudine *σπλῶν & s* uocatur, & ueluti cuneus inseritur . hoc si inter superioris maxillæ ossa numerabimus, quindecim numero erunt: uel ut aliis placet, octo: inter quæ cēsentur, & genarum & narium ossa. Duodecim faciei ossa numerant alij. Maxillæ inferioris nō est os simplex: in summo nanque menti acumine, si coquitur, laxatur. Maxillis dentium genus inhæret, os partim cauum, partim solidū & adeo firmum, ut solum inter ossa ferri aciem respuat: neque eandem penitus naturam quam cætera ossa habet. Cætera nanq; in prima corporis constitutione omnia gignuntur, neque est quod post oriatur: at dentes post enascuntur. quo fit, ut cum deciderint, denuo possint osiri: soli q; dentes inter ossa,

tota

- A tota uita crescunt. Dentes omnes in suorum ossium concavis infiguntur. Et ossa ipsa quibus continentur dentes, *φύματα*: quæ subeunt foramina, *βόθραι* dicuntur. & capitis ossa ita se habent. Spina longitudinē & rectitudinem continet animalium: hæc ex uertebreis quatuor & uiginti constat (excepto osse sacro) in homine scilicet: nā in reliquis, ex pluribus compacta est. Harū tota compago in ceruicis uertebreis, & dorsi, & lumborū, & os sacrum (quod & os latum uocatur à nōnullis) diuiditur. Dorsi eam partem intelligimus, cui cum pectore est æqualis lōgitudo: quod subest reliquum, lumbi appellantur: quorum pars ultima sacro osse finitur, in homine inquam. homo enim cauda uacat. In collo septē uertebrae sunt: duodecim ad costas, ad lūbos quinque. Earum quæ in collo sunt, supremæ uertebrae in utroque eius
- B latere sinus inest, in quos ingredi conspiciuntur processus ossis caluæ sub inferiore cerebelli parte egressi, quæ *κροτάλαι* dicuntur. Ex secunda colli uertebra sursum uersus, in primæ uertebrae sinus quosdam (quos ab oculorū finis similitudine *χλωροδόντες* appellant) prioribus minores, processus duo inseruntur, qui à figura turbinata *πυλωδοδόντες* dicuntur: Hippocrates à figuræ similitudine *ιδιόβιδόντες* uocauit: & totam quoque uertebra *ιδιόβη*, id est dentem inde nominauit. Ultima uero colli uertebra *ἄτραλεις* uocatur. Sub atlante proxima, & prima dorsi uertebra *λοφία* dicitur: & quæ illi subest, *μικροχλωροδόντες*: quæ deinde sequuntur, *πλάγιαι*. Duodecima uero dorsi uertebra, *ἀσφαιλίτις*. E lumborum uertebreis, prima *κροτάλαι* dicitur: postrema *ἀσφαιλίτις*. Os sacrum ex tribus particulis tanquam ex propriis quibusdam uertebreis
- C compactum est: quarum extremæ os aliud quartum quod coccix nominatur, additum est: cuius pars quæ podici proxima inhaeretur, *κροτάλαι* uocatur. Vertebrae omnes breues teretesq; sunt: processus tamen quosdam exigunt, *ἀκροφύτοι* Græci uocant. Ex mediis enim omnium (præter primā) partibus postremis, exeunt ossei quidam processus: qui tanquam uallū spinam ab ea parte defendunt, *ἄκροφύτοι* Græcis nomen est. Sunt & ab utroque uertebrae latere processus: & à superiore etiam parte atq; inferiore omnibus, exceptis tribus summis. Omnium spinæ ossium, infimum (quod os sacrum dicitur) maximum est, quod ueluti fundamentum quoddam omnes sustinet uertebreas. Secundum uero locū in magnitudine occupat, quæ illi proxima uertebra est: quæ inter eius quæ in lūbis sunt, quinta numeratur. Reliquæ uero, quod longius ab infima recedunt, eodē etiā fere magnitudine deficiunt. Primæ itaque ceruicis uertebrae, minimæ sunt omnium, & ob foraminis amplitudinē tenues: uertebrae namq; omnes foramine medio sibi iunguntur, quod *σπάλω* dicitur, quod spinæ medulla à cerebro descendit. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas tēdunt: nostri scapulae, *ἀμφοτέρω* Græci nominant: ea summis uerticibus, qui ad scapulas sunt, sinuata, ab iis triangula, paulatimq; latescencia ad spinam tendunt. Hæc parte sui posteriore cartilaginosa sunt, sed in imo maxime: ibiq; ualidis musculis neruisq; constricta sunt, nulliq; nisi in summo, ossi coherescunt. Inæqualia undiq; sunt hæc ossa, atq; omni ex parte dissimilia: gibba quidē exteriore ex parte, intrinsecus sima: & summa in parte crassa, in imo uero tenuia sunt.

*Humeri artic.
5. igitur 6. par
sup. 3. par.*

paulatimque pleniora euadunt, donec ad eam partem peruenierint, quam E
scoptuli ceruicem nominant. Is in extremo in acetabulum desinens (ut mo-
do diximus) eius ossis caput in se excipit, qui humerus dicitur, efficitque
humeri articulum. In utriusque scoptulorum parte gibba, *ἰσχυρὸν*, id est spi-
na huic parti propria addita à natura est: quæ paulatim superiore sui parte,
qua scoptulorū ceruicē attingit, altius sese attollens, ossi alligatur, quod iu-
gulū dicitur: idque efficit hic ossium nexus, quod *ἀρτέριον* à Græcis uocatur:
quod simul esset & humeri articulo operimentū, ac propugnaculū: & pro-
hiberet, ne humeri ossis caput sursum uersus, articulo excederet. Est & in
scoptulo utroque, in inferiore capitis eius parte exiguus acutusque processus:
qui cum anchoræ aut coruini rostri similitudinē referat, *ἀγκυράκις* à nonnul-
lis, ab aliis *καρπικακίς* nuncupatur: quandoquidem extrema eius pars uti cor-
uinum rostrum extenditur. Hæc ossa in hominibus quidem longius distāt
à pectoris ossibus, & huic parti quasi innatant. Quin & humerorum arti-
culi à reliquis pectoris ossibus altius prominent: at in quadrupedibus, sco-
ptula reliquis pectoris ossibus fere coniuncta sunt: ac proinde homini soli
sunt humeri, cæteris armi. Lato huic scapularum ossi, quā desinit pars illa,
quam *ἰσχυρὸν*, id est spinam uocauimus, adnectitur iugulum, non inter duris-
sima ossa numerandum: (fistulosum enim est) altero eius capite in eo quod
posui, altero in exiguo sinu ossis pectoralis (quod *σῆμα* dicitur) insidet. Pars
eius inferior qua pectoris ossi alligatur, crassior cæteris rotundiorque est:
quæ huic succedit, longe gracilior: procedens uero, quo propius lato scapu-
larum ossi sit, eo plenius latiusque & in exteriora curuatum est. Costæ ab G
utroque latere sunt duodenæ: rarissime nanque decimatertia costa in ho-
mine uisitur, atque hoc rarius undecim tantum. Hæ primis partibus ro-
undæ & leniter quasi capitulata, uertebRARUM transuersis processibus, ibi quo-
que paulum insinuatæ in hærent. Inde pateſcunt, & in exteriorem partem
recurrente, paulatim in cartilaginem degenerant: eaque parte rursus in in-
teriora leniter flexæ, committuntur: septem quidem cū osse pectoris, quod
σῆμα dicitur: octaua uero cum cartilaginis radice, quæ *σφολδὴς* uocatur. re-
liquæ autem quatuor in pectoris latera ad septum transuersum desinunt,
quæ cæteris etiam breuiores sunt. Quinque istæ postremæ nothæ appel-
lantur, suntque cartilagineæ omnes: atque adeo ipsarum finis, exquisita car-
tilago est. Costis non una est, simplexque figura: nam in prioribus illis H
quicquid cum pectoris osse committitur: non os est, sed in cartilaginem de-
generat: & suprema costa, ea parte conspicitur maxima, qua spinæ adnecti-
tur: reliquæ in medio, & ubi ad pectoris latus accesserint, latiores sunt, quæ
earum partes *καρπικακίς* dicuntur: angustiores autem, qua spinæ coniunguntur,
& *καρπικακίς* uocantur. Pectoris os, *σῆμα* à Græcis nominatum, à iugulo statim
incipit, & per medium pectoris protensum ad præcordia ipsa molli carti-
lagine terminatur: (quæ quidem cartilago triangula est, & à nonnullis *σφολδὴς*
appellatur, non unum os hoc est, sed ex pluribus ossibus constat: sunt
autem numero septem, sicuti costæ utrinque septenæ, quæ cum ipsis alli-
gantur. Brachij ossa sunt, primum humerus: hic extremis utrinque capi-
tibus

Atibus tumidus: mollis, sine medulla, cartilaginofus: medius, teres, durus, medullosus, & in priorem, & posteriorem partem leniter gibbus. maximū omnium hoc os est, scēmore excepto. Summa eius pars grandisculum habet caput, & in eo tuberculum quoddam adnatum rotundum, quod scapularum ossi inferitur: pars autem inferior in tubercula duo definit in æqualia, inter quæ sinus est: circa hunc cubitus mouetur. constat hic ex ossibus duobus. Radius quē *ῥαδις* appellant, superior minorque, rotundo & leniter cauo capite, exiguum humeri tuberculum recipit. Cubitus alterum os dicitur, eodem scilicet quo totum nomine, inferior maiorque. In huius fine extremo, ubi scilicet cum humeri osse committitur, duo inveniuntur tubercula: alterum maius, & in parte cubiti posteriore inferioreque: alterū minus, & in parte anteriore superiorēque: & communi quidem nomine *καρπιοὶ* uocant, & *καρπιαὶ*: proprie uero maiorem illum & posteriorem Attici *ἐλπίγον* dicunt, Hippocrates *ἀστυον*. Radius supra infrāque ualidis ligamenti cubito alligatur: media inter se omnino deliſcunt. Radius superiore parte tenuior est, cubitus plenior: uerum cū rursus ad manū cocunt, modo crassitudinis mutato, ibi radius plenior, cubitus admodū tenuis est. Vtrunque adnatum tuberculum iuxta carpi partes habet, ex interiore parte cauum, extra uero gibbum. In sinum cuiusmodi sese insinuat *καρπις*, quā primam palmæ partem diximus, eique adnecitur. inest autem cubito & processus quidam, quem à columnæ similitudine *στυλοειδής* appellant: & hic quoque carpo annectitur. Cubitus minimo digito, radius pollicis è directo respondet. In manu prima palmæ pars, quæ græce *καρπις* dicitur, ex multis minutisque ossibus constat: quorum numerus incertus est: quidam tamē octo numerant. dura omnia, nec medullosa multiplicisq; figuræ sunt: nam partim gibba, partim sima, partim recta, partim orbiculata: sed oblonga omnia & triangula. Recta deinde quatuor ossa ad digitos tendentia palmam explent. Ab iis digiti ipsi, præter pollicem, omnes oriuntur: qui ex ossibus ternis constant, quæ *φάλαγγες* dicuntur, id est internodia & *συννύκτις*: omniumque eadem ratio est. pollicis tantum primum internodiū, ex transuerso illi palmæ parti, quam metacarpium diximus, annexum est. Compactus ita & pollex ex triplici osse est: primumque eius internodium cum posteriore palmæ parte minime connumerandum censet Galenus. Ac superiorum quidem partium ossa sic ordinata sunt. Ad imā uero spinam ab utroque sacri ossis latere, coxarum os, & quod *ἰχίος* dicunt, utrinque adnecitur: quod transuersum longeque ualentissimum, uulua, uelicam, rectum intestinum tuetur. Atque iis quidem ossibus quæ ex utroque ossis sacri latere cernuntur, integris nullum est nomen unum inditum: nam partes eorum latæ superiores, ilium ossa nuncupantur: inferiores exteriorēq; coxæ & coxarum ossa. In quorum utroque sinus prægrandis est, qui recipit rotundum scēminis caput, acetabulū uocant: Græci *καυήλας*. Ab iis quæ in anteriora protensæ partes, tenuēsq; & foratæ, atque inter se coniunctę sunt, os constituunt, quod pecten dicitur: quod in uiris rectius est, recuruatū magis in exteriora in scēminis, ne partum prohibeat. E coxatum of-

Totius manus ossa numero sunt viginti sex, ut auctor est Clearchus.

ἰχίος, ἢ καυήλας.

DE DIFFERENTIIS

sibus fœmina oriuntur, quæ magnitudine cæteris præstant omnibus: quorum capita rotundiora etiam quàm humerorum sunt, cum illa ex cæteris rotundissima sint. Ad fœmoris cervicem oriuntur processus duo, *ἡ ἑξωτερικὴ* dicti: quorum exteriorem, qui longe minor est, *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant: infra uero leniter patefscens in duo tubercula à priore & à posteriore parte definit, adeo quidem grandia, ut uel capita possint appellari: eaque tibix adnectuntur. Hæc uero commissura osse paruo, rotundo, molli, cartilaginoso tegitur: patellam uocant. Tibia, ut ante dictum est, ex ossibus duobus constat. Etenim par omnia fœmur humero: tibia cubito similis est, adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. Horum uero alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod sura nominatur: id breuius est (neque enim adeo protenditur, ut genu ipsum cōingat) supraque tenuius, ad ipsos malleolos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui tibix nomen est, longius & in superiore parte plenius solum cum fœmore committitur, sicut cum humero cubitus: eaque parte duplicem habet linum, qua fœmoris capita recipiat. Inter eos tibix sinus neruosum quoddam cartilagosumque eminet: quod inter fœmoris capita illa, ueluti in imā quādam scissuram inscribitur. Et hæc quoque ossa infra supraque coniuncta, media, ut in cubito dehiscunt. Imæ ab utroque latere tibix suræque partes, malleoli nuncupantur: ii que gibbi & carnis omnino expertes prominent: intrinsecus uerò caui sunt. Excipitur autem tibia infra primo pedis osse: quod nos talum, Græci *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant. à malleolis hic continetur ac contegatur, ut cum ne tangere quidem possis. Huius pars illa quam *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant, sursum uergit: posterior uero orbiculata est, & ad superiora potius spectat. Prior autem pars, rotundo quidem capite, cum eo osse connectitur, quod ad scaphæ similitudinem *ἡ ἑξωτερικὴ* nuncupatur. Huic subest os pedis maximum, quod *ἡ ἑξωτερικὴ*, id est calcem, uocant, durum, sine medulla: eius pars qua ingredimur, leniter rotunda & latiuscula est: posterior quoque teretem figuram repræsentat, in posterioremque partem proiecta, tibix rectitudinem admodum excedit. Ex partibus eius anterioribus, quæ à regione magni digiti sita est, capiti ipsius tali subiacer: nec cum alio osse copulatur. quæ uero minimo digito respondet, cum eo osse quod à tessera similitudine *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant, annectitur. *ἡ ἑξωτερικὴ* autem à parte exteriori iuxta *ἡ ἑξωτερικὴ* positum est. Tria deinceps ossa paruula inferiori *ἡ ἑξωτερικὴ* parti adiunguntur, cum quibus etiam exteriori ex parte *ἡ ἑξωτερικὴ* una porrigitur. Atque prima quidem pedis pars, quam *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant, hæc septem continet ossa. Pars inde pedis inchoatur, quam Græci *ἡ ἑξωτερικὴ* uocant: quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti sunt, qui ex ternis interno diis omnes, ad eorum, quæ in manuum digitis sunt similitudinem, constant, pollice tantum excepto: qui solus omnium ex duplici osse constitutus est. Itaque pedis ossa pleraque ad eorum quæ in manu sunt similitudinem, instructa sunt: plantæ, palmæ, digiti digitis, sicuti & ungues unguibus respondent. Hæc, ut arbitror, de ossibus ueluti rudimenta discitibus dicta satis sunt. Quod si quod ossiculum alibi, utpote in corde, in naso, in gutture,

A gutture, itēque in aliquo ex digitis, (ut quę a fefami similitudine *αἰγμοῦδι* uocantur) aliudue eius generis deprehenditur, non necessarium arbitror hoc opere pertractare.

F Spina, *ῥάχις*. Calua, uel caluaria, *κεφαλή*. Totum capitis os etiā *καφαλή* *κῆρυξ* dicitur. Sutura, *ῥαφή*, *ῥαφίς*. Sunt & aliz suturę, & in faciei ossibus, & quę communes sunt superioris maxillę & caluę: ut uidere licet apud Galenū lib. De ossib. & Celsū, & Introdūct. Galeni. Iugale, *ὀγκυλίς* *ἢ ῥήγματος*: uerum Pollux *ὀγκυμαῖον* appellat post tempora bina obliqua: quorum connexus aures complectitur, qui *αἰγμοῖναι* etiam dicuntur. sed an idem sit *ὀγκυλίς* Galeni, quod Celfo, consideret lector. Vertebrae, Colli uertebrę etiā *σπονδυλῖαι* dicuntur. *ἢ ῥαχίς*: Homerus etiam *ἀσπυδάς* uocauit. *Ἰσθμῖς*, Spina articulum, *σπίνα* inquit Plinius) *ἀτλάτης* uocant: est autem primus. Processus, *αἰσθητήρ*. *ἢ ῥαχίς* *ἢ ῥαχίς* uocat. Celsus, processus, & excessus, & tubercula. Quam formam suamq; habeant processus isti, luculentissime ostendit Galenus lib. De ossib. & lib. de usu part. & Celsus lib. 8. Scoptula, *ὀμοπλάτης*, & *ὀμοπλάτης*, & *πλάτης* quidam uocant: Celsus hæc etiam scoptula, & lata scapularum ossa nominat. Sunt qui hoc loco apud Celsū scoptula operta legi uolunt. Costę, *πῶς* *ῥαχίς*. quo pacto costę cum spinę uertebrarū processibus connectantur, leges apud Galenum lib. Anatomices 8. & lib. De ossib. *πῶς*, minores costę dicuntur, sicut *γῆρας* maiores. Costę utrinq; duę primę *ἀνίστροφα* uocantur: quę has sequuntur itē duę, *σπῆλαι*. Post has *σπῆλαι* duę. Et deinde quę ad pectoris cartilaginē desinūt, *πνεύμονες*. Quę reliquę sunt quatuor nothę *μαλισταί* uocantur, id est molles. Humerū, *βραχίον* uocat Galenus. Radius, *ῥάδις*, *ἢ πρῶτον χῶρον*, *ἢ πῶς*. Cubitus, *πῆχυς*, *ἢ ἄλκιον*. Quatuor ossa, Ira Galenus: uerum Pollux hanc palmę partem (ut supra diximus) exceptis quinque ossibus ad digitos tendētib; constare, primumq; polliis internodium metacarpij partem esse scribit. Ilium ossa, *λαγῆρες* sūt. Coxę & coxendices, *ῥῆμα*, *κατύλη*, *ἢ κατύλη*. *ἢ ῥαχίς*, *ἢ ῥαχίς* sūt. Femur & femur, *μῦρ*. Caput femoris, *καφαλή* *μῦρ*, *ἢ κατύλη*. Patella, mola, *μύλη*, *ἢ ὀδονταῖς*, ut supra. Tibia, *κνήμη*. Sura, *πῆστις*: recentiores fibulam uocant. Tibia, *κνήμη*: quidam etiam *καρύδα* uocant. *ἢ ῥαχίς* *ἢ ῥαχίς* *ἢ ῥαχίς* *ἢ ῥαχίς*, hic est, de quo lib. 1. De temperamētis. Malleoli, *σφυγῆς*: Celsus hos etiā talos uocat: & talos itē appellat os illud quod & nos, quod scilicet *ασπυδάς* uocauit Galenus. Talus *ασπυδάς* Aristot. lib. de hist. animalū: & r. ius Plinio lib. 11. uidetur aliud significare: de quo infra plura dicemus in quadrupedibus uiuiparis. Ossiculum, Sub tonsillis ossiculum est *ὀστέον* dictum, eod quod simile sit *υ* literę, quod arreni caput amplectitur: alij *πνεύμονες* uocant.

De cartilagine.

Cap. XXXII.

Eiusdem fere naturę cum osse cartilago est: & quemadmodum os præcisum nunquam recrefcit, ita & cartilago ablata nunquam reparatur. Differt autem ab osse pluris minorisq; ratione: & uidetur quidem cartilago ex osse ligamentoque constare: utrique enim aliqua ex parte similis natura est: uerum ligamento durior, sicuti osse mollior est. Et partes cartilaginosa membrorum articulis inseruntur, ueluti puluinar, ne attritu mutuo lædantur ossa. Terrestrium quę & sanguine habet, & animal gignunt, cartilago nullo foramine hifcit: nec ossium more medullam continet. At uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorsū ossibus proportionatum tendit, cartilago est humorem in medullę speciem continens: & Plinius, cartilaginea medullam in spina habent, inquit. Gressilium, quę animal gignunt, auriculę, nares, extrema ossium nonnulla cartilagine constant. Priuatim uero quę in extrema ora est ossis, quod in medio pectore *σπῆστις* uocatur, prope os uentriculi *ἢ ῥαχίς* cartilago dicitur, & triquetra est.

DE DIFFERENTIIS

De unguibus, ungulis, chelis, id est ungulis bifidulis, cornibus
& rostris.

Cap. XXIII.

E

Vngues, ὄνυχες, ὀνύχια, ὀνύχες. Apud Celsum pro pedibus ipsis capiuntur ungulae. Chela, χελαι. Cornua, κέρατα. Rostrum, ῥύγχος, ῥίμφος.

Sunt item alia partium genera, quæ naturam nec eadem habent, quam sea quæ exposita sunt: nec longe ab iis remotam, ut ungues, ungula, chela, cornua: præterea rostrum, quale datum auibus est: hæc enim & flexilia & fililia sunt: cum nullum os hndi possit, sed fragile quodq; habeatur. Colores cornuum, unguium, ungularum & chelarum, cutis pilorumque colorem sequuntur: etenim cutis nigra, cornua nigra, & ungues ungulaeque nigra oriuntur. Et candida pari modo in colore respondent: mediis etiam medium eadem colorem præferunt. At dentes naturam ossium æmulantur: quamobrem hominum nigrorum ut Aethiopum, atque similibus dentes, ut ossa cadent: ungues nigri, modo suæ cutis apparent. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus ambiunt os, quod ortum à capite, cauo cornu inferitur, totumque implet: in mucronem tamen solidum & simplicem exeunt. Adhærent cornua cuti potius quam ossi. Ceruino generi tota solida & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, nisi castrentur: cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat. Cornua quibusdam inesse dicimus, sed per similitudinem: cum nullum ex iis cornu officio fungatur: qualia cochleis data sunt ad prætentandum iter: quæ enim iure cornua intelliguntur, gerunt quadrupedes uiui para ad uim, aut inferendam, aut depellendam, quæ uirium sunt officia: quod nulli ex cæteris quæ cornua habere dicuntur, contingit. Vngues à neruis neruosis ue ligamentis orti, iis scilicet quæ digitorum ossa continent, indurescunt. Habent autem ungues quibus digiti sunt: digiti uero iis sunt, quibus pedes articulis formati, excepto elephantis. ungues etiam in senectute, & defuncto augescunt, durioresque redduntur: & ungula quoque maiores in senecta redduntur: quod idem rostris etiam auium euenit. Vngues præterea nonnullis animalium adeo duritate degenerant, ut præ nimia duriitudine nihilo ab ossibus differre uideantur.

De unguibus ex ortu plura apud Pollucem.

De pilis & cute, & quæ his proportionem respondent, scilicet cortice, squama, testa & crusta.

Cap. XXIII.

Cutis, ὄψιμα. Pilus, ὄψι. Lana, ὄψι. Cortex, ὄψι. Squama, ὄψι.

Pili.

De pilis & cute, atque de iis, quæ uicem pilorum cutisq; suppetunt, ita se res habet: cutem omnia habent quibus inest sanguis: pilos habent quæ pedestria eademque uiui para sunt. nam lana etiam pilus est, sed pilus proprie crassior est & procerior: lana uero crispa magis ac tenuis. Cortice autem integuntur quæ ouis ara sunt pedestria, appellanturq; squama uero pisces tantum, sicuti penna aues: & testa silicea includuntur, quæ testacea dicuntur, ut ostrea: crusta operiuntur, quæ crustata uocantur, ut cancri, locustæ. Gignuntur pili ex uaporibus fuliginosis è cute exeuntibus, iam lori formam adeptis: quorum quod in meatibus est, stirpis radici simile uidetur: quod uero ex cute extat, ipsi ueluti stirpi. Habent autem pili ad suam radicem lentum quædam humorem, quo protinus, ubi euulsus pilus est, si qua leuiuscula tangat, ita adhæret ut trahere possit. Quibusdam animalibus

- A** malibus nulli dari sunt pilaliis supina in parte nulli, aut pauciores quàm in prona. Iis animalibus qui molli sunt cute, ut homo, quanto siccior calidiorque cutis fuerit, tanto magis pilos gignere potest. at neque in iis, quæ silicea testa includuntur, ueluti ostreis: nec crustatis, ut locustis, cancris: sed nec quæ corticem habent, aut squamas, ut serpentes, ut pisces, oriri pili possunt. Sunt enim horum quæ summæ cutis loco habentur, uere & in totum sicca ritu testæ uel petrae. Pili præfecti augeri inferius ab radice possunt, superne non possunt. Pennæ autem nec ab radice, neque superne ab incisura possunt, sed cadat necesse est. Cortex squamæ loco est, & illi similis: sed natura rigidior atque durior: quod in testudine & serpētibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam firmiter enim osse euadit. Cutem, ut diximus, omnia habent, quibus est sanguis: pilos non omnia, sed sicut distinctum iam est. Inest in cute omnium lentor quidam mucosus: uerum aliis minus, aliis magis: ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent. ubicunque cutis per se ac sine carne est, uulnerata nō coit, ut in gena, præputio, palpebra. Sed neque in carnosis etiā partibus restitui cutis potest talis omnino qualis erat quæ periit: sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest, non tamen plane cutis. Cōtextu perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur: nec alibi interpellatur, quàm ubi sint naturales meatus: ut in ore & excrementorum exitibus, atque etiam in unguibus. Cutis hominis proportionem magnitudinis tenuissima est. Cutis quæ quidem totum corpus ambit, *ἄρουρ*, id est excoriari potest à subiecta carne, & membrana
- C** eam circumdante, ideoque, *ἄρμα* Græci uocant: manuum autem internam & infimæ plantæ cutē, præterea frontis & totius fere faciei, aliarumque quarundam partium animalis excoriari nō contingit. Cuti superiacet summa cuticula, quæ Græcis *ὠδὴ Ἀρμὴ* dicitur, tenue quiddā, quale est quod serpētis se necētus nominatur: id quod in scabie, lepra, & lichenibus maxime cernitur.

Quing. cutis differentias enume-
rat Calenus lib.
11 De usu part.
quarum aliqua
excoriari possunt,
aliquæ uero mi-
nime. Quo pa-
tello autem excor-
iari debeat en-
tis à subiecta si-
bi membrana, do-
cet idē Calenus
lib. 3. Anatomice.

De membranis.

Cap. XXV.

- S**unt & membranæ in sanguineis animalibus: quæ quidem pars similis cuti prætenui spissaque est. Sed diuersum genus id est: quandoquidē neque fililis, neque euulsilis cutis est: membranæ etiam omnes, cute sicciores sunt. Ambit singula, tum ossa, tum musculos, tum etiam uiscera, membrana tam in maiore, quàm in minore animalium genere: uerum in minore sensum effugit. Quæ ossa contegit membrana, *παράσπον ὑμὴν* dicitur: quo in genere est quod *παράσπον* uocatur, membrana scilicet caluariam ambiens. Ligamenta per quæ muscoli ossibus colligantur, mēbranas circa ipsos musculos efficiunt. Inter membranas præcipue duæ sunt, quibus cerebrū oper-
D tum munitur, *κάλυψις* dicuntur: altera superior adhæret ossi, quæ firmior & crassior est: hæc *σκληρὰ* dicitur, & *πυκνὰ*, & *ἀσπλαγχνή*, hoc est dura, crassa & coriacea: altera inferior contigua est cerebro, quæ *χερσίδις* uocatur, quod *χερς* membrana similiter, uenas in se & arterias habeat connexas: atque hæc cerebro tanto durior est, quanto altera, crassior uidelicet illa, osse sit mollior. Adhærent item membranæ duæ septo transuerso, ex utraque eius parte

Κάλυψις, Plu-
nim continen-
tes cerebrū mē-
branas eas uo-
cat.

περιτονίδος, ἡ
 τῆς κοιλίας
 ἡ περι-
 τόνειος χιτὼν,
 ἡ περιτονία

σπλίνος.

singule, superiore scilicet parte & inferiore. Superior *περιτονία*, id est succin- E
 gens, inferior uero *πληκται* nominatur: quod à renibus ortum, toti abdo-
 mini interne obtenditur, atque adhæret ad pubem usque infimam. Utra-
 que siue membranam dicere placet, siue tunicam, (*χιτὼν* nanque Græ-
 ci dicunt) substantia omnino simili est: utraque enim araneæ modo
 prætenuis est: non ut tendens quidam, qui cum in membranarum spe-
 ciem tenues sint, si tamen eas clara luce inspicias, fibras quasdam tenues
 intercurrentes ostendent. At non ita peritonæum: est enim simplex, to-
 tum sibi continuum & adamussim simile corpus, quod inde nomen ha-
 bet *ἐπεὶ τὴν περὶ τὴν σπλῆνός*, id est quod prætendatur omnibus, quæ inter septum
 transversum & crura continentur. Eodem etiam modo succingens costas
 membrana simplex est peritonæo similis, eundemq; usum omnibus spiri- F
 tus instrumentis, quæ intra pectus sunt præstat, quem peritonæum iis quæ
 nutriendi gratia in uentre sita sunt. Costas nanque omnes intrinsecus suc-
 cingit: & operimentum est eorum quæ intra pectus continentur omniū. Ve-
 rum non una est membrana quæ utriusq; lateris costas succingit: à dextra et
 enim parte una est, à sinistra altera. Neque unum & continuum est totius
 pectoris spatium internum (ita enim uoco *ἐπεὶ χυθῖον*) sed membranis distin-
 guitur. Ex membranis nanque illis succingentibus oriūtur partes duæ, quæ
 totum hoc pectoris spatium diuidunt, atque ob id *αἰσθητὴν* uocant. Hæ
 ad iugulum usque à dorso ascendentes, & per totam ossis, quod in medio
 pectore est, longitudinem ad mucronatam usque cartilaginem, quæ *σπλῆ-
 νος* dicitur, porrectæ, mutuo sibi coherant: nisi ea tantū parte qua cor situm G
 est. Hic nanque separatæ, cor ipsum unā cum propria quadam membrana,
 siue tunica crassiuscula cor ipsum ambiente (*περικάρδιον* uocant) inter se cō-
 prehendunt. Succingentiū autem bases, supernis septi transversi parti-
 bus superbiacent: quemadmodum alia quædam membrana similis, infer-
 nis substrata est, quæ peritonæi vertex, aut principium non inepte dicitur.
 Hæc totam inferiorem septi regionem sublinat: ac ubi septum perforatum
 est, quo uasis transitus pateat, ibi iis ipsis quæ permeant, undique adhæret,
 ferturque una per totum corpus, ut quæ iam ipsis simul & operimentum
 fiat, & quasi firmamentum. Eodem modo & membranz illæ succingentes
 quæ supra septum sunt, uasis septum permeantibus iungūtur, & simul per
 corpus feruntur. Membranosa præterea quædam corpora multis in locis H
 præter hæc existunt: quædam ex ossibus procedentia in ipsa ligamentorum
 substantia, quædam ex neruosis musculorū finibus (*αἰσθητὴν* uocant) intē-
 dinum substantia. At quæ uere maximeq; proprie membranz dicūtur, hæc
 sunt. Omentum quoque non nisi membrana est, *πρωτόν* à Græcis dictū.
 hoc omnia habent animalia quæ sanguinem, sed alia pingue, alia macilentum.
 Nomen hoc à ueteribus *ωδονομα* sortitū est, quoniam nulli intesti-
 norum adhæret: sed neque ulli alij perpetuo præterquam iis tribus, uentri-
 culo scilicet (à quo oritur atque dependet) lieni & colo, quibus semper con-
 nexum est. Adnascitur etiam nonnunquam, sed raro tectinoris fibræ cui-
 piam, aut ex nothis costis alicui. Est autem corpus ex duplici peritonæi ceu
 plexu

Aplexu compositum, in quo uenæ permultæ sparguntur. Descendit uero in quibusdam animantibus, haud multo infra quàm umbilicus est: at in quibusdam ad pubis ossa: maximum id habent inter animantia, homines & simia. Quod etiã lactes uocant, membrana & ipsum est duplex pertendens continua de intestinis ipsis ad uenam usque, quæ in iecinoris porta est, uti ante dictum à nobis est. Vesica etiam utraque, tam ea quæ urinam recipit, quæ maior est, quàm quæ flauam bilem, quæ minor, membranosa est: quãuis maioris illius collum carnosum sit. Membranæ etiam quædã sunt factum in utero inuoluentes: prima *χρῖον* dicitur, quæ uulua adheret: hæc nil aliud quàm uenarum, & arteriarum multarum cõtextus quidam est, cum interuallis quibusdam membranosis: altera tenuis est & mollior, totum **B** circundans factum; *ἐμυλον* uocant: tertia duplex membrana est, & partibus tantum prominentibus circuniecta: capiti dico, natibus, & pedibus. hæc *ἐμμενελιδί* dicunt, quodd *ἐμμεν*, id est intestino crumenæuë similis sit. albæ utræque ac tenues, forma ad araneam proxime accedentes. Sunt & oculorum membranæ, de quibus supra pertractauimus. è membranis si qua præcisa fuerit, non coit. Ergo de sanguine & uenis, neruis, fibris, cute, membranis atque etiam de pilis, unguibus, ungulis, tam solidis quàm bisulcis, rostro, cornibus, dentibus, cartilagine, ossibus, eorũque proportionalibus, statuendum ad hunc modum est.

C Membranæ, *ὀστέα*. Euulsilis, *πλάσι*. **G** Peritonæi uertex, *κεφαλὴ τῷ περιτονίῳ*. **H** Omentum, *ἐπιπλῶν*, & *ἐπιπληστ*, & *ἐπιπλησσω*. **A** Lactes, *μυστηρίον*, ἢ *μυστηρίον*: medium intestinũ uocauit Cicero lib. 2. De natura deorũ. Lactes Plinio aliud significant: nẽpe ieiumum intestinum, opinor, & quæ *ἰσχυρὸς* dicitur. Vesica *κύστις*. Quo conueniant, quòue differant istæ uesicæ, præclare docet Galenus lib. 5. de usu part. *χρῖον*, secundas uocant: de his plura legas apud Galenum in lib. de dissect. uulua, & de scie. Aristoteles duas tantum enumerat, lib. de hist. animal. 7. & mēbranas uocat.

De carne.

Cap. XXVI.

EX animalium partibus, nulla omni animantium generi, carne magis communis est: nam & exanguia quoque suam quandam habent carnem, ut ostrea & testacea reliqua. In genere animalium sanguineo, caro, & quod carni simile est, omnibus fere inter cutem & ossa, aut quæ ossi proportionem respondent, continentur: estq; caro ueluti molle fulcimentum. **D** cuiusculum ossibus impositum, ornandi pariter & uelandi causa. aboletur, & in uenas fibrasque transiit, quoties animal extenuatur & gracilescit: uertitur item in pingue, quoties pabuli copia suppetit. Sed carnis plures sunt species: primam quidem, quæ sincera & absq; fibris est, & proprie caro dicitur, nusquam in corpore per se inuenias: sed est perpetuo musculi pars. *Caro, σὰρξ.*

Musculi autem reuera carnes sunt, potissimumque partes ipsorum membri: nam extremis in sinibus plurimi in magnos desinunt tendines. Est autē & carnis quoddam genus cuiusque uisceris propriũ, quod parenchyma ab Erasistrato dictum est: iecinoris enim, lienis, renum & pulmonis caro, simplicis cuiusdam naturæ est, circa cuiusque uisceris artcrias, uenas, & neruos crescens. Cordis simplex carnis natura non est: sed sunt in eo sui generis fi- *Musculi, μῦς.*

bræ, quales in musculis cernimus, quibus caro circumhæret. Est & uentriculi, intestinorum, uteri, uesicæ utriusque propria quædã caro, quæ suis ipsorum fibris circunnascitur. Lingua præterea substantiam quandam habet sibi propriam: est enim rarior fungosiorue eius caro, & minus habens sanguinis, quàm sit musculorum. Neque enim eandem penitus formam habent hæc carnis genera. Musculorum nanque caro rubicundior est ac mollior, quàm uentriculi aut uulvæ, uesicæue aut intestinorum: cordis autem durior, & fibris magis uaria: muscoli enim fibras habent positu simplici, & quæ neruorum ligamentorumque sunt particula, ut supra dictum est: cordis autem propria fibrarum est species, quæ situ sunt magis uario.

De glandulis.

Cap. XXVII.

F

*Glandula, ὀ-
δινί. Ἀλλὰ ὅτι
συνοφθαλμοῦ
καὶ οὐκ.*

CArni proxima est adenum siue glandularum natura: est enim ueluti caro conglomerata. quantum autem lingua differt ab ea quæ proprie caro appellatur, tantum glandulæ à linguæ substantia recesserunt. Harum cum duplex sit usus, duplex quoque genus esse debet: alterum densum ac siccius, quod ualorum, uenarum dico & arteriarum, fulcimentum est in iis locis, quibus in ramos discissa, periculum subeunt, ne in uehementioribus agitationibus disrumpantur: alterum uero glandularū genus, rarioris substantiæ est, cauernosum fistulosumue, ac madidæ spongiæ in modum, humore imbutum. Hoc nanque glandularum genus humorem quandam in se gignit, aut ad aliorum membrorum usum, irrigandorum scilicet causa, ne facile exsiccantur: ut quæ linguæ adiacent adenes saliuam procreant: aut **G** ad generis propagationem, ut testes semen, (nam & hi è glandularum genere sunt) aut ad conceptus nutritionem, ut quæ in mammillis sunt glandulæ, lac generant. Huius generis adenes uenas & arterias, perspicuas quidem, ac nonnunquam magnas, & item neruos in se habent: illæ uero alteræ neque sensum habent, neque motū, neque neruum in se ullum. Sunt præterea nonnullæ in quibusdã corporis partibus adeo exiguæ, ut uulgus ipsum lateant: ueluti in lactibus, (*μαρμαίον* dicunt) in quibus utriusque generis glandulæ reperiuntur. Et in aliis quoque corporis partibus sunt exiles quædam, ualorum diuisiones fulcientes: circa fauces autem & laringa magnæ sunt atque conspicuæ. Haud longe à cordis radice & pericardij membranæ, ad septimam spinæ uertebra, (*σπινθη*, glandula est, haudquaquam exigua, glā- **H** dium Latini dicunt. hæc in recens natis animantibus est quæ maxima, crescentibus autem minuitur. *παρὰ τὴν* dicuntur glandulæ, ceruici uesicæ adiacentes, quas & *ἀδελφοὶ παρὰ τὴν* quandoque uocat Galenus, in maribus maiores, scæminis minores. Sunt qui renes quoque inter glandulas numerant: ij nanque etiam glandulosum quiddam habere uidentur. Glandularū omnium natura exanguis est.

παρὰ τὴν
apud Pollucē,
(nisi liber sit
medosus) sunt
meatus quibus
defertur semē
à testibus ad
uētriculū.

De adipe & sebo.

Cap. XXVIII.

*Adeps ὁ ἴσος
ἔστι, (quod ὁ
sebum dicitur)*

ADeps quoque & sebum ex maxime communibus sunt inter animalium partes: nam quæ rite alūtur, sanguinea dico, ea omnia aut adipem habent,

- A** bent, aut sebum. Quòd si uoles, licebit omnē quæ in animalis corpore est, *πικρὸν ἔσται*
oleosam & pinguem substantiam, utrumuis appellare, sebum scilicet aut *πικρ.*
adipem: utrumque enim oleosum & pingue est, & utrumque sanguis est *Pinguetudo cō-*
concoctus per bonitatem nutrimenti. humiditate tamen & siccitate differ- *mune nomen*
runt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, nec ad ignem admotum *est Latinis,*
tam facile liquecat, & cum refrigit, concrecat, ut ovis, ut capræ: adeps li- *aut pinguedo,*
quidior sit, hoc est, ad ignem facile liquecens, minimèque aptus durari, o- *Sebum, πικρ.*
leo longa uetustate incrassato similis, ut equi, ut suis. Locis etiam discre- *Adeps, πικρ.*
pant, adeps enim inter carnem cutemque solet consistere: sebum in fine *λά.*
carnis semper est. Itaque si ex hominibus quempiam incidas, qui uel graci-
les sint, & paruas uenas habeant, sceminam præcipue (ut quæ & frigidiore
B est natura, & uitæ magis desidiofæ) adeps excidet, quam cōstat cuti ad in-
ternam eius membranam subnasci. Omentum omnibus adipe pingue-
scentibus adipem est, sebo obesis sebale. Quæ parte utraque dentata sunt,
adipe pinguescunt: quæ una, sebo. Generatur autè pinguedo omnis ex san-
guinis parte pinguiore, per tenuis uenas effusa, circa parteis animatis mē-
branolas ac neruolas: cui concretio ideo contingit, quòd membranis adia-
cet: crasso nanque oleo est similis, eoque congelatur, ubi cum frigidis & ex-
anguibus particulis coniungitur. At neque circa iecur coire potest (inquit
Galenus) neque circa arterias uenæ suo aut cor: sed nec circa ullam aliam
partem calidam. Renes autem ex uisceribus maxime pinguescunt, uerum
dexter minus semper quàm sinister: & quanuis uehementer fuerint pin-
C gues, tamen aliquid fere mediis deest. Quæ sebo pinguescunt, maxima pro
parte magis quam quæ adipe in renibus opimandis luxuriant, ac omnium
præcipue oues: quippe quæ renibus pingui obductis intercant, quod uber-
tate pabuli fit. Plerisque animalium est pinguedo sine sensu: quam ob cau-
sam sues spirantes à muribus tradunt rosas. Animalia quæuis aut intra car-
nem, aut seorsum pinguescunt. quibus autem pingue separatim non est, ea
minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguillæ: paucum est e-
nim eis pingue in omento. Plurima tamen pars animalium uetere pingue-
scit, & præcipue quæ parum se moueant: est nanque uitæ magis desidiofæ
eiusmodi nota. Minus esse secunda, quæ admodum pinguescunt, siue ma-
res sint, siue sceminæ notum est.

*Finis causa
redditur ab
Aristotele lib.
De part. ani-
malium 2.*

D De medulla.

Cap. XXXIX.

Medullæ rationem iis addere debemus: nam ea quoque humidis ad-
numeranda generibus in nonnullis sanguineis animalibus est: hu-
mida est enim, & propemodum fluxilis. Maxime uero mollem ipsius sub-
stantiam adsimulare pinguedini possis: nam cum nouellis adhuc animali-
bus medulla cruenta admodum sit, ætate prouectis, ut adipe piguescenti-
bus, adipi similis est & albescentis: sic sebo deputatis generibus, sebum præ se
fert. Quod in spinæ ossibus continetur, colorem habet medullæ similem,
ῥιζίνος μυελός, id est spinalem medullam uocant. Est porro spinalis medulla
cerebro cōtinua, ac eiusdē cum eo substantiæ, nisi quòd compactior multo

*Medulla, μυ-
ελός.*

*ῥιζίνος, μυ-
ελός, ἢ σπονδυ-
λικός.*

DE DIFFERENTIIS

fit & durior, potissimum in infernis spinæ sinibus: quanto enim ab cerebro abscedit, tanto magis durefcit. Eandem uero esse ei naturam, quam cerebro colligunt (inquit Plinius) quoniam prætenui eius membrana modo incisa statim expiretur. Quamquam medulla non nisi inclusa ossibus est, (ut reliqua quoque omnia, quæ suapte natura humida in corpore sunt, conceptaculis quibusdam tanquam ualculis continentur: ut sanguis in uenis, & alia in membranis, aut cutibus, aut uentribus) tamen ossa nō omnia medullam intra se cōtinent: sed ea tantum quæ caua habentur, tametsi ne ipsa quidē omnia continent: ossa enim leonis partim nullam, partim admodū exiguum habent, ut dictum est. Hæc fere semper in animalibus natua & congenita humidi geneta habentur.

De lacte & coagulo.

Cap. XXX. F

ADnata autem posterioraq; sunt lac & genitura: præterea excrementa tam alui quàm uesciæ, atque alia quædam, scilicet in iis quorum natura hæc obtinet: hæc enim similia uidentur, licet re uera nō sint omnia similia: lac etenim tametsi sensui quidē simile apparet, ex tribus tamē naturis diuersis est cōpositum: prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur: altera pingui, ex qua butyrum: & tertia aquea, quod serū nūcupamus. Plus casei lac illud habere uidemus, quod crassius est. coit lac eorum, quæ non utrinque dentata sunt: quapropter caseus ex iis fit, quæ inter urbana dentium ordine carent superiore. Eorum autē quæ utrinque dentata sunt, lac coire tam facile non potest, (sicuti neque adeps) & tenue & dulce est: tenuissimum cameli est, mox equæ, tum alinæ: crassissimum bubulum est **G** & pinguisimum: mediocris consistentiæ est capratum, crassius hoc est ouium lac: sed lactis differentias pluribus infra explicabimus. Nulli fere animalium lac fieri solet, antequam uterū ferat: nec dum ferunt, utile omne est: lac enim fieri incipit ad speciem puris statim cum coire inceperint: sed utile postea est cum pepererint. Prima autem à partu spongiosa densitas lactis, colostræ uocatur & colostrū. & ex primo lacte in bobus semper à partu colostræ sunt: quæ, ni admisceatur aqua, in pumicis modum coeunt duritia, uel perinde ut lapis durefcunt, ut prodit Aristoteles. Non prægnantibus aliquando, sed raro, eduliis quibusdam, aliisque artibus (ut uberum frictione) efficitur ut lactescant. Quæ lac habent omnia, māmīs id continent. Maribus magna ex parte nec bestiis nec hominibus gignitur lac: fieri tamē **H** potest, ut aliquibus interdum gignatur: uiris enim post pubem, exiguum nonnullis exprimitur. Cogitur lac succo ficulneo & coagulo. Coagulum lac etiam est: quippe quod in eorum uentriculo, quæ adhuc lactent, continetur. est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tepore concoqueretur, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter detata utrinque dasypus. Coagulum, inquit Plinius, hinnuli, leporis, hædi laudatum: præcipuum tamen dasypodis. Habent quibus hoc datum est, non in magno uentre, neque in reticulo, neque in ultimo, quod abomasum nominatur, sed in eo qui inter ultimum & duos primos positus est, quod omasum uocatur. Quo uetustius coagulū est, cō præstantius:

A rius: tale profluuium alui mederi potest, atque etiam quod leporis est, sed laudatissimum hinnuli, inquit Aristoteles.

F. Lac, γάλα. Butyrū, & βούτυρον. Serum, ὀρός. Caseus, caseus non fit ex utrinque dentatis, inquit Plinius, quoniam eorū lac non coit. Lac, Plinius, crassissimū est a sinu lac, inquit, ut coaguli uice utantur: nisi fortasse menda sit. H. Coagulum, πύμα. Est ergo, &c. Aliter libro secundo de generat. animalium, Coagulum lac est edinens calorem uitalem, qui partem similes ducit eodem, & unit atque constituit. Coagulum etiam uituli marini, & balenz quoque reperitur apud Plinium & Dioscoridem.

De semine.

Cap. XXXI.

B Genitura nō eodem modo in omnibus est: sed quibusdam pro genitu- Genitura, γένεσις. Gra, γένος, id est genitale uirus sui generis habetur, ut piscibus. *antiqua*, id est. est semen genitale habent omnia quæ sanguinem. exit profecto semen genitale à maribus album & crassum, si integrum est: sed foris tenue totū redditur & nigriusculum. Nunquam id gelu concrefcit: imo admodum extenuatur, & aquæ tum colorem, tum substantiam trahit: calore autem coit, & crassescit. Delabitur in aqua quod fecundum est atque subsidit: quod autem infecundum, diffunditur atque exolefcit.

De excrementis.

Cap. XXXII.

E Xcrementum appello reliquias alimentis: cuius uariæ sunt species. naturalibus excrementis omnibus fere locus præscriptus est, ut sit humoris ueluti conceptaculum: uerbi gratia, alimentis siccis excrementis, alius inferior, humidus uesica, lactis mammae, seminalis (nam & hæc excrementa dicuntur) quæ circa uterum & genitale sunt uasæ: in ea nanq; loca se colligunt, atque conflunt. Quod enim sterces & siccū excrementum uocatur, à syncero nutrimento separatum, paulatim impellitur per omnia intestina usq; ad satis amplum spatium, quod ad illud intestinū uisitur, quod rectum uocant: postea uero quàm plurimum congestū iam graue animali fuerit, tum foras egeritur. Serosum uero excrementum, renes à sanguine secernentes, ad uesicam maiorem transmittunt: ea porro id colligit seruaturq; ad eundem ferme modum, quo de siccō excremento retulimus. Biliosum excrementum ex iecinore attrahitur à uesicula, quæ illi subiicitur: alterum uero à lien- D ne. in iis collecta excernuntur, alterum in priorem tenuis intestini partem, alterum uero in uentriculum: ab iisdq; iam per omnia intestina unā cum sicciore excremento permeant. Quod uero pituitam expurget, natura nullū instrumentum cōdidit singulare: mixta enim cum cibo puro, alere potest, & in laborantibus in alimentum absumitur. pituita ergo illa, quæ adiecit unā cum succo perlata est, non uacuari desiderat, sed in corpore manēs alterari: dum enim cum succo illo unā concoquitur, sanguis euadit: & quod in uentriculo reliquum ex cibo est, & in intestinis, à desuente in ea loca bile extersum, per inferiora egeritur. Quod uero à cerebro destillat (mucū uocant, & destillationem, græce βροχια καὶ κοίτη) per palatum & nares exitum habet manifestū. Ex hoc genere esse uidetur, & quæ quotidie expuen-

D ij

DE DIFFERENTIIS

do excernitur salua. Aliud excrementorum genus est, quod in singulis animalis nascitur particulis, ex ipso unde aluntur succo, humidum tenuéque, cui nullus certus à natura præscriptus meatus est: expellitur tamen per exiguos omneis corporeæ molis meatus, *πρωι* Græci uocant, quorum nō modo reliquum corpus uniuersum, sed etiā tota cutis plena est: partim uiolēto motu confertim erūpens (appellant uero quod ita excernitur, sudorem,) partim in speciem halitus ab insito calore solutum, quod per flatus sensum latens uocatur. ueteres quidem authores hoc excrementorum genus totum *σύντηγμα*, id est colliquamentū (ni fallor) uocauerūt: quod enim ex corporis incremento secermitur propter motus calorem, uim habet colliquamenti. In hoc insensibili perflatu, crassioris excrementi nonnihil excernitur: ex quo tum pilis origo est (natura enim commodè uel excrementis suis interdum abutitur) tum uero iis quæ circa omnem cutem semper aceruat sordibus. In hoc genere excrementum est, quod Græci *ανήλας* dicitur, ita uocant aurium sordes, quæ interdum etiam auditum multitudine sua obstruunt. De partibus animalium iis, quas similes dissimilesque appellamus, deniq; de omnibus tam interioribus, quàm exterioribus partibus dictum iam est: reliquum est, ut ad instituta pergamus.

ανήλας, ανήλας.

B Excrementum, *σύντηγμα*. C Stercus, *κρέας*. Vrina, *ὕρῳ*. Bilis, *χολή*. D Atra bilis, *χολή μέλαινα*. Pituita, *φλέγμα*. E Salua, *σάλις*, ἢ *σάλια*, ἢ *σάλιας*, ἢ *σάλιας*. Sudor, *ἰδρῶς*. quo pacto in corpore generetur, leges apud Galenum lib. 10. De simplic. med. faculta. F Perflatus sensum latens, uel transpiratio sensum latens, uel perspiratio, græce *ἀνὴλῶς αἰσθῆσις ἀσπνοῖς*.

G

DE ANIMALIUM DIFFERENTIIS LIBER II.

Per quæ potissimum constitui, inueniriue possint animalium
differentiæ. Cap. XXXIII.



Vemadmodum corpus totum animi gratia conditum est, (organum nanq; animi corpus censetur) ita & corporis partes officiorū gratia constant, & operum ad quæ singulæ accommodantur: indeq; fit, ut quorum actiones officiāque plura sunt, ea plureis exerceant motiones, plurēisque & uarias desiderēt corporis parteis, quæ sint ipsarū motionum instrumenta: quæ uero aut immobilia sunt, aut parum motus adipiscuntur, ut testata, eorum corpus non adeo multiplex, ut sit necesse est. Atque hæc quidem cum ita se habeant, præter corporis parteis, earumq; actiones motionesq; tertium etiam

A etiam quoddā adesse est necesse, nempe affectus. Porro actiones & affectus intelligi diximus, incessum & quauis loci mutationem, in uictu parando solertiam, ortum, incrementum, coitum uenereum, sensum, spirationē, uocem, uigiliam & somnum: ætatem, ut iuuentutem & senectutem: uitā, ualitudinem prosperam & aduersam, atque mores: & quæcūque huiusmodi alia possunt generi animalium tribui. Per hæc, ut diximus, potissimū, partes dico, actiones & affectus, animalium differentias constitui dignū est: sunt enim hæc animalibus partim omnibus communia, partim uero pluribus.

De differentiis animalium, quæ à partium discrimine oriuntur.

Cap. XXXIII.

H Abent uero animalia partes, aut eiusdem sibi omnes, aut diuersas partes: eadem, uel specie intelligi uolo, ut hominis nasus aut oculus specie cum oculo aut naso alterius hominis conuenit, & caro cum carne, & os cum osse: (ut enim totū se habet ad totum, sic partes singulæ sese ad singulas habeant, necesse est) uel genere, quanquam excessu defectūue differunt. de iis loquor, quorum idem est genus, uerbi gratia, auis aut piscis: id enim utrumque differentiis cōsumitur generis: & species complures cū piscium, tum etiam auium habentur. Diuersæ uero inter se sunt animalium partes pene plurimæ, contraria affectuum qualitate: ut coloris & figuræ, eò quod aliæ magis, aliæ minus affectu iis ipsius qualitatibus sint: multitudine etiam & paucitate, & magnitudine paruitatēque, mollitiæ & durezza, leuitatē & asperitate, & reliquis generis eiusdem, atque omnino excessu defectūque discrepant: id est quod magis minūse quicquā horū habeāt, uerbi gratia, oris magnitudine discrimen existere animalibus palā est: aliis enim os magno hiatus rescissum est, ut canī, leoni: aliis paruum, ut homini: aliis mediocre, ut generi suū. Multitudine & paucitate differunt partes: ut eorum quæ pedes habent, alia bipeda sunt, alia quadrupeda, alia multipeda. mollitiæ & durezza, ut inter ea quæ oculos habent: alia duris oculis sunt, ut cancri, locustæ: alia humidis mollibūque. leuitatē & asperitate, ut concharum quibusdam testæ leues sunt, aliis scabræ. præterea aliquæ longæ sunt, quædam rotundæ, itaque in figura notatur differentia. item aliis crusta, aliis testa protegmine habetur: & aliis rostrū portectius est, ut gruibus: aliis breue. Penna item aliis uberius, aliis parcius data est. Sunt item auium aliæ longo crure, aliæ breui. Linguam etiam aliæ latiusculam habent, aliæ angustam. Pectus animalia plurima humano proportionatum pectori habere uisuntur, uerum non simile: homini enim pectus latum est, cæteris uero, ut quadrupedibus, angustum. sed & in iis quoque ratio partium nonnullarum diuersa est: eò scilicet quod quas alia animalia habent, alia iisdem careant. Alia enim calcari aut aliquo armantur aculeo, alia nihil eiusmodi habent: & aliis apex in capite est, aliis deest: & eorum, quæ loco se mouent animalia, quædam pedes habent: ut bipeda, quadrupeda, multipeda: (sed omnia pedes pari numero possident) alia nullis fulciuntur pedibus. & oculos habentium, alia carent palpebris, alia habent, ut uisus sit exquisitior. Partes ita-

D iij



que animalium (prope dixerim) plurimæ aut eadē sunt, ueluti dictum est, E aut ratione contrariorum differunt, aut per excessum defectūque. Nō defunt tamen quibus partes nec specie sunt eadem, neque secundum excessum defectūue, sed proportionē conueniant: quæadmodum os cum cartilagine aut piscium spina, & unguem cum solida ungula, & manus cum chele, id est forcipato pede, & pennam cum squama conuenire animaduertimus: quod enim penna in auium genere est, idem squama in piscibus habetur. Proportionē item conueniunt, quod aliis pulmo datus est: aliis pulmo quidem negatus, sed uice pulmonis iunctum aliquid est, quod pulmoni respondeat. aliis item sanguis inest, aliis sanguinis proportionale, quod eandem in genere exanguī obtinet uim, quam sanguis in compote illo sanguinis habet. Differentias præterea nonnullas partium situ atque ordine F contemplamur: sunt enim complura animalia quæ easdem habeant partes, sed non situ eodem: uerbi gratia, mammæ alia in pectore habent, alia inter scapulas, ut uacca. Partes quas singula animalia habent, hunc in modum diuersas eadēque intelligimus. Differūt autem suis partibus animalia: cum alia omnium communes sint, alia uero plurimorum, alia quorūdam generum propria: ut piscium branchiæ, ut auium pennæ. Omnium animalium communes partes sunt, quæ cibis recipitur, & in quam deuoratur: communes enim partes tam sanguineo generi, quàm exanguī sunt os, uēter, & plurima ex parte stomachus & intestinum, aut quæ iis proportionalia habentur: plurimorum namque animalium cōmunes partes sunt, per quas transit cibus, & quibus cibi excrementū emittitur. Et cum excrementum hoc, ut antea docuimus, duplex sit, humidum & siccum, quæ partem illam humidi excrementi capacitatem habent, hæc siccū receptaculū continent: quæ uero hoc habent, non illud etiā habere omnia nouimus. quāobrem quæ uescicam habent, aluum inferiorem eadem etiam obtinent: at uero quæ aluum habent, non omnia & uescicam possident. Oculos item habent animalium genera omnia, præterquam talpæ, (quem tamen modo quodam habere dixerim) & quæ testa integuntur, & si quid imperfectum aliud est, ut uermes. Et per partes quidem animalium differentiæ his modis constitui debent.

De differentiis quæ ab animalium actionibus oriūtur. Cap. XXXV.

Actiones animalium plurimæ circa coitum, fortis procreationem, at- H que uictus solertiam uersantur: necnon ad frigora & æstus, mutationes denique temporū pertinent: inest enim omnibus ex natura sensus mutationis factæ ex frigore aut colore. Itaque ut homines alij domicilia hyeme repetunt, alij qui amplioris provinciæ principes sunt, sedem pro tempore mutant, ut morā æstate locis frigidis, hyeme tepidis trahant: sic bruta quæ loca possunt permutare, faciunt. Atque alia iuuamen in ipsis consuetis sibi locis comperiūt, alia locum mutant: iam enim post autumnale æquinoctium, aliqua ex ponto locisq; frigidis fugiunt hyemem futuram: à uerno autem, ex tepida regione ad frigidam sese conferunt, æstus metu futuri: & alia

A alia de locis uicinis discedunt, alia de ultimis (prope dixerim,) ut grues faciunt, quæ ex Scythicis campis ad paludes Aegypto superiores, unde Nilus profluit, ueniunt. Quinetiam pisces modo eodem, alij ex ponto aut in pontum tranant: alij per hyemem ex alto ad litora teporis gratia ueniunt: contra, æstate ex litore in altum uitantes æstum discedunt. Aues quoque imbecilliores hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore potius: æstiuo autem repetunt montes, ut æstu careant. Idem hic affectus, fugiendi scilicet caloris frigorisque; exuperantias, uenit iis, quæ temporibus quibusdam se abdunt & latent: ut terrestria quædam hyeme latebras subeunt, tempore iam tepidiore exeunt. Condi autem plurima hyeme, diebus scilicet frigidissimis, uel eo maxime argumento constat, quod minime cum algor est capiuntur. Sed piscium nonnulli æstate etiam latent, ut glaucus. latet aliquorum genus totum: aliquorum partim latet, partim non latet. testacea omnia latent, uerum non eodem modo: absolorum enim latibulum euidentius est: condunt enim se suis testis, ut pectines facere uisuntur: aliqua leuiore tegmine superimposito delitescunt, ut limaces: eorum autem quæ adhærent, non est tam manifesta latitatio. insecta pene omnia hyeme conduntur. Sanguinei quoque generis multa se condunt: ut ea quæ cortice intacta sunt, serpentes dico, laceratos, crocodilos fluuiatiles. Piscium etiam complures latere nouimus: alios hyeme, ut coracinum, thumnum: nonnulli æstate etiam latent, uti diximus, ut glauci: auium etiam complures conduntur, ut hirundines. iam enim uisæ sunt multæ hirundines in angustis couallium nudæ atque omnino deplumes. Quadrupedum quoque quæ animal generant, nonnulla conduntur: ut hystrices, ursi: glires etiam latent in ipsis arboribus. Nonnulla ex iis quæ conduntur, exuunt id, quod senectus *Senectus, uocat.* uocatur, (est autem senectus ueluti cutis ultima, uel cortex, qui ueluti operculum cuti est) ut ex sanguineis ea quæ cortice molliori intacta sunt, serpentes scilicet & lacerti. insecta etiam quædam senectutem exuunt, ut silpha & culex: & ea quarum pennæ uagina continentur, ut Scarabei: & omnia quidem, ubi iam factum est, quod gigni debuerit, exuunt. quædam etiam inter marina senectutem exuunt, ut locustæ, gammari & cancri. Sed quarum lateant, & quo modo & tempore: atque etiam quo tempore exuant senectutem dictum iam est.

D Ab animalium motu quæ constituuntur differentie. Cap. XXXVI.

Differunt animalia inter se etiam ipsa motione: animalium nanque alia sede stabili degunt, alia mutabili & uaga. Sedes stabilis in humore tantummodo est: terrestrium nulla statu immutabili uiuunt: at aquatiliū plura faxis affixa uitam omnem traducunt: ut conchæ genera complura. Sunt ite quæ & adhærere soleant, & quoties libeat absolui: ut genus quoddam quod urticam uocamus: quippe cum nonnulla ex iis noctu absolutæ pascantur. Non desunt complura, quæ cum sint absoluta, mouere tamen se nequeant, ut ostrea. Omnia uero tum natantia tum stabilia, locis eisdem quibus orta sunt, aut similibus degunt: suis enim quibusque cibis in iis est:

uagantur maxime & oberrant quæ carne aluntur. Quæ loco mouentur E animalia, iis initium incedendi omnibus à dextris partibus est: & omnia aut quaternis notis mouentur, aut pluribus. quaternis tantum, quæ habent sanguinem, ut homines binis manibus binisque pedibus, quadrupedes pedibus quaternis, pisces pinnis quaternis: nam & quæ pinnis, aut non amplius binis, aut nullis, ut serpentes, utuntur, quaternis ea quoque notis nihilominus mouentur: flexus enim aut quaterni iis aguntur, aut bini cum pinnis binis. At quæ sanguine uacua, pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sunt siue pedestres, iis certe motus per notas plureis exercetur: nam & ephemerum pedibus quatuor, pennisque totidem mouetur: quæcunque uero ambulant, omnia pedes pari numero possident. Animalium quoque alia uolatilia sunt, ut aues, apes: alia gressilia, ut quadrupedes, multipedes: F alia natatilia, ut pisces: alia reptilia, ut angues: alia tractilia, ut hirudines. Animal quod uolucres tantum sit, ut piscis natatilis solum est, nullum nouimus: ut uero quæ gressilia eademque natatilia sunt, complura reperiuntur.

Item eorum quæ pedibus carent, alia incesu undant fluctuant, *(αμαύνω)* Græci uocant, hocque bifariam accidit: quædam namque flexuosis impulsibus per terram labuntur, ut angues: quædam corpus sursum flexcentia progrediuntur, (parte enim innitentia priore, contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimque incedunt) ut eruce quædam. alia in incesu *(αμαύνω)* utuntur (ac si per limum trahi dixeris) hoc est præcedere parte priore progrediuntur, & quod reliquum est corporis ad illam contrahunt: quo mouentur modo hirudines & uermes terreni. Animalium præterea quæ G loco se mouent, alia toto corpore id præstant, ut salientia: alia per partes, ut incedentia omnia. Quæ per saltum sese loco mouent, ut serpentis genus, qui iaculus dicitur, nullum pedum ministerium ad eiusmodi saltem motionem desiderant: at quæ saltu utuntur, & gressus insuper indigent, cum illis saltus satis non sit, uis pedibus opus est.

Incedentia, αμαύνω.

E Notæ, αμαύνω partes significare uidentur Aristoteli, per quas motio fiat: libro etenim de animalium gressu, αμαύνω, id est notas uocat & alas, & brachia manusque, in auiibus atque hominibus, & pedes item in reliquis.

A generatione quæ oriuntur differentiæ.

Cap. XXXVII.

EX omnibus uitæ muneribus, animalium quibusdam nihil præter generationem inesse percipitur: quædam uero non tantum procreandi officio suis quodque temporibus funguntur, sed in nutrienda etiam prole laborant. atque horum quædam cum hoc perfecerint, nullam insuper cum prole seruant societatem, sed sibi tantum uiuunt: alia uero ciuilius agunt cum prole. Prima igitur pars uitæ animalium, in officio procreandi consistit: altera in alédo: in his enim duobus studium omnium uitæque uersatur. charum enim cuique suaueque contingit, quod per naturam habetur: sequunturque omnia eam uoluptatem quæ secundum naturam est. Sunt autem generationes animalium multæ ac uariæ: hoc enim commune animalia cum stirpibus habent, quod alia semine, alia sponte naturæ oriuntur, nullo cognatio-

A cognationis semine antecedente: quorum alia humo aut stirpe putrescente consistunt, ut plura insecta generantur: alia ex rore, qui frondibus insidat, ut erucæ: alia à limo, ut testaceæ: alia in animalibus ipsis excrementisq; partium gignuntur. Quæ uerò ex semine cognato procreantur, iis omnibus ortus per coitum est, dum modo sexus discrimen id habeant, quod marem & feminam describere potest: non enim in omnibus animalibus, sed in præditis sanguine omnibus, paucis quibusdam exceptis, alterum mas, alterum femina perfectum euadit. marem appellamus, quod in alterum, feminam, quod in seipsa semen illud prolificum mittit. Et quanquam diuersa sunt animalia mas & femina, tamen specie idem sunt: homo nanque utrumque est. In piscium genere, nonnullæ nec mares nec feminae gignuntur. Exanguium etiam quædam matrem & feminam habent, ut sobolem eiusdem generis procreant. Alia procreant quidem, sed non sui generis prolem: scilicet quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed quæ per se uel in animali, uel in terra putti, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus uel excrementis gignuntur: quæ nanque hoc modo per se generantur, si in mares ac feminas descripta sunt, ita generant quidem ea aliquid coitu, sed imperfectum & dissimile, & ex quo nihil amplius gignatur: sed id quod sunt, in nonnullis, sordes persistunt: ut uetmiculi ex muscis, ut pulicum aut pediculorum fœtus: id nanque magis declarant naturæ eorum quæ insecta dicuntur. Coitus nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur: quæ enim ex sanguineis pedestria uiuipara sunt, & tetro utinam mittunt, auersa coeunt: ut leo, lupus, canis: crustacea quoque & insecta eodem modo. Carcetorû, quæ sanguinea uiuipara sunt, magna ex parte modus coeundi idem est, femina scilicet mare superingrediente: quanquam non omnia simili modo cōiunguntur. Aliis enim coitus cōplexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpētibus, mutenis, & lacertarum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilaginei generis, admotis inuicem partibus supinis copulatur. Aues mare feminâ superueniente coeunt: quæ mollia dicuntur oribus inuicem admotis, cōplexuq; mutuo brachiorû, libidine explent. Coitum omnium animalium ad hunc modum fieri apertum est. Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalibus natura fixit & statuit. Ergo plurimum animantium natura uult quidem rem ueneræ per id tēpus cū hyemis cessante sæuitia, ætatis clementia oritur: quod sane tēpus ueris est, quo animalia, prope dixerim omnia, & uolantilia, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur: sed sunt tamen quæ non eo tempore coeant: uerum prout quæque alere suos fœtus cōmodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. sunt enim quæ per autumnum etiam & hyemem coeant & pariant: ut nonnulla tum aquatiliū tum uolucrum genera. sicuti enim temporis beneficio, ita & corporis ualitudine propensiora ad uenerem reddunt animalia. Homo uero atque etiam plura alia pedestria, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernatur, (uidelicet propter teporem & pabuli ubertatē) ut fœsus, canis, & uolucres quædam. Genus autem auium parte plurima uere ac ineunte æstate coit &

Mas, ἄρρεν.
Femina, θήρ.
Aut.

Auersa, πρὸς
γούνα.

DE DIFFERENTIIS

parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est: quædam etiam E
 æstate: aliæ à bruma incunte uere pariunt & incubant. Iuscinia æstate parit:
 infecta hyberno quoque tēpore coeunt. non defunt quæ omnibus anni tem
 poribus pariant, ut ex piscibus murena, & ex mollibus scpia. Aetate etiam
 ad coitum differūt animalia: primum enim magnæ eorum parti semen nō
 simul incipit, & excerni, & posse generare: sed uis illa prolifica postea acce
 dit: nouellorum enim in omnibus animalium generibus, prima emissio se
 minis, aut infecunda, aut si fecūda sit, imbecilliora tamen generat & mi
 nora: quod potissimum in hominum, & quadrupedum animal gignētium
 genere, atque etiam auium patet: alterum enim prolem minore procreat,
 alterum oua edit minora. Aetas uero accommodata ad coitum cuique suo
 in genere, plurima ex parte, fere tempus idem sortitur, nisi quid præmatu
 ret, & aut ob aliquam rem monstruam, aut ex detrimento naturæ & uitio F
 anticipet: ut oues & capræ anniculæ coeunt, atq; utero ferunt. mares quoq;
 in ipsis generibus eodem illo tempore incunt. Sues tum mares tum fœmi
 næ coire incipiunt mensē suæ ætatis octauo: sed tamen non omnibus locis
 eadem ætatis ratio est: iam enim sues nonnusquam tam mares, quàm fœ
 minæ quarto coeunt mense: sexto tamen ita, ut uel progenerare & educare
 possint. Ex quadrupedibus itaque uiui paris, aliæ anniculæ & coeunt & pa
 riunt, ut oues, capræ, canes: aliæ mense suæ ætatis octauo, ut sues, ut iam di
 ximus: aliæ uero biennes coeunt, ut equus, asinus, tam mas, quàm fœmina
 coire incipit in trimatu: fert uentrē menses duodecim. Elephātus tam mas,
 quàm fœmina incipit coire ante annum ætatis uicesimū: incipit enim fœ
 mina coire anno duodecimo cum celerrime, aut quintodecimo cum lētis
 G
 sima: eas quinque aut sex annos natus superuenit incūte uere: coitū trien
 nio interposito repetit. Lacustres & palustres pisces, quinto suæ ætatis mense
 uterum gestare magna ex parte incipiunt. Coeunt quandoque uel alieni
 gena, ut in Cyrenēli agro lupi cum canibus coeunt. Indicos etiam canes ex
 tigrīde & cane gigni confirmant. Raro quidem id fit: sed tamen id fieri, &
 in canibus, & in uulpibus, & lupis certū est: necnon in auibus salacioribus
 idem fieri uisum est, ut perdicibus & gallinis. In Africa coeunt & generāt
 etiam quæ genere diuersa sunt, sed quorum tempora eadem ferendi uteri
 sunt, & magnitudines non multò inter se discrepent. Obseruatum, inquit
 Plinius, è duobus diuersis generibus nata tertij generis fieri, & neutri parē
 tum esse similitudine: æque ipsa quæ ita nata sunt, non gignere in omni anima
 H
 lium genere: idcirco mulas non parere. Coitum animalium, quæ non nisi
 coeundo progenerant, ad hunc modum se habere intelligimus. Generant
 autem hæc, alia uermē, ut aranei & aliorum insectorum quædam: alia oua
 ouipara, & ouipara dicuntur, ut aues, serpentum maxima pars, & quadrupedes ouipara,
 & pisces plurimi: alia animal pariunt (appellanturq; uiui para, ut ho
 mo, equus, uitelus marinus, & reliqua quæ pilis integuntur: & quæ cete di
 cuntur, ut delphini: & ex piscibus cartilaginei, & ex serpētibus, uiperæ. At
 uero eorum quæ animal pariunt, aut oua intra se prius cōficiunt, ut cartila
 ginea, aut illico animal intra se formant, ut homo & equus. Ouiparorū alia
 ouum

Ouipara, & ouipara
 mag.
 Vniipara, & ouipara
 etiam.

- A ouum edunt perfectū, ut aues, & quæ quadrupes ouum pariunt, & serpentum pars plurima: (oua enim eorum postquam prodierūt, nullum insuper capiunt incrementū) alia imperfectum edunt, ut pisces, & quæ crustata, & quæ mollia dicuntur: nanque eorum oua postquam edita sunt augentur. Quæ ex ouo generantur, fere omnia coitu oriuntur, mare in foemininam emittente semē genitale. Ouum id uocamus, quod ubi in sœtura perfectū est, eius ex parte principio animal consistit: reliquū uero, alimentum ei quod gignitur est. Continetur autem ouum ipsum, aut putamine testaceo, & bicolor est, quale auium esse uidemus: aut cute molli obducitur, unicolorque est, quale est cartilagineorum & piscium omnium. Vermē id esse dicimus, ex quo toto nō ex parte aliqua animal totum per subiecti fœtus formatio-
- B nem incrementumq; gignitur. Quæ ex ouo generantur, constat non similiter gigni, atque ea quæ ex uermibus: in ouo nanque oculi primū in capite patent grādes: contra uero in illis euenit, ut scilicet pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augeantur. Hic admirari naturam subit, quā bene mirōq; deinceps ordine generationem reddit: alia enim & quæ perfectiora sunt, animalia intra se statim generant perfectā, sed tamen quæ foris incrementum recipiunt: alia non statim animalia, sed cum prius intra se ouum pepererint, mox animal edunt in lucem: alia non perfectum animal generant, sed ouum, idq; edunt perfectum, ut aues: alia, ut quæ frigidiora iis consent, generant quidem ouum, sed nondum perfectum: uerū quod foris perficiatur, ut genus piscium squamatum, crustata & mollia.
- C quintum genus, ne ouum quidem ex sese parere potest, nisi quod hæc affectio foris euenit ei, uti infra docebimus: insecta enim primo uermiculum pariunt, qui addito tempore, speciem accipit oui: quæ enim chrysalis appellatur, oui obtinet facultatē, tum ex eo animal nascitur, tertia mutatione finem accipiens generationis. Differunt etiā animalia, tum gerendi uteri tempore, tum pariendi, tum partus etiā numero: semel anno pariunt quædam, ut magna pars syluestrium animalium: alia bis, alia ter, alia sæpius. Dasy-podes & cocunt, & pariunt quoque tempore, & singulis mēsis: & alia uere, alia æstate, alia autumnō, alia bruma pariūt: ut inter aues halcyone, ex piscibus menides: alia omni tempore, ut homo, uitululus marinus. rursū alia breui à coitu pariunt, ut insecta maxima sui parte, quæ solēt coire: alia diutius uterum ferunt: alia denique singulos fœtus pariunt: alia, binos, ternos, aut quaternos: alia numeroſo magis partu fœtificant. In ouiparo genere sanguineo, quadrupedum ortus uerno tempore agitur: auium syluestres semel magna ex parte pariunt: aliquæ tamen bis, ut hirudo: alia & cocunt, & pariunt omni tempore anni, ut gallinæ: columbæ decies anno pariunt: & columbaceum genus magna ex parte bina parit oua: turtur tamen & palūbes uere, nec plus quā bis pariunt. Piscium alij diebus amplius tricenis uterum ferunt, alij minus. alij item circa æquinoctium uernum pariūt: aliis æstas, aliis autumnale æquinoctium attribuitur: menides bruma pariunt, ut dictum est. Ex iis qui in lacubus fluuiisq; degūt, Cyprini quinquies aut sexies anno pariunt: chalcis ter: reliqui semel edunt oua. in exanguī uero

Ouum, dicitur.

Vermis, enī
est.

DE DIFFERENTIIS

genere, tribus mensibus oua gerunt locustæ: quatuor mensibus squillæ: intra diem decimum quintū parit sepia. Ex uiuiparis delphini singulos magna ex parte edunt, interdum tamen & binos. Sues cicures uterum ferunt mēses quatuor: numerus partus cum plurimum ad uicenos. Oues & capræ magnæ ex parte singulos: aliquando binos, & ternos, & quaternos. uterum ferunt quinque mensibus, tum oues, tum capræ. Parit canis duodecim cum plurimum: sed magna ex parte quinque, aut sex: unum etiam aliquam peperisse certum est. Gerūt uterum canes Laconicæ sexagenis diebus, aut uno aut altero plus minúsue. sunt & canes, quæ quinta anni parte uterū ferant, hoc est tribus & septuaginta diebus: nonnulla quarta parte anni. Vaccæ decimo mense pariunt singulos, geminos uero raro. Ferunt uterū equæ menses undecim: pariunt duodecimo mense, magna ex parte singulos, sed gemellos quoque aliquando. eodem modo asinæ. Camelus fert uterum menses decem. Elephanto ferendi uteri tempus incertum: alij annū & sex menses, alij biennium, alij triennium statuunt. Ceruæ uterum gerunt octo menses: pariunt magna ex parte unum. Vrsæ fert uterum dies triginta: parit tum unum tum duos: sed cum plurimum quinque. Histrix totidem diebus fert utero, & reliquæ facit perinde, ut ursæ. Læna singulis annis uere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex catellos. Vulpes cum plurimos quatuor edit. Lupus fert, & parit ut canis, tum tempore, tum etiā scetus numero: parit inuente æstate. Felis & ichneumonæ tot pariūt numero quot canes. Thos uel canis impletur, & generat numero duos, aut tres, aut quatuor. Murium generatio mirabilis præter cetera animalia maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate.

Duobus & septuaginta.

A locis in quibus gignuntur animalia, & in quibus degunt, colliguntur differentiæ.

Cap. XXXVIII.

Ad generationem pertinet & locus: est enim uel locus generationis principium, ac proinde à diuersitate etiam locorum differentiæ oritur: ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic aliis generantur quidem, sed minora aut pauciora & uita breuiore, nec prospera: serpentes enim & lacertæ corticataque omnia, in locis calidis, & in mari rubro testata omnia gignuntur prægrandia. In frigidis autem, ut septentrionali plaga, ex animalibus, quæ aut parum sanguinis habent, aut eodē uacant, quædam omnino nō gignuntur: quædā gignuntur quidem, sed minora uitaque sunt breuioris. Maxima in India gignuntur animalia: indicio sunt canes grandiores cæteris. Plurimum autem discriminis ex ipsa regione oriri certum est, non ad magnitudinem tantum habitūque uegetiorem, uerum ad coitum etiam & partum: ut eadem alibi pluries generent, alibi minus. In uniuersa Africa non aper, non ceruus, nō capra syluestris est: & locis quoque uicinis discrimen huiusmodi existit, ut agri Milesij locis sibi propinquis cicadæ alteris gignantur, alteris non. Amnis in Cephalinia insulam dirimit, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ. Terræ Bœotia in Orchomenio agro talpæ habentur multæ: at in Lebadio uicino

Plinius capreas dicit.

A uicino nullæ sunt: neque si aliunde portatæ eò fuerint, uolunt infodere. India quæ sanguine carent, & quæ secessu tempore conduntur, grandiora nimitum illa possidet, sicuti & reliqua quoque animalia, ut modo diximus. In Africa, magnitudo anguium mira, sicut & fertur. In Arabia, lacerti magnitudine cubitum excedunt. In Ponto, neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca. In mari rubro, testata omnia mira quadâ magnitudine augentur. In Syria oues sunt cauda lata ad cubiti mensuram: capræ auriculis mensura palmari & dodrantali, ac nonnullæ demissis, ut spectent tertiam. In Cilicia capræ tondentur, ut alibi oues. In Ægypto aliqua maiora quàm in Græcia fiunt, ut boues & oues: aliqua minora, ut canes, lupi, lepores, uulpes, cerui, accipitres: aliqua magnitudine pari, ut cornices & capræ: cuius rei causam attribunt cibo, qui aliis large aliis parce sit: tum etiam cæli conditio temperaturæ causa est: ut in terra Illyrica & Thracia & Epiro, asini parui habentur: in Scythica & Celtica nulli aut omnino pauci, propter immodicum frigus. Item leones in Eutopa potius sunt: pantheræ in Asia: in Europa autem nullæ. Bestiæ denique omnes fetæ efferaiores in Asia sunt, fortiores in Europa, multiformiores in Africa: quo quidem loco etiam quæ alienigenæ sunt, coeunt & generant, ut ante dictû est. Morum etiam diuersitatem loca efficiunt, ut môtana & aspera suas bestias reddunt, & aspectu efferaiores, & uiribus robustiores, quàm plana & molliora. Morfus etiam ferarum & ictus ex locorum diuersitate plurimum differunt: ut in Pharo locisque aliis quibusdam scorpiones non lædunt: at aliis, & præcipue in Scythia multi & magni, & nocui sunt. Anguium quoque morfus per loca plurimum differunt. Genera enim serpentium peregrina aliquanto magis pestifera sunt: maxime quæ æstuosis locis gignuntur. Italia frigidiorisque regiones minus terribiles angues edunt. Atque hæc ita se habent.

De sexuum differentiis, masculini scilicet & fœminini.

Cap. XXXIX.

SEXUS item masculinus fœmininûsque distinctus quidem, sed non in omnibus animantibus, est: sunt enim quibus id desit, ac similitudine quadam & parere dicuntur & ferre uterum. In iis enim animalibus quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino iis, quæ testa integuntur, sexus discrimen nullum omnino est: in mollibus uero, crusta opertis, & pedestribus omnibus, tum bipedibus tum quadrupedibus sexus uterque est: atque etiam in aliis quæ animal per coitum generant, aut ouum aut uermem. At uero in genere insectorum & piscium, sunt quæ omnino sexus hoc discrimen alterutrâ in partem non habeant. Nulla parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero & testibus, atque iis quæ illis adiuncta sunt. Fœminis enim omnibus sanguineis intus conditæ habentur hæ partes: maribus autem multiplici differentia euariant testes: aliis enim nulli omnino sunt, ut piscibus, serpentibus: aliis sunt quidem, sed intus: & iis quæ intus continent, nō etiam omnibus eodem modo habentur, ut infra docebimus. Maribus in quocunque animalium genere, partes superiores priorisque sunt potiores, ualidiores

*Sunt tamē qui
dā qui in rin-
nocerotū ge-
nere matrem
tantum repe-
ri existimēt.*

& aptiores. Quæ autem dici possunt inferiores posterioremque, eas fœminæ habent robustiores, tum in hominibus, tum cæteris animalibus omnibus, quæ pedestria sunt atque animal generant. Et fœmina fere inneruior atque infirmior est: à partu tamē fœmina in educanda sobole fere acerbior mare est. In pedestribus sanguineis uiuiparis, maxima ex parte maiores sunt mares quàm fœminæ: at in iis quæ aut oñum pariunt aut uermem, ut piscesibus atque insectis, fœminæ maiores suis maribus euadunt. Fœminis sanguis nigrior & crassior quàm maribus est, dummodo cætera adsint pariter, quæ uel ab ætate uel sanitate proficiſcuntur. Et minus sanguis per summam corporis fœminarum est, plus enim parte interiore continetur. Caro quoque humidior est fœminæ quàm maris: pilum etiā habet tenuiorem fœmina quàm mas: uox item fœminis omnibus tenuior & acutior, boue F excepto. Partes autem quas uelut arma natura animalibus dedit, cuiusmodi sunt dentes exerti, cornua, calcaria, & cætera generis eiſdem: eas certe in nonnullis generibus omnino mares habent, fœminæ non habent: uelut generis ceruini, fœmina cornuum inops mutilaque est: & auium nonnullarum quibus data calcaria sunt, fœminæ omnino iis carent: pari modo ut fœs fœminæ dentibus uacant exertis. At in nonnullis generibus sunt quidem hæc sexui utrique, sed maribus potiora, ut cornua tauris robustiora quàm uaccis.

Auctus ratione diuerſa oriuntur animalium differentiæ. Cap. XL.

*Terrestria, uel
pedestria, πηδ
Aquatilia, ὑδ
ροφύα.*

Ἐπιπνοέζον.

DEgunt animalia locis diſiuncta, alia nanque terrestria, alia aquatilia G sunt: quam differentiam trifariam intelligimus: aut enim recipiendi aeris aut aquæ ratione, altera terrestria, altera aquatilia dicimus: aut quòd apta natura sunt seruari temperamento alterutrius, quanquam aërem aquamue non recipiant: aut etiā quod cibum petant, uersanturque utrobique diutius. Complura enim cum recipiant aerem, id est spirant, partuſque faciant in terra, cibum tamen à madidis locis petunt, uersanturque in humore partem maximam temporis: quæ sola ἡπιφνοέζον, id est uitam ambiguan agere uidentur: quippe eadem & uelut pedestria & uelut aquatica statui possunt. At eorum quæ humore recipiunt, præter unum cordulū, nullum uel pedestre uel uolatile est, nec cibū sibi ex terra petit: quanquā multa spirabilia pedestrisque generis humore gaudent: & adeo nonnulla ut ne H uiuere quidem disclusa ab aqua natura ualeant, ut testudines marinæ & lutariæ, crocodili, fluuiatiles equi, uituli marini. Hæc enim omnia nisi aliquandiu spirent, intereunt: & parere educarēque solent in sicco. Quæ uero in cetaceo uel in reliquo aquatili genere fistulam gerunt in capite, ut delphinus, balæna, hæc natura quadam peculiari, nec aquatilia tantum, sed nec terrestria facile dixeris: siquidē terrestre quod aerem recipit, aquatile quod aquam, secundum naturam est: particeps nanque est hoc genus utriusque, cum & mare accipiat, reddatque per fistulam, & aerem per pulmonem: habent enim hoc membrum & spirant, uerum in utraque diuisionis tam cōtrariorum generum parte collocari hoc genus absurdum est. Quamobrē aqua-

- A aquatile genus amplius distinguendum uidetur: ut alia accipiant reddantque aquam, ea causa, qua spirantia aerē, quo scilicet refrigerentur: alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur: quod admissum, quo emittant, instrumentum habeant necesse est. Quę igitur loco aeris, qui per spirationem attrahitur, humore utuntur, quo scilicet refrigerētur, branchias habent: quibus autem cum cibo humor illabatur, iis fistula in sanguineo genere data *Fistula, uel hys* est. Mollibus etiam & crustaceis hoc idem adhibitum est: nam ea quoque humorem propter cibum accipere coguntur. Altero etiam modo aquatilia sunt, (ob temperationem corporis dico & uictum) quę accipiant quidem aerem, sed in humore etatem degant: aut quę recipiant quidem humorem & branchias habeant, sed terram petant, unde cibū accipiant: quale cordulum esse diximus. Sed horum omnium natura quasi peruersa deprauataue uidetur: sicut marium nonnullorum natura scēminam refert, & scēminarum marem. Cum ergo animalia trifariam in aquatile & terrestre diuidantur, ut dictum iam est: aut enim recipiendi aeris aquaue necessitudine, aut corporis temperatione, aut tertio cibi ratione, uictus prorsus discrimen pro his diuisionum membris consequetur: alia enim temperandi corporis gratia, & propter cibum, atque etiam recipiendi aeris aut aque necessitate ita degunt: alia temperamēti uictusque causa tantum. In iis, eorum quę testa operiuntur, quę quidem sua natura immobilia sunt, plurima aluntur humore dulci & potulento, qui tenuior ex aqua falsa elicitur: quę autē mobilia eademque carne uescētia sunt, *καταγενητα* Gręci dicunt & *καταγενητα*, iis uictus ex pisciculis est, ut purpuris: alia & iis quę in mari pululāt uescuntur. Quę crusta integuntur, omniuora sunt: quippe quę & lapillos, & limū, & algā deuorent: atque quādam etiā stercus, ut cancri fluuiales: carnes etiam nimirum appetūt. Locustę uel pisces maiores cōvincere possunt. Mollia omnia carniuora sunt: lolligines enim atque sepia pisces uel maiores euincunt: polypi conchulis maxime uescuntur. Pisces sere omnes scēturam suo tempore, alter etiam alterum edit, maiorūque minores sunt praeda: reliqua uictus ratio nō eadem omnibus est. In auium genere, quibus unguēs aduncę, omnes carniuorę sunt. In genere etiam non adunco sunt, quę carne uescuntur, ut hirundo. Sunt quę uermiculos cum aliis, tū qui in lignis nascuntur, pascant: alia spinam appetunt: alia frugibus uiuūt. Omnium sere auium, alia uictum à terra petunt: alia à fluuiis & lacu, ut ardeolę: alia mari, ut halcedo & fulica. Genus auium omne cum potu exiguo contentum sit, tum aduncis nullus usus bibendi est, pręterquam paucissimis quibusdam, quę & ipsę raro utuntur. Auium cęterę sortu bibūt: sed quibus collum est longum, intermittunt, caputque resupinant. porphyrio unus morfu bibit. Genus animalium cortice intectum, ut lacerti & reliquę huiusmodi quadrupedes, atque etiam serpentes, omniuorum est: nam & carnem edunt & herbam: sed desiderium iis quoque bibendi exiguum, & reliquis quibus pulmo fungosus est. Quadrupedes quę animal generant, syluestres eademque serratę dentibus, ut leo, lupus, carne omnes

DE DIFFERENTIIS

uescuntur. ursus animal omniuorum est. Cornigera animalia, & quibus E
dentes serrati non sunt, omnia fruge herbâque uescuntur, nisi uehementer
esuriant, sue excepto, qui minime herbę frugûm ue appetens est, sed radicû
maxime ex omnibus animalibus. Sunt & inter quadrupedes ferâsque, quæ
uictum ex lacu & fluuiis petunt, ut fiber, lutris, laticæ: at uero à mari nullum
præterquam uitulus marinus. Bibunt, quibus dentes serrati animalia, lam-
bendo: atque etiam nonnulla ex non ferratis, ut mures. Quibus autem con-
tinui, sorbendo, ut equi, boues: ursus neque sorbendo neque lambendo, sed
morsu. Bibunt cætera quidem magis tempore æstiuo quàm hyberno: quæ
autem in Africa degunt animalia, contra: insuetum nâque iis est bibere æ-
state, propterea quod imbres per id tempus fieri non soleant. Insecta ani-
malia quibus dentes omniuora sunt: quibus autem lingua tantum, humo- F
rem undique exugendo sua lingua uescuntur: quorum alia omniuora sunt,
quibus gustus omnium saporum est, ut muscæ: alia sanguiuora, ut tabani
& asili: alia succis plantarum & fructuum uiuunt. Animalium quibuscû-
ruminare in more est, proficiuntque ac delectantur non minus in rumi-
nando, quàm edendo. Ruminant, quæ superiore dentium ordine carent, ut
boues, oues, capræ. Ex feris nullum ruminare constat, præterquam ea, quæ
aliquando cum hominibus exigunt, ut ceruus: hunc etenim ruminare pla-
num est. Sunt etiam de dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mu-
res pōtici, lepores & piscis quidam, quem ab ea re *μύρμα*, id est ruminalem
quidam appellarunt. Talis animantium uictus est.

*Vide an hoc pa-
cto legendū sit
apud Aristote-
lem, Et pisces
quidā, & quæ
ab ea re, &c.*

A sensibus quæ oriuntur animalium discrimina.

Cap. XLI. G

Sensus quidem, ut ante dictum est, omnibus animalibus communis est:
Sensus tamen omnes, aliis uero pauciores dedit natura. Quæ nanque san-
guine prædita sunt omnia, omnes habent sensus, nisi quid læsum mutilum-
ue sit, ut talpa: præterea iis quæ mollia, quæ crusta insecta, & quæ insecta di-
cuntur, prope dixerim omnibus, sensus omnes insunt. Quæ autem siliceo
tegmine operiuntur, quâquam tactum (quem omnibus animalibus com-
munem esse diximus) & olfactû gustumq; habere constat, de uisu tamen &
auditu nihil certi manifestiq; habemus: quædam tamen ut echini, tethya,
glandesq; olfactum minime habere uidentur. Eorum quæ non spirant, alia
branchiis, alia fistula, alia præcincta, ut insecta, odorē sentiunt. Nec pro cō- H
pari modo genera animalium omnia, sensibus prædita omnibus sunt: sed
olfactu canes præcellunt, uti quibusdam placet: uisu aquilæ: gustu proto-
geustæ animalia Indica, unde & nomen acceperunt: tactu serpētes, & quæ-
dam aues: auditu anseres. Verum Plinio auctore, ex sensibus ante cætera
homini tactus, deinde gustus: reliquis superatur à multis. Aquilæ clarius
cernunt: uultures sagacius odorantur: liquidius audiunt talpæ. Cicero, omnis,
inquit, sensus hominum multo antecellit sensibus bestiarum: quorum ita
clara iudicia & certa sunt, ut si optio naturæ detur, & ab ea deus aliquis re-
quirat, contentane sit suis integris incorruptisq; sensibus, an postulet me-
lius aliquid, non uideam quid quærat amplius. Hæc Cicero.

*Quam sint cer-
ta humanorum
sensuum iudi-
cia, plurib. ex-
plicat Cicero
libr. 2. De nat.
deor. et 4. Aca-
demic. quæst.*

A respiratione

A A respiracione & uoce, animalium discrimina. Cap. XLII.

A Nimantium alia accipiunt redduntq; aërem: quæ res respiratio nominatur, ut homo, & quæcunque terrestria habent pulmonem: alia uero minime, ueluti pisces & insectorum genus omne: & his quidem neq; uocis emittendæ, neque locutionis ulla facultas est, sed sonus tantum in nonnullis: differt enim uox à sono, & cum iis tertia res adnumeranda est locutio: gutture (*φάρυγξ* dicunt) parte una, uox agitur: locutio non nisi uocis per linguam explanatio est. Quamobrem quibus animantiū lingua libera absolutaq; non est, neque sermone utuntur, neque uocem emittunt, sed sonū tantum. Insectorum alia murmur edūt, ut apes: alia canere dicuntur, ut cicadæ: nullum molle, nullum crustatum, uel uocem uel sonum mittit naturalem. Pisces uocis quidem expertes sunt, sed sonos stridoresq; mouēt, qui uocales esse existimantur: at uero, quæ & linguam habent & pulmonem, si quadrupedes ouiparæ sunt, uocem quidem emittūt, sed exilem: & alia longum sibilum edunt, ut serpentes: alia abruptum & perexiguum, ut testudines: alia uero exilem & imbecillē uocem: rana suum habet ululatum, quā ololyginem nominant. Genus auium uocem mittere potest: iisq; præcipua facultas conficiendæ locutionis, quibus lingua mediocriter lata uel tenuis. Quadrupedū genus quod animal procreat, uocem uarie mittit: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est: omnium uero uocaliū animalium communis mos est, ut sui coitus tempore potissimum canant & blaterent præter hominem, ut aues tunc maxime plurimāsque emittunt uoces cum coeunt. Differunt tum uoces animalium, tum locutiones tractus ratione & regionis. Et uox quidem acumine grauitateq; maxime innotescit: in iis tamen specie nequaquam discrepāt, quæ generis eiusdem sunt. Ætatis quoque ratione differunt uoces: iunioribus enim quàm uetustioribus fere acutior uox est. Magna etiam ex parte uox marium fœminarūq; differt: eo quod mares grauius sonant quàm fœminæ: uerū non in omni animalium genere ita agitur: sunt enim in quibus è contrario fit, ut in bubus: nam boum fœmina grauiorem, quàm mas agit uocem: & uittulis grauior, quàm adultis. Quamobrem castratis uox è contrario mutatur: transseunt enim quæ castrantur in fœminam.

A Spiratio, *ἐκπνοὴ καὶ ἀκπνοή*. Vox, *φωνή*. Locutio, *λογισμός*. Sonus, *ἡχώ*.
 DB Longum sibilum, *συνεχμῆς*. Abruptum & perexiguum sibilum, *συνεχμῆς μικρὸς*, uel potius *συνεχμῆς*. Ololygo, *ὀλολυγὶς*.

Animalium discrimina, quæ à somno & uigilia oriuntur: aut ætate, iuuenta scilicet & senectū, à uitæ prolixitate & breuitate. Cap. XLIII.

Sunt uero hæc animalibus omnibus cōmunia, uigilia & somnus, iuuentū & senectus, uita & mors: non tamen pariter omnibus eodemq; modo insunt: omnia enim animalia dormiunt quidem & uigilāt: (nullū enim reperitur, quod uel semper dormiat, uigiletue semper) sunt tamen quæ somno omnino adeo exiguo contenta sunt, ut sæpenumero quemuis lateat, dormiant, necne. Pedestria omnia & prædita sanguine dormire ac uigilare,

*Aquatilium,
Quod pisces et
aquatilis reli-
qua dormiant,
unde argumētū
Aristo. histor.
animal lib. 4.*

*Sani trahit,
iuxta Arist. lib. 1.*

sensu ipso percipiuntur: quibus enim palpebrę adiunctę sunt, conuiuendo E
obdormiscūt. Aquatiliū quoque somnus apparet, ut piscium, mollium,
& crusta opertorum, locustarum inquam, & ceterorum generis eiusdem.
Argumentum uero, quāuis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris
carent, ipsa tamen quiete cernuntur placida, seu soporata. Insecta etiā dor-
mire argumentum, quodd requiem capiūt, motuq; omni procul dubio ces-
sant, quod præcipue patet in apibus: quiescunt enim noctu & conticescūt,
ut nullus omnino bombus sentiat. Item somniare non solū homines, sed
& alia quædam animalia, ut equos, canes, & boues palam est. Dormiētibus
sanguinis copia partes exteriores deserit, subit interiores: ita ut adactō cul-
tello non æque effluere possit. Etatum etiam ratione nonnihil discriminis
accidit: etenim in prima ætate, & admodum iuuenili, sanguis sanie trahit, F
& copiosior est: in senectute autem crassus, niger & paucus, medium tenet
in media firmatq; ætate. Concrescit etiam facile senu, uel in corpore san-
guis, qui per summa est, quod idem nunquam in iuuenibus accidit. Auge-
scunt animalibus pili in senectute, durioresque redduntur: quod idem un-
guibus quoque euenit: piscibus quoq; senescētibus squamę duriores cra-
sioresque efficiuntur. Quadrupedum etiā uilli lanæue senectute prolixius
augentur: quanquam rarefcant, fiantq; pauciores. & ungulae quoque ma-
iores in senecta redduntur, quod idem rostris etiam auium euenit. Pennas
gruum in senecta nigrescere perspectum est. Viuunt certe alia diutius, alia
uero quo nata sunt, eodem die emoriuntur, ut ephemerus: longioris uitę
sunt alii, quę gressilia sunt, pariter & sanguine prædita, ut homo & ele- G
phas: & aquatilia terrestribus breuioris uitę sunt. In pedestribus sangui-
neis uiuiparis maxima ex parte longioris uitę sunt mares quàm fœminę:
fœminas autem piscium maribus esse uiuaciores cōstat, eod quodd fœminę
ueteriores quàm mares capiuntur. Quę semine abūdāt, & salacia sunt, ci-
tius senescunt: quę contra, diutius uiuunt: ideoque mulus lōgiorem degit
uitam, quàm aut equus aut asinus, ex quibus procreari solet. Mares, prope
dixerim omnes, diutius uiuunt, quàm fœminę: accidit tamen uel ob sala-
citatem, ut in passeribus, uel ob nimium laborem, ut in iumentis, ut mares
quidam suis fœminis ocyus senescant.

Differentiæ animalū, quę à moribus constituuntur. Cap. XLIIII. H

MORibus item animalia distinxit natura: habere enim uim quandam
naturalem animantes in quauis animi affectione uidentur: hoc est
prudencia, stulticia, animositate, ignauia, clementia, atrocitate, & reliquis
habitus generis eiusdem. in quibusdam etiam commune aliquid disci-
plinę eruditionisque habetur: atque etiam prudētię imago quædam inest
in nonnullis: alia enim uicissim inter se, alia ab homine (quę scilicet audi-
tu non carent) non modo strepēdi, uerum significandi differentias possunt
dinoscere. Sunt etiam animatum alię ciuiles, alię inciuiles: ciuiles appel-
lo animātes, quę labori comunicāt: id est, quarum opus communi effici-
tur opera, ut homo, apis, formica, grus. In omnibus uero generibus, in quibus

*Ciuiles, πεν-
τα.*

- A bus per marem & scēminam procreatio est, mores distinxit natura, quibus mas differt à scēmina: quod præcipue tum in homine, tum etiam in iis, quæ magnitudine præstant, & quadrupedes uiuiparæ sunt, percipitur. (mores nanque minorum animalium, parumq; uiuentium temporis, minus sensu percipiuntur: uiuaciorum euidentiores sunt:) scēminæ enim in iis moribus sunt mollioribus, mitescunt celerius, & manum facilius patiuntur: discunt etiam, inuitanturq; ingeniosius: ut in genere canum Laconico: sed fere minus quàm mares sunt animosæ, uerum maliciosiores, astutiores, & insidiosiores scēminæ sunt, atque in nutrienda prole sollicitiores: mares cōtrà, animosiores, ferociiores, simpliciores, minùsque insidiosi. Pugnant inter se ipsa animalia, quæ loca eadem incolunt, atque iisdem uescūtur cibis: nam si uidus penuria sit, fit certe ob eam rem, ut uel eiusdem generis animantes pugnam inter se conferant. Et quidam marinos uitulos eiusdem loci pugnatè inuicem aiunt, & marem cum mare, & scēminā cum scēmina, donec alter ab altero, uel occidatur, uel eiiciatur: idemq; corū catulos facere. Carniuora etiam (Græci *ἐμψάλα* uocant) oppugnantur à cæteris omnibus: & ipsa cum cæteris pugnat, quoniā uictus iis ab animalibus est. Sunt ferarum aliæ semper inter se infestæ: alię hominum ritu, cum res ita tulerit. Piscium autem, alię gregatim degunt, amicique sunt: alię non gregatim, inimicique uiuunt. Conger & muræna caudas inter se prærodunt. Polypum intantum locusta pauet, ut si iuxta uiderit, omnino moriatur. Locustam cōger, rursus polypum congre lacerant. Genus ouile amens, & moribus stultissimis est. Ferarum quadrupedum cerua non minime prudentia præstare uidetur: id quod & pariēdo, & scētum educando ostendit. Omnino ratio brutorum magnam refert uitæ humanæ similitudinem: magisq; in min ore genere, quàm in maiore uideris intelligentiæ rationem: quod primū in auium genere, hirundo in effingendo construendq; nido, ac pullis educandis ostendit. Columbi cum pluribus coire nolunt, neque coniugiū iam inde à primo ortu initum deferunt, nisi cœlebs aut uidua. quin etiam scēminę parturienti mas adest, & cultu, omniq; officio fungitur. Domicilia quoque agrestes uolucres aptissime ad uictum, & prolis salutē moliuntur. Sunt item aliæ parentes feliciores, & suorum gnatorum diligentiores: alię contra. Et aliis ingenium ad uictum acutius, aliis obtusius est. Sed in marinis
- D quoque animantibus permulta intelligi possunt, nō sine solerti ingenio effici rationē uitæ commodioris: rana nanque, quę piscatrix appellatur, præterea torpedo & pastinaca sese abscondentes piscantur. Obruunt arena sese & aselli, & raix, & passerēs, & squatinæ: cumque nullam sui corporis partē intactam reliquerint, uerberant radiolis sui oris; quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi cum aspexerint, adnatāt quasi ad algas, quibus uesci soliti sunt. Mollium astutissima sepia est: maxime enim hæc suo utitur atramento, non modo cum metuerit, uerum etiam abscondendi causā. Polypus fatuus quidem est, cum ad manum demissam hominis accedit: sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio recondat: sui etiam mutatione coloris uenatur pilces. Insectorum operosissimum, &

DE DIFFERENTIIS

præ cæteris fere animalibus officiosissimum genus formicarum & apud est. E Crabrones item & uespæ, & prope dixerim omnia huius cognata generis, & aranei quidam in uitæ muneribus ingeniosiores habentur. In moribus animantium percipi differentias licet: præcipue quidem ad fortitudinē & timiditatem, ad mansuetudinem quoque & feritatem, etiam in ipso syluestrium genere: leo enim quanuis in edendo ferocissimus sit, tamen pastus & fame iam uacans, facilis mitisque maiorem in modum est: elephātus omnium ferarum mitissimus & placidissimus est. E terrestribus mures, è uolucris hirundines indociles sunt: cum elephanti iussa faciant, leones iugum subeant, in mari uituli, totque piscium genera mitescant. In marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum ac mitium. Genera autem quæcunque placida sunt, hæc eadē quoque fera fieri possunt reperiri, ut fues, equi, homines, oues, capræ, canes, boues.

Ab affectuum quorundam immutatione, quæ oriuntur animalium differentia.

Cap. XLV.

VT quæque animalia pro suis affectibus agere, sic contra, pro suis quoque actionibus affici immutarique moribus solent: quin & partes corporis nonnullæ sæpè numero ratione agendi immutantur. In auium enim genere gallinæ cum mares uicerint, cucuriunt: & exemplo marium tētant superuentu coire, crista etiam caudaque erigitur. Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat cum se abditurus est. Complures etiā alia immutantur aues per tempora, & colore & uoce: ut merula quæ ex nigra redditur ruffa, & uocem mittit diuersam: strepitat enim per hyemem, cum per æstatem tumultuante cantet. mutat & turdus colorem, uoce tamen eadē est. Luscinia quoque & colorem per tempora mutat & uocē: & quidem in terra Italia per id tempus, quo sic immutari solet, alio nomine appellatur. Denique auestunc maxime plurimisque emittunt uoces, cum coeunt. Colorem etiam mutant & pisces, merulæ & turdi. phuca etiam mutat colorem: cum enim cæteris temporibus candida sit, uerno uaria redditur. Mutantur uero animantium aliqua, forma & moribus, non modo per ætates & tempora, uerum etiam castratione. Castrantur autem ea quibus sunt testes. Gallinaceus si perfecta ætate est qui castratur, illi crista pallescit, & cucurire desinit: neque coitum uenericum repeti: sed si adhuc pulchellus est, ne inchoari quidem ex iis quicquam potest cum accrescit. Quod idē in homine quoque accidere certum est: nam si puer adhuc excidatur, neque post geniti pili crescunt, neque uox immutatur, sed suum seruat acumen: at si iam puber, post geniti desuunt pili præterquam pubis: hæc enim quantuis minuatur, tamen manet, & congeniti non desuunt: nemo enim spado caluescit. Quadripedum etiam excitorum uox omnium in feminam mutatur. Omnia denique si dum crescunt, castrantur, maiora elegantioraque, quam incastrata euadunt: sed si posteaquam adoleuerunt & iam incremento constiterunt castres, nihil præterea accedere ad magnitudinem potest. Cerui si cum per ætatem nondum cornua gerunt, castrantur, non edunt cornua:

nua:

A nua: sed si cornigeri exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem feruantur. Et castrata denique auctiora quàm incastrata euadunt.

A ualetudine prospera uel aduersa differentia. Cap. XLVI.

Valetudines etiam & morbi per tempora, pro generum diuersitate uarie accidunt, & in totum non eadem omnibus ualetudo existit: uiuunt enim animalia prospere, non eisdem temporibus, nec omnibus æque qualitatibus exuperantibus. Iam auiibus profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum ad partum. At uero piscibus (exceptis quibusdam paucis) imbres conducunt: incommodi contra auiibus anni pluuij sunt, piscibus siccij. Et pisces quidam suos morbos habent, ut cyprinus, glanis. Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquàm purpuris. Quadrupedum, siue sauiis morbi generibus laborant, scilicet raucedine, dolore capitis, alui profluuij, & grandine: canes, rabie, angina & podagra. Boues gregales morbis duobus tenentur, podagra & struma. Equi gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: at uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt. Asini maxime morbo laborant, quam malidam uocant, Græci *malos*: elephanti morbis ex inflatione contractis: agrotant etiam si comedant terram, nisi ea frequenter utantur: nec non profluuij alui tentantur, & alijs quibusdam morbis. Insectorum maxima pars eo tempore ualet, cum annus humidus est & repidus. Apibus præcipue nocent bestiolæ quædam, quæ in alueis innascentur. Discrimen animalium ut prospere contrahere exigant, etiam cum utero grauescant, existere nouimus: testa enim intacta atque etiam crustata, tunc optima sunt cum grauida, ut locustacea: mollia etiam præstant cum grauida sunt. Et pisces cum impleri incipiunt à coitu, boni omnes fere sunt: sed, præcedente uteri tempore alij præstant, alij non.

Animalium discrimina, eò quòd commoda magis minusue, aut incommoda nobis sint. Cap. XLVII.

Hominis causa uidetur natura cuncta animalia genuisse: alia namque in confortium operum nobis ueniunt, ut ea quæ iumentum nomen a se trahere: quòd nostrum laborem, uel onera subuectando uel arando iuuarent: alia uoluptatis ac redditus & custodiæ causa parari solent, ut ovis, capra, pella, sus, canis. Ouillum namque pecus, & contra frigoris uiolentiam nos protegit, corporibusque nostris liberaliora præbet uelaminatum etiam cæsi lactisque abundantia, non solum agrestes saturat, sed etiam elegantium mensas iucundis & numerosis dapibus exornat: quibusdam uero nationibus frumenti expertibus; uictum commodat: ex quo Nomadum Getarumque plurimi *salutis uictum* dicuntur. Capra pilos ministrat ad usum auticum, & ad bellica tormenta, & fabrilia uasa: nec non quædam nationes harum pellibus sunt uestitæ, ut in Getulia & Sardinia. Canis aut custodiæ paratur, propellendis scilicet iniurijs hominum ferarumque: aut uenationi. Mella contrahunt apes, succumque dulcissimum ac saluberrimum, fauibusque conficiunt & ceras: alimenta nobis præbent & alia nonnulla, tum

DE DIFFERENTIIS

ex suis partibus, tum ex quibusdam, quæ in partibus ipsis continentur aut E
generantur: cuius generis sunt sanguis, oua, lac, caseus & butyrum. E diuer-
so alia, ut serpentes & pisces nonnulli, mortem ilico afferre in cibis serun-
tur: & plurima ex animalibus morborum colliguntur remedia.

Ab alimentis, quæ ex animalibus nobis suppeditantur, diffe-
rentiæ quibus modis constituentur. Cap. XLVIII.

IN iis quæ nos alunt, scire oportet hæc inueniri discrimina. Omne ani-
mal quadrupes domesticum, omnem gradem feram, quales sunt capræ,
ceruus, aper, onager: omnem grandem auem, quales sunt anser, pauo, grus:
omnes beluas marinas, ex quibus cetos est, quæq; his pares sunt, alimentor-
um ualidissimi generis esse: id ualentissimum uoco, in quo plurimum ali-
menti est. Caro quæ durior est, inquit Galenus, & crassiorū partium, si pro-
be concoquatur: alimentū corpori præstat copiosius, quàm quæ humidior
est ac mollior. In media uero materia numeratur, ex quadrupedibus lepores:
& gallinaceum genus, phasiani, perdices, attagenæ, columbæ, merulae,
turdus, auiculæ omnes à minimis (ut inquit Celsus) ad phœnicopterū. Item
pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidius salūtur: uel ut Galeno pla-
cet, pisces omnes & litotales & pelagici: qui neq; glutinosum habeant luc-
cōm, neque insuauē quicquam, aut uirosū referant. Imbecillissimā uero
materiā esse tradunt, ex auibus, eas quæ in montibus uicētur: sturnos sci-
licet, turdos, merulas, columbasq; & passerēs, qui in turribus degunt: ex pi-
scibus eos, qui in saxis uitam agunt, ut iulides, phucas, scaros, merulas, tur-
dos: Sed quātis hæc ita discreta sint, tamen etiā quæ sub eadē specie sunt, G
magna discrimina recipiunt: alia nanque res, alia uel ualentior est, uel infir-
mior. Siquidem ex auibus, quæ in media specie sunt, ualentior ea quæ pedi-
bus, quàm quæ uolatu magis nititur: & ex iis quæ uolatu fidunt, firmiores
sunt quæ gradiores, quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula & turdus. Inter do-
mesticas uero quadrupedes leuissima suilla est: grauissima bubula: item quæ
ex feris, quod maius quodque animal, eò robustior ex eo cibus est. Piscium
quæ eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur, grauissimi
sunt, ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est: deinde,
qui quantis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, coruus, scarus, oculata,
tum plani: post quos etiā leuiores, lupi muli q; & post hos sunt omnes sa-
xatiles. Leuiorem cibum præstant pisces, quàm uolucres: & hæc leuiorem
quàm caro suilla: quæ inter domesticas quadrupedes, ut modo diximus, le-
uissima est. Neque uero in generibus rerum tantummodo discrimē est, sed
etiā in speciebus ipsis: quod & pabulo fit, & ætate, & membro, & solo, &
cælo, & habitu affectioneue. Nam animalia omnia quibus abunde suppe-
dunt idonea alimenta, longe seiphs euadunt in alendo præstantiora: quem-
admodum si desint, multo sunt deteriora. Et quadrupes animal omne, si
laetens est, minus alimenti præstat: item quod tenerior pullus cohortalis est:
in piscibus quoque media ætas, quæ nondum summam magnitudinē im-
pleuit: nam alimentum humidius, ut distribuitur, ita etiā celerius discu-
titur.

*Galenus de
uictu rat.*

A pabulo.

Ab ætate.

A titur. Deinde ex eodem sue, ungula, rostrum, aures, cerebellum: ex eodem agno hedoue cum pectiolis totum caput, aliquanto quam cætera membra leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint: & ex eodem sue pedes, quàm immum crus leuiorẽs sunt, & hoc quàm reliquæ partes: ex auibus colla, alæ uel recte infirmis cibis annumeratur. Quod ad solum uero pertinet, leuior piscis inter saxa editus, quàm in arena: leuior in arena, quàm in limo: quò sit, ut ex stagno uel lacu, uel flumine eadem genera grauiora sint, leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferũ animal domesticum leuius est, & quodcunque humido cælo, quàm quod siccò natum est: quandoquidem ea quæ in montibus uiuunt, temperamẽto sunt sicciorẽ, atque eorũ caro minime pituitosa aut lenta est: quæ uero in locis aquo-

B sis & campestribus degunt, humidiora sunt, & excrementosa magis. Eadem omnia pinguius quàm macra: recentia quàm falsa: noua quàm uetusta plus alimenti habent. Tum idem magis alit iurulẽtum, quàm assum, magis assum, puàm fixum, ut Celsus prodir. Ouum durum ualentissimæ materiæ est: molle uel forbile, imbecillissimæ. Fere uero sequitur, quò ualẽtior quæque materia est, eò minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus alar, ut dictũ est. Et imbecillis hominibus, rebus infirmis opus est: mediocriter firmos media materia, optime sustinet: & robustis apta ualidissima est. Plus deinde assumere ex leuioribus potest: magis in iis, quæ ualentissima sunt, temperare debet: uerum hæc potius ad medicinam pertinent, *Ab habito.*

C A Cara humidior, suillam carnem tradit Galenus ualentissime nutrire. Cõsidera. B Ex auibus, has aues inter ea recenset Galenus, quæ in tenui uictus ratione conueniunt: at Celsus aues omnes à minutis ad phœnicopterum in media materia reponit. C Suilla. Omnium ciborum, inquit Galenus, plurimũ nutrit caro suilla: idemque in ratione uictus analeptice, id est reuolutoria, à piscibus, ac, deinde ab auibus ad carnes suillas statim uictum mutat. A Et quodcunque. uide an ita legẽdum, sit apud Celsum: Et quodcunque siccò cælo, quàm quod humido natum est: sed nihil muto.

Alia quædam ab alimentis quæ nobis præstant animalium discrimina. Cap. XLIX.

D Neque hæc sola quæ diximus, discrimina sunt, sed etiam alia boni succi, alia mali sunt, *ἰσχυρὰ & ῥαιχρὰ* Græci uocant: alia stomacho idonea sunt, alia aliena: alia facile concoquuntur, alia difficilius: alia inflant, alia ab hoc abundant: alia intus facile corrumpuntur, alia minime uiciantur: alia mouent aluum, alia supprimunt: alia citant urinam, alia tardant: alia succũ procreant crassiorẽ, alia tenuiorẽ: alia glutinosum, alia mediocrem: sicut alia magis excrementosum gignũt, alia minus. Boni succi sunt, ex quibus probus gignitur sanguis: ut aues piscesque fere omnes, præterquam qui in lacubus, paludibus, fluuiisq; uictitãt limosis, alioue quouis modo uiciatis. Quadrupedũ carnes, si bene cõcoquantur, & in iis præcipue porcina quæ ætate media est: lac omnium penẽ aliorum ciborum optimũ procreat succum. Agrestium animalium caro succum efficit meliorem, quàm domesti-

DE DIFFERENTIIS

corum. Boni succi sunt, inquit Celsus, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex E media materia sunt: ex maioribus quoq; eę, quas supra memorauimus. medij inter teneros durósque pisces, ut mullus & lupus. In summa, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur, ubera, rostra, & aliæ partes ex: carnes ut uenter, intestina, uulua, & omnes extremæ partes, & cauda succum gignūt, quàm carnes minus bonum. Mali uero succi sunt, quæ sanguinem efficiunt minime probum, sed humoribus uitiosis exuberantem: sunt autē & quæ frigidiora sunt, & pituitosa: & quæ calidiora biliosaq;: & quæ melancholico succo abundant. Sunt uero inter animalia huius generis, pisces omnes, qui ex tenerrimo genere sunt, aut ij rursus, qui nimium duri, uirosiq; sunt: ut ferē quos stagna, lacus, limosiue riuī ferunt, quīue in nimia magnitudinem exceſſerunt. Mali succi est, & ouilla caro: caprina uero, & acrimoniā habet. Hircorum caro deterrima est: arietum deinde & taurorum. In omnibus autem iis, ut castratorum meliores, ita pessimæ sunt seniorum carnes: his nihilo meliorem succum gignit ceruina caro. Lepores crassiorē quidem sanguinem generāt, probiorem tamen succum, quàm aut bouilla caro, aut ouilla. In his sunt, & caro domestica permacra: & omnis caro falsa, omnēque falsamentum, atque animalium omnium caro, quæ in lacubus, paludibus, fluminibusue limosis uictum habent: præsertim si urbis cuiuspiam populosę purgamenta, ut balnearum, latrinarumue, aut culinarum, in eas aquas defluant. Stomacho idonea sunt (inquit Celsus) omnis uenatio: atque utraq; uel assa, uel elixa: ex domesticis animalibus, bubula, siquid ex cæteris sumatur, macrum potius quàm pingue: ex singula, rostra, aures, uulua: duri ex media materia pisces, ostrea pectines, muriccs, purpura, cochlea. Aliena à stomacho sunt omnia falsa, omnia pingua, cerebrum omne, & omnes medullæ. Ex his autem intelligi potest, nō quicquid boni succi est, protinus stomacho cōuenire: neque quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Facile in uentre concoquuntur pisces, maxime saxatiles: auium genera omnia, si cum quadrupedibus cōferas. Ex quadrupedibus, suilla caro facillime concoquitur. uitulina facilius q̃ bubula: hedina, quàm caprina: & omnium eorum carnes quæ adhuc adoleſcunt, facilius concoquuntur, quàm quæ ætate declinant: & hesternum, quàm recens necatum, facilius concoquitur. Caro caprina, bubula & ceruina difficilius concoquuntur: & sucs cum senuerint, & anno-

Extrema partes, trunculos has vocat Celsus.

Εὐσπύλα.

μενέσπυλα.

Εὐσπύλα.

Αὐσπύλα.

Αὐσπύλα.

Αὐσπύλα.

Εὐσπύλα.

ta, cochlea,

Ara: cochleæ, murices, purpuræ, paruulæ chanææ, & testacea alia quæcunque duram habent carnem. Dantur uero bis tertiae elixa iis, quibus ob humoris cuiuspiam uitium corrumpitur in uentre cibus. Facile autem intus cor-
rumpuntur lactentia omnia, teneri pisces, ostrea, lac, caseus, & uetus & recens. Aluum mouent lac & lactentia omnia, cochleæ, ostrea, pelorides, echini, musculi, & omnes fere conchulæ, maximèque ius earum: salsamenta, omnes teneri pisces, sepiarum atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel uirulenta uel elixa, aues quæ natant. Cōtra, astringunt dura oua, magisque si assa sunt, minutæ aues, merula, palumbus, magisque si in posca decoctus est, grus: omnes aues, quæ magis currunt quàm uolant: lepus, caprea: iecur ex iis quæ seuum habent, maximèque bubulum, ac seuum
Bipsum: caseus, qui uehementior uetustate fit: in eadem carne, assa potius quàm elixa. Vrinam autem mouet, ex uenatione maxime lepus, peccan-
culi, purpuræ, & quæ coriphia uocantur. Ad tenuem uictus ratione idonea sunt, pisces saxatiles, auiculæ montanæ: quæ enim in montibus degunt animalia, omnia siccus præbent alimentum, minúsque pituitosum ac lentum. E diuerso sanguinem crassiotem procreant, pisces grandiores. Græci uocant, id est cetaceos) cuius generis sunt thumni, anguilla, cochleæ, ostrea, & testaceum genus omne: & quæ mollia uocantur, ut lolligines, sepiæ, polypi: caro ceruina, caprina, bouilla, leporina, porcina. Lentum glutinosumue succum gignunt suilla atque agnina caro, testudines omnes, & quæ circa labra sunt partes atque lingua. Scire autem oportet, quæcunque crassum glutinosumque succum procreant, si recte in uentre ac iecinore concoquantur, optimum sanguinem efficere. Medium autem inter tenuè crassumque succum gignunt, gallinarum, phasianorum, perdicum, attagenarum, merularum, omniumque paruatum auium caro. E piscibus, tam littorales quàm pelagici, gobij, murenæ, buglossi, & quicunque neque lentorem habent neque fetorem, neque aliàs insuauis sunt. In omni autem genere, ad salubrem uictus rationem præferuntur animalia quàm exercitatis sima, & quæ cibo siccior aereque purissimo utuntur: iis quæ aut otiose degunt, aut humidior alimèto, aereque impuro crassoque uiuunt. Et ex piscibus eliguntur, qui carnem teneram habent & friabilem: qui uero aut duram aut lentam glutinosamque, reiciuntur: sicuti & qui ex tenerrimo genere sunt: & ut paucis rem absoluiam, duobus hisce iudiciis, quod scilicet molles sunt & friabiles, omnium animalium carnes perpenduntur: quibus enim utrunque inest, tuto usque ad saturitatem eduntur: cui uero neutrum, ab eo penitus abstinentum iudicat medici. Quod si cui alterum solum insit, hoc genus quoque fugiendum admonent: nonnunquam tamen, ob aliorum inopiam in usu cibario esse solet, sed citra satietatem acceptum: his saltem qui sanitati tuendæ student. In cibis quoque pituitosum succum generant alia, ut testacea, caro agnina: alia melancholicum, ut bouina, caprina, & præsertim hircina taurinaque. Et nonnulla excrementosum procreant succum, ut palumbi, anseres, & aliæ, quæ in paludibus aut stagnis ui-
citant aues. Porcina caro & ouilla, atque omnis nouellorum & domesti-

αποδιδω.

corum animalium caro, & eorum quæ otiose uiuunt: piscēsque, qui in lacu-
bus aut fluuiis limosis degunt, atque cetacea omnia. Nonnulla minimū
excrementi habent, ut syluestrium animalium caro, & eorum quæ in sic-
cioribus locis uiētant: colla animalium & caudæ & alæ. Quin & ipsa
præparatione (quod ad alimenta attinet) differunt animalia: reddūtūrque
nonnunquam & aliis & seipſis meliora deterioræ. Apparamus autē ea,
sicuti & alios cibos: aut apponentes quippiam, aut auferentes, aut modo
quodam immutantes. Sordes eluuntur: ingrati uero si quid inest saporis,
aut in humore macerando aufertur, ut falsugo, aut elixando: quæ enim ue-
hementer amara aut austera sunt, si in aqua elixentur, exuperantem illam
qualitatem exuunt: acris uero & mordacia in aceto diluto. Asſorum quo-
que & elixorum uirū fortior, aut succi ipsius malitia, si qua adſit, partim
aufertur, partim uero immutatur, & ab igne, & ab iis, quæ cuique accom-
modata sunt condimentis. Hæc Diocles. Differūt elixa ab asſis, quod hæc
sicciora, illa humidiora sunt, ut Galeno placet atque Ruſo: contra Aristoteli,
elixa asſis aridiora sunt, asſorumque externæ partes internis sicciores:
cum in elixis è diuerso, extre mē humidiores sint. Ut rite asſentur, quæ car-
nosa aut pingua sunt, copiosiore indigent igne, lēto autem, quæ macra aut
sanguinis expertia. Non parū carnis discrimen contingit, si sale macere-
tur: sæpe nanque fit, ut animal quod sua natura sit humidum, salis ui red-
datur alio, quod siccum natura sit, aridius: & quæ edulia dura sint, & sua na-
tura sicciora, eadem sale, macerata, reddantur ob nimiam siccitatem cibo
inepta: sicuti contra, quæ excrementis abūdant, succūmq; in se pituitosum
contineant undique permixtum, eadem sale macerata euadant meliora.
Sunt quoque eadem sapore grata, & tenuis uictus rationi idonea, sed à sto-
macho aliena: & succum gignunt non bonum, aluūmq; perturbant.

Discrimen quoque in iis nō paruum uel hinc oritur, quod alia duriorem
habent carnem, alia mollem & ueluti fluidam, sicuti mediocrem alia. Rur-
sum alia carnosa sunt, alia præpingua, & nonnulla graciliora macræ: &
quædam iamdiu, quædam uero non ita pridem sale condita sunt. Sed de
falsuris plura aliàs.

A medicamentis, quæ nobis præstant animalia, quibus modis con-
stituuntur differentiæ.

Cap. L.

H

Non alimenta solum uarie nobis præbent animalia, sed & medicas ui-
res suppeditant plurimas. Rerū nanque omnium parēs, nullum ani-
mal ad hoc tantum ut pasceretur, aut alia satiare, nasci uoluit: quin artes
salutares inferuit & uisceribus: quippe cum surdis etiam rebus inferuerit,
tum uero illa animæ auxilia præstantissima, ex anima alia esse uoluit, con-
templatione ante cuncta mirabili. Exsiccant, humectant, calfaciunt, refri-
gerant, tum ex animalibus nonnulla, tum ex eorum partibus. Sunt præter-
ea quæ durities emolliant, ut adipēs atque medullæ: quæ concoquant, συμ-
πιττειν Græci uocant, ut cæſypus & butyrum. Pus mouent adeps uitulinus,
porcinus & butyrum: per halitum digerunt nōnulla, ut coagulū omne,
adeps

μελα κίτριον.
συμπιττειν.
πυρρὸν καὶ τριπλόν.
ἡ δὲ φερεται.

B

De animalibus, quæ sanguine prædita sunt, partium
exteriorum differentia. Cap. LI.

F ij

DE DIFFERENTIIS

ris bestiis euenit manifeste: ut quorum oculi recens natorū nō plus, quā E
unum colorem habent sua natura. Genus hominum, quadrupedum tam
uiuiparorum, quā ouiparorum, & auium, oculos uisus custodiendi gra-
tia integunt, sed uarie: quæ enim animal pariunt, geminam habent palpe-
bram, & conuiere utrāque solent. Aues grauiorēs, & quadrupedes ouipa-
ræ palpebra inferiore conuiuent: columbæ autem & similia, utrāque. Pi-
sces palpebrā non habent, sicuti neque insecta aut crustacea. Cilium habet
palpebris adiunctum omnia, quæ obtinent pilos: aues, & quæ cortice inte-
guntur carent, ut quæ pilos habeant. Auriculæ alijs sunt, alijs desunt: me-
tusq; patent quibusdam audiendi, ut iis quæ penna aut cortice integuntur.
Quæ animal statim pariūt omnia auriculas habet, excepto uitulo marino, F
& delphino, & reliquis cetaceis: pisces uero auditus nullum continent mē-
brum manifestum. Cætera suas auriculas omnia mouent, uerū homo unus
aurem non mouet. In iis quæ spirant animalibus, olfactus instrumentum
modo quodam euariat: quæ enim uiuipara sunt, quibus maxillæ longæ ex-
eunt in acutum, iis nares in rictu appellato continētur: cæteris explanator
hæc pars habetur maxillis adiuncta: at elephātus peculiarem hanc partem
præ cæteris sortitus est animalibus. Aues uero & serpentes, & quæcunq; ex
quadrupedibus sanguinis compotes ouiparæ sunt, foramina quidē narium
ante os habent, sed non ita explanata, ut nares appellari possint, nisi spirandi
officiō. Nares desunt iis quæ non spirant: aërem enim hac quoq; parte red-
dimus atque accipimus: efficiturq; sensus olfaciendi per spirationem in iis
quæ obtinent nares. Naribus labra subiacent iis, quæ simul & dentes habet G
& sanguinem: auibus enim cibi armamentiq; gratia rostrum osseum habe-
tur, non nares. Maxilla cum duplex sit, ut ante dictum est, superior scilicet
& inferior, mouent animalia omnia maxillam inferiorem, crocodilo flu-
uiatili excepto: is enim unus superiorem mouet. Homo & uiuiparæ qua-
drupedes maxillam inferiorem sursum deorsum, atque in latera agitant: pi-
sces uero, & aues, & ouiparæ quadrupedes sursum deorsumq; tantum mo-
uent. Oris officium omnibus commune cibus conficiendis est: robur non-
nullorum peculiare est: sermo aliorum: spirandi etiam usus (iis scilicet quæ
spirat) per os accidit. Fit itaque ut os alijs compressius, alijs amplius habeatur:
quibusdam enim cibi tantum conficiendi, & spirandi, & loquendi gra-
tia os datum est: atque iis compressius est: alijs auxilij gratia: iis, si dentibus H
sint serratis, rescissum. Cum enim tota eorum uis in mordendo sit, hiatus
oris ampliorē esse necesse est: plenius enim morsum infigent, quō amplius
rescissum os sit. Piscium quoq; mordacibus, & carniuoris tale os est, sicuti
nō carniuoris in arcum se colligit. Aues, quod rostrum uocatur, pro labris
& dentibus habent. Dentium serie os continetur & constat: horum natu-
ra communi quidem officio ad cibum conficiendum adiuncta est: quibus-
dam tamen seorsum roboris gratia, tum ad inuadendum, tum ad defendē-
dum, ut quæ ex feris natura carniuora sunt: alijs auxilij tantum causa data
est, scilicet ne male ab alijs afficiātur: quibus simul & auxilio & robori sunt

πύλη
πίς.
πύλη

καυλίδητα.

dentes, hæc aut exertos habent (καυλίδητα uocat) ut sus: aut acutos pectina-
tim

- A tim sese stipantes, unde ferratis dicuntur esse dētibus, *αερεοδόντες* Græci dicunt, ut pisces fere omnes. Dentium itaque tria genera, ferrati, aut cōtinui, aut exerti: ferrati pectinatim cōeūntes, ne contrario occurſu atterantur, ut serpentibus, piscibus, canibus: continui, ut homini equo: exerti, apro, hippopotamo, elephāto. Qui canini dicūtur, sunt ferratis longissimi. Continui aut utraque parte oris sunt, ut equo: aut superiore primores non sunt, ut bubus, ouibus, omnibūſque fere quæ rumināt. Nulli simul & ferrati & exerti sunt dentes: nec ulli, cui cornua, exerti. piscium omnibus ferrati, præter scarum. Maribus dentes plures, quàm fœminis, ut in genere hominum, suum, ouium, caprarum patet: uerum in ceteris nondum exploratum est. Quibus plures, hæc uiuaciora magna ex parte sunt: quibus pauciores & rariores,
- B hæc magna ex parte uitæ sunt breuioris. Cæteris cum ipsis nascuntur dentes: homini postquam natus est septimo mense: reliquis perpetui manent, mutantur primores homini, leoni, iumento, cani, & ruminantibus: maxillares nullum animal mutat. Cæteris senectū rubescunt: equo tantum candidiores fiunt. Lingua in ore palato subiacet: sed terrestribus fere omnibus modo cōsimili, cæteris dissimili, tum eorundem ipsorum, tum terrestrium comparatione. Hæc aut lata est, aut angusta, aut mediocris (quæ quidem optima & explanatissima est): item aut absoluta, aut constricta, qualis tortorum & balborum est, Græci *Μλυνε* & *βρωλυνε* uocant. Homo linguam habet absolutam, mollissimam & latā: quadrupedes, quæ animal pariunt, duram, crassā, nec adeo absolutam. serpentes & lacerti longā habent, & bifidam. piscium generi data est lingua imperfecta, ossica, nec fere absoluta, sed adharens. Lingua color uarius est: perinde nāque eam, ac partem aliquam esse exteriorem putandum est, qualis manus aut pes est, quāquam ore operiatur: itaque cum animantium colore uariarū, cutis non sit unicolor, cutis quoque linguam ambiens uaria erit. Linguam illam minorem operiendi ministrā, quam *ὠδον* Græci uocāt, quam etiam linguæ partem aliquam esse diximus, ea tantum habent, quibus pulmo, & cutis pilo intacta, non cortex, non penna operimento est. Nullum enim ex iis, quæ ouum pariunt, ut aues & quadrupedes, superimpositā eam suæ arteriæ continet: sed meatum ipsum arteriæ, modo contrahunt, modo laxant, pro sui commodi desiderio: atque ita efficitur, ne quid pōderis in pulmonem delabatur. Collum capiti subiacet, iis quæ id habent animalibus: nō enim omnia habent, sed ea tantū, quibus aspera arteria productior est, atque gula. Asperam autem arteriam habent omnia, quæ pulmonem: eadem quoq; & gulā habet. Ea uero quæ carent collo (ut piscium genus) gulam hæc manifestam nō habent: & quidem à situ oris continuo uenter esse potest, pulmo non potest. Collum itaque omnibus uiuiparis est: ouiparorum aliis est, aliis deest: quæ enim spiritum extrinsecus non accipiunt, carēt hac parte. serpentum etiam genus collū minime, sed proportionale colli habere uideri potest. Hoc cæteris animalibus flexibile, & uertebbris compactum est: at lupo & leoni perpetuo ossē riget. Quæ alimēta sibi à terra ore suppeditant animalia, collum habent longitudine cruribus æquale: at homo, & quæ illi similia sunt ani-

DE DIFFERENTIIS

malia, breuius. Aues item quibus longa sunt crura, & collum longum, & E
 præterea palmipedibus nonnullis: quibus breuia crura, iis collum breue fe-
 re. Pectus homini latum, quadrupedibus arctius: auib. pectus acutum,
 carnosumq; omnibus est. Mamma omnibus negata est, quæ animal nequeat
 generare: nec uero uiuiparis omnibus data est: sed iis tantum, quæ protinus
 animal intra se formant: nec primum ouum, deinde animal. Quæ pilis inte-
 guntur, omnia mammas habent: & præterea cetera in aquatili genere. At ea
 quæ oua pariunt, aut ouo intus concepto animal post in lucem excludunt,
 hæc & mammis carent, & lacte, ut pisces, ut aues: lac enim fit iis fœminis,
 quæ animal statim intra se generat. Mammas homo fere solus è maribus
 habet: cetera animalia mammarum notas tantum. Mamas item uarie haberi
 certum est: nam & inter se ipsæ quadrupedes, & ab homine mammarum F
 differunt ratione: aliis enim mamma in pectoris parte priore sunt bing, bi-
 nisq; papillis: ut homini: elephantro sub armis duæ, tam mari quam fœmi-
 nę perquam exiguæ. ursæ mammas habent quaternas. Aliis mamme inter
 fœmina binæ, papillæq; binæ, ut ouibus: aliis papillæ quaternæ, ut uaccis.
 Quibusdam nec in pectore, nec in fœminibus māmā, sed in uentre habēt,
 & quidem plures: uerum non omnes pares, ut canibus, ut suis. Cum
 itaque cetera id genus habeant plures, pantheræ quaternas medio uentre
 gerunt: camelus quoq; in uentre māmā duas cū papillis quatuor habet, ut
 bos: leena etiam duas in uentre. Umbilicū omnia habent, quæ uel utero ui-
 uiparis, uel ouo ouiparis excluduntur: sed auib. iam adultis, hic delitescit
 incertusq; est. Membrorū etiā, quæ ad uenereū coitum accommodata habēt G
 tur, discrimen plane est: genitale mariū, quæ animal gignunt, aliis foris est,
 ut homini, equo, & aliis multis: aliis intus, ut delphino. Quibus foris est, iis
 aut ante habetur, ut homini, & reliquis multis: aut retro. Quinetiā iis qui
 ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendent, ut homini: aut aluo adhæ-
 rent & penis & testes: & aut plus aut minus absoluuntur: non enim pariter
 apro & equo penis absoluta est: nec uero eodem modo ad aluum omnibus
 continetur, sed aliter iis qui ex aduerso mingunt, aliter iis qui ex auerso.
 Aliis itaque, ut diximus, testes absoluti pendent, ut equo: aliis non sunt ab-
 soluti, ut apro: elephantus non foris conspicuos, sed intus conditos habet.

Maris instrumentum alterum ab altero differt pro discrimine corporū:
 aliis cartilaginofum carnosumque est, ut homini: aliis neruofum, ut came- H
 lo, ut ceruo: aliis oscum, ut lupo, uulpi, mustellæ, uiuerræ. Augetur etiā &
 minuitur hoc membrū sine ulla ualitudinis mutatione: partim enim ner-
 uum, partim cartilaginem habet: itaque & contrahi potest & extendi, atq;
 etiam flatus capax est. Parte eadem utitur natura, tū ad humidie excrementi
 exitum, tum ad rē uenereā: in sexu tum masculino, tum etiam fœminino,
 in omni uiuiparo genere. Atque hos quidem in usus omnia id genus, tam
 fœminæ quam mares genitale habent, quo & excrementum humidum se-
 cernatur: quoq; maribus genitura, & fœminis partus emittatur: parte scilicet
 priore atque superiore, quam sit excrementi sicci meatus: diuersus enim
 est in iis meatus, quo excrementum siccum & quo humidum exit. Omni-
 bus

A bus autem quibus deest humidi excrementi secretio, & quæ genitali carêt, (etiam ouiparis, quæ uesticam habent, ut testudinibus) meatus idem sicci excrementi, qui & seminis coitusque foris pertinet: intus uero alter iuxta habetur: quæ quidem similiter tam in fœminis eorum, quàm in maribus sunt. Caudam omnia fere non solum uiuipara, sed etiam ouipara habent: nam etsi quibusdam magnitudine membrum id caret, tamè aliquid prominet, quod caudam describere possit. Homo unus cauda uacat: nates habet, quod nulli quadrupedū datum est. A collo & capite crura priora habentur: sed homo uice pedum priorum, brachia, & quas manus dicimus, habet, ut aues alas. Quadrupedibus autem pro brachijs & manibus, crura priora subdita sunt: posteriora uero bina omnibus gressilibus esse necesse est.

Ἄλλὰ σμικροῦ
καὶ ὀνικαγέχων
αὖ τινὰ γὰρ ἔχει.

B Nullum quod pedibus constet, excepto homine, crura habere carnosā perspectum est: sed neruosa ossulentāque sunt, carne autem deficiunt. Coxarum etiam carne exuberante in clune uacant omnia, quod in genere auium conspici apertius potest, at in homine contra. Homini pedes omnium maximi proportionē magnitudinis: fœminis tenuiores in omni genere. Pedes quibusdam digitari: quibusdam uero solidi, sicuti bisulci alijs. Ex ijs quorum pedes in digitos finduntur, nonnulla quaternos digitos habent, ut aues: alia quinos, ut homo, elephantus. Ex quadrupedibus uero nonnullæ pedes priores quinis distinctos digitis habent, posteriores quaternis: sed quæ paræ inter digitatas sunt, in posterioribus etiam quinos digitos obtinent. Ungues habent omnia fere quæ digitos, uti infra explicabimus. Humeri

C armisue contra, quàm cubiti aut crura priora flectuntur omnibus, quæ ea possident: coxæ etiam contra quàm suffragines. Flectūt autem crura priora fere contra, atque posteriora: sed cætera è contrario, quàm homo membra inflectat: quadrupedes enim, quæ animal generant, priores pedes ante se flectunt: posteriores uero in auersum. Aues etiā suos inflexus similes quadrupedibus uiuiparis agunt: at ouiparis quadrupedibus, ut crocodilo, laetæ, & reliquis generis eiusdem crura, tum priora, tum etiam posteriora retro flectuntur, paulum in latus uergentia. Homo brachia retrorsum flectit, quanquam ita, ut paulum uergant in latera interiora: crura ante contrahit recte. Sed quod ante tam priora, quàm posteriora inflectat, nullū est.

Homo cum ad iusta incrementa peruenit, contrà atque cætera fere animalia, quæ sanguine consistunt, partem superiorem habet minorem, quàm inferiorem: partem superiorem intelligi uolo, quæ a capite ad eam pertendit partem, quæ exitus patet excrementis: inferiorem autem, quantum ab ea ipsa sublequitur reliquum corporis. Animalibus ergo quæ pedibus inniti natura uoluit, crura posteriora, partem complent inferiorem: quæ autem pedibus carent, ijs caudæ & quicquid uice caudæ similēque habetur, pro parte inferiore est. Et tales quidem perfectis iam incrementis, animantes euadunt: discrimen autem in crescendo est. Homo enim priusquàm adultior sit, partem superiorem corporis habet maiorem, quàm inferiorem: & quò per ætatem amplius augetur, eò contrà euenit, ut scilicet inferiora sint superioribus longiora. Sunt quæ ex proportionē, incrementa partis u-

Μεινorem, ὅ
λατῆρα.

DE DIFFERENTIIS

triusque capere soleat, ut canis. Nonnulla primum parte superiore minora E sunt, post maiora cum creuerint, eadem parte euadunt, ut iumenta. Partes exteriores sanguineorum animalium, quibus differentiis inter se diffonēt, explicatum iam est.

C Sanguinea, uel sanguine prædita, *ἡμικρατα*. D Cæsum, *καυκριν*. Fuluum, *καποριν*. Caprinum, *αιμιν*. Aquini, *ὑδαρπας*. Rufi, *χρσορμι*. Varij uerficolorēsq; *πολυχρον*. F Rictus, *ῥις*; *ῥις* homini tantum: *ῥις* & in canibus & alijs quadrupedibus: *ῥις* in auiibus dicitur: Aristoteles tamen & in auiibus *ῥις* dixit. D Aspera arteria, Plinius aliter distinxit: Ceruix, inquit, nulli, nisi quibus utraque hæc, scilicet gula atque arteria: cæteris collum, quibus tantum gula: sed quibus ceruix è multis uertebraisq; orbiculatim ossibus, flexilis ad circumspectum articulorum nodis iungitur: leoni tantum & lupo & hyænz singulis rectisq; ossibus rigens. E Pectus homini tantum latum, inquit Plinius, reliquis caninarum, uolucris magis. C Quam suffragines, *ἡ ὑποδαρπας*, id est, quàm poplites aut suffragines.

Interiorum partium discrimina in animalibus, quæ sanguine prædita sunt. Cap. LII.

EX interioribus uero, cerebrum omnibus animantibus datum est, quæ sanguinem obtinent, ut ante dictum est: hoc ut adipe pinguescentium pinguiusculum est, uelut suis: sic sebo obeforum squalidiusculum sentitur, ut ouis. In collo tendit arteria omnibus ad pulmonem, gula ad uentrem perfertur, transigens septum transversum, in iis scilicet quæ hæc habeant: pisces enim arteriam illam asperam non habent, & magna ex parte gula carent. Situm quoque utriusque, gulæ scilicet & arteriæ, similem habent omnia, sed discrimē species earum partium affert. Viscera eorum propria sunt, quæ sanguinem habent: nulli enim exanguium animalium uiscus ullum est: quædam certe omnia habent, quibusdam aliqua desunt. Cor enim & iecur omnibus animalibus sanguine præditis necessaria sunt: reliqua uero quibusdam desunt. Et in omnibus sanguine præditis primum omnium membrorum gignitur cor, ut Aristoteles author est: & in eo est innati caloris principium, sicuti in exanguibus, in eo quod est cordi proportionale. at contra Galenus cor posterius iecore formari contendit. Statim uero cum consistunt quæ sanguinem habent, exiguæque admodum sunt, deprehendi cor, & iecur sine dubio possunt: & in ouis triduo cubatis puncti iam magnitudine apparent: necnon in partibus abortitijs perquam exiguæ cernuntur. Et in partium prima generatione, statim cor palpitare cernitur. Et uarie quidem hæc habentur: neque enim cor simile habet ea, quæ corde prædita sunt, neque aliud, prope dixerim ex uisceribus ullum. Cor, ut modo diximus, omnibus est, quibus sanguis: estque prorsus in medio pectore in homine, & omnibus præterquam piscibus suo turbinato mucrone tendit in priorem partem. Discrimina cordis, quæ amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia existant, uel ad mores pertinent aliquatenus: quæ enim sensu hebetiori sunt, cor habent durum & spissum: quæ uero sensu ualent, mollius: quæ autem pauida sunt, iis cor grandius est: cor enim magnum proportionē fere omnibus est, quæ aperte timida sunt, aut propter metum

A metum malefica: at audentiora fidentioraque, minus aut mediocre. Pulmo non omnibus datus est: quæ enim branchias habent, ut pisces, carent pulmone: quod nanque idem simul & pulmonem habeat & branchias, nullum adhuc animal uisum est. Verum quæ spirant, omnia pulmonem habent, ut sanguinea pedestria omnia: & aquatiliū nonnulla, ut balena. Pulmo omnium bipartitus esse solet: uerum in iis quæ animal generant, distinctio non æque apparet, minimèque in homine: at in ouiparo genere, ut in auibus & quadrupedibus, quorum partus oui primordio inchoari solitus est, pars altera pulmonis multū discissa ab altera est, ita ut binos habere pulmones uideantur: atque à singulari arteria partes in utrūque pulmonis latus duæ dependent. Pulmonis differētia uaria est: aliis enim sanguineus magnusque, aliis minor, fungosus, & minus habens sanguinis: quæ enim uiuipara sunt, maiorē, & copia refertū sanguinis habēt: quæ cōtra ouipara sunt, quales sunt lacertæ, testudines, serpentes, atque aues, exiguū & ficiore, sed aptum ampliari atque extumescere cum inflatur: & proinde desiderium iis etiam bibendi exiguum est. Septum transversum habent omnia, quæ sanguinē obtinent, æque ut cor & iecur, quæ omnibus insunt, ut iam diximus, sed uarie: iam enim iecur aliis multifidum est, aliis simplicius, uel in eorū genere quæ uiuipara sunt: sed longe magis piscium iecinora & quadrupedum ouiparorum, tum inter seipsa, tum ab aliis dissident. Auium iecur maxime simile est iecori uiuiparorum: puro enim & sanguineo colore exhilaratur: at uero quadrupedum ouiparorum iecinora, maxime parte pallidiuscula sunt. Iecur si non fissum est, dextro latere totū continetur: sin à principio usque fissum est, uelut in iis quibus nullus aut exiguus admodū lien, & ueluti notæ tantum gratia habetur, in iis, inquā, iecur bipartitum est, & dextro lateri maior pars applicata est. Quibusdam uero partes ita sepositæ sunt, ut bina esse iecinora uideantur, nec eadem origine contineri: ut inter pisces galeorum præcipue generi: & inter quadrupedes, leporū generi cuidam. Iecur è uisceribus adipeum nonnullis consistit, ut inter aquatilia cartilagineis: quorum iecinoribus colliquatis oleum facimus. Lien magna ex parte, omnibus quibus sanguis est: sed magnæ parti eorū, quæ non animal, sed oua pariunt, lien usque adeo exiguus est, ut propemodum sensum effugiat: quod magna in parte auiū, & quadrupedibus ouiparis experimur. Ut

D lienis magnitudo, ita neque color idem omnibus inest: quippe leo, canis, omniæque fortia & calida animalia nigrum admodum: iis uero humidioraque & frigidiora magis candicantem habēt. Fel etiam habet maior pars animalium quibus sanguis: idque aliis adnectitur iecori, aliis uero intestinis, ut piscibus quibusdam. Et aliis quidē deest, ut quadrupedibus quibusdam uiuiparis: & inter cetacea, delphino. Aues autem piscesque omnes fel habēt: & quadrupedes quæ oua pariūt, dixerim in uniuersum omnes, aut plus, aut minus fellis fortiuntur. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ iecur habent, inquit, iis & lien omnino inest, & meatus, qui bilem recipiant: etsi uesica ipsa, qua bilis colligitur, non sit omnibus concessa. Renum & uesicæ similis ratio est: omnibus enim quæ sanguineum habent pulmonem, utrunque

DE DIFFERENTIIS

membrum natura tribuit: quæ autē oua pariunt, ut aues, piscesq; & serpentes, renibus uesciq; carent. Quadripedum etiam ouipararum, una testudo marina habet: iis enim tantum ea tribuere uoluisse natura uidetur, quæ pulmonem haberent sanguineum, quæ omnium maxime animalium litibunda sunt. Ventrem habent omnia situ quidem simili, (septo enim transuerso continuo subest) magnitudine tamen ac specie dissimili: quadrupedes enim uiui paræ cornigeræ altera maxilla dentatæ, quaternos habent sinus, quæ quidem & ruminare dicuntur: at uero quæ uiui paræ sunt, & dentatæ maxilla utraque, uentrē simplicem paruumq; habent, ut homo, canis, fuscus. Differentiam autem duplicem fere omnia recipiunt, quæ utrinq; dentata sunt: alia enim canino similem, id est paruum, nec multo ampliorem intestino, leuēque intus: alia suillo, qui amplior est, mediocres quosdā habens cancellos rugasue, *ὠρίετες* Græci vocant: atque hæc tam in maiore, q̄ in minore animalium genere: sed discrimen in iis quoq; magnitudine, figura, corpulentia, exilitatēue oritur. In ouiparis etiam, quadrupedibus scilicet, serpentibus atque piscibus eadem fere ratio est: uenter enim iis unicus & simplex, sed figura uaria est: & piscibus etiā appendices exeunt circa uētriculum, aliis plures, aliis pauciores. Aues etiam inter se ipsas, & à cæteris discrepare animalibus uentriculi ratione apertum est: aliis enim ingluuius præposita uentriculo est: aliis ingluuius deest: nec desunt, quibus uētriculus ipse similis sit ingluui ei: at parti plurimæ carnosus callosusq; est. A uentre natura intestinorum posita in omnibus est: differūt autem inter se magnitudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora intestina non utrinque dētatis, nec immerito: nam ipsa ita dentata, omnia sunt auctiora: pauca enim parua in eo genere habentur. Est uero intestinum, aliis quidē simplex & partibus omnibus simile, ut piscibus, aliis uero dissimile: quibusdā enim, parte qua uētri iungitur, laxius est, qua desinit arctius, ut canis: sed tamen maiori animalium numero arctius parte superiore est, latius inferiore. Quæcunque enim intestina habent minus recta, sed anfractus orbēque plures continētia, iis omnibus in latius tendunt: & quod colon uocatur habent, & cæcum quiddam ac tumidum: mox arctatur, & in anfractus complicatur. Ab hoc rectum ad exitum usque excrementi pertendit: quæ quidē pars aliis pinguis, aliis sine pingui est. Quæ igitur continentiora esse ad cibi desiderium conuenit, hæc sua in aluo inferiori, neque intestinorum sinus *ἡ* laxiores magnosue habent, nec intestino utuntur rectiore, sed quod anfractus orbēsque plures continēat: laxitas enim intestini auiditatem auget cibi: rectitudo accelerat auiditatem. Indēque fit, ut animalia quæ uel simplex, nec adeo in anfractus conuolutum habent intestinum, uel conceptacula intestinorum ampla, cibum aut copiosum capiant, aut celerius repetāt. Appendices habent quædam infra, parte intestini extrema: ut aues, & ex uiui paris etiam animalibus nonnulla. Lactes quoque & ormentum habent omnia, quæ sanguinem: sed alia pingue, alia macilentū: oritur id, & depēdet in iis quæ animal generant, eademq; dentata utraque parte sunt, à medio uētre, qua ueluti quædam futura ducitur (inest enim & in uentre, ut in corde, futura

- A turæ uestigium quoddam nec secus in iis quæ altero dentium ordine carent, à maiore uentre dependet: in aliis quoque animalibus sanguineis uentriculo intestinisq; & iis quæ sub septo sunt, uisceribus prætenditur: maximum hoc habent homines & simiæ. Quæ uero partes ad generationem ministrant, feminis omnibus intus conditæ habentur: maribus enim multiplici differentia euariant: aliis enim testes nulli omnino sunt, ut piscibus, serpentibus. nulli denique quod pedibus careat, testes adfunt, nisi intra se formare animal possit, ut delphinus: aliis sunt quidem, sed intus quibusdam, ut auibus: quibusdam foris dependent. Et iis quæ intus continentur, aut lumbis adherent circiter sedem renum, ut auibus & quadrupedibus ouiparis: aut in ultima alui parte priore conduntur, ut delphino ex iis quæ pedibus uacant, & elephantino ex iis quæ quadrupedes sunt: cornibus enim quæ animal generant, testes ante habentur, uel intus, uel extra, præterquam in inaceo. Quibus itaque testes intus continentur, iis protinus cum meatibus seminariis intus firmantur: quibus autem foris sunt, horum quibusdam, ut modo diximus, absoluti pendent, ut hominibus: aliis non sunt absoluti, sed alio adherent, ut apro. Quæ intus continentur suos testes, eos nulla cure habent obductos: quæ autem foris, hæc coniectos in conceptaculum, quod scortum uocamus, gerunt. Omnibus autem quæ oua edunt, siue bipeda, ut aues, siue quadrupeda sunt, testes lumbis annexi infra septum continentur, uel candidiores, uel pallidiores, uenulis admodum tenuibus circumdati. meatus singuli de singulis pertinent, eademque coeunt supra ostium excrementi, sicuti & in piscibus serpentibusque: atque is meatus, qui ex coitu amborum consistit, genitale est: quod in minoribus latet: in maioribus uero, anserem dico & reliqua huiusmodi, euidentius est, cum recens inierint, iis quæ foris testes habent, meatus utrinque bini à uasis illis maximis, quæ per dorsum feruntur (uenâ dico magnam atque arteriam, quâ aortam uocari diximus) deorsum pertedunt ad eam partem, quæ *ἀνδρῶν* dicitur: est autem *ἀνδρῶν*, ut nomen ipsum indicat, testium superimposita capiti, ex qua meatus quidam ueluti fistulæ seroso quodam humore plenæ in testes permeant, suiq; partem quandam exiguam ipsis distribuunt, atque ita testibus committuntur. A capite deinde ipsorum testium meatus utrinque oriuntur singuli, superioribus illis spissiores atque neruosiore, (meatus uocant, aut uasa seminaria: aliqui uero *meatus* uel *uasa* *seminaria*, quasi uaricosos dixeris) qui inde progressi, multifariamque sese flectentes, in idem postea coeunt, & ceruicem subeunt genitalis, humorem iam habentes in se candicantem, quæ *σπέρμα*, id est genitura dicitur, quæ ab epididymi ad penis meatum defert. Quæ uero testibus carent, ut serpentes & pisces, meatus & ipsa seminarios continent binos, qui de septo exorti lateris spinæ utrinque percrepent coeantq; superne, & ad spinæ locum in unum, atque ita ad ostium excrementi finiunt. Testes animalium, & quæ seminaria dicuntur uasa, ita se habere cognitum est. Pars autem femininarum ea, quæ semen recipit, non meatus, traieciusq; quidam est, sed uterus amplior. Vteri autem bipartiti omnium sunt: sed nec eodem situ habentur, nec similes omnium sunt: sed differunt, tum eorum quæ animal generant inter se, tum

DE DIFFERENTIIS

ab illorū uteris, quæ oua pariunt. Situs uteri, aliis infra longius à septo trāf-
uerſo, iuxta genitale, ut mulieribus, & omnibus quæ animal non ſolum fo-
ras, ſed etiam intra ſe generant, & piſcibus qui oua edūt: aliis iuxta ſeptum
tranſuerſum, ut auibꝯ omnibus, & piſcibus qui animal pariūt, atque qua-
drupedibus ouiparis. Serpentes tam ab aliis ſupra dictis, q̄ inter ſe diſſerre
apertū eſt: uiperę nanq; uni uulua ſimilis, ut cartilagineis: aliis uero ſerpēti-
bus tēdit uulua prolixior modo corporis, exorſa inferius ab uno meatu cō-
tinua diductaq; utrinq; in latus ſpine, quaſi duplex meatus uſq; ad ſeptum.

Sunt & omnes uteri, qui infra iuxta genitale continētur, ueluti biſariam
diuiſi, in ſiniſtrum ſcilicet & dextrum: initium uero unum eſt & commu-
ne oſtium, uidelicet ceruix, carnoſa admodum cartilagineaque, parti plu-
rimæ auctiſſimæque animantium tributum. Sunt partes uteri, Eudemus, *καρπια*, id eſt cirros, Diocles *καρπιας*, id eſt cornua dixit, Praxagoras & Phi-
lotimus *κάλπας*, id eſt ſinus uocarunt: mulierisq; uterū *διπλῶς* dixerunt,
id eſt binos habere ſinus, in quibus & fœtū contineri exiſtimabant: uerum
quæ multos ſimul habēt fœtus, ut ſus, ſinus quidem habere multos uerum
eſt, in quibus & fœtum geſtent (ſinus enim tot in utero reperias, quot ha-
bet fœmina ipſa mammæ.) Mulier autem & cætera animalia quæ uterum
muliebri ſimilem habent, ut capra & uacca, non in cornibus illis (quippe
quæ multo minora ſunt, quàm ut fœtum continere poſſint,) ſed in toto u-
teri ſpatio fœtum habere conſpiciuntur. Validiores eſſe eas uuluas, quæ
animal contineant neceſſe eſt: quamobrem omnes hæ carnoſæ ſunt: quę au-
tem ad ſeptum iunguntur, ut auium, & præterea piſcium uteri, exceptis car-
tilagineis, membrana conſtant, & tenues ſunt. Vulua omnibus, quæ & in-
tra ſe & foras animal generant, ſuper aluum poſita eſt: quæ oua pariunt, iis
lumbis adhæret: quæ animal edunt in lucem, cum intra ſe oua generarint,
ut cartilaginea, iis anceps ratio eſt: nam & lumbis adiūgitur ea pars uulua,
qua oua continentur, & ſupra inteſtina oſtiū eius ſuſtinetur. Et partes qui-
dem diſſimilares animalium, quæ ſanguine prædita ſunt, hunc in modum
ſe habere conſtat.

G Cor, Cōuenit inter omnes (inquit Solinus) corda primū ex uniuerſa formari car-
ne, eaq; in diē quintum & ſexageſimū teſcere, deinde minui. H Sinus laxiores ma-
gnosue, *ἀπρηκτους μεγάλους*. Appendix, *ἀπρηνός, ἢ ἰσχνός*. C. Meatus, Hæc ex Galeni
ſententia aſſertuntur; nā, ut Atiliſoteli placet, nullam partē meatuū teſtes complent, ſed
adiecti pendunt eo modo, quo pondera retrices telis adnæſcunt, ut motū excrementi
genitalis ſtabiliore faciant: his enim detractis meatus intro ſe retrahunt. Hæc Ariſto-
teles. Vas ſeminarium uel meatus ſeminalis, *ἀνδρῶν ἀσπρματικὸν, ἢ τῶν ἀσπρματικῶν*.

Similarium partium differentię in animalibus ſanguineis.

Cap. LIII.

Similarium uero ſanguis potiſſimum cōmunis animalibus ſanguineis
ſomnibus eſt, ut ante dictum eſt. Habet & genus animantium ſanguinis
compos uafa illa maxima, quæ aliarum quoque uenarū arteriarumq; ini-
tia ſunt, eo quo diximus modo. Nam reliqua uenarum copia non ſimili ra-
tione in omnibus eſt: neque enim animalium partes eodem modo aut æ-
dem

- A dem in omnibus habentur. Nec uero æque in omnibus patet uenarum series: sed potissimum in iis constat, quibus sanguinis copia & præcipua magnitudo est. Nam in minutis, sanguinisue inopibus, uel per naturam, uel per immodicam corporis obesitatem, haud æque inspicere possunt: alteris enim meatus quasi canales multo intersepti limo uix conspiciuntur: alteris parua, eadẽque fibra potius quàm uenæ habentur: una tamen, quam maiorem ex præcipua magnitudine cognominauimus, potissimum euidens in omnibus etiã minutis animalibus est. Copia sanguinis in primis iis animalibus inest, quæ animal & intra se formant, & in lucem edunt: mox iis sanguineis, quæ pariunt oua. Præpingua omnia sanguinem quantius purum, tamen paucum habent: & quò plus pinguedinis, eò minus possident sanguinis: pingue enim omne exanguis est. Discrimina uero sanguinis ad sanguinem, qui melior sit aut deterior, hinc habetur: alius enim tenuior, alius crassior est: & alius syncerior, alius turbulentior: item alius frigidior, alius calidior, tam in eodem animali, quàm in diuersis. Quântum enim sanguinis parte continetur superiore, his differentiis discrepat cum inferiore: inferioribus nanque partibus crassior & attrior est, quàm superioribus. Animalium, fortiora quibus sanguis crassior: sapientiora, quibus tenuior: quibus minimus hebetia. Dormientibus porro sanguinis copia partes exteriores deserit, subit interiores, ita ut adacto cultello nõ æque effluere possit. Fœminis sanguis nigrior & crassior quàm maribus est, dummodo cætera adsint pariter, quæ uel ab ætate uel à sanitate proficiuntur: & minus sanguinis per summa corporis fœminarũ est: plus enim parte interiore continetur. Ætatum etiã ratione sanguis discrimen, tum in modo, tum in genere, (hoc est in quantitate & qualitate) recipit. Etenim in ætate iuuenili, saniem trahit & copiosior est: in senectute autem crassus, niger, & paucus: mediũ tenet in media firmæque ætate. Concrefcit etiã facile senum, uel in corpore sanguis, qui per summa est, quod idem nunquã in iuuenibus euenit. Quibus datus est sanguis, iisdem omnibus iterui adiuncti sunt: sed quæ nullos habent articulorum flexus, priuataque pedibus & manibus sunt, iis prætenues incertique habentur: quapropter in piscibus, qui iuxta pinnas positi sunt, ij præcipue ueniunt in conspectum. Ossa habent, quæ sanguine prædita sunt omnia, aut aliquod, quod uice fungitur ossis, ut spinam, cartilaginem: ossa, inquam, caluariam, maxillas, dentium genus, uertebras quæ spinam constituunt, & pectoris ossa: nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat. Sunt item ossa humerorum, & quæ scoptula appellantur, & quæ iis annexa dependet brachiorum & manuum ossa saltem in homine: & modus idem compaginum uel in iis est, quæ crura habent priora. A coxendicibus ossa iam crurum oriuntur, quæ græco nomine *καὶνὸς* dicuntur. Ab iis ossa pedis subiacent. Quæ igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, hæc ossa non multo diuersa habent sere, sed ad proportionem tantummodo, duritia, mollitie, magnitudine, figuræ uel multitudine discrepantia. Costæ homini tantum octonæ, inquit Plinius, subibus denæ, cornigeris tredecim, serpentibus triginta. Ossium item

DE DIFFERENTIIS

animalis eiusdem, alia medullam intra se continent, alia minime: sunt enim nonnulla, quæ suis in ossibus nullam omnino medullam habere uideantur, ut leo. Cæterorum animalium sanguineorum ossa aut paulo differunt, ut auium: aut proportionem eadē sunt, ut piscium. Qui enim inter eos animal generant, cartilagineam pro spina habent, (prospiciuntur. Sic Græci uocāt) ut ea quæ cartilaginea appellantur: qui autem ova pariunt, spinam continent, quæ perinde ut spina dorsi in quadrupedum genere habetur: omnia namque animalia quæ sanguinem habent, dorso constant, aut osseo, aut spinoso, aut cartilagineo. Cætera ossa aliis insunt, aliis desunt: ut enim partes corporis quæque habentur, ita ossa quoque ad partes accommodata habentur: quibus enim crura & brachia desunt, iis pennis aut culinæ etiā desunt: nec uero quibus partes eadem quidem sed dissimiles sunt, eadē ossium ratio seruatur: sed aut plurius minorisue modo differūt, aut proportionem. Ossa igitur ita se habent. Cartilago terrestrium, quæ & sanguinem habent & animal gignunt, nullo foramine hincit, nec ossium more medullam continet: at uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est, humorem in medullæ speciem continens. Cartilagine constant gressilium, quæ animal gignunt, auriculæ, nares, extremitatesque ossium nonnulla. Ungues habent omnia fere, quæ digitos: alia uero, quæ scilicet solidos pedes habent, ut equus, pro unguibus ungulas obtinent: quæ autem bisulcos, chelas. Quæ habent ungues, aut rectis unguibus sunt, ut homo: aut aduncis, ut inter pedestria leo: inter uolatilia aquila: similia imbricati sunt, & homini lati. Pilos habent, quæ pedestria eademque uiuipara sunt. cortice autem integuntur, quæ ouipara sunt pedestria: squama uero pisces tantum. Differentiæ autem, pilorum existunt duritie, molitie, longitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate: ad hæc coloribus ut albedine, nigredine, eorumque mediis. Crassitudinis, tenuitatis, copię, magnitudinis pilorum discrimina pro partium quibus adherent conditione, atque pro cutis qualitate proueniūt. Fit enim magna ex parte, ut pili duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur: plures autem & longiores humidioribus (dummodo sint ad gignendum pilum idonei) prodeunt. Regionum etiam tepore & frigore differentia est: ut pili hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur. Sunt præterea molles, qui promissi: duri, qui crispi. Nonnulli pili paulatim adeo duritate degerant, ut non iam pilis, sed spinis similes esse uideantur, ut erinaceorum. Differunt & colore: aliis enim niger pilus est, aliis albus, aliis flauus, & rufus aliis. Et colorum causa cæteris animalibus cutis natura est, & ut unicolora sint & uaria: alborum enim alba est cutis, uariorum permixtorumque partim alba partim nigra esse conspicitur. Sed homini nihil causæ cutis affert, (qui enim sunt albi, admodum nigros habent capillos), nisi quandoque ad canitiem, uidelicet eam quæ morbo, non quæ senio accidat: nam eo uitio corporis, quæ λεύκη, id est uiriligo uocatur, pili efficiuntur albi. Mutatur color pilorum in senectute, candidique pili efficiuntur in hominibus: quod uel cæteris animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo.

- A equo. Pilos habent cetera animalia, nec intra os, nec parte pedum resupina: lepori uni pili in bucca, & sub pedibus sunt. In sanguineis animalibus sunt & membranæ, ut antea exposuimus, caroque & quod carni simile est: & præterea sebum & adeps: sebum enim habent, quæ non utrinque dentata, sed cornigera sunt. At uero genus utrinque detatum & cornuum expers & multifidum, uice seu adipem habet. Animalia quæuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt: quibus autem pingue separatim non est, ea minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguilla: plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant. Steriliora cuncta, pingua & in maribus & in fœminis. Senescunt celerius præpingua: quædam non pinguescunt, ut lepus, perdix, auctor Plinius.
- B Semen genitale habent omnia, quæ sanguinem: non eodem tamè modo in omnibus est, sed quibusdā pro genitura, ^{ἄρσ} id est genitale uirus sui generis habetur, ut piscibus. Lentum semen est pilos habentium, cæterorum nullam habet lentitiam.

C Fœminis sanguis nigrior, Contrà Plinius (nisi exemplaria sint mendosa) maribus quàm fœminis nigrior, & in iuuenta magis quàm senio. D Scopula, Theodorus scapulas uocat. καλλῶς, Theodorus pernas aut culinās interpretatur. G Disferunt & colore, De his fusius apud Galenum secundo De temperament. libro.

Eorum quæ ad generationem pertinent discrimina, in iis quæ sanguine prædita sunt animalibus. Cap. LIIII.

- C In omnibus sanguine præditis, paucis quibusdam exceptis, ut piscibus nonnullis, sexus discrimen ita habetur, ut alterum mas, alterum fœmina perfectum euadat. Coitus autem in iis, nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur. Eorum enim quæ pedestria uiuipara sunt, magna ex parte modus quidem coeundi idem est, fœminā scilicet mare superingrediente: uerum non omnia simili modo coniunguntur. Aliis coitus complexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpentibus, murenis & laceratorum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilagineis, admotis inuicem partibus supinis copulantur. Aues mare fœminam superueniente coeunt. Morantur in coeundo diutius omnia quæ animal generant, quæ quæ oua. Cum uero tempora coitus descripta, & ætates certas ad uenerem sin-
- D gulis animalium natura finxit & statuit: quæ tamen cum homine uiuunt pedestria coitum nullo tempore aspernātur, uidelicet propter teporem, & pabuli ubertatem: quorum tempus etiam gerendi uteri breue est, ut suis, ut canis, ut uolucrum quæ sæpius pariūt. Semel anno magna pars syluestrium animalium parit: tam eorū quæ animal generant, quàm quæ oua, quæ scilicet non ut lepus superfœtant. Omnium maxime animalium grauida coitum patiuntur mulier & equa: cætera ubi grauida fuerint, fugiunt mares: ea scilicet quorum natura superfœtare more leporis recusat. Quæ sanguinem habent omnia, aut animal pariūt, aut ouum, nisi omnino sterilia sint: bipedum solus homo animal generat. Semen ubi à coitu insinuatū in utero fuerit, aliquandiuq; contentum, membrana obducitur: quippe quod si

antequam articulis discernatur membra, eiiciatur, uelut ouum in sua membranula contentum apparet detracto putamine: membrana etiam ipsa uenis referta est. Omnia uero tum natatilia, tum pedestria, tum etiam uolatilialia, siue animalis, siue oui forma procreantur, simili modo gignuntur: nisi quod alia umbilicum habeant uuluae adhaerentem, uidelicet quae animalis forma enascuntur, alia ouo, alia utroque modo, ut in quodam piscium genere, cartilagineo scilicet. Pari quoque modo tam in uiuiparis, quam ouiparis uocantur ea, quibus obuolutus est foetus, uti inter membranas antea diximus: aliae secundae (Graeci *χελει* dicunt,) aliae membranae, quas *αμνιον* & *αλ-λαντιδον* uocant nonnulli. Augentur omnia animalia, quibus est umbilicus, per ipsum umbilicum. Est autem umbilicus uena in aliis simplex, in aliis multiplex (in maiore enim animali plures sunt uenae, ut in boue: binae in me-
diocribus: singulae in minimis, ut Aristoteles author est) quam uenam putamen cuticulare ambiat, quod & umbilicus uocatur: uenae autem qualis ra-
dices aguntur, per quas alimentum haurit foetus. Haec Aristoteles. Galenus, Coeunt, inquit, in unum, & uenae, & arteriae, quae à *χελει* membrana, id est à secundis producuntur in foetum: atque ex eo coitu, coniugium fit utrorumque uasorum, quod in umbilicum inseritur. Animalia quae non utrinque dentata sunt omnia, etiam detatorum utrinque, quorum uterus uenam non singularem habet pertinentem grandem, sed pro una plures frequentes continet, haec in utero habent, quae acetabula appellatur, in quae umbilicus deuenit atque adhaeret. Sunt autem acetabula, uasorum ora, quae in uulua penetrant: & in quae ueluti in mammis reponitur à natura foetui alimentum sanguineum, quae ferendi uteri tempore, quandiu scilicet foetus sit minor, nec multum alimenti assumere possit, in matrice prominent, in pustularum (*βλαβήματα* uocant) & inflammationum morem: & conspicua maioraeque sunt, non aliter quam in recto intestino haemorrhoides solent: foetu uero accrescente proficiscentaeque ad exitum, minora subinde redduntur, demumque confidunt, obliteranturque: cum perfectus iam est: minuta uero & utrinque dentata nonnulla acetabulis uteri carent: tendit umbilicus iis in uenam singularem, quae per uterum maiuscula fertur: iam quae ouo nascuntur omnia incrementum foris recipere abiuncta ab utero aperta sunt. Situs in utero quadrupedum omnium exrensus est: expedum autem obliquus, ut piscium: bipedum uero inflexus contractusque, ut auium, hominum. Omnibus & quae animalibus, dum in utero continentur, caput primum superius est: sed cum creuerint, & iam exitum appetant, deorsum deducitur: ita fit, ut omnibus partus secundum naturam in caput, contra naturam in pedes, aut inflexo circumactoque corpore agatur. Animalia quorum natura imperfectior est, conceptum cum perfectus iam est, sed nondum animal perfectum, foras edunt (perfectum autem est animal, cum conceptus iam aut mas, aut foemina est, scilicet in quibus sexus haec differentia habetur: sunt enim quae nec marem nec foeminam generent: uidelicet quae & ipsa non ex foemina, marisque & coitu animalium procreantur.) Quae autem animal intra se generant, scilicet naturae perfectae animalia, quousque animal pa-
riant

Umbilicus,
αμνιόν.

Acetabula,
κετολάδης.

Ariant, forasque emittant, gerunt intra se innexum quod gignitur. At uero quæ foras animal pariunt, cum intra se prius ouû generint, eorû nonnullis ouum iam perfectum absoluitur, ut eorum quæ foras pariunt ouum, atque ita animal ex ouo intra feminam nascitur: aliis cum alimentû in ouo contentum absumptum iam est, perficitur ab utero, atque ob eam rem ouum utero non abiugitur. Atque hæc fere cartilagineorum piscium differentia est, de quibus post seorsum per se disseremus. Partus cæteris animalibus minime laboriosi eueniunt: minus enim cum parturiunt infestari uidentur: at mulieribus dolores uehementissimi incidunt. Postquam conceperit femina, definit lac atque extinguatur, tam in homine, quàm in quadrupedum uiuiparo genere. Habent quod coagulum uocatur, omnia quæ plures continent uentres: carent fere quæ unum habent, excepto lepore.

Morû actionûmq; & affectionû quarundâ aliarû differentia. Cap. LV.

Sanguinei generis multa temporibus quibusdam se condunt, ut ea quæ cortice intecta sunt: serpêtes dico, lacertos, stelliones crocodilos fluuiatiles. Piscium etiam cõplures latere nouimus, alios hyeme, alios etiâ æstate: & præterea aues nonnullas, ut hirundines. Quadrupedum etiam quæ animal generant, nonnulla cõduntur, ut histrices, glires. Et ex iis nonnulla exiunt id quod senectus uocatur: ueluti ea quæ cortice molliori intecta sunt, ut serpentes & lacerti. Maiora sunt quæ sanguinem habent, quàm quæ non habent: & in iis magna ex parte, quæ maiora perfectioraq; sunt animalia, C plus temporis uiuunt: sed tamen non omnia maiora sunt diuaciora: homo enim plus temporis, quàm quoduis animal uiuit, excepto elephante: quamquam homo minoris est incrementi, quàm ueterina & alia multa. Singulis generibus pro sua natura cibus statutus est: nec omnibus eadê esse in cibo idonea, cum in multis palam est, tum omnium fere consensu in ceruis patefcit, qui uiperas edunt, quibus cætera moriuntur: & Lucretius,

Præterea (inquit) nobis ueratrum est acre uenenum:

At capreis adipēs, & coturnicibus auget.

Atque uidere licet pinguescere sæpe cicuta

Barbigenas pecudes, homini quæ est acre uenenum.

DEorum quæ in his alimenti aut medicamenti rationem obtinent, discrimina. Cap. LVI.

Alimenta quæ ex his animalibus sumuntur, non parum præ se ferunt differentiam: non omnium etenim caro (quæ maxime in usu cibario est) idem præstat nutrimentum: quædam hoc ipsum tantum sunt, alimentum scilicet. Alia præterquam quod nutriunt, habent & medicam quædam facultatem: nempe ut excalfaciendo, refrigerando, humectando, siccadotie corpus nostrum immutent: ut uiperarum carnes, cum in anguillarum morem condiuntur, calfaciunt palam, desiccantq;, & corpus totum per cutem expurgant. Alia medicamenti duntaxat uim habent: eorum quibus quotidie uicimur, quæ domestica sunt, otioseq; uiuunt, carnem habent humi-

DE DIFFERENTIIS

diolem, & quæ magis excrementis abundet: quæ uero syluestria, duriores & excrementisq; uacuum: & quæ lacustribus palustribusue locis, aut in fluminibus immundis ac turbidis lutosisq; degunt, deterrimam habent. Cômune & hoc quoque, & uolucris & quadrupedibus, longe præstantiorem, concoctiq; faciliorem esse carnem eorum, quæ adoleſcunt, quàm aut recēs natorum, aut iam senescentium. Hæc enim dura est, neruosaque & arida: ideoq; & concoctæ difficilior, minusque alimēti præbet: illa uero mucosa, præhumida, atque excrementosa est, eorum præsertim animalium, quæ suapte natura humidiores sunt carne, ut agni & fues: uerū hædi & uituli, ut qui natura sunt sicciore, melius multo & concoquantur & nutriunt. Sicuti enim in humidioribus natura animantibus ipse ætatis flos temperiem affert mediocrem, ita in sicciorebus ætas adoleſcens, & quæ adhuc crescat: nam quod præhumidum est alimētum, ut distribuitur, ita etiam celerius discutitur. Non lōge post tempore, quàm mactata sunt animalia (inquit Rufus) coqui solent, ex quadrupedibus suilla caro, & ouilla atque caprina: ex aui- bus turtur, columba, & turdus: diutius seruantur uenatio omnis, & bubula caro: maiores quoque aues & palustres: & gallinaceum genus, phasianus, perdix, pauo, & attagena. Piscium genus omne fere, uel antea quàm expiret, coquendum est: haud facile nanque seruari patitur. Castratorū animalium carnes in suo cuiusque genere præstant: auium caro, si cum quadrupedibus conferas, minus præstat alimenti. Pisces leuiorem cibū præstant, quàm caro suilla, quæ inter domesticas quadrupedes leuissima est: & alimentum quod ex piscibus provenit, sanguinem procreat tenuiorem, quàm quod ex pedescribus animalibus, & qui non tam abunde nutriat. Ex piscibus tamen nonnulli teneriorem, alij duriores carnem habent: quæ cete appellatur, eorū caro dura est, maliq; succi. Quod uero ad medicas uires attinet, syluestris suis caro uehementius exſiccatur, quàm domestici: sue sicciore ouis est, oue capra: hanc bos superat, illum denique leo. Erinacci utriusque uſtinerem ulceribus sordidis imposuere quidam: hiruḍinum quoque combustarum cinis, cum melle gutturis affectibus medetur.

Ex animalium sanguineorum partibus, alimentorum medicaminumque uires diuersæ.

Cap. LVII.

E Reliquis animalium partibus, oculi à paucis eduntur. constant autem H ex partibus dissimilibus: alia nanque tunica sortita sunt naturam, multo aliam: denique humores aliam, qui crystalloides & hyaloides uocantur, in quibus soli muscoli facile concoquuntur. Lingua (uti diximus) carne substantia est rariore, minusque continens sanguinis: huius natura fere glandulosa est: & glandulæ ipsæ à lingue substantia tantum recessere, quantum lingua ab ipsa carne. Omnibus autem glandulis illud commune est, quod in cibo suaves pariter & friabiles sentiuntur: succum gignunt crassiusculum. Mammæ autem lactantium certe animalium (si de his appellamus) habent à lacte comparatam dulcedinem: quocirca maxime à gulosis expectuntur, præsertim suillæ. Alimento uero, quod ex iis gignitur, si probe fuerint

Abe fuerint in uentriculo concoctæ, prope ad carnis alimentum accedit, sed crassum efficit succum. Atque si animal ipsum, ex quo sumuntur, boni habitus fuerit, abunde nutriunt, & probum generant succum: sin minus probe, succum crudū aut pituitosum procreant. Sunt qui renes quoque inter glandulas adnumerent: habent uero ij ex urina uirosi quippiam: ac proinde uitiosum gignunt succum, concoctūque difficiles sunt. Virus quoque habent testes à femine contractum, ex adultis saltem quadrupedibus: altitium autem gallinaceorum testes & suaves sunt, & optimum præbent corpori succum. Quadrupedum quoque iuniorum testes manduntur: taurorum uero, hircorum & arietum, sapore sunt ingrato, cōcoctū difficiles, malique succi. Viscera ad concoctionem difficilia sunt, crassique succi, atque

B excrementosi: in iis tamen iecur uel quadrupedum nonnullarum succum procreat non omnino malum. Cerebrum omne pituitosum crassūque est, nec probum efficit succum. ægre concoquitur, tardēque permeat, atque à stomacho alienum est, idque haud modice: quippe quod nauseam concitat, adeo ut si cui à cibo uomitum ciere decreuerint, cerebrum postremum ciborum exhibendum suadeant medici. Idem tamen si probe concoquatur, alimentum præstabit corpori nō exiguum. Auium cerebrum paruum quidem est, sed quod pedestrium cerebro tanto præstantius, quanto durius est. Cerebro dulcior est, suauior quoque & pinguior, quæ in ossibus reperitur medulla: ut si utrunque gustando inter se conseras, uidebitur certe cerebrum austeri in se quiddam continere: & medulla ipsa quoque si liberalius edatur, nauseam excitat ut cerebrum: & si probe fuerit concocta, nutrit non aliter atque cerebrum. Facillime omnium putredinem sentit medulla, ut Rufus author est: eoque fit, ut eorum animalium ossa, quorum caro grauius olet, quamprimum confringi soleant. Emollit medulla, quæ in corpore nostro dura sunt: etiam quæ scirrum patiuntur, siue in musculis, siue tendonibus aut ligamentis, siue etiam in uisceribus id accadat. Mollunt, inquit Dioscorides, omnes medullæ, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent, & ut Plinio uidetur, exsiccant. Laudatissima est ceruina, proxima uitulina aut boum iuniorum: dein caprina, inquit Plinius. Hircorum uero, taurorumque medulla & acrior & sicciore est, quàm ut scirrosas durities emollire possit, uti Galeno placet: Dioscorides taurinam caprinæ præfert & ouillæ. Curantur medullæ hyemē, ut uult Galenus: alij uero ætatis exitu, uel ante autumnum. Utimur autem medulla, non ea solum quæ in ossibus, sed & quæ in spina reperitur, quàm & spinalem medullam nuncupant: quæ altera illa & durior & sicciore est. Hæc pinguedinis habet minimum, quo fit ut nauseam minime ciat: non exiguum dat corpori alimentum, sed quod crassiores succum efficiat. Pinguedo omnis, siue adipē dixeris, siue seuum, pauci nutrimenti est: potiusque carnis, quæ nos alit, condimentum est, quàm alimentum. Excalfacit, mollit, rarefacit & humectat omnis pinguedo: uerum cuiusque differentia in maioris minorisque ratione consistit. Nam pinguedo suilla, omnium est humidissima, oleiq; instar fluida: caprina ob crassitiem citius concrefcit. Taurinus adeps suillo longe

calidior & ficcior est, minus tamen, quàm sit leoninus: uilulinus quoque E taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hœdinus quàm sit caprinus: minus quoque hic, quàm hircinus. Adeps anserinus suillo calidior est, inter quos medium locum obtinet gallinaceus. Piscium adipem ad suffusiones imposuere nonnulli: Massurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradit. A renibus autem est laudatissimum omne sebum. Perficitur omne sebum exemptis uenis membranisque. Sanguis omnis concoctu difficilis est, præcipue qui crassus, qualis est bubulus: leporinus tamen, utpote omnium suauissimus, in pretio est. Suum quoque & iuniorum & eorum qui castrati sunt, sanguine pro alimento utuntur quidam: sicuti & gallinarum & caprarum nonnulli. agrestesque nonnunquam caprarum sanguine unâ cum adipe sese replent, uti & Homerus de Penelopes procis retulit. Aprorum sanguinem, qui uel gustare quidê uelit, nemo est: taurorû sanguis recens epotus uenenum est. Sanguis anseris, anatis & hœdi, utilissime in antidota miscentur: palumbi autem, turturis, columbæque ac perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorundem uulneribus illinuntur. Partes animalium excarnes, ut pedes, rostra, aures, cartilagine, minimum præstant alimentis: & neruossæ partes omnes, ut ligamenta atque tendones alimentum gignunt lentum glutinosumue: nec sane aliud, quàm partes ipsæ coctæ præferunt. Et quæ circa quadrupedum labra sunt, eandem habent naturam: glutinosum nanque, sed minime grassum generant succum: uerum facile concoquantur & hæc & uolucrum alæ. Ossâ cremata digerunt atque exsiccant egregie: maxime uero (ut nonnullis placet) humana. Quidam autem G arthritim & comitalem morbum epotis ossibus uisitis sanauere. Pili uisiti calfaciunt egregie, atque desiccant: & lanæ crematæ eodem modo.

D Curandæ medullæ rationem uarie explicant Galenus, Dioscorides & Plinius. E Quomodo curari debeat omne pinguedinis genus, docent Dioscorides & Plinius.

De excrementorum, quæ in animalibus sanguineis reperiuntur, differentiis. Cap LVIII.

Huiusmodi omnium qui in animalibus insunt, bilis calidissima est: cuius proinde uis acris exalfaciensque est. Exalfacit, inquit Plinius, mordet, scindit, extrahit, discutit, & calidissimorum animalum fel, certe: Hæc quoque in calore superare palam est. Quia & in animalibus, quæ magis calida sunt, colore flaua uidebitur bilis: quæ uero minus calida, pallidior erit. Et cum animal quod sua natura calidum est, fame sitique torquetur, ad atrum colorem uergit bilis. Porcorum fel omnium humidissimum est, ac proinde maxime imbecillum, præterquam agrestium: hoc itaque felle tanquam ad aurium ulcera idoneo medicamento utuntur. Suillo felle acrius paulo est ouillum: ouillo caprinum, cui bubulum ursinumque similia sunt, taurinum ualentius est, quod tamen ab hyænæ felle uincitur: hoc quoque superat callionymi bilis, scorpiisque marini & testudinis marinæ. Minorum animalium fel subtilius intelligitur: & ideo ad oculorû medicamenta uti-

lius

Alius existimatur. Auium fel omne & acrius & siccius est, quàm quadrupedum. Perdici fel atque gallinæ ad medicinę usum cæteris præferuntur. Felle quocunque facile, infantibus præcipue, alui deiectionem quis molietur, si intinctum linamentum sedi subiiciat. Sudor omnis falsus est: sepe uero & amaritudinem præ se fert minime obscuram. Vrinarum non minor est uarietas, quàm bilis esse diximus. Et omnium quidẽ uis calida est: magis autem eorum quæ calidiora sunt, sicuti frigidiorũ minus. Hominis, ut & ex ceteri suis domestici, maxime est imbecillis: apri uero syluestris ualida est, ut ex odore facile apparet, qui utique acerrimus est. Salua canis certe rabidi, in homine quoq; rabiẽ excitare potest, si in eius corpus inciderit. Hominis salua uenenosis omnibus bestiis aduersatur. Hoc autem scire oportet, B saluæ discrimina contingere, tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoque sano aut ægro, ieiuno & sitibundo, aut cibo potuq; sumpto: à cibo nanque imbecilla est ualida acrisque earum, quæ longa inedia aut siti uexantur: mediocris eorum, quæ probe concoxere, nondum tamen cibum potumue hausere. Stercus fimumue omne digerendi facultate pollet: uarie tamen pro animalium temperaturis: eorum nãque quæ sicciore sunt temperatura exsiccantius stercus est, sicuti & quæ calidiore, calfaciens magis. Quin & pro eorum quæ pascuntur natura, numerosa sunt discrimina: id quod in hominibus maxime conspicuum fuerit: quandoquidem hoc animal ciborum generibus utitur maxime uariis: caprarum quoq; pilulæ, pro pastus uarietate nonnihil discriminis habent. Quorundam animalium C fimum non modo medicamentis quæ foris imponuntur, sed iis quoque quæ intro in os sumuntur admiscet nonnulli: caprarum etenim fimum, earum præsertim quæ in montibus uictitant, in uino potum, regium morbum emendat. E siue syluestri fimum aridum ex aqua aut uino epotum, sanguinis reiectionẽ sistit, diuturnum lateris dolorẽ lenit: ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur. Horum certe usus contingit nonnũquam, dum aut ueniamur, aut peregre, aut ruri agimus: cum scilicet præstantius nihil affuerit. Humanum autem stercus ob fetorem omnino reicitur.

H Taurino felli, inquit Plin. præcipua potẽtia. A Quonã modo curabitur felis genus quod uis docet Dioscorid. lib. 2. & Plin. lib. 29. C Fimi stercorisue animalium discrimina, quod ad agrum lætificandum atiner, ostendunt rei rusticæ auctores, Columella scilicet ac Plinius lib. 17.

D De lacte, & iis quæ ex lacte fiunt, ut caseo, butyro, & aliis. Cap. LIX.

I N lacte non parua est huius generis animalium differentia: humanũ etenim lac corpori humano maxime accommodatum est, ut quod & suauissimum sit, & optime nutriat: aliorum uero quorundam animalium lac, homini ingratum est, ut canis, lupi, leonis, uulpis, ursi, & id genus aliorum: caprino autem ouillo, bubulo, asininõq; libetius uestimur: caseosq; nobis ex iisdem conficimus, præterquam ex asinino. Horum animalium lac generatim omne probatissimum gignit alimẽtum: discrimen uero est, quod crassius est bubulum, ouillum, caprinum: minus autẽ crassum equinum, & asininum (quanquam Plinio crassissimum asininum) camelinum omnium

DE DIFFERENTIIS

liquidissimum est. Vt uero paucis eius facultatem definiamus: lac medico **E**rum omnium consensu, inter omnia edulia quamoptimum gignere succū, multumque alimenti præstare dicimus: ex contrariis quibusdam substantiis, ac facultatibus compositum: uentrem scilicet mouendi, ac sistendi, obstruendiq; ac tenuandi. Quod nanque in eo serosum est, succos extenuat crassos, & aluum ciēt: contra, quod caseosum aluum sistit, succosque reddit crassos. Quò fit, ut lac, quod serosum ac tenue est, minus nutriat, aluum magis moueat: sicuti contrā, quod crassius est, aluum minus citat magisq; nutrit. Camelinum, asininumq; serosi humoris plus habet: plus casei ouillum: pinguetudinis bubulum: caprinum inter cetera mediocritatem obtinet, ut quod nec pingue admodum, nec crassum sit: bubulum pingue, ouillū crassius, cōtrā asininum tenue. Optimi succi lac ex iis habetur animalibus, quæ **F**optimo sunt corporis habitui: dūq; si, ubi emulctum fuerit, quamprimū hauriatur: ubi nanque diutius emulctum manserit, genuinæ bonitatis nōnihil amittit. Quod uero postea coctū amplius fuerit, succum gignit crassiorē: multo uero maxime, si uel farinam triticeam, uel milium aut amyllum incoxeris. Lac, ne in uentriculo coaguletur, mellis, aquæ, & salis nonnihil admiscēt quidam: nam uel caprinum ipsum, absq; melle sumere, minime erit tutum: plerisque enim qui illud purum hauerint, in casei speciem in uentriculo coactum est: quod cum acciderit, mirum quā aggrauet hominem, ac prope dixerim, strangulet. Non parua quoq; lactis discrimina sunt ab anni tēpore: ab eo ipso spatio, quo à partu in lucē edito, distat: ab ætate, & à passionibus. Quanquam sunt qui pascuorum rationē plane pro nihilo **G**habeant, quasi nihil parumue ad lactis bonitatem conferant. Cæterū haud dubie uidemus, animalium, quorum usuri lacte sumus, si scammonia aut marinatum lactucarum quapiam (tithimallum uocant) uescantur, in lacte quoque laxandi uires inesse. Ex quo patet, quòd ex uitioso pascuo, ac re, acidum, & austerum reddetur, natura uidelicet herbarum imitatu: & à uiridi pabulo lac aluum magis emollit, inquit Dioscorides. Quod uero ad anni tempora pertinet: uernum lac ut liquidissimum, ita copiosissimum: æstate uero media, ipsum etiam mediocre est: post id uero temporis, sensim iam crassescit, quoad prorsus deficiat. A partu dilutissimum est: procedente deinceps tempore crassescit semper. Probi lactis improbiue hæc sunt indicia: quod optimum est, id gustanti olfacienti q; suaue dulcēque mediocriter: nec amarum, nec acidum falsūue aut acre, aut grauis odoris: intuenti candidum, æquabile, liquidū, crassūq; medium apparebit, ut si ungui instilletur, hæreat, nō defluat. Quod uitiosum est, è diuerso crassum & caseosum: aut liquidum & serosum ac liuidum consistentia ipsa calorēque uidebitur: idem gustantibus amarorem, aut falsedinem, aut qualitatem quāpiam extraneam exhibebit: tale uero nec olfacienti suaue erit. Lac animalium sanorum, aduersus acres, mordacesq; fluxiones est utilissimum: quandoquidem non solum à partibus affectis eas abluit, sed & corpora ipsa ueluti illinit: ne quod defluit, in loca nuda incidat. Continet enim in sese extergentē quandam humiditatem, quam serum uocāt: & præterea crassum quiddam pingueq;

A pinguedq; quod corpori illinitur, atq; adhæret, non aliter ac pinguedo adêps
 ue aut ceratū aliquod: ex triplici nanq; substātia conficitur lac omne, ut an-
 te diximus: serosa scilicet, caseosa, & pingui. Serum abstergentem uim ha-
 bet, qua uel absque rosione abluit acres humores. Pars lactis crassior, & quę
 casei naturam refert, ceu illita adhæret, nō aliter atque pinguedo adêpsuc,
 aut ceratum aliquod, acrimoniamq; humorū ea ratione obtūdit: lac uero
 ipsum totum lene mitigāsq; pharmacum est (καταρρετικόν) uocant) & mor-
 dacitatis expers: præcipue uero si ex mediocri decoctione partis serosę plu-
 rimum sit exhaustum. Ob succi quem lac gignit probitatem, nonnulli uel
 pulmonis ulceribus afflicto sola lactis portione curari putauere: antea sci-
 licet quā ampliora fiant ulcera ipsa, callumq; contrahant. Sed in tabificis
 B morbis, lac muliebre præcipue laudatur, tanquam eiusdem naturę nobis-
 que accommodatissimum: maxime uero si infantium in morem ab ita affe-
 ctis ex uberibus exugatur. Ad acres oculorum fluxiones ipsum lac, tum per
 se, tum cum molliorum collyriorū aliquo imponitur: præterea ad hypo-
 pia & hypophagmata. Palpebris quoque extrinsecus unā cū oleo rosaceo
 & ouo impositum, iis qui ophthalmia laborant, ubi somno sese dabunt,
 phlegmonas ipsas cōcoquit: mulieris autem lac esto, quod recens ex mam-
 mis expressum sit. Vbi uero exsiccantem uim quampiam adiunctā habue-
 rit, lac crassum caseosumque, optimū euadet dysenterię, acriūmq; omniū
 uentris fluxionum remedium: quam sane facultatem accipiet potissime à
 lapillis (quos καταρρετικόν uocant) uel ferreis quibusdam cylindris candentibus
 C lacti ante decocti iniectis. Decoqui autem lac eousque debet (ut modo di-
 ximus) dum serosi in eo humoris pars maxima absumpta fuerit. Hęc Ga-
 lenus: Plinius uero, Et si urat dysenteria, inquit, infunditur decoctum cum
 marinis lapillis, aut cum ptisana ordeacea. Item contra rosiones intestino-
 rum bubulum aut ouillum utilius. recens quoque dysentericis infunditur.
 Vtero quoque ulcerato infunditur lac: atq; omnibus, quęcunque leniri po-
 stulāt, prodest impositum, siue ob phlegmonē, siue ob humorū acrimonā
 malignitatē uel, ut sedis pudendorumq; ulceribus & cācerosis omnibus.
 Infunditur quoque lac cōtra rosiones à medicamento factas. Oris, guttu-
 risq; inflammationes lenit collutum gargarizatumq;: ac proinde anginas
 mitigat, tonsillāsque & columellam, si phlegmonē afficiantur. Datur & ad
 D uenena quę et odendo interimunt, qualia sunt lepus marinus, & cantharis.
 Sunt qui lac exhibeant, & iis qui aconitum & thapsiam sumperint. Priua-
 tim bubulum iis qui choleicon biberint, aut cicutam, aut doricnium, aut lei-
 poreum marinum: sicut asininum contra gypsum, & cerusam, & sulphur, &
 argentum uiuum. Sunt inter exempla, inquit Plinius, qui asininū biben-
 do liberati sunt podagra chiragraue. Vfus lactis ad omnia intus exulcerata,
 maxime renes, uelicam, interanea, fauces, pulmones: foris pruricum cutis,
 eruptiones pituitę post abstinētiā: thoraci quoque ac pulmōni lac omne
 utile est. Lactis usus contrarius spleneticis, hepaticis, comitiali morbo affe-
 ctis, uertiginosis, neruorum uitio laborantibus, febres habētib; caput dol-
 lentibus, uertigini, inquam, præterquam purgationis gratia, grauedini, tuf-

*Vsq; ad dimi-
 dum, ut uult
 Dioscorides.*

q; q; m...

q; q; m...

DE DIFFERENTIIS

fientibus, lippis. Minus inflat quodcunque decoctum. nocet usus eius assiduus dētibus & gingiuis. Lac quod feri habet plurimum (inquit Galenus) nihil affert periculi: quod uero feri exiguum habet, crassumque est & caseosum, non sine periculo assidue estur: ab iis ptesertim, qui renum calculo aut iecinoris obstructionibus obnoxij sint. Oxygala quod uocant, frigidum est, crassique succi: dentes, qui iusto sunt frigidiores, læditi euenit nāque iis, qui oxygala sumplerunt, symptoma quod dētium stuporē uocant: quale post acerborum acidorumque esum accidere solet. Ventriculus frigidior oxygala haud bene concoquit: temperatus uero, quanuis agere, conficit tamen: sed qui iusto calidior est, præterquam quod minime læditur, cōmodi nonnihil ab eo sentit. Fit autem oxygala uno modo, acido lacte addito in recens quod uelis acescere. Oxygala fit & alio modo, dum crebro iā-
 ctu in longis uasis conficitur butyrum, additur paulum aquæ ut acescat: quod est maxime coactum in summo fluit, atque id exemplum addito sale oxygala appellant. Medici speciem unā addidere lactis generibus, quod schiston appellauere. Id fit uel citra coagulum, cum scilicet ipsius partes lactis secernuntur, & discedit serum à lacte, cum lacti abunde calido acetum multum affundimus, aut uinum multum. Interdum etiam citra omnem li-
 quorem infusum uasculo frigidissimam aquam continēte, in lac dum feruet dimisso, lactis partes separamus. Ad hæc lac quod statim ab edito sortu emulsum fuerit, uel absque coagulo concreuit, si super cineres calidos paulisper ferueat: quod uero hoc pacto concreuerit, ueteres comici *πρωϊάντω*, asiatici uero *πρωϊάσι* uocant: & hoc quidem lac syncerum est, nulla admixta aliena natura. Cum uero una cum melle addito, per coagulum fiat *χλωρ*, id est separatio concretioque: discedit certe quod tenue & aquosum est, uerum id solum mandunt nonnulli, quod coactum est, quod tum ex caseosa lactis substantia, tum ex feruida igneæue coaguli facultate, tum uero ex melle ipsis admixto compositum est. Alij uero non hoc solum, sed unā cum eo quod concreuit, serum etiam deuorant: & id quidem uel pariter totum serum cum eo toto quod concretum est, uel eorundem altero alterum copiosius. Euenitque ut his quidem magis, illis uero minus uenter moueatur pro quantitatis serosi humoris ratione. Ac præterea quod, qui solū id quod coactum est comedant, uberius alantur: qui uero unā serosi quicquam humoris deuorauerint, minus: ac longe minus ij, qui eius quod concreuit pa-
 rum, serosi uero liquoris multum hauserint. Serum nanque postquam à lacte discessit, aliud egregie mouet, & ad purgationes ualentius redditur: datur autem potissimum, quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, in lepris, elephantis, erumpentibus, ex toto corpore pustulis, articularibusque morbis, (ut sentit Plinius) & paralyticis. Bibitur autem efficacissime heminis, per interualla temporis usque ad quinās: ita ut per interualla illa temporis potantes ambulent. Serum exempto caseo potum cum exiguo sale, phthiriasin à toto corpore inhi-
 bet. Lac coagulatum expressumque caseus est: non ita tamen ut uniuersa lactis moles in caseum cogatur, sed quod crassum est duntaxat, separatōque eo quod

Oxygala.

Aphrogala.
 Schiston, χε-
 στίον.

Serum, ὀρός.

Caseus, τυρός.

A eo quod ferosum est. Porro dictum iam est habere lac in se naturam quandam pinguem & oleosam: hæc ubi à reliquo lacte seiuncta fuerit, solâque per se constiterit, butyrum appellatur: uerum si unâ cum crassiore lactis parte coacta coagulataque fuerit, (feroso duntaxat lactis humore separato) caseus ipse pinguior efficitur. Abunde nutrit in cibo caseus sine salerecens, stomachoque idoneus est, & facile in corpus digeritur, corpus auget, & aluum leniter emollit: alius tamen alio præstat, pro lactis natura ex quo conficitur. Elixus autem & expressus, ac deinde assatus aluum sistit: oculorum inflammationibus atque hypopiis impositus iuuat. Qui uero recens nuperque salutus est, in cibo minus alimenti præbet, carniſque minuendæ aptus, stomacho aduersatur, uentrem & intestina turbat. Vetusior aluum

B sistit, corpûsque minuit, & stomacho utilior est. Hæc ex Dioscoride & Plinio. Vt uero Galenus refert, caseus omnis crassum procreat succum, uetus etiam malum: recens autem & qui nuper coactus est, neque malû gignit, nec æque atque uetus, crassum. Caseus cum conficitur, acrimoniam quandam ab iniecto coagulo contrahit, humiditatemque amittit, id quod maxime cum inueterauerit, conspicuum est: quo tempore & acrior & manifestio calidior sentitur. quo fit, ut & sitim excitet magis, & concoctu difficilior, deteriorisque succi euadat. Quapropter reiiciendum penitus suadent medici id genus casei: ut quod neq; ad concoctionem sit utile, aut in corpus digestionem, nec utique ad probi siccæ generationem. Malus deinde, sed prædicto minus, iudicatur, qui necdum uetus est, nec magnam contraxit acrimoniam: recens ut diximus, succi malignitate uacat. Crassities cum lentore non omni caseo inest: quandoquidem nõ paruum casei discrimen est, tum à lacte ex quo fit, tum ab animalium ex quibus colligitur natura, tum uero à pabuli uarietate: nonnihil ite à præparationis modo: præterea quod alius mollior, alius durior, aut densior laxiorue, glutinosior aut friabilior sentitur. Sapor deinde alius acidus, acrior alius aut dulcior. Mollior durior præstat: rarior quoque & laxior eo, qui densus admodum aut eousque friabilis est, ut & asperitatem habeat. Inter hos qui mediocritatem obtinet, præferendus est. Quod uero ad sapores attinet, is omnium præstantissimus esto, qui nullam refert qualitatem insignem, ut dulcis tamè alias modice exuperet. Melior quoque suauis, quàm qui ingrati saporis est: & qui salis modicum, eo qui uel permultû habeat, aut qui expertus omnino salis est.

D Qui oxygalactinus à nonnullis appellatur, omnium caseorum recetum nouellorumue præstantissimus est: ut qui in cibo suauissimus, & stomacho minime omnium noxius est, aliisque cõcoctu faciliior: sed neque uitiosum, neque usque adeo crassum præbet succum, quod uitium omnium caseorû commune esse diximus. Huius generis est qui Romæ diuitibus habetur gratissimus, *Asiæ*, nomine, & alij quidam in alijs regionibus. Quæ plures quaternis mammas habent, inquit Plinius, caseo inutilia sunt, & meliora, quæ binas. Caprarum gregibus sua laus est in recenti maxime, eam augent gratiam fumo, qualis in ipsa urbe conficitur, cunctis præferendus. Transmaria uero Bithynius fere in gloria est. Commodum ad consiciendum repo-

DE DIFFERENTIIS

nendūmq̃ caseum, lac præcipue ouillum caprinūmq̃ est, mox bubulū. E
Equinum ac asininum miscēt interdum. Bubulū fertilius caseo est, quā
caprinum. Caseos, si cerebrum mustelē coagulo addatur, negant corrumpi
uetustate, aut à muribus attingi. Tradunt Zoroastrem in desertis caseo ui-
xisse annis uiginti, ita temperato, ut uetustatem non sentiret. Vetus-
tus caseus pernæ suillē decocto maceratus ac probe in mortario subactus, arthri-
ticis, quibus tophi (quos *migra* uocant) in articulis creuerint, impositus plu-
rimū iuuat. mollis uero & qui recens iam coactus est, repulsoriam uim
obtinēt & modice frigidā. Tritus itaque uulnus mediocre cōglutināt im-
positus. Oxygalactinus autem uim habet præterea digerendi, sed paruam,
ut uel magnum uulnus, etiam in rusticano corpore glutinare possit. Sa-
prum uocant, inquit Plinius, qui cū sale & sorbis siccis ē uino tritus potūsq̃; F
medetur cœliaci. Quod hippacen uocāt, caseus est equinus: ea uirus olet,
magnopere alit, bubulūque proportionē respondet. Non desunt qui hip-
pacem equinum coagulum appellarint. Hippocrates Scytharum inuentū
hippacem dixit: effec̃que quod in equino lacte in alucolis subactus, in fundo
subsederit: quo gens illa quotidie uesceretur. Hippace exiguo gustu famem
sitimque sedat, ut Plinius author est. E lacte fit & butyrum, barbararum
gentium laudatissimus cibus. Spuma id est lactis, inquit Plinius, concre-
tiusque quā quod serum uocatur: fit autem crebro lactis iactatu in lon-
gis uasis, donec pinguior lactis pars separetur: plurimum ē bubulo (inde no-
men) & pinguiusculū, ut Galenus author est: ut uero Dioscoridi placet at-
que Plinio, pinguiusculum ex ouibus: fit & ex caprino. Quod magis ui- G
rus respuit, hoc præstantius iudicatur. Recens obsonis additum, olei ui-
cem pensat: & in bellariis adipis loco ponitur. Neque omittendum in eo
olei uim esse: & barbaros omnes infantesque nostros ita ungi. Butyrum
exiguo gustu famem sitimque sedat, conseruatque uires. Butyrum natura
oleosum & emolliens est: unde si largius sumatur, aluū soluit: & contra ue-
nena, si oleum desit, utile est. cū melle admistum dentitiones adiuuat, si ad-
fricetur. Phlegmonas quæ in mollibus sunt corporibus, cōcoquit ac discutit,
ut parotidas, bubonas, orisq̃ ac similibus partiū phlegmonas in pue-
rorum & mulierū corporibus postea quā fluxio constiterit. Cōtra uulnū
inflammationes, atque duritias efficax est butyrum, quod neque uirus res-
pit, neque uetustum est. In medicamenta additur, quæ pus mouent, præfer- H
tim in neruorum uulneribus aut cerebri mēbranarum, aut ceruicis uesticæ.
Natura butyri est mollire & (ut Dioscoridi placet) purgare, replere & car-
nem creare, & astringere quoque ut Plinio uidetur. Aspidis morfui utilissi-
me imponitur. Deuoratū uero & in corpus digestū, pleureticis peripneu-
monicisque confert plurimū, ut & liberior fiat ex creatio & materiæ cōco-
ctio facilior. Quod si syncerum butyrū linctū hauriatur, cōcoquit quidē
magis, sed spurum minus educit: uerū unā cum melle & amigdalīs amaris,
minus certe concoquit, sed educit liberius. Fuligo ex butyro collecta, in
ocularibus medicamentis exsiccādi astringendiq̃ uim habet: oculorum
fluxiones cohibet, & ulcera ad cicatricem facile perducit. Coagulū omne
ut

Caseus mollis.
Caseus muste.
Caseus uiridis.

Saprum.

Hippace.

Butyrum.

Coagulū,
ut

A ut Dioscorides prodit, & dissipata cogit, & coacta separat. Ego uero (inquit Galenus) coagulo uti, acri certe medicamēto, ad affectum aliquem qui adstrictionem desideraret, nunquam sum ausus. Porro coagulum omne acre est, facultatēque habet extenuantem, digerentem, & exsiccantem. Lac in uentre coagulatum dissecat: & sanguinem in uentriculo concretum, non leporinum solum, sed coagulum quoduis epotum: quanuis efficacius id faciat leporinū. Hædi, agni, hinnuli, dorcadis, platicerotis, dorci, uituli, & bubali coagula similes habent naturas. Coagulum hinnuli, inquit Plinius, leporis, hædi, laudatum: præcipuum tamē dasypodis, quod & profluuiio alui medetur, unius utrinque dentatorum. Et hæc quidem animalibus quæ sanguine prædita sunt, partim omnibus communia sunt, quibus uidelicet ab his quæ sanguine carent, ea differre constat: partim uero generibus quibusdam propria: de quibus accuratius generatim deinceps pertractandum iam nobis restat, ab homine exorsis.

G Si scammona aut &c. Hoc confirmant Theophrastus lib. 9. De historia plantarum, & Dioscorides lib. 2. De lacte quoque tabiarum, quantum discrepet ab aliis, leges apud Galenum lib. 5. Method. medend. E Oxygala, aliis quoque modis oxygalam conficit Columella lib. 12. Est quod aphrogala uocatur, quod æstate dant media in caloris siccitatisque leuamen: an idem sit quod hoc loco ex Plinio oxygala appellatur, coniecere potius licet quàm certi aliquid pronuntiare: cum neminem hactenus aut græcum authorem aut latinum (quod certe memini) uiderim, qui quid sit aphrogala explicet. Melca autem quid sit (quod è lacte quoque obsonium est, cuius & usus idem qui aphrogalactis est) descripsit nobis Constantinus Cæsar in agriculturæ lib. 12. ex Paxamo autore. Melcam scilicet lac esse, in ollas fictiles, quæ acrum feruescens ebiberit, coniectum repositumque: atque quod hoc pacto acidum fuerit redditum, melcam uocat. Interdum etiam &c. Hoc à Dioscoride & Plinio fit, non ad separationem, sed ne superfundatur lac cum feruet. Serum à lacte) Modus separandi describitur à Dioscoride, & Plinio lib. 28. *πρωτότυον*, aliàs *πρωτότυον*, *πρωτότυον*, inquit Athenæus, à nonnullis uocatur primum lac, quod statim ab edito fetu mulgetur.

H Caseus, Casei faciendi ratio traditur à Columella lib. 7. A Stomacho utiles, inquit Plinius, qui non sunt falsi, id est recentes. Caseus mollis, ut Plinio uidetur, alui sinit. Elixus, *ἐψιδωτός*: ita habetur in Dioscoride, sed non sine suspitione mendosi exemplaris. Caseus recens cum melle, inquit Plinius, sugillata emendat. D *βουβύς*, aliàs *βουβύς*. Latinus interpret uetus baynticus legit. an fortasse bithynius? ut idem sit, de quo statim ex Plinio. De caseorum præstantissimorum uarietate ex locis, plura habet exempla Plinius lib. 11. E Mollis, Mollem caseum, & qui recens coactus est, Columella (ut arbitror) caseum uiridem, Plinius muscum uocauit. Saprū, id est putridus caseus, uel uetustate putridus. H Fnligo ex butyro, *μαγίρης ἢ τῷ βορνίπεν*. Quo pacto colligitur ex butyro fuligo, docet Dioscorid. lib. 2.

DE DIFFERENTIIS

nendumque caseum, lac præcipue ouillum caprinumque est, mox bubulū. E
 Equinum ac asininum miscet interdum. Bubulū fertilius caseo est, quàm
 caprinum. Caseos, si cerebrum mustelę coagulo addatur, negant corrupti
 uetustate, aut à muribus attingi. Tradunt Zoroastrem in desertis caseo ui-
 xisse annis uiginti, ita temperato, ut uetustatem non sentiret. Vetus-
 tus caseus pernæ suillę decocto maceratus ac probe in mortario subactus, archri-
 ticus, quibus topi (quos ~~uiscus~~ uocant) in articulis creuerint, impositus plu-
 rimū iuuat. mollis uero & qui recens iam coactus est, repulforiam uim
 obtinet & modice frigidā. Tritus itaque uulnus mediocre cōglutinat im-
 positus. Oxygalactinus autem uim habet præterea digerendi, sed paruam,
 ut uel magnum uulnus, etiam in rusticano corpore glutinare possit. Sa-
 prum uocant, inquit Plinius, qui cū sale & sorbis siccis uino tritus potūsq; F
 medetur cœliaci. Quod hippacen uocāt, caseus est equinus: ea uirus olet,
 magnopere alit, bubulūque proportionē respondet. Non desunt qui hip-
 pacen equinum coagulum appellarint. Hippocrates Scytharum inuentū
 hippacen dixit: esseque quod in equino lacte in alueolis subacto, in fundo
 sublederit: quo gens illa quotidie uesceretur. Hippace exiguo gustu famem
 sitimque sedat, ut Plinius auctor est. E lacte fit & butyrum, barbararum
 gentium laudatissimus cibus. Spuma id est lactis, inquit Plinius, concre-
 tiusque quàm quod serum uocatur: fit autem crebro lactis iactu in lon-
 gis uasis, donec pinguior lactis pars separetur: plurimum ē bubulo (inde no-
 men) & pinguisimū, ut Galenus auctor est: ut uero Dioscoridi placet at-
 que Plinio, pinguisimum ex ouibus: fit & ex caprino. Quod magis uir-
 G
 rus respuit, hoc præstantius iudicatur. Recens obsonis additum, olei ui-
 cem pensat: & in bellariis adipis loco ponitur. Neque omittendum in eo
 olei uim esse: & barbaros omnes infantēsq; nostros ita ungi. Butyrum
 exiguo gustu famem sitimque sedat, conseruatque uires. Butyrum natura
 oleosum & emolliens est: unde si largius sumatur, aluū soluit: & contra ue-
 nena, si oleum desit, utile est. cū melle admistum dentiliones adiuuat, si ad-
 fricetur. Phlegmonas quæ in mollibus sunt corporibus, cōcoquit ac discu-
 tit, ut parotidas, bubonas, orisq; ac similibus partiū phlegmonas in pue-
 rorum & mulierū corporibus postea quàm fluxio constiterit. Cōtra uulnū
 inflammationes, atque duricias efficax est butyrum, quod neque uirus resi-
 pit, neque uetustum est. In medicamenta additur, quæ pus inouent, præfer-
 H
 tim in neruorum uulneribus aut cerebri mēbranarum, aut ceruicis uescicæ.
 Natura butyri est mollire & (ut Dioscoridi placet) purgare, replere & car-
 nem creare, & astringere quoque ut Plinio uidetur. Aspidis morsui utilissi-
 me imponitur. Deuorātū uero & in corpus digestū, pleuteticis peripneu-
 monicisq; confert plurimū, ut & liberior fiat excreatio & materiæ cōco-
 ctio facilior. Quod si syncerum butyrū linctū hauriatur, cōcoquit quidē
 magis, sed sputum minus educit: uerū unā cum melle & amigdalīs amaris,
 minus certe concoquit, sed educit liberius. Fuligo ex butyro collecta, in
 ocularibus medicamentis exsiccādū astringendiq; uim habet: oculorum
 fluxiones cohibet, & ulcera ad cicatricem facile perducit. Coagulū omne
 ut

Caseus mollis.
Caseus muste.
Caseus uiscis.

Saprum.

Hippace.

Butyrum.

Coagulum,
πύμα.

A ut Dioscorides prodit, & dissipata cogit, & coacta separat. Ego uero (inquit Galenus) coagulo uti, acri certe medicamēto, ad affectum aliquem qui adstrictionem desideraret, nunquam sum ausus. Porro coagulum omne acre est, facultatēque habet extenuantem, digerentem, & exsiccantem. Lac in uentre coagulatum diffecit: & sanguinem in uentriculo concretum, non leporinum solum, sed coagulum quoduis epotum: quanuis efficacius id faciat leporinū. Hædi, agni, hinnuli, dorcadis, platicerotis, dorci, uitulī, & bubali coagula similes habent naturas. Coagulum hinnuli, inquit Plinius, leporis, hædi, laudatum: præcipuum tamē dasypodis, quod & profluuiū alui medetur, unius utrinque dentatorum. Et hæc quidem animalibus quæ sanguine prædita sunt, partim omnibus communia sunt, quibus uidelicet ab his quæ sanguine carent, ea differre constat: partim uero generibus quibusdam propria: de quibus accuratius generatim deinceps pertractādum iam nobis restat, ab hominē exorsis.

G Si scammonia aut &c. Hoc confirmant Theophrastus lib. 9. De historia plantarum, & Dioscorides lib. 2. De lacte quoque tabiarum, quantum discrepet ab aliis, leges apud Galenum lib. 5. Method. medend. E Oxygala, aliis quoque modis oxygalam conficit Columella lib. 12. Est quod aphrogala uocatur, quod ætate dant media in caloris siccitatisque leuamen: an idem sit quod hoc loco ex Plinio oxygala appellatur, coniecere potius licet quā certi aliquid pronuntiare: cum neminem hactenus aut græcum autorem aut latinum (quod certe meminī) uiderim, qui quid sit aphrogala explicet. Melca autem quid sit (quod ē lacte quoque obsonium est, cuius & usus idem qui aphrogalactis est) descripsit uobis Constantinus Cæsar in agriculturæ lib. 12. ex Paxamo autore. Melcam scilicet lac esse, in ollas fideles, quæ acutum feruescens ebiberit, coniectum repositumque: atque quod hoc pacto acidum fuerit redditum, melcam uocat. Interdum etiam &c. Hoc à Dioscoride & Plinio fit, non ad separationem, sed ne superfundatur lac cum feruet. Serum à lacte) Modus separandi describitur à Dioscoride, & Plinio lib. 18. *ορυζήλα*, aliās *πρωγήλα*, *πρωγήλα*, inquit Athenæus, à nonnullis uocatur primum lac, quod statim ab edito serui mulgerit.

H Caseus, Casei faciendi ratio traditur à Columella lib. 7. A Stomacho utiles, inquit Plinius, qui non sunt salsi, id est recentes. Caseus mollis, ut Plinio uidetur, aliuū sistit. Elixus, *ἐψιδος*: ita habetur in Dioscoride, sed non sine suspitione mendosi exemplaris. Caseus recens cum melle, inquit Plinius, suggillata emendat. D *ἐκιδος*, aliās *ἐκιδος*. Latinus interpret uetus baynticus legit. an fortasse bithynius? ut idem sit, de quo statim ex Plinio. De caseorum præstantissimorum uarietate ex locis, plura habet exempla Plinius lib. 11. E Mollis, Mollem caseum, & qui recens coactus est, Columella (ut arbitror) caseum uiridem, Plinius mustem uocauit. Saprū, id est putridus caseus, uel uetustate putridus. H Fuligo ex butyro, *μαρμελάς* in *τῷ βορμηγόν*. Quo pacto colligitur ex butyro fuligo, docet Dioscorid. lib. 2.

H ij

DE ANIMALIVM DIFF- E FERENTIIS LIBER IIII.

De homine.

Cap. LX.

Homo.



VM animalium differentias quæ dictu dignè uidebuntur, prout natura cuiusq; admonebit generatim et ciatimque sumus notaturi, iure potissimum ab eo ordiemur quod primum est: prima autè sunt quæ perfectæ: eiusmodi uero sunt quæ animal generant perfectum, eorumque primum & præcipuum homo est: utpote quæ rerum natura, sensus iudicio & rationis capacitate præposuit omnibus. Sapiens enim est hoc animal, & unum ex omnibus animalibus nobis cognitis diuinitatis particeps, aut omnium maxime simul & prudentissimum omnium. Homo itaque cum sit animalium omnium diuino cultui maxime deditum, non abs re effectum est, ut omnium maxime erectus uiuat, superiorem sui partem ad uniuersitatis supremum erectum habes: caput scilicet, quod membrum corporis totius diuinissimum esse cæterorumque principè asserit Plato: cui totum corpus connexum subest & ueluti pareat: atque in hoc tanquam in summa corporis arce præstantissimam animi nostri partem, ipsam scilicet rationem, sedem habere dicimus. Et cum alia item animalia imaginationem habeant, quæ per sensus sit, (*φαντασία κίνησις* uocant Græci) homo unus ex numero animalium, quæ nobis cognita sunt, *ψυλλοτὴν*, id est uim obtinet cogitandi deliberandiue. Et memoriæ quidem atque disciplinæ plures animantes participes quandoque sunt: nulla tamen præter hominem potest reminisci: quandoquidem id nulli contingit absque *συμμετρίᾳ*, id est rationis quodam ueluti discursu, quid prius & quid postea factum fuerit colligere. Quod uero ad sensus attinet, homo quanquam pro corporis magnitudine minime fere omnium animalium procul sentire potest, sensilium tamen differètiarum sensu atque iudicio maxime omnium ualeat. Et in tactus quidè acumine & gustus (nam & hic tactus quidam est) homo reliqua facile superat animalia: uerum olfactum habet, non solum aliis animantibus obtusiolem, sed & omnium sensuum, qui uel in seipso sunt, maxime stupidam.

G Præstantissimam. Variam authorum sententiam de principalis animi partis sede, explicat Iulius Pollux, lib. 2. H Quod uero ad sensus. Humanorum sensuum quàm sint certa iudicia pluribus explicat Cic. lib. 2. De nat. deor. & 4. Academ. quæst.

De partibus hominis exterioribus.

Cap. LXI.

HAbet sane homo solus inter animalia caput superiorem obtinens situm, non corporis sui ratione tantum, ut cætera, sed quòd parti sublimi uniuersi

- A** uerſi reſpondeat, ut ſupra dictum eſt. Eſt autem propria naturalis que capi-
tis figura, ueluti ſi excogitares ſphæram paulo longiſculam utrinque com-
preſſam: prominet enim pars utraque, prior ſcilicet & poſterior. Facies ho-
mini tantum, nomēque à re accepisse uidetur *πρῶτον*: (quod enim unus ani-
malium homo erectus eſt, ſolus proſpicit ante uerſus uocemque ante uer-
ſus mittit.) cæteros aut roſtrum: nam piſcis aut bouis faciē dicere non ſo-
lemus. frons & alii: ſed homini tantum triſtitia, hilaritatis, clementia, ſe-
ueritatis index eſt. Supercilia homini & pariter & alterne mobilia: & in iis
pars animi, negamus an annuimus: ſupercilium homini dextrum magis
artollitur, & arcuatum magis quàm ſiniſtrū habetur. Diſtant oculi homi-
nis ſibi interuallo o proportionē magnitudinis reſpectu cæterorum anima-
B lium minimo. Puerorū omnium oculi ſtatim à partu cœſiſculi ſunt: poſt
uero immutantur in eam naturam quæ futura eſt: quod in cæteris anima-
libus non euenit manifeſte. naſcuntur etiam nonnulli altero tantum oculo
diuerſo, cæſio ſcilicet, quod item cæteris fere non contingit. Cum cæte-
ris quidem animalibus in ſuo genere fere ſingulis color ſit idem, ſolus, uel
ſaltem potiſſimum animalium homo numerofa oculorū uarietate nota-
tur: quod enim nigrum oculi dicitur, aliis atrum conſpicitur, aliis admo-
dum cæſium, aliis fuluum, aliis caprinum, quod ad cernendi claritatē pri-
matum obtinet. Sunt & oculi in homine grādiore, modici, parui, promi-
nentes, (quos hebetiores putant) cōditi: (quos clariffime cernere) præterea
alii contuentur longinqua: alij niſi prope admota nō cernunt, *αἰόων*: dicū-
C tur & luſcioſi. Multorum uifuſ fulgore ſolis conſtat, nūbilo die non cernē-
tium, nec poſt occaſum: alij interdū hebetiores, noctu præter cæteros cer-
nunt: utique nyctalopes uocantur. Augurium eſt ex homine ipſo nō timē-
di mortem in ægri tudine, quādiu oculorum pupillæ imaginem reddāt. In-
ter ea quæ pilos habent, homo unus cilium in utraque palpebra obtinet, &
parte magis ſupina quàm prona, contra quàm quadrupedum generi acci-
dat: & frequentius conuiuet homo, quàm alia. Aures homini tantum im-
mobiles: & ſitum utroque ex latere, eodem in orbe quo oculi obtinent: nō,
ut quadrupedum nonnullis, poſitæ ſuperius ſunt. mobiles eſſe nares natura
uoluit, nec ſicut aures immobiles. Labra homini mollia, carnoſa, & quæ ſe-
parari poſſint data ſunt: tum dentium tuendorum gratia, ut & cæteris, tum
D etiam ad uſum ſermonis agilia. Barba nō pari modo effunditur omnibus,
ſed aliis tam muſtax, quàm maxillæ & mentum, pilorum frequentia inte-
guntur: aliis mentum leue & muſtax, maxillæ uero piloſæ cernuntur. Ho-
mo contra quàm cætera animalia dentibus carens uenit in lucem, niſi quid
præter naturā interceſſerit: pueri deinde ſeptimo menſe dentire incipiunt:
primo edunt primores, alij ſuperiores, alij inferiores: ſed fere ſuperiores, uti
Plinio uidetur. Denique omnes maturius dētiunt, quorum nutrices lac ha-
bēt calidius. Mutantur poſtea homini dentes (ſicuti & quibuſdam aliis) pri-
mores: nam ſeptimo eodē decidere anno, aliōſq; ſuffici palam eſt: at ca-
mini amiſſi caſu aliquo, nunquā renaſcuntur: & maxillares nullū animal mu-
tat, ut dictum eſt. Homini nouiſſimi maxillares, quos genuinos uocamus,

DE DIFFERENTIIS

circiter uicesimū annum gignuntur & uiris & mulieribus. Iam uero quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idem euenisse accepimus: quod certe iis accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint: sed quibus in iuuenta non fuere nati, inquit Plinius, decidere in senectā, & mox renasci certum est. Dentes habet plures mas, quā scēmina. tricenī bini uiris tribuuntur, scēminis minor numerus. Aliqui uice dentium continuo osse gignuntur. Hominum dentibus quoddam inesse uirus traditur: nanque & speculi nitorem ex aduerso nudatos hebetare, & columborum scetus implumes necare. Linguam habet homo absolutam maxime, mollissimam & latam: ut sit non ad sapores solum percipiendos, sed ad literarū explanationem, & sermonis expressionē accommodatissima. Latū pectus humanū est, cetera angusta. Et prāter hominē nullum est animalīū, quod mammas parte gerat priore. Mammas homo solus ē maribus habet: cetera animalia mammarum notas tantum: maribus mammæ conspectiores & scēminationes tum iunioribus tum senioribus efficiūtur, qui humidiores, leuiiores, nec uenulenti sunt: eorūque ipsorum, iis magis qui fusi, quā qui candidi sunt. In mammis etiam maribus lac fieri potest: uerum caro iis spissā, mulieribus fungosa foraminulentaque. uiris post pubem exiguum nōnullis lac exprimitur: ueruntamen per suctum frequentiore, uel multum prodisse aliquibus traditum est. In muliere lac quod ante septimum mensem contractum est, inutile est: sed simul infans natalis est, & lac esse utile incipit: prius autem falsum etiam est, ut pecoris. Mulieris lac commodius lactentibus est, ex Aristotelis sententia, quod liuorem trahit, quā quod candidum est: & fuscæ salubrius quā candidæ. Galenus candidū lac, Paulus quod nō solum crassitudine, odore, & sapore, sed & colore quoque mediocre est, commodius arbitratur. Maris genitale foris prominet & ante habetur, testēsque absoluti pēdent. Genitale illi cartilaginofum carnosūque, quod ut parte carnosā inflari nequit, sic cartilaginosa intumescit. Homo unus sanguineorum cauda uacat: nates habet, quod nulli quadrupedū datum est. Homo uice pedum priorum brachia habet & manus: & ungues in digitis habet rectos ac latos. Solus quoque animalium ambidexter, hoc est dexter utraque manu nascitur. Hominis digiti articulos habet ternos: pollex binos, & digitis aduersus uniuersis flectitur: per se uero in obliquum porrigitur, crassior ceteris. Huic minimus mensura par est: duo reliqui, sibi: inter quos medius longissime protenditur. Digi quibusdam in manibus seni. Inflexus articularum tum brachij, tum digitorum omnium agitur ad interiora. Crura homini scēmore suraque carnulenta sunt: nullamque fere sui corporis partem, tam carnosā habet, quā nates, scēmorā, tibias: (quas enim suras uocamus, non nisi carnis copia parte tibie posteriore complentur) cum cetera animalia quæ cruribus constant omnia, uacua carne hæc habeant. Sura aliis retracta ad poplitem est, quibus scilicet nates sunt pleniores: alii detracta, quibus graciliores. In ipsa genu utriusque commissura dextra læuāque, à priore parte gemina quædam buccarum inanitas

Nates pleniores, in γέννηται ἰχθίν.

A nitas inest, qua perfossa, ceu iugulo, spiritus fugit, ut Plinius auctor est. Homini pedes omnium maximi proportionem magnitudinis: quibus pars interior plantę non caua, sed ita pleniuscula est, ut solū toto attingat uestigio, ij uersuti sunt, ut inquit Aristoteles, & fraudulentū. Digitorum manus magnitudo, contra quam pedis est. manus enim longos, pes uero breuior habet digitos. ungues habet homo pro digitorum magnitudine minimos. Homo cōtra atque cetera animalia inflectit crura brachiaque: quippe qui brachia in posteriora flectat, (quanquam ita ut paulum uergant ad latera interiora:) crura autem in anteriora. Partes naturales hominis unius, secundum naturam dispositę sunt, tam superiores quàm inferiores: quandoquidem partem superiorem ad uniuersū supremū erectam obtinet: solus enim animalium erectus incedit. Homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quàm inferiorem, cōtra quàm cetera animalia quę sanguine constant: (partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, qua exitus patet excrementis: inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquū corporis.) homo nanque in prima ipsa ætate, antea quàm adolescat, partem superiorem corporis habet maiorem quàm inferiorem: & quò per ætatem amplius augetur, eò contra euenit, ut inferiora superioribus magis crescant, donec ad iustam peruenerint magnitudinem. Quamobrem unus ipse non eodē modo ingredi solet, infirma adhuc ætate, quo iam firma ingreditur: sed dum infans est principio, ne serpere quidem potest, sed immobilis iacet: deinde C primum quadrupes reptat: postea se erigit, bipēsque incedit, nisi formam po- Natalis. milionis habeat. Est autē pomilio cuius pars superior magna est, inferior, quę sustinet pondus motumque exerceat, parua. Parti dextrę habilior adscribitur motus, leuā firmitas maior: unde altera gestulationibus promptior est, altera oneri ferendo accommodatior. Vires tamen quibusdā dextera parte maiores esse, quibusdā æquas utraq; aliquibus leuā manu precipuas obseruatum est.

D Quosdam etiam cum dentibus esse natos, exempla sunt & apud Plinium & Solinum. Genuini, *negerrime, & alij.* F. Natalis, *γεννητός*, id est ad partum habilis: Plinius uitalem dixit. Quod liuorem trahit, *παραλινός*, id est quod ad liuorem accedit, uel subliuidum. H Pollex, inquit Aristoteles, uno inflectitur nodo, ceteri binis adducuntur: ut uero Galenus, compactus pollex est ex triplici osse: primūque eius internodium tanquam palmę pars minime est accipiendum. A Partes etiam crurum brachiorumque, quo pacto & contrario modo inter se flectantur, & contra quàm in ceteris animalibus, pluribus explicat Aristoteles lib. De gressu animalium.

De partibus interioribus hominis, & similaribus. Cap. LXII.

Homo plurimum cerebri proportionem magnitudinis, ac humidissimū habet: & mas plus quàm femina. Vni animalium homini cerebrum in infantia palpiat, nec roboratur ante primum sermonis exordium. Cor animalibus ceteris in medio pectore est: homini tantum infra leuam papillam turbinato mucrone in priora emens. Est hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorum animal procreantium est: nec leuis,

DE DIFFERENTIIS

sed inæquabilis est. Fibras habet, quas *ascor* uocant, quatuor quidem maiores, utraque scilicet parte binas: unam autem simplicem & minorem. Rotundum hominis iecur est, ac simile bubulo: superne quâ manu tangitur, gibbum est, intrinsecus cauum. Iecur quatuor fibras habet, in iis duntaxat qui procero corpore sunt, uti Theophilus prodidit: non in omnibus enim hominibus fibrarum numerus similis conspicitur, sicuti neque magnitudo. etenim uti recte scripsit Herophilus, in quibusdam ne fibras quidem habet iecur, sed ex toto rotundum est: quibusdam duas, aliis plures, nonnullis quatuor. Iecori fel adnexum habetur: aliqui tamẽ eo carere uidentur, quorum ualetudo, inquit Plinius, firmior, & uita longior. Carent eo qui absinthio uescuntur in Ponto. Est hominis lien suillo similis specie angusta & longa. Hominũ renes, inquit Aristoteles, similes bubulis sunt: quippe qui tanquam compositi ex multis exiguis renibus consent: neque æquabiles sunt, quomodo renes ouium cæterarumque quadrupedum habentur. Galenus uero eorum figuram, ea parte qua uenæ atque arteriæ in ipsos inferuntur, simam esse prædicat: altera uero, quæ illi parti opposita est, plane rotundam. Ventriculus humanus canino similis est: (quippe qui nõ multo amplior sit quàm intestinum) figura illi rotunda, sed oblongior, & quasi intestino similis ampliori. Intestina homini suillis ac simiarum proxima sunt: in quibus quod colon appellatur, amplius est: & quod post ipsum in sedem porrigitur, breue id corpulentumque est. Omẽtum homini proportionẽ magnitudinis maximum est: oritur id & dependet à medio uentre, quâ ueluti futura ducitur. Est & hominis uesica proportionẽ, quàm cæterorum amplior. Sanguis homini tenuissimus ac purissimus est: extremumque sanguinis uitium habetur, cum sit uel in picis liquidæ modum crassius, uel serosius adeo, ut posteaquam è uena effusus concreuerit, plurimum habeat liquidi humoris supernatans: optimus uero qui inter hos medius est. Omnium fœminarum maxime mulier sanguine abundat: & quæ menstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent. Sunt & hominis uenæ crassæ proportionẽ humani corporis. Inter ossa incipit ultimum confirmatur: iam enim cum partus in lucem uenit, molle hoc infantis os est, palpitâtque, ut antea dictum est. Caluaria homini raro solida sine futuris est: sed tamen & uiri caput uisum sine ulla futura est. Spina hominis ex uertebreis quatuor & uiginti constat: (excepto etiam osse sacro) nam in reliquis, ex pluribus compacta est. Homo omnium animalium, quæ pilos habent, nudissimo corpore est: pilis enim paucissimis exiguisque integitur, nisi in capite: qua quidem parte, hirtillimus omnium ipse est. Et cum cæteris, quæ pilis uestiuntur, partes pronæ pilosiores sunt, supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur: homo contra. Cilium etiam homini utraque in palpebra, ut dictum est: & alæ oppletæ pilis, & pubes, quod cæteris deest. Pili in homine omnium animalium uno, partim simul, partim postea per ætates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, superciliorũ & palpebrarum: postgeniti pubis primum, mox alarum, postremo mentis: loca enim quibus pili proueniant, totidem sunt congenitis deputata, quot post

Colon, Theodorus alius interpretatur.

- A post genitis. Deficiunt ac defluunt maxime primique per ætatem pili capitis, non tamen omnes, sed tantum primores. ergo capitis leuitatem caluitium nuncupamus, Græci *καλιόνηται* dicunt: quam rem in superciliis *αἰσκαλιόνηται*, hoc est salitium appellamus, quoad melius uocabulum inuenierimus, inquit Theodorus. Mutatur color pilorū in senectute: cādidiq; pili efficiuntur in hominibus, quod uel in quibusdā aliis, uerum per paucis animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo: hunc pilorum candorem caniticism uocamus, Græci *καλιόνηται*. Caluitium uni tantum animalium homini, præterquam innatum: parte itaque capitis priore nonnulli caluescunt. sed pueri aut mulieres raro caluescunt: uiri autem procedente ætate sapius calui euadunt. necnon capite homines senescentes canescunt, quod uulli fere ex cæteris accidit manifeste. Canescunt homines primo temporibus: sed nemo uel temporibus, uel occipite caluescit. Pili post geniti iis, qui ante pubertatem caltrati sunt, nō exeunt, & post pubertatem excisis, soli decidunt, præterquā pubis: hæc enim quanuis minuat, tamen manet. congeniti uero iis non defluunt: nemo enim spado caluescit. Pili in mento mulieris non prodeūt, nisi interdum pauci: reliqui pili qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniūt, sed parcius. Fieri potest, ut homo tum mas tum etiam femina pilis post genitis careat, iam inde ab ortu naturæ uicio contracto: & nisi ut pubescant contingat, steriles in gignendo sunt. Crescūt pili quibusdam in morbis, ut præcipue in tabificis: quinctiam in senectute & defuncto augetcūt durioresq; redduntur, quod
- C idem quoque unguibus euenit. Copiæ pilorum defectusq; discrimina pro corporis temperatura, atque pro cutis qualitate proueniūt. Qui enim calida & sicca interperie sunt, magna ex parte hirsuti euadunt: uerū hoc, si in summo fuerit: mediocriter autem, si calida quidem est interperies, sed in altera cōtrarietate mediocritatem habeat. similiter & quæ sicca quidem, sed in calido & frigido media est temperie: est enim ea quoq; modice hirsuta. Raro pilo sunt omnia frigida temperamenta, siue ea mediocriter se habeant in humiditate, siue immodice. Cæterum ad summum glabra est frigida temperies & humida: minus hac quæ frigida est, sed in altera cōtrarietate temperata: adhuc minus, quæ frigida & sicca est. Nō ut in cæteris animalibus quæ pilum habent, colorū causa cutis est: qui enim alba sunt cutē, nonnunquā nigros admodū habent pilos. Cutis homini proportionē magnitudinis tenuissima est: ea uero quæ in manu est, quā proxime ad mediocritatem accedit: ideōque & tactus instrumentum in homine præcipuū est. cutis quoque affectus secundum naturam est, tum Ægyptiorum nigritia, tum Gallorum candor, tum Scytharum rufus color.

De uoce hominis, & somno.

Cap. LXIII.

Vocem quidem mittunt & alia animalia: nullū tamen aliorū est, quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Qui surdi iam inde ab ortu naturæ sunt, iidem etiam muti. uocem ergo emitte possunt, locutionem autem nullam. Pueri ut cætera sua membra continere ac regere nequeunt,

φιλίσιος ἐστὶ
Ἰασηλίζουσα.

sic etiam linguæ sunt impotentes, & serius lingua absoluntur: itaque magna ex parte balbutiunt, tortæque lingua sunt. Infantis nascentis uox nulla auditur antequam totus emergat utero. Primus sermo anniculo est: qui celerius fari cœpere, tardius ingredi incipiunt. Vox roboratur à tredecim annis, eadem in senecta exilior: neque in alio animalium sepius mutatur. Differunt tum uoces tum locutiones tractus ratione & regionis: locutioque ipsa non perinde ut uox per naturam prouenit, sed per disciplinam acquiritur: unde homines quoque locutione utuntur uaria, cum uocem omnes reddant eandem. Homo genitus premitur somno per aliquot menses: deinde longior in dies uigilia. Infantes primis quadraginta diebus neque ridet cum uigilant, neque lachymantur, sed noctu & per quietem utrumque interdu faciunt. somniatque statim infans: nam & pauore expergiscitur, & suctum imitatur. Homo maxime animalium somniat: sed editis nuper in lucem, & infantibus adhuc, nullum ita cōtrahitur somnium, ut meminisse possint imaginum: sed plurimis anno circiter quarto aut quinto ætatis, uisæ incipiunt. Produntur tamen & uiri & mulieres, qui nūquam quicquam somniarint: quorū nonnullis in processu ætatis accidit, ut uiso somnio mutarentur habitu sui corporis, uel in mortem, uel in morbum.

De hominis generatione & partu, atque de iis quæ
ad hæc pertineant. Cap. LXIIII.

Semen habet homo pro corporis magnitudine plurimū: & homini maxime omnium animalium temporibus omnibus oportunus coitus est. G Cæteris enim animalibus statim per tempora anni concubitus: homini uero omnibus horis dierum noctiumque: cæteris satietas in coitu, homini prope nulla. Stimulatur ad uenerem mas hominum magis tempore hyberno, femina æstiuo, ut Hesiodus prodidit. Ætas uero accomodata ad coitum innotescit homini, tum uocis mutatione, tum etiam testium non magnitudine tantum, uerum etiam specie: quemadmodum etiam mammis declaratur, sed præcipue ortu pilorū pubis. Mas semen genitale magna ex parte incipit ferre anno peracto bis septimo: simul etiā pubescere incipit eo tempore. Vox item per id tēpus mutari in sonum asperiores inæquabilioresque incipit: quanquam nondum grauis, neque acuta præterea est, neque tota æquabilis. Mammæ etiam extuberant: & genitale nō solum magnitudine, H sed etiam specie proficit. Fœminis etiam per id tempus exurgunt ubera: & quæ menstrua uocantur erumpunt: & uox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. In puellis item diuersitas uberum est alius enim admodum magna, aliis exigua sunt: euenit sane ut immodice crescant, cum puellæ excrementis redundant. Semen profecto infœcūdum usque ad bis septimum annum est: mox prolificum quidem est, sed exigua imperfectaq; generant iuniores & mares & feminae, ut in cæterorum quoque animalium plurimis euenit. Concipiunt quidē facilius natu minores: sed ubi cōceperint, laborant in puerperio uehementius: corpore etiam minus magna ex parte perficiuntur: & senescunt celerius mares salaces, & mulieres quæ frequētius

- A** frequentius pariant: nam ne incrementum quidem post tertium partum effici posse uidetur. Post annum ter septimū mulieribus quidē opportune iam procreatio est: sed uiris accedere aliquid potest adhuc ad perfectionē. Homo mas ad annū usque septuagesimum, uidelicet termino ultimo potest generare: scēminā usque ad quinquagesimum, uerum id raro: paucis enim proles in eo atatis tēpore procreata est: sed magna ex parte maribus sexagesimus, aut quintus & sexagesimus annus finis prognerandi est: scēminis quintus & quadragesimus. Bipedum solus homo animal generat: & homo maxime sua natura uniparum est: cum omnibus tamen generibus ambigit: nam & uniparum, & pauciparum, & multiparum interdum est: hinc tempus etiam uteri ferendi enorme unum hoc animal fortitū est. cē-
- B** teris enim unū est tempus: homini uero plura sunt. Nam & septimo mense & octauo & nono parere potest: & quod plurimū, decimo, nonnulla etiam undecimum attingunt. Fœtus qui maturius quā septimo mēse prodeat, nullo pacto uitalis est: septimo, non nisi pridie posterōue plenilunij die aut interlunio concepti nascuntur, ut Plinius author est: qui septimo mense, uitalis quidem hic primus exit: sed magna ex parte infirmior. Nonnullis etiam meatus quidam infissi, ut aurium & nariū, sæpenumero generantur: sed accrescenti articulantur infanti, & demum suam formam recipiūt: & in his multi etiam uiuere atque adolescere possunt. Qui autem mēse octauo nascuntur, non nisi perpauci seruantur: unde fit ut si quis in locis saltem Græciā seruetur, non octauo mense natus existimetur, sed mulierem
- C** sui conceptus initium latuisse. Simili modo & qui diuturniores quā undecimo mense nasci uidentur, eorum conceptus initium latere putatur. Ita multiplex perficiendi tempus, pariēdisque diuersum homini datum est. Et cum alia singulos pariant fœtus, alia plures, genus humanum, uti diximus, in incipiti est. Nam quod plurimum & locis plurimis agitur, mulieres singulos singulæ pariunt: sed sæpe geminos etiam: (nam in Ægypto plerumque geminos pariunt) quandoque etiā & tres & quatuor: sed quinque cum plurimum nascuntur: iam enim hoc pluribus euenisse cōspectum est. Et quādam uiginti, partibus quatuor edidit: quinque enim singulis partibus enixa est. Verum supra ter geminos nasci, inter ostēta adducitur, (ut inquit Plinius) præterquam in Ægypto, ubi fœtifer potu Nilus: quo in loco septenos
- D** uno utero simul gigni author est Trogus. Et cū in cæteris animalibus gemini nati, etiam si mas & scēmina sint, nihilominus enutriantur seruēturque, quā si mares ambo aut scēminæ sint: in genere certe humano pauci gemini seruātur, si alter mas sit alter scēmina. E geminis si remanēte altero alter abortiuo fluxu exciderit, alter qui legitime natus est, uopiscus nominatur. Vopiscus. Mulier grauida quidem maxime fere animaliu coitum patitur: uerum raro euenit ut superfœtet, sed factum tamē aliquando est. Qui itaque longo post tēpore sine cōcepti, minime perfici possunt, sed præmaturius dolore, quo ipsi & primus fœtus intercāt, mouēt. At uero si proxime à primo cōceptu secundus sit factus, alio lui ediq: potest quod superfœtari: ut quasi gemini nasci uideantur: quomodo Hercule & Iphiclem procreatos esse fa-

bulantur: unum quidem omnino, aut alterum superferat mulier. Extat in E monumentis etiā medicorū, & quibus talia cōsecrari curę fuit, uno abortu duodecim puerperia egesta. In ferendo etiā utero homines cum ceteris animalibus dissident: cum enim cetera animalia plurimum temporis valeant corpore cum utero ferunt, mulieres magna ex parte ægre degūt. Quibus autem gentibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, iis nec uterus tam difficulter gestatur, & partus facilis est. denique quibus suis locis mulieres quæ laborare consueverunt, facilius pariunt. Omnium animalium mulieribus inter fœminas plurima mentium purgatio euenit: ut uero Democritus phisicus ostendit, mulier solum animal menstruale est. Conceptus mulieribus à menstruorum profluuiio sua natura contingit: & quæ iis carent, steriles magna ex parte exigunt uerum fieri potest, ut aliquę etiam sine eorum profluuiio concipiant, uidelicet quibus tantum humoris colligitur, quantum iis mulieribus, quæ purgātur restare solet: quanquam non tanta copia ut & foris possit profluere. Sunt quibus prægnantibus etiā menstrua usque in postremum gerendi tempus eueniant: quibus accidit ut paruos fœtus pariant, & proles aut minus uitalis, aut infirma procreetur. Desinunt plurimis menstrua circa quadagesimum annum: quod tempus quæ excederint, iis ad quinquagesimum seruantur nonnūquam: etiā nonnullæ eo tempore pepererunt, ut dictum est: sed ultra hoc tempus nulla potest protrahere. Et ipsæ fœminæ quibus munus est necessitatis huiusmodi, quandiu sunt in sua lege, non innocentibus oculis contuentur: aspectu specula uitiant, ita ut hebetetur uisū fulgor offensus, & solitam æmulationem uultus extinctus splendor amittat, faciēsque obtusi nitoris quadam caligine nubiletur. Mulierum aliæ in æternum steriles sunt: aliæ mutatis coniuigiis exuunt sterilitatem: nonnullæ tantum semel pariunt: quædam autem fœminas aut mares semper. Euenit quippe multis & uiris & mulieribus, ut qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum aliis, queant. Quod idem in maris quoque aut fœminæ procreatione nimirum euenire certum est. plerunque enim tum mulieres tum uiri, quandiu cum eisdem iunguntur, fœminam tantū marēque procreant, seiuncti autem cōtra. Etatis etiā ratione immutātur, ut scilicet iuuenes inter se fœminas generent, seniores facti, mares, aut contra. Et qui iuuenes nihil procreent, seniores iam incipiant generare: aut contra, ut qui ante possent, post nihil possint fecundificare. Sunt etiā aliæ mulieres, quæ uix concipiant: sed si concipiant, perficiant atque edant: aliæ contra, facile quidem concipiunt, sed seruire non possunt. Sunt & uiri qui non nisi fœminam procreent, & mulieres quæ non nisi marē: & contra, ut de Hercule fabulantur, qui inter duos & septuaginta liberos, fœminam unam tantūmodo genuit. Quæ concipere nequeunt, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, fœminam magna ex parte pariūt potius quā marē. Multis etiā uiris euenit, ut cum antea possent generare, post nequeant: deinde rursus facultatem recipiant generandi. Fœtus in utero in semet conglobatus, sic gestatur, ut nasum inter genua habeat. Nascuntur pueri (ut cetera etiam animalia)

A lia) in caput uerſi: in pedes autem procedere naſcentem, contra naturā eſt: quapropter uelut agre parti appellantur agrippæ. Ita editi minus proſpere uiuunt, & de uita æuo breuiori decedunt. Sed pueri manus quoque ad eoſtas porrectas extenſaſque habent: qui cum exierint, uocem ſtatim emittunt, & manus in os admovent. Excremētum etiam reddunt, aliſj ſtatim, aliſj breui, ſed omnes intra diem: quod excremētum copioſius quā pro infantis magnitudine eſt: *μακρόν*, id eſt papauerculum hoc mulieres uocant, colore cruentum arque admodum nigrum & piceum eſt: poſtea lacteum iam & albidum redditur: ſugit enim conſeſtim ubera infans. Vocem antequam egrediatur nunquam emittit, uti ante dictum eſt: etiamſi cum diſſiciliter egreditur, caput extet, corpus intus ſit totum. Naſcentium uox prima uagitus eſt: lætitiæ enim ſenſus diſſertur in quadrageſimū diem. Nam infantes, ut modo diximus, primis quadraginta diebus, neque rident cum uiſilant, neque lachrymantur: ſed noctu & per quietem utrunque interdū faciunt: nec uero ſentiunt magna ex parte, cum ſcalpuntur. Plurimam huius temporis partem dormiunt: cæterum in dies quō ſubinde auctiores fuerint, eō magis ad uiſilandum immutantur. Pueris ſinciput, ut modo diximus, molle eſt, ſerōque duratur: cum tamen cæteris animalibus diſcrimen oſſium nullum ſit: ſed omnia perfectā iam à natiuitate proueniant.

Fœminæ non ſimiliter atque mares perficiuntur: quippe cum & intra partem fœminæ tempore longiore conficiatur quā mas: & ubi in lucem uenerint, celerius fœminæ quā mares perficiantur. Nam & pubes & uigor C & ſenectus fœminis prius uenit quā maribus. Partus cæteris quidem animalibus minime laborioſi eueniunt: at mulieribus dolores uehementiſſimi incidunt, & præcipue ſtabilibus & ſellulariis, & quibus nō bona latera ſunt, neque facultas retinendi ſpiritus ſuppetit. Poſt partum purgationeſque lactis copia excitatur, & nonnullis effluit non ſolum de papillis, ſed etiam paſſim per ubera: aliquibus etiam per alas. Edurāt in poſterū globuli, (*γαγγανίαι* dicunt) quoties humor non coquatur nec exeat, ſed redundet: ubera enim tota fungoſa ita ſunt, ut ſi in poculo pilum forte hauſerit mulier, dolor moueatur in mammis, quod malum *τεχία* uocant, id eſt pilare appellant: nec ſedatur, donec pilus uel preſſus exeat ſponte, uel cum lacte exugatur. Solent pueri plurimi conuulſione excipi: & præcipue corpulentiores, D & lacte ueſcentes copioſiore aut craſſiore, & nutriceſ lactentes ſucci plenam & corpulentam. Plurimi ante ſeptimum diem intereunt: plenilunio etiam infeſtantur hoc malo periculoſius. Et quia ſolus homo, aut certe maxime animantium omnium homo comitiali morbo in tenera ætate laborat, quod morbi genus tranſuertere oculos, ſicut & cætera etiam membra poteſt, eō fit, ut ſoli aut certe maxime animantium homini oculi deprauentur per limitatem, ſiāntque limi. Mares potius quā fœminæ oblati mutillæ in genere hominum naſcuntur: cum in cæteris animalibus nihilo potius mares quā fœminæ ita proueniant.

A Exant apud Plinium & Solinum exempla quorundam, qui uel poſt ſeptuageſimum annū liberos genuiſſent. D De paruum ſuperſtitatione exempla uideas apud Ariſtotelem lib. 7. hiſt. animalium, & Plinium lib. 7, & Solinum cap. 4.

Hominis uita, ætates & statura.

Cap. LXV. E

*Alias, ad qua-
dragesimū ue-
ro inuentam.*

V luit homo plus temporis quàm quoduis animal, excepto elephanto, quod quidem usu rerū adhuc fide digno nouerimus, inquit Aristoteles: quanquam alij aliter sentiant, uti ex Hesiodo circumferuntur uersus. Tertia secula hominis transmittit garrula cornix. Quatuor & peragit cornicis tempora ceruus. Porro ætatū gradus Varro ita distinxit: pueritiā ex puritatis ratione ad quintumdecimum extendit annum: inde ad tricesimum, ad adolescentiam: ad quintum uero & quadragesimum iuuetam: ad sexagesimum denique senectutem: in qua qui agunt, iam uocantur senes. Quinquennio fere corpus in homine quidem dimidium capere uidetur omnis magnitudinis eius, quæ reliquo toto tempore comparetur, ut sentit Aristoteles. In trimatu suo, inquit Plinius, cuique dimidiam esse mensuram staturæ certū est. Homo crescit in lōgitudinem ad annos usque ter septenos: tum deinde ad plenitudinem. Maxime autem pubescens, nodum quendam soluere, & præcipue ægritudine sentitur. Proficere uero homines ad annum usque tricesimum, aut longitudine aut crassitudine prodit Aristoteles. Corporis mensuræ ratio bisariam conuenit: nam quantus manibus expassus inter digitos longissimos modus est, tantum constat esse inter calces & uerticem. Nunc si de ipsis hominum formis requiramus, liquido manifestabitur, inquit Solinus, nihil de se antiquitatem mendaciter prædicasse, sed corruptā degeneri successione sobolem nostri temporis, per nascētium detrimenta decus ueteris pulchritudinis perdidisse. Licet ergo plerique definiant nullū posse excedere longitudinem septem pedū, quòd intra hunc modum Hercules fuerit: præcorū tamen molem testantur etiam Orestis suprema, cuius ossa Tegeæ inuenta à Spartanis didicimus implese longitudinem cubitorū septem. Procerissimum hominem ætas nostra, inquit Plinius, diuo Claudio principe, Gabbarum nomine ex Arabia aduectum, nouem pedum & totidem unciarum uidit. Iam uero ante tot annos uates ille Homerus non cessauit minora corpora mortalium, quàm præca conqueri. In India multos quina cubita constat longitudine excedere. Oniscritus, quibus in locis Indiæ umbræ nō sunt, corpora hominum cubitorum quinū & binorū palmarum existere prodidit: & uiuere annos 130, nec senescere, sed ut medio æuo mori. Cirnos Indorum genus Isigonus tradit annis centenis quadragenis uiuere.

G Longitudine septem pedum. Et alia inueniuntur exempla magnitudinis humanorum corporum, & apud Plinium & Solinum.

Multiformes hominum effigies, & mira quædam de hominibus alia.

Cap. LXVI.

*Hippopodes
Alias, Tuman
montis.*

E T monstriferæ narrantur hominum effigies: à litore Scytharum tridui nauigatione feruntur insulæ, in quibus equinis pedibus homines nascuntur, Hippopodes appellati: aliæ in quibus nuda alioqui corpora prægrædes ipsorum aures tota integant. In quadam conualle magna Imai montis regio quæ uocatur Abarimon, in qua syluestres uiuunt homines, a uersis post crura plantis, eximiæ uelocitatis, passim cū feris uagantes. Hos in alio non spirare

- A spirare solo, ideôq; ad finitimos reges non pertrahi aiunt: & in quadâ Afri-
cæ parte quoque homines feri sunt, & uiri & mulieres. In Scythia iuxta se-
ptentrionem produntur Arimaspi uno oculo in fronte media insignes: id
quod ne crediderim quidem, inquit Herodotus, ut uiri nascantur uno oculi,
cæterum naturam habentes hominibus parem. Ferunt certe in Æthiopia
ab orientis parte intima, gentes esse sine naribus, æquali totius oris planitie:
alias superiore labro orbas, alias sine linguis. Pars etiam ore concreto & na-
ribus carens, uno tantum foramine spirat: potumque calamis auenæ trahit,
& grana eiusdem sponte prouenientis ad uescendum: quibusdam pro ser-
mone, nutus motusq; membrorum. Megasthenes gætem inter Nomadas
Indos narium loco tantum foramina habentem prodit. Supra Nasamonas
B confinésque illis Maclias Androgynas esse utriusq; naturæ, inter se uicibus
coeuntes, Caliphanes tradit: Aristoteles adiicit, dextram māmam iis uiri-
lem, læuam muliebrem esse. In monte cui nomen est Milo, homines esse a-
uersis plantis, octonos digitos in singulis pedibus habentes, author est Me-
gasthenes. In multis autem montibus genus hominum, capitibus caninis,
ferarum pellibus uelari: pro uoce latratum edere, unguibus armatū: uena-
tu & aucupio uesci. Ctesias scribit, in quadam gente Indiæ fœminas semel
in uita parere, genitōsque confestim canescere: esse rursus gentē alteram
quæ in iuuenta sit cana, nigrescat in senectute, ultra æui nostri terminos
perennātem. Perhibent esse & gentem fœminarum in Calingis Indiæ gæte,
quæ quinquennes concipiunt: sed ultra octauum annum uiuendi spatium
C non protrahunt. At Cirnos Indorum genus Isigonus tradit annis centenis
quadragenis uiuere. Legimus quoque Monoscelos in India nasci singulis
cruribus, & singulari pernitate ad saltum, eisdemque Sciopodas uocari:
qui in maiore æstu humi iacentes resupini, umbra se pedum protegant: nō
longe eos à Troglodytis abesse: rursusq; ab his occidentem uersus, quosdam
sine ceruice, oculos in humeris habentes. Sunt & Satyri in subolanis Indo-
rum montibus, perniciosissimum animal, tãquam quadrupedes: tamen recte
currētes, humana effigie, ut propter uelocitatem, nisi senes aut ægri, non
capiantur. Satyri cum senuerint Sileni uocantur, inquit Pausanias. Euphe-
mus prodidit in insulis, quæ Satyrides in extero mari uocantur, incolas ru-
fos esse, & caudas habere haud multo equinis minores. Satyri in Æthiopia,
D ut inquit Plinius, in Lybia, ut Solinus, de hominibus nihil aliud præferunt,
præterquam figuram. India præterea habet genus hominum, qui non alia
quàm testudinis carne uiuūt: hirsuti omnia facie tenus, quæ sola levis est:
iisdem coriis piscium uestiuntur, Chelonophagi cognominati. Blemmyas
in Æthiopia credunt truncos nasci parte qua caput est: os tamen & oculos
habere in pectore. Himætopodes flexis nilibus crurum, repūt potius quàm
incedunt, & pergunt usum lapsu magis destinant quàm ingressu. Post uas-
tam Ægypti solitudinem feruntur Cynoprofopi homines habitantes, qui
ex uenatu dorcadum & bubalorum uiuunt, nigro aspectu, capite & den-
tibus caninis: uocis quidem expertes, sed strident acute. eorum manus ro-
bustis armantur unguibus arque acutis: similiterque toto pectore, ut capite

Satyri.
In Æthiopia,
inquit Solinus,
Cyn. Plin. quo-
que lib. 5. ca. 8.
Sileni.

Cynoprofopi.
Cynocephali.

DE DIFFERENTIIS

ipſo, hirsuti habentur, pedum celeritate ualent. Cynocephali ex eo nomen E
traxere, quod caninum caput habeant, cætera membra homini ſimilia. Fer-
rarum pellibus induuntur: & iuſtitie retinentes lædunt neminem: cùmq;
Indici ſermonis intelligentes ſint, nihil tamè loquuntur. Choromadarum
gentē uocat Tauron ſylueſtrem, ſine uoce, ſtridoris horrendi, hirtis corpo-
ribus, oculis glaucis, dentibus caninis. Eudoxus in meridianis Indiæ uicis
plantas eſſe cubitales prodiit: ſcæminis adeo paruas, ut ſtrutopodes appellè-
tur. Megathenes ad extremos fines Indiæ ab oriente circa fontem Gangis
Aſtomorum gentem ſine ore, toto corpore hirtam: ueſtiri f. ondiū lanu-
gine, halitu tantum uiuentem, & odore quem naribus trahit: nullum illis
cibum, nullumque potum: tantum radicum florumque uarios odores ſyl-
ueſtrium malorumq; ſecū portant longiore itinere, ne deſit olfactus: gra-
uiore paulo odore haud difficulter exanimari. Super hos extrema in parte F
montium, ſpithamæi Pygmæi narrātur, ternas ſpithamas longitudine, hoc
eſt ternos dodrantes non excedentes. Quidam & Pygmæorum gētes pro-
diderūt ante paludes ex quibus Nilus oriretur: ubi & cum gruibus pugna-
re dicuntur. Degunt uero in cauernis: neq; id fabulam eſſe arbitrat̃ur Ari-
ſtoteles. Strabo autē qui uidiſſe ſe diceret, fide dignum neminē eſſe prodiit.

Homini, quæ ex homine aut eius partibus, oriuntur
commoda. Cap. LXVII.

N Vnc quæ in ipſo homine homini utilia inueniantur indicabimus,
ipſum ſibi exquirentes. Quorundam hominū tota corpora profunt: G
ut ex iis familiis, quæ ſunt terrori ſerpentibus, tactu ipſo leuant percuffos
ſuctūue modico: quorum è genere ſunt Pſylli Marſiq; & qui Ophiogenes
uocantur in inſula Cypro. Et in inſula Nili Teutiri naſcētes tanto ſunt cro-
codilis terrori, ut uocem quoque eorum fugiant. Quæ autem nonnulli de
hominis partibus excrementisq; prodiderint, nec referenda arbitror: ſan-
guinem nanque gladiatorum bibere nonnulli, ut bibentibus populis pro-
cul eſſent comitiales morbi. Et hercule illi ex homine ipſo ſorberi efficacif-
ſimum putāt calidum ſpirantēque, & una ipſam animam ex oſculo uul-
nerum, cum è plagis hunc, ne ferarum quidem admoueri ori fas ſit huma-
na. Ad elephantiaſin quoque in Ægypto, cum in reges incidiſſet morbus,
in balneis lilia temperabantur humano ſanguine: alij medullam crurum H
quarunt, & cerebrum infantium. Nec pauci apud Græcos ſingulorum ui-
ſcerum, membrorumque etiam ſapores dixere, omnia perſecuti uſque ad
reſegmina unguium: quaſi uero ſanitas uideri poſſit, ſerā ex homine fieri.
Xenocrates, tanquam ſane ille ipſe fuerit expertus quosnam affectus cura-
re ualeat in cibo cerebrum, aut carnes, aut iecur humanum, prodidit: quos
etiam capitis, tibiæ, & digitorum oſſa epota: quos denique ſanguis, ſudor,
urina, muliebria, & ſtercus deuorata: inſtaſtabilia hæc & dictū quoq; faſti-
dienda. Quæ autem retuliſſe fas ſit, pleraque etiam ex iis non ſine honore
dicto, explicabimus. Sanguine ipſius hominis ex quacunque parte emiſſo
efficaciſſime anginam illini tradunt Orpheus & Archelaus: item ora comi-
tiali

*Alias, cū pla-
gi ne ferarum
quidem admo-
ueri ora fas ſit
humana.*

- A** tiali morbo lapforum, exurgere enim protinus: quidam si pollices pedum pungantur, exq; his guttae referantur in faciem. Lac muliebri corpori hu-
mano inter omnia lactis genera accommodatissimum est, ut quod & dul-
cissimum molliissimumque est, & plurimum alit. Mulieri ante septimum
mensem profusum lac inutile: ab eo mense, quod uitalis est partus, salubre.
Lac utilissimum cuique maternum est. Cōcipere nutrices exitiosum est: hi
sunt enim infantes, qui colostrati appellantur, densato lacte in casei specie.
Mammis quoque exuctū lac, stomachi rofionibus prodest & tibi, pulmo-
nūque incommotis. In longa febre coeliacis utilissimū arbitrantur, ma-
xime eius quæ iam infantem remouerit. Item mamarum collectionibus
cum thure: & oculis ab ictu cruore suffusus; & in dolore aut epiphoris si e-
B mulgeatur, plurimum prodest: magisque cum melle & narcisci succo, aut
thuris polline: mixto præterea ouorum candido liquore, madidāque lana
frontibus impositum, fluxiones oculorum suspendit: nam si rana salua sua
oculum asperferit, præcipuum est remedium: & contra morsum eius bibi-
tur stillatūq;. Qui simul matris filiaq; lacte inunctus sit, liberari oculorū
metu in totam uitam affirmant. Autium quoque uitiis medetur, modice
admixto oleo: aut si ab ictu dolent, anserino adipe tepefactū: & contra mor-
bum regium in morbis relictum, instillatur cum elaterio. Podagris quoq;
iubent illini cum cicuta: alij cum æsypo & adipe anserino: (qualiter etiam
uuluarum doloribus imponitur) alij cum opio & ceruto: peculiatiter ualet
potū contra uenena, quæ data sunt cum marino lepore buprestiq;: & con-
C tra infantiā, quæ fit hyoscyami potu. Semp̄rque in omni usu efficacius eius
quæ marem enixa sit: multoque efficacissimum eius, quæ geminos peperit
mares, & si uino cibisque acrioribus abstineat: eius uero quæ fœminā eni-
xa sit, ad uicia tantum in facie sananda præualet: eius quæ marem peperit
lacte gustato, canes rabiosos fieri negant. Hominum qui probe concocxe-
rint ieiuna salua, lichenas puerorum illitu assiduo sanat: item lippitudines
matutina quotidie uelut inunctione. Mulieris quoque salua ieiuna, potē-
tem diiudicant oculis cruentatis, & si contra epiphoras feruentes anguli o-
culorum subinde madificentur: efficacius si cibo uinoque se pridie ea absti-
nuerit. Scorpiones interficit hominis salua: & omnibus bestiis uenenosis
sua natura aduersatur: feruntq; ictas salua, ut feruentis aquæ contactū fu-
D gere. Martion Smyrneus qui de simplicibus effectibus scripsit, rumpi scolopendras marinas sputo tradit. item rubetas aliasque ranas: Ophilius ser-
pentes, si quis in hiatum earum expuat. Nunc mirum dicemus, sed experi-
mento facile: Si quæ pœniteat ictus eminus cominusue illati, & statim ex-
puat mediam in manum qua percussit, leuatur ilico percussus à pena.
Hoc sæpe delumbata quadrupede approbatur, statim à tali remedio, cor-
recto animalis ingressu. Morsus hominis inter asperrimos iudicatur: me-
dentur sordes ex auribus: ac ne quis miretur, etiam scorpionum ictibus,
serpentiūque statim impositæ. Melius è percussis auribus profunt: ita &
reduuias sanari. Gymnasionum strigmenta molliunt, calfaciunt, discu-
tiunt, complent, sudore & oleo medicinam facientibus. Vuluis inflamma-

Lac

Salua

Auriū sordet.

Strigmenta gy-
mnasionum.

tis contractisq; admoventur: sic & menses cient, sedis inflammationes & E
condylomata leniunt: item nervorum dolores, luxata articulorum no-
dos. Efficaciora ad eadem, strigmenta à balneis, & ideo miscentur suppu-
ratorii medicamenti. Nam illa quæ sunt ex ceromate permixto cæno,
articulos tantum molliunt, calfaciunt, discutiunt efficacius: sed ad cæte-
ra minus valent. Imo etiam ipsos gymnasiorū rasere parietes: & illæ quo-
que sordes excalfactoriam uim habere dicuntur. panos discutiunt. ulceri-
bus senum puerorūque & desquamatis ambustis uel illinuntur. Hæc Pli-
nius. Ut uero Galenus prodidit, hominum sudor in palæstris miscetur
subiecto pulveri, quem *μύζα*, Græci uocāt. Quod ex his componitur, con-
salon dicunt, uim habet digerendi cum adstrictione quadam: quo fit, ut ef-
ficacissimum sit mammis inflammatis remedium: & lac quod à partu in
mammillis exundet, reprimat. inguinum quoque tumores discutit. *Vri-*
na hominis, quàm sit aliorum animalium, multo imbecillior est, abstergē-
di tamen uim obtinet: id quod uel maxime ostendunt fullones, qui ea præ-
cipue ad uestium sordes eluendas utuntur. Quin & medici psoras & lepras
ea colluunt, ulcerāque præhumida ac fordida, maxime ubi putridi insit
quippiam. Impubium puerorum urina contra saliuas aspidū, quas pryadas
uocant, quoniam uenena in oculos hominum expuant, prodest: contra ocu-
lorum albugines, obscuritates, cicatrices, argema, palpebras: & cum erui fa-
rina contra adustiones, contra aurium pituitas uermiculōsq; si decoqua-
tur ad dimidias partes cum porro capitato, nouo sicili. Vaporatio quoque
ea menses foeminarum ciet. Hac & atramenti litura abluantur. uirilis, *G*
podagris medetur, argumento fullonum, quos ideo tentari eo morbo negāt.
Veteri miscetur cinis ostreorum aduersus eruptiones in corpore infantū,
& omnia ulcera manūia. Ea exesit, ambustis, sedis uitiis, rhagadiis, & scor-
pionum ictibus illinuntur. Obstetricum nobilitas non alio succo efficacius
curari pronuntiauit corporum pruritus nitro addito, ulcera caputem, pru-
rigines, nomas præcipue genitalium. Sua cuique autem (quod fas sit dixisse)
maxime prodest, confestim perfuso canis morsu, echinorūque spinis
inhærentibus, & in spōgia lanisue impōita, aut aduersus canis rabidi mor-
sus cinere ex ea subactō: contrāque serpentium ictus. Ostones contra ma-
la medicamēta omnia promisit auxiliari matutinis horis suum cuique in-
stillatum in pedem. Stercus humanum in medicamenta ob scetorem *H*
rarissime admittitur. Inter omnes tamen cōuenire uideo, humanum sterces,
non aliter atque caninum gutturi impōitū anginis auxiliari. Capillus pue-
ro, qui primum decisus est, podagræ impetus dicitur leuare circūligatus,
& in totum impubium impōitus: uiroꝝ quoque capillus canis mor-
sibus medetur ex aceto. Et caputem uulneribus ex oleo aut uino: combustus
æque capillus carcinomati. Capilli mulieris si crementur, odore serpentes
fugari produntur: eodem odore, uuluz morbo strangulatas respirare. Ci-
nere eo quidem, si in testa sunt cremati, uel cum spuma argenti scabrics
oculorum ac pruriges emendari: item uerrucas & infantium ulcera cum
melle. Capitis quoque uulnera, & omnium ulcerum sinus, simul addito
melle

*Vrina.**Alias, contra
aurium pura.**Stercor.**Pilul.*

A melle & thure, panos: podagras cum adipe suillo: sacrum ignem, sanguinemque fisti ilico, & fornicationes corporum. Pueri qui primus ceciderit dens, ut terram non attingat, inclusus in armillam, & assidue in brachio habitus, muliebrium locorum dolores prohibere traditur. *Dentes.* Ossa humana *Ossa.* combusta, ut quibusdam placet, uim habent maxime omnium ossium digerentem exsiccantemque. De homine satis dictum habeo. Nunc ad reliqua transceamus animalium genera, primumque terrestria.

DE ANIMALIVM DIF-

FERENTIIS LIBER V.

De quadrupedibus uiuiparis, & eorum partibus exterioribus. Cap. LXVIII.



Homini proximum genus quadrupedum est. Inter uniuersa nanque animalium genera, homini simillime sunt quadrupedes: tum ossibus ipsis (quæ maxime totius corporis figuram constituunt,) tum reliquis etiam partibus omnibus, tum uero totius corporis forma. Quæ in genere quadrupedum non pennatæ continentur, sanguine quidem omnia prædita sunt: sed alia animal pariunt, & uiuipara dicuntur, (quæ & perfectiora sunt) alia ouum edunt, & ouipara uocantur. Quadrupedes quæ animal generant, caput, collum, & omnes partes corporis sortiuntur: (nam & talpæ modo quoddam oculos habere dixerim) uerum ipsæ singulæ partes inter se differunt. Sunt quadrupedum alia cornigera, alia mutila: & quæ cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est: nisi quid per similitudinem & translocationem cornu habere dicatur, quemadmodum Ægyptij de anguibz Thebanis perhibent, quasi aliquid illis ueluti uestigium cornus extuberet. Nec **D** alibi quàm in cornibus maior naturæ lascitia: sparsit hæc in ramos, ut ceruorum: aliis simplicia tribuit, ut in eodem genere subulonibus ex argumento dictis: aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex iis, unde platycerotas uocant. Dedit ramosa capreis, sed parua, nec fecit decidua: conuoluta in anfractum arietum generi: rupicapris in dorsum adunca: damis in aduersum. Erecta autem rugarumque ambitu contorta, & in leue fastigium exacuta strepsiceroti: mobilia eadem ut aures, Phrygiæ armatis: Troglodytarum in terram directa, qua de causa obliqua ceruice pascuntur. Aliis singula dedit: omnia in mucronem migrantia. Quæ cornua gerunt, bifurca magna ex parte per naturam sunt: & bifurcorum magna pars cornua gerit: ut bos, ceruus, capra. Quod autem idem & solipes & bicornis sit, nullum est,

quod nos adhuc nouimus, inquit Aristoteles: at solipes idemque unicornem, & quanquā rarum, ut asinus Indicus: unicornis uero idemque bisuleus oryx est. Gerunt sane medio sui capitis cornu fixum ea quæ unū habent, aut certe naribus. Sunt nonnulla quæ simul bisulea sunt, & iugam habent, & cornua bina ordem inflexu mutuo colligentia gerant, ut bonafus. Conigerum nullum admodum paruum esse nouimus: omniū enim quæ explorata habemus minimum dorcas est. Tenuiora sceminis plerumque sunt cornua, ut in pecore: multis ouium nulla: nec eeuarum ulli. Quæ pedes multifidos habent, cornu omnia carent: & quæ superne priores habent dentes. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus osseum quoddā solidum ambiunt: in mucronem tamen solidum exeunt, & simplici parte extremā cō-

Ceterorū cornua ossibus ad hærere, ceruorū tātum cuius enasci sentit Plinius.

stant. Pars caua ex cute potius oritur: at solidum illud osse enascens subit impleretque rotum, quomodo cornua boum constare uidemus. Ceruino generi ex cornigeris uni, tota solida & sparsa in ramos: & omnibus annis decidua, nisi caltrentur, cum ex cæteris cornigeris nulli cornua decidunt, sed omnibus perpetua sint, nisi per uim aliquam amittant. Aurículas habent omnia, excepto uitulo marino: & eas quidē maximā ex parte ueluti capiti appensas, & propterea mobiles: quas etiam non eodem orbe quo oculos, quemadmodum homines, sed supra oculos sitas habere uidentur: uerum tamen non ita est, sed conspectum ementiuntur: quoniam bestię non erecto, sed prono sunt corpore. Quadrupedum quæ multifida sunt, ut canis, leo, lupus, uulpes, lupus eeuarius, omnia cæcos generant: post palpebræ dehiscent. Cilio carent palpebræ inferioris quadrupedes: sed paulo inferius pili

Nares, p̄ūr̄e.

rari nonnullis exeunt. Nares quibus maxillæ longæ exeunt in acutum, in ritu appellato continetur: cæteris explanatius magisque discretè ad maxillas iunguntur. at elephantus peculiarem hanc partem præ cæteris sortitus est animalibus. Maxillæ aliis rotundæ, ut simijs. lumentorum omnium caput paruum est: maxillæ longæ. Oris etiam magnitudine discrimen existere iis animalibus planum est: aliis enim os magno hiatu reuissum est, ut canis, leoni: denique omnibus quibus dentes ferrati: aliis mediocriter est, ut generi suum. Linguam habet quadrupedes duram, crassam & minime absolutam: indèq; fit, ut uocem parum explanare possint. Habet dentes omnia quæ quadrupeda & uiuipara sunt, sed uarie: sunt enim alia utrinq; dentata: alia altero dentium ordine carent. Quæ enim cornua gerunt, hæc nō dentata utrinq; sunt: quippe quæ primoribus maxillæ superioris careant dentibus: quanquam sunt nonnulla quæ & cornibus uacēt, & utrinq; dentata non sint, ut cameli. Item alia dentes habent exertos (χαυλόδοντα dicuntur) ut aper: alia sine iis sunt. Et aliis dentes ferrati, ut canis, leoni: aliis continui, ut equo, boui. Sunt enim dentibus ferratis, (αγχιόδοντα uocant) quorum ferries acutorum dentium mutua insertionem pectinatim se constipat. Quod autem simul & dētem exertū & cornua habeat, nullum est: nec uero quod simul & ferratis dentibus sit, & alterutrum habeat illorum, hoc est uel cornu uel dentem exertum. Raro sceminæ, & tamē sine usu sunt dentes exerti: itaque cum apri percutiunt, sceminæ sues mordent. Primores dētes plurima

- A rima habent acutos, interiores planos. Minutis quadrupedibus primores bini utrinque longissimi. Genus autem quod duplicem dentium ordinem habeat, nullum nostro in orbe est. Mutantur dentes, ut homini, ita quibusdam aliis animalibus, ut equo, mulo, asino: homini, ut diximus, primores mutantur: maxillares autem nullum animal mutat. In collo gula atque arteria iis omnibus est, & eodem situ quo homini. Pectus maxima ex parte non ut homini latum, sed in iis coarctata hæc pars est: unde fit ne quadrupedes eo loco habeant mammas. Ipsas autem mammas haberi uarie certum est: nam & inter seipsæ quadrupedes & ab homine mammarum differunt ratione: elephanto enim mame parte priore, hoc est in pectore, aut iuxta pectus sub armis sunt binæ, binisque; papillis: ursæ mamas habet quaternas. Aliis mammæ inter femina binæ: quibus enim solida ungula, aut cornua & partus numero pauciore, hæc mamas inter femora habet, easque binas. Et inter hæc aliis papillæ binæ, ut ouibus: aliis papillæ quaternæ, ut uaccis. Quibusdam nec in pectore nec in femoribus mammæ, sed in uentre habentur, & quidem plures: uerum non omnes pares: quæ nanque numeroso partu & pede multifido sunt, hæc aut plures per uentrem duplici ordine utroque de latere gerunt, ut sues, ut canes: aut binas tantum medio uentre, ut leo: pantheræ quaternas in medio uentre gerunt. Camelus quoque in uentre mammas duas cum papillis quatuor habet ut bos. Genitale marium aut ante habetur, ut equo & aliis multis: aut retro. Testes autem omnibus esse conspicuos natura uoluit, præter elephantum & erinaceum. & iis quæ C genitale ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendunt: aut aluo uel loco cuiuspiam illi proximo adherent, & aut plus aut minus absoluuntur: non enim pariter apro & equo membrum hoc absolutum est, testes namque apro non pendunt absoluti aut tremuli, sed hærent annexi retro. Ossea sunt genitalia, lupis, uulpibus, mustelis, uiuerræ: urso quoque simul ut expirauerit, cornescere aiunt: elephantes testes non foris conspicuos, ut diximus, sed intus conditos habet. Quadrupedes feminarum omnes in auersum mingunt: mares uero perpauci ita in auersum mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus: solidipes nullum sic mingit. Magna item quadrupedum pars caudam habet. Cauda quibusdam prolixior dependet, nonnullis uero perexigua est: & quibusdam tam exigua, ut uix dignosci à sensu possit: aliquid tamē prominet quod caudam describere possit: quibus enim corpus admodum pilosum natura cōdiderat, caudam iis diminuit: quod in ursis perspicuum est. D Quinetiam caudas prolixiores pilis natura ornauit: alias longis, quibus tenor caudæ brevis, ut equis: alias breuibus, quibus tenor longus, ut bubus. *Tenor, σέλας.* Habent quadrupedes, quæ animal generant, omnes uice brachiorum crura priora: non tamē omniū crura priora cubitis manibusque proportionem respondent, sed quæ multifida sunt: hæ præcipue manibus suo digitato pede respondent: hoc enim non sustentandi tantum corporis causa, sed ad plura etiam quasi manu utuntur: quippe quæ & capiant prioribus cruribus & repugnent, quod solidipedes posterioribus faciunt: atque ob id nonnulla ex iis quorum pedes in digitos finduntur, pedes priores quinque distinctos digi

DE DIFFERENTIIS

*Multifida, περι-
διδυ.
Bisulca, δι-
δυ, ἢ διχρυσ.
Solipedes, nel
solipides, nel
μολιπιδες.*

*Talus, ἄσπε-
τος.*

tis habent: posteriores quaternis, ut leones, canes, atque etiam lupi & pan-
theræ. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digi-
tos obtinent. Sunt è quadrupedibus quæ sanguine constant, eadem que a-
nimal generant: aliæ multifidæ, quales hominis manus pedesque habetur:
sunt enim quæ multiplici pedum fissura digitetur, ut canis, leo: aliæ bisul-
cæ sunt, quæ *χῆλας*, id est forcipem pro ungula habeant, ut oues, capræ, cerui:
aliæ infisso sunt pede, ut quæ solipedes nominantur, ut equus, mulus. Ge-
nus sane suillum ambiguum est: nam quibusdam in locis sues solipedes gi-
gnuntur, ut in terra Illyriorum & Pæonia, & quibusdam aliis locis. Bisulca
igitur binis fissuris utrinque, id est à parte priorè & posteriorè diducuntur.
Solipeda eam partem continentem ex toto habent. Omnibus autem ungu-
læ in senectâ maiores redduntur. Per multa ex bisulcorum numero talum F
habent: solipeda eo carent omnia, excepto asino Indico. Multifidum item
nullum adhuc talum habere cognitum est, sed lynxi semitalo quiddam si-
mile: leoni autem tortuosum in anfractum est. Omnia uero quibus datus
est talus, cruribus cum non prioribus, sed posterioribus continent in cruris
articulo. Talus autem, ut qui ueluti clauus est, tanquam alienus artus duo-
bus illis interfertur qui articulum ipsum constituunt. Quædam ut mani-
bus utuntur priorum ministerio pedum, ut dictum est, sed etiam ad os illis
admoventia cibos, ut sciuri. Quibus ex rapina uictus quadrupedum, quini
digiti in prioribus pedibus, reliquis quaternis: leones, lupi, canes, & panthe-
ræ in posterioribus quinos unguis habent, uno iuxta cruris articulum de-
pendente. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digi-
G
gitos habent, ut modo diximus, quoniam serpere solent: scilicet ut unguibus
numerofioribus facilius obrepant ad superiora. Mirum pardos, pantheras,
leones, & similia, cõdito in corporis uaginas unguium mucrone, ne refrin-
gantur hebetenturque ingredi: auersisque falcibus currere, nec nisi appeten-
do prætere. Quadrupedibus contrâ quàm homini, in primâ ætate in-
ferior pars maxima est, tum processu temporis superior crescit, quæ scilicet
ea est quæ ab ano ad caput porrecta est. Partes quas homo habet priores,
quadrupedes infra habent supinas: quas autem ille posteriores, hæ pronas.
Et motus omnium quadrupedum per diametrum agitur, quo modo etiâ
subsistere solent. Flectunt autem quadrupedes uiuiparæ crura priora con-
trâ atque posteriora: & è contrario quàm homo membra inflectat, excepto H
elephanto. Priores enim pedes ante se flectunt, posteriores uero in auersum:
aduersaque inter se habent conuexa curuaturæ crurum suorum. Partem
corporis læuam minus quàm homo absolutam habent & agilem, excep-
pto elephanto.

Interiorum quarundam partium discrimina in quadrupedi-
bus uiuiparis.

Cap. LXIX.

I N hoc genere fel quibusdam deesse notatum est: ut ceruo & illi qui prox
uocatur, equo, mulo, asino, uitulo marino, & murium nonnullis. Sunt e-
tiam quæ partim habeant, partim nō habeant uel in eodem genere, ut mu-
res:

- A** res: quod idem & homini accidere diximus: aliqui enim fel in iecore habere uisuntur, aliqui carent. Hoc idem ouibus etiam caprisque euenit. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ iecur habent, inquit, iis meatus quidam insunt, qui bilem recipiant: etsi uescam, quæ amaram bilem colligit, non omnibus concesserit natura. Lienem bifurca & cornigera habent rotundum, ut capra, ouis, & reliqua omnia: nisi aliqua pro sua magnitudine auctiorem in longitudinem habeant, ut boues: at multifidis prolixus omnibus est ut mure, cani: solidipedibus autem medium tenet, & promiscuus est: partim enim latus est, partim angustus, ut equo, mulo, asino. Renes atque uescam, omnes quæ animal generant, quadrupedes possident. In his, quæ seuo pinguescunt, magis quam quæ adipe, in renibus opimandis luxuriant.
- B** ac omnium præcipue oues: quippe quæ renibus pingui undique obductis, quandoque intereunt. Ventris in iis dissimilitudo est: quæ enim cornigera sunt, altera maxilla dentata, quaternos habent uentris sinus: (quæ quidem & ruminare dicuntur:) gula enim incipiens ab ore, deorsum tendit ad pulmonem septimumque transuersum: hinc se ad uentrem applicat maiorem: qui parte interiore asper interceptusque est, ac prope gulæ commissuram, sinum sibi adnexum habet, quem ex argumento *καρίφαιλον*, id est reticulum uocant. Est enim uentri extrinsecus similis, intus reticulis capilli mulierum implexis, magnitudine multo quam uenter minor: hunc excipit omasum, parte interiore asperum, cancellatum, crustatum, magnitudine reticuli. Abomasum, uenter ab eo alius iungitur, magnitudine amplior omaso, forma oblongior: cæcæ intus & crustis multis magnis & leuibus inornatus, mox intestinum sequitur. Cornigera altera maxilla dentata omnia ad hunc modum suum habere uentrem certum est: sed differunt inter se magnitudine & figura: atque etiam quod gula uel in medium uentris tendat, uel in latus uergat. At uero omnia dentata maxilla utraque, uentres singulos habent, ut canis, sus, ursus, leo, lupus. iis igitur omnibus simplex uentriculus est, quæ excipit intestinum: uerum aliis amplior, ut sui, ut urso: aliis ætior, nec multo amplior intestino, ut cani, leoni. Cæterorum etiam formæ omnium respectu eorum quos modo numeraui, distinguuntur: aliis enim uenter suillo similis, aliis canino, tam in maiore quam in minore animalium genere. Sed discrimen in iis quoque, magnitudine, figura, corpulentia, exilitate uel oritur: atque etiam situ gulæ, quo meatum ad uentrem ducat, & conuiuio iungat foramini. Intestinorum etiam natura utrique illi animalium generi, hoc est utrinque dentato, & altera maxilla dentato, sibi differt magnitudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora omnia intestina non utrinque dentatis, nec immerito: nam ipsa ita dentata omnia sunt maiora: pauca enim parua in eo genere habentur. admodum nanque paruum inter cornigera nullum est. Rectum autem intestinum nulli est cui non utraque parte detes. Quibusdā & appendices intestinorum, sicuti & auiibus nonnullis. Oritur omentum atque dependet superiore sui parte, in iis quæ utraq; parte dentata sunt, à medio uentre, quæ ueluti quædā futura ducitur. Nec secus in iis quæ altero dentium ordine carent, à maiore uentre dependet.

*Reticulū, Theophrastus
odorus arsinetū
quoque vocat.
Omasum, ixi-
nes. Aboma-
sum, uentrem.*

DE DIFFERENTIIS

Pilorum colorumque discrimina, & uocum in quadrupedibus uiui par. Cap. LXX.

E

Iuba, & c.

Omnia fere quadrupeda eadēque uiui para sunt pilosa, nec hominis modo leuia esse nouimus: partes enim pronæ, contrā quā hominis, pilosiores sunt: supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur. Cilium etiam, ut diximus, non ut homo habent in utraque palpebra: neque pubem, aut alas oppletas pilis. Ipsorum autē quadrupedum pilis intercorum, aliis corpus totum est hirtum: aliis collum hirtius pari undique modo, ut quæ iubam habent: qualis est leoni mari: aliis prona tantum colli parte à capite ad armos usque, ut quæ iubam habent, quā *leui* dicunt: qualis est equo & mulo. Quadrupedum uilli lanæue senectute prolixius augentur: quanquam rarefcant fiāntque pauciores. Quadrupedibus pilum cadere atque subnalci annum est: quæ molles suapte natura pilos habere solēt, hæc per usum pabuli melioris, duriores incipiunt gerere: contrā autem molliores paucioresque, quæ duos copiososque habuerint, eadem illa scilicet ratione. Aquarum diuersarum usu animalia suos immutant colores: alibi enim cædida, alibi nigra redduntur. Sunt etiam aquæ multis in locis, quas cum oues biberint moxque inierint, nigros generēt agnos: ut in Assyritide agri Chalcidici Thraciæ facit amnis quem Pylchrum uocant. Et in Antandria quoque duo sunt fluuij, quorum alter candorem, alter nigritiā pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur. Vocē uarie mittit quadrupedum genus quod animal procreat: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Exectorum omnium uox in scemineā mutatur. G

De coitu partique, & aliis quæ ad generationem pertinent in quadrupedibus uiui par. Cap. LXXI.

Commune omnium quadrupedum est, ut cupidine uoluptatēque rei ueneræ maxime incitentur. Ferociunt scemina à partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent: sternunt equitem atque insequuntur. Sues quoque feri acerrime scuiūt: dimicant inter se, mitum in modum mantes sese: si simili modo & tauri efferantur, & arietes, & hirci. Qui enim superiore tempore socij iugi concordia pascuntur, coitus tempore dissident, & alter alterum libidinis rabie inuadit: camelus etiam mas sequit tempore coitus: & elephanti quoque ad coitum efferari solent. Idem feris quoque euenire apertum est. nam ursi, lupi, leones acius per id tempus in eos qui accesserint sequuntur: inter se tamen minus hæc dimicant, quia nullū ex iis gregale est. quin etiam ursæ à suis catulis uehementer ferociunt, ut canes à catellis. Quæ autem non uno tempore, sed sæpius anno coeunt, ut ea quæ cum homine degūt: uerbi gratia canes, sues, ut minus efferentur, facit coitus copia. Omnino fera omnia, aut certe plurima, non ante cū sceminis ad commune pascuum ueniūt, quā tempus sit coeundi: sed cum iam per ætatem licuerit, segregantur mares à sceminis, seorsumque pascuntur. Plurimæ quadrupedes pedibus innitendo exercēt uenerem, sceminam scilicet mare superingrediente, ad motūque parte maris supina ad dorsum scemina rem peragunt.

- A** agunt. Quæ retro urinam mittunt, aversa iunguntur, ut leones, lepores, lynces. Quadrupedes tempore coitus non nihil humoris suo genitali, tum maribus tum etiam feminæ emittunt, atque ad motus ad genitale naribus odorantur: prominet etiam genitale in feminis cum ad coitum stimulantur. Viviparorum quadrupedum alia imperfectum animal pariunt, aliæ perfectum. Quæ multifida sunt, fecundiora sunt: multipara enim id genus animalia sunt: nec tamen partum perficiunt complura: fortum nanque adhuc recentem alere possunt, auctum iam adeptumque magnitudinē nequeunt: sed cum corpus ad nutriendum non sufficiat, partum emittunt, ut ea quæ uermem pariunt: quædam enim ex iis catulos inarticulos propemodum pariunt, ut uulpes, ursa, leæna, & alia nonnulla, sed omnia fere cæcos. Sola
- B** inter multipara sus parit perfectos: solipedes & bisulcæ perfectos edunt. Bisulca pauca generant præterquam sues: singulos enim aut binos magna ex parte edunt totus. Quæ autem maxima inter animalia sunt, ea singulos pariunt, ut elephas, camelus, equus, & reliquæ solipedes. Quadrupedes in utero gestantur extensis ad longitudinem cruribus & ad alium suam applicatis. Pinguescunt quadrupedes cum gerunt partum, comeduntque amplius. omnes autem cum lactentur extenuari solent.

De quadrupedum uictu & ætate.

Cap. LXXII.

- P**inguescunt uero quadrupeda omnia melius, si præfatigata fame fuerint: & præterea quiete immotioneque. Quadrupedum quæ animal
- C** generant, quæ sylvestres eademque ferratæ dentibus sunt, carne omnes uescuntur: (nisi quod lupos aiunt terram quandā cum esuriunt edere: hoc igitur peculiare luporum sit.) herbas autē non alio tempore tangunt, nisi cum morbo laborant: quomodo & canes herba ingesta euomunt, atque ita purgantur. Sunt inter quadrupedes feras, quæ uictum ex lacu & fluuiis petant: at uero à mari nullum, præterquam uitulus marinus: sunt in hoc genere fiber, facheriū, faryrium, lutris, & latax. Cornigera animalia, tam fera quàm urbana, & quibus dentes ferrati non sunt, omnia fruge herbæque uescuntur, nisi uehementer esuriant, sue excepto. unum animal digitos habentiū herba alitur lepus. Bibunt quibus dentes ferrati sunt animalia labendo: atque etiam nonnullæ ex non ferratis, ut mures: quibus autem continui, forbendo,
- D** ut equi, ut boues: ursus neque forbendo, neque labendo, sed morflu. Iumeta pro aquæ quam bibant usu, suo fruuntur pabulo: & quod minus potum aspernatur, id appetentius pabuli est. In Africa maior pars ferarū æstate non bibunt inopia imbrium. Ætatem dignosci quadrupedum confirmant, qui in eorum cura sunt constituti, si cutis prætenta maxillis detracta, mox relaxata, ilico in suum redeat locum: hoc enim indicium recetioris quadrupedis est: ueteris contra, si diutius rugata maneat cutis. Ætas ueterinorum dentibus indicatur, & dentium brochitate, superciliorum canitie, & circa ea lacunis cum fere xvi annorum existimantur. Ut uero Columella tradit, decimo anno equis tempora cauari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominare.

DE DIFFERENTIIS

De quadrupedum ruminacione, latitatione, & aliis quibusdam
actionibus affectibusque. E
Cap. LXXIII.

Ruminant quæ superiore dentium ordine carent, ut boues, oues, capræ. Ex feris nullum adhuc ruminare constat, præterquam ea quæ aliquando cum hominibus exigunt, ut ceruus. Iacent potissimum cum ruminant omnia: & hybernis præcipue mensibus solent ruminare: septem fere mensibus hoc faciunt, quæ intra tecta aluntur: gregales minus, breuioræq; tempore ruminant, quoniam foris pascuntur. Sunt etiam ex dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mures pontici, ut lepores. Ruminantia omnia coagulum habent: etiam inter dentata utrinque lepus. Conducuntur nonnulla hyeme, ut hystrices, ursæ: glires etiam latent in ipsis arboribus: itidem & mures pontici. Volutatio solidipedum propria est. Cû cætera nisi nouella castrentur intereant, aper unus qua ætate castratur non refert. Omnia denique si dum crescant, castrantur, maiora & elegantiora quàm incastrata euadunt: sed si postea quàm adoleuerunt, & iam incremento constiterunt castræ, nihil præterea accedere ad magnitudinē potest. Magnas quadrupedes Epirus gignit, excepto asino: sed præcipue boues & canes, indicio sunt boues quæ Pyrrhiæ uocantur. Pusillas bucculas fert regio Phasiana.

Alimenta ex quadrupedibus & eorum partibus uaria.

Cap. LXXIIII.

Quæ herbis pascuntur inter quadrupedū genera, aut tenellis arborum ramis germinibusue, ea omnia cum hæc abundant nitidiora sunt ac pingua, nobisq; alendis accommodatiora. Ideoque quibus altior herba pro pabulo est, ea hyeme primòque ac medio uere sunt gracilia macræque, & succum præstant uitiosum, ut boues: qui procedente tempore fiunt obesiores meliorisq; succi: postquam scilicet auctæ fuerint herbæ. Quæ uero ex quadrupedibus humiliori herba pasci solent, ut oues, ea primo ac medio uere sunt præstantiores. Capræ æstate prima ac media, cum scilicet plurima fruticibus insunt germina: nam iis audivissime uescuntur capræ. Cuiusque quadrupedis caro deterior est, cum locis palustribus quàm cum editioribus pascit. Et in domesticis ipsis, castratorum caro in suo cuiusque genere præstantissima est, uti ante diximus: pessima uero, tum ad concoctionem, tum nutritionem, tum etiam ad succi bonitatem, senescitium animalium caro. Probatissimum alimentum inter pedestria præstat suilla caro, deinde hædina, mox uitulina. Agnina uero præhumida lentæque est & mucosa: succumque gignit pituitosum. A cæteris autem abstinendum suadeo, inquit Galenus, iis qui probum succum procreare studet. Caro etenim bubula multum quidem præbet alimēti, sed quod sanguinem gignat crassum ac melancholicum: præcipue uero taurina. Ouilla caro excrementis abundat, ac succum præstat deteriorem. Caprarum autem caro, præterquam quod succum præbet uitiosum, acrimoniam etiam habet: & melancholicum gignit succum, præsertim hircina. Leporina caro sanguinem gignit crassiorem, sed qui meliorem procreat succum, quàm aut bubula aut ouilla.

Inter quadrupedes gloria prima lepus, inquit Martialis.

- A** ouilla. Ceruina succum generat uitiosum ac concoctu difficile. Huic proxima est agrestis asini caro, si minor adhuc ætate fuerit & optimo corporis habitu: nam & domestici asini caro melancholicum succum procreat: sicuti & camelina, uulpina, canina, leporina, & ð sue syluestri caro. Et ceterarum quadrupedum caro ipsa quanto suilla in alimenti probitate fuerit inferior, tanto & illarum reliquæ partes quæ excarnes sunt, ut pedes, aures, rostra, suum partibus sunt deteriores. Iecur omnium quadrupedum crassum in cibo præbet succum, tardius permeat & ægre concoquitur: uerum succum procreat non omnino malum. Et quæ lætent adhuc, si matris lac probum fuerit, eorum iecur boni succi est. At quorum deprauati humores fuerint, aut quæ iam consenuerint, eorum iecur bonum efficere succum non potest.
- B** In omnibus uero, quod *νεφρον* uocatur, eo quod animal quod mactatur caricis sit saginatum, præstantissimum est, tum ad alia, tum uero ad saporis gratiam: & in iis præcipuum suillum est. E reliquis autem uisceribus, lien neque gustui suauis est: (habet enim in se acerbitatem perspicuam) & succum præterea gignit uitiosum ac melancholicum. suillus uero lien non adeo malus est. Pulmo utroque concoctu facilius eo est quo rarior: iecinore tamen longe minus alit, atque quod ex eo gignitur alimentum, pituitæ magis naturam habet. Cor ad concoctionem item difficile est: uerum si recte conficiatur, alimentum gignit neque exiguum, neque quod malum succum efficiat. De renibus inter sanguineorum glandulas diximus. Venter, uterus & intestina quadrupedum, ipsa carne duriora sunt, ideoque concoctu difficiliora: quod si rite concoquantur, succum gignunt, qui non omnino inculpatus sit, sed frigidior, crudiorque, & qui tempus prolixius desideret, ut ex eo probus fiat sanguis: minus quoque alunt quam caro ipsa. uulua electo partu melior est quam edito. Quadrupedum testes concoctu sunt difficiles malique succi, ut qui uirosus quiddam sapore referat. Caudæ duriores sunt, uerum ob frequentem earum motum, minimum habent excrementi. Aurium cartilago in uigentibus saltem ætate animantibus, & sicca est, & minime nutrit. Earum cutis tenuis aridaque est: ægre item concoquitur, & paucissimi nutrimenti est. In quadrupedum lacte non parua reperitur differentia: siquidem boum lac, ut Galeno uidetur, crassissimum est & pinguisimum: casei butyrique habet plurimum, ualentius nutrit. Minime uero pingue camelinum est: liquidissimum quoque & feri multum habet, imbecillius dat alimentum, & aluum ciet: mox equinum liquidissimum minimèque pingue est: postea asininum. Caprinum mediocriter crassum est: ouillum crassius illo est. Plinius uero de lacte hæc prodidit: maxime alit quodcunque humanum, mox caprinum, dulcissimum ab hominis camelinum, efficacissimum ex asinis, magnorum animalium & corporum facilius redditur. Stomacho accommodatissimum caprinum: bubulum medicatius: aluus enim maxime soluitur bubulo. Ouillum dulcius & magis alit, stomacho minus utile, quoniam est pinguius. Aluum minus tætat lac caprinum, inquit Dioscorides, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis fere utitur: & inde quoque stomacho idoneum est. Ouillum uero dulce, crassum & præ-

DE DIFFERENTIIS

pingue, non usque adeo stomacho utile. bubulū asininūque & equinum E
alium cient magis. Minus inflat lac quodcūque decoctum: & omnino in-
nocentius est decoctum, præcipue cum calculis marinis. Medicamentosa
partium & excrementorum vires earūque discrimina, explicata in san-
guineo animalium genere sunt.

De quadrupedibus uiuiparis multifidis, & primo
de elephanto. Cap. LXV.

Generis quadrupedum quæ animal gignunt, plura quidem genera in-
telliguntur, sed nullis fere notata nominibus, nisi quod singularū spe-
cierū nomina habentur, ut leonis, equi, cerui, canis, reliquorūque ad hūc
modum. Scorsum igitur eorum naturam singillatim consideremus neces- F
sarium est, ut differentias quæ cuique animalium generi conueniant acci-
piamus, à multifidis exorſi. In quadrupedū genere maximum est elephas,
proximūque humanis sensibus, idēque multifidum. Elephanto oculi
quauis magni habeantur, minores tamen sunt quā pro corporis magni-
tudine. Promyscidem pro nare gerit: atque hanc partem fortius est præ cæ-
teris animalibus peculiarem, prolixam adeo, ut ad terram pertingat, & ua-
lidam, gracilem tamen pariter & mollem, aptāque ad flectendum. Eius
uero ulus idem qui manus: ea nanq; cibos tam siccis quā humidis collig-
git, capit & in os perinde ac manu admouet solum animantium omnium:
& arbores quoque eadē proſternit. Et quoties immerſus per aquam ingre-
ditur, ea ipsa edita in sublime reflat atque respirat: adūciūscula parte sui po- G
strema naris hæc est, ac cartilaginea, & proinde rigidiuscula. Dētes illi utrin-
que quatuor intus, quibus conficit cibum atque in farina speciem mollit.
Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores refimatosq; ha-
bent: femina minores, & contra quā mares uergūt enim deorſum pro-
nūque deuiant. Statim cum nātus est elephans, dentes habet: quamquam
grandes illos non ilico perspicuos obtinet: & candore dentium intelligitur
iuuenta. Decidunt elephanto dentes isti grādiore, & renascuntur quibuf- 2
dam temporum interuallis. Et deciduos casu aliquo uel senecta defodiunt:
hoc solū ebur est: cætero & in iis quoque, quod corpus intexit uilitas ossa.
Linguam perquam exiguam habet elephas, atque interius positam quā
in cæteris sit, ita ut uix eam uidere possis. Mammæ duas quidē, & papillas H
item duas, uerum non in pectore habet, sed paulo citra sub armis: quæ tam
mari quā femina perexiguæ sunt, nec pro corporis uastitate, ita ut eas
à latere conspiciere propemodum nequeas. Crura habet priora multo po-
sterioribus logiora: & malleolos posterioribus iunis cruribus possidet par-
uos. Pedes habet, ut dictum est, multifidos, & digitos numero quinque in-
diuifos leuiterque discretos: & unguis omnino nō sunt, sed ungulis potius 3
similes. Flectit hic suos posteriores poplites modo hominis: ut uero Solinus
scribit, suffragines flectere nequit. Nequit certe præ nimio pōdere, utrūque
in latus equilibrium quodā uergere, sed aut læuo incubat aut dextro: atque eo
ipſo habitu requieſcit. Genitale habet simile equo, sed paruū, nec pro corpo-

ris

Pro: exis.

*Alq; hæc pars
hæc impro-
prie appellatur
manus, Plin.*

Ebur.

Aris magnitudine. Testes itē nō foris cōspicuos, sed intus cōditos habet: quo circa initum celerius agit. Vt in quadrupedū genere, elephas minime hirtus est: & setarū certe, ut inquit Plinius, nullum illi tegumentū: ne in cauda quidē p̄sidium abigēdo rēdio muscarum, sed cancellata cutis, & inuitans id genus animalium odore. Ergo cum extēti recepere examina, arctatis in rugas repente cancellis, comprehensas enecant. Hoc iis pro cauda, pro iuba, pro uillo est. Durissimū dorso tergus est, uentri mollius. Viscera illi suillis proxima, sed maiora: iecur enim quadruplo maius bubulo est: & reliqua pari ratione, excepto liene: hic enim minor ex proportionē est. Iecur sine felle est: inciso tamē, parte qua fel adhærere solet, humor felleus effluit plus minus. Fel ad pectus habere traditur à nōnullis: Galenus, Huic, inquit, uescica bilis iecori adhæret, magnitudine ad uisceris rationem. Intestinum per amplum est, equino simillimum: ita tamē sinuosum, ut aluos habere quatuor uideatur. In hoc etiam cibus recipitur: nullum enim conceptaculum cibi separatū adest. Gratissimas in cibatu palmas habent: quanquam & truncos edunt, & lapides deuorant. Elephanti solitudines petunt coituri, sed præcipue secus flumina, & quā pasci cōsueuerunt: est enim hoc animal uti mox explicabimus, sua natura simul terrestre & palustre. Incipit autem coire tam mas quàm fœmina ante annum ætatis uicesimū. Fœmina enim incipit coire aut duodecimo cum celerrime, aut quintodecimo cum lentissime. Mas quinque aut sex annos natus superuenit ineūte uere: & coit quatuor uel amplius, in anno diebus. Coitum triennio interposito (uel uti aliis placet, biennio) repetit mas. Quam grauidam reddidit, eandem præterea tangere nunquam patitur. Ad coitum efferari solent elephantī, adeo ut pluribus incommodis homines afficiant: mitigari pabuli copia narrantur. Ferendi uteri tempus, alij annum & sex menses, alij biennium, alij triennium statuunt. Causa quam ob rem incertum hoc sit, quod nō pareat coitus. Decem annis gestare in utero uulgus existimat: Aristoteles biennio. Parit posterioribus curibus subsidens innitēsq̃, & manifesto cum dolore: parit in uere. Parit autem singulos: unipatum nanque est. nec amplius quàm semel gignere tradūt Plinius & Solinus. Fœtum magnitudine bimestris aut trimestris uituli edit: uel, ut aliis placet, uituli anniculi, aut porci ætatis integre. Pullus statim cum natus est, cernit & ambulat. Citra nares ore ipso uocem elidit spirabundam, quemadmodum cum homo simul & spiritum reddit & loquitur: at per nares simile tubarum raucitati sonat. Elephantus dum in syluis uersatur, ferocissimus est: at mansuefactus, omnium ferarū mitissimus & placidissimus euadit. Facillime autem omnium mansuefcit: ac permulta officia & cruditur, & quasi intelligit. Valet sensu atque memoria, & reliqua sagacitate ingenij excellit. Elephantī pugnant inter se uehementer, & dentibus alter alterum ferit: qui autem uictus fuerit, adeo animū amittit, ut ne uocem uictoris toleret. Propter fœminas tamen nunquam dimicant: nulla enim nouerunt adulteria. Sunt apud Indos in usu rei bellicæ non solum mares, sed etiam fœminæ: uerū fœminæ pauciores sunt, & longe minores. Differunt inter se elephantēs mirum in modum robo-

Anno decimo Solinus
& Plinius.

In quibusdam
exemplaribus
Plinius hæc
non habetur.

Minores, The
odorus simio
res dixit, hæc
non.

DE DIFFERENTIIS

re atque animo. Duo nāque sunt eorū genera. Nobiliores indicat magnitudo: minores nothos dicunt. Indicos elephantos Mauri timent, & quali paruitatis suæ conscij aspernantur ab iis uideri. Elephantes alij annos ducentos uiuere aiunt, alij trecentos: & alij mares annos ducētos uiuere, alij centum & uiginti aiunt: fœminas etiam fere totidem, sed florere ætate circa sexagesimum narrant. Hyemis ac frigoris impatiens hoc animal esse dicitur. Amat amnes: & quanquam non fluuiatile sit, tamen riparium dici potest. Incedit etiam in aquis, & eatenus progreditur, quatenus eius promuscis superat: refat enim per eam, & spiritum accipit & reddit: sed natare satis pondere sui corporis non potest. Elephantos cæteris malis immunes esse aiunt: inflatione autem alui acris infestari. Ægrotant etiam si comedant terrā, nisi ea frequenter utantur: nam si frequenter, nihil sentiunt mali. Lapides etiam interdum deuorant, ut diximus, & truncos: nec non fluore tentantur. Odorem muris uel maxime fugiunt: pabula etiam quæ à musculis contacta sunt, recusant. Mortem suam præsentunt, sicuti & olores. Est elephantes animalium humanis sensibus proximum: quippe intellectus illis sermonis patrij, & imperiorum obedientia, officiorumque quæ didicere memoria, amoris & gloriæ uoluptas: imo uero, quæ etiam in homine rara, probitas, prudentia & æquitas: religio quoque, ut prodidere authores, & magna docilitas. Et hæc quidem uestigia morum animi humani in hoc cernuntur animali. Elephantes fert Africa ultra Syrticas solitudines: & in Mauritania. Ferunt etiam Æthiopes & Troglodytæ, sed maximo India. Elephantes Italia in Lucanis primum bello Epirotico uidit: & boues lucas inde dixit. Elephantorum dentibus ingens pretium, uim adstringēdi obtinent: eorum scobe imposito paronychia sanātur. Ita Dioscorides. Plinius uero, Ramenti, inquit, eboris cum melle Attico (ut aiunt) nubeculæ in facie, scobe paronychia tolluntur. Elephanti sanguis, præcipue maris, fluxiones omnes, quas rheumatismos uocant, sistit. Proboscidis tactu, capitis dolor leuatur: efficacius si & sternuat. Dextera pars proboscidis cum lennia rubrica adalligata, impetus libidinum stimulat. Sanguis & ischiadicis prodest. iecurque comitalibus morbis.

1 De dentibus hisce, an dentes dicendi sint, an potius cornua, uide Pausaniā in Heliacis, & Oppianū De uenator. lib. 2. 2 Decimo quoque anno, ut refert Ælianus, quo pacto dentes etiam defodiant, idem narrat. 3 Indiuisos leuiterque discretos, *τὴν πρῶτην τῆς ἀκτῆς καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ στόματος.* Plinius informes dixit. 4 Hinc Plinius uentres elephanto quatuor esse dixit. 5 De elephanti pastu & portione Aristoteles lib. 8. histor. animalium. 6 Quo pacto uenatu capiantur elephanti, & quomodo domentur atque manuscant, ostendunt Aristoteles lib. 9. histor. animalium, & Strabo lib. 14 & 16, & Solinus. 7 Philostratus de Appollonij uira, lib. 1. tria prodidit elephantorū genera: palustrium, montanorum & campestrium.

De simiarum generibus.

Cap. LXXVI.

*Simia, m. 3a-
nes.*

*Simiarum
uulgus.*

COrporis figura simiarum genera perfectam hominis simulationē cōtinet, inquit Plinius. Conueniunt certe cum homine plurimum sua facie simiarum uulgus. Est enim hoc genus, inter omnia simiarū genera homini simillimum: facies nāque iis rotunda est: & aures, nares dentēsq; tam primores,

A primores,quàm maxillares hominis more habent:natura tamen in iis
- narēſque à fronte remiſſas

Contudit,& rugis perarauit anilibus ora.

Cilium etiam cum cæteræ quadrupedes non in utraque palpebra habeât, ſimix habent:quanquam prætenue ac prolixius, potiſſimum in inferiore. Collum itē ut homini breue . pectus habet omnium quadrupedum latiſſimum. In pectore quoque binas mammarum papillas: & brachia hominis modo, ſed hirtiuſcula, quæ & ipſa & pedes, ut homo inſlectūt: hoc eſt ita ut circūferentiæ membrorum utroꝝque obuerti inter ſe adducantur. Ad hæc manus, digitos, ungues homini ſimiles: & pollex iis quoque & articuli, ut homini: uerum omnia rudiora efferatioraque, - Vt eadem

B Diſſimiles homini poſſent ſimilesque uideri.

Pedibus paulum differunt: ſunt enim ut manus prælongi: & digiti ut manus conſtant, medio longiore: & ueſtigium palmæ ſimile faciunt, atq; iſdem & ut pedibus & ut manibus utuntur: inſlectuntque eoſdem perinde ac manus: & ut paucis dicā, pedes manibus habent ſimiles, & quali ex manu pedēque conſtitutos: & calcis poſtremum ad pedem, reliquæ autē parti- culæ ad manum facile referuntur. Lacertos & fœmora habet breuia pro- portione cubitorum & tibiartum. Umbilicum qui emineat nullum habet: ſed durum quiddā continetur loco umbilici. Partem corporis ſuperiorem multo minorem habent quàm inferiorem, uidelicet more quadrupedum: quinarij enim fere ad ternarium ratione conſtat. Degunt plus tēporis pro-

C næ quadrupedū more quàm erectæ. Carent natibus, utpote quadrupedes: priuatæ cauda ſunt, utpote bipedes: exigua enim cauda omnino ineſt, qua- tenus nota ſolum habeatur. Genitale fœminę, mulieris eſt: mari potius canis quàm hominis. Partes interiores humanis ſimiles continent. Simia ani- mal ad omnia imitanda habile eſt: & omne quod corpore agitur, ſi doceatur, facile diſcit, & idipſum actione repræſentat, ſaltat, tibia canit: denique adeo uariū natura animal eſt & multiplex, ut ad omnē actionē ſe ſe uerſet. Apud Indos ſimiarum quoddam genus ruſum eſt, quod in urbes nō addu- citur: quippe quod ueneris libidine adeo inflāmur, ut ad muliebrem ſexum furiat. Has itaque ſi quando deprehendunt, ſtatim interficiunt Indi. Simiatum generi præcipua erga fœtum affectio. Geſtant catulos, ut quos

D immoderate amant, magnaque ex parte complectendo necant: quo fit ut catulos facilius amittant, quos impendio diligunt, & ante ſe geſtant: quo- niam neglecti pone matrem ſemper hærent: ex binis nanque, quos fere pa- rere ſolēt, alterum amant, alterū uero negligunt. Pro uoce ſtridor quidam iis eſt. Poſt hominem nullum animal præter ſimiam *ὠδὴν ὀνέει* uexatur: omentum enim illi omnium quadrupedum maximum eſt. Sunt & alia ſi- miarum genera: nempe cercopitheci caudas habent: hæc ſola diſcretio eſt
inter prius dictas. Cercopithecos generat Æthiopia nigris capitiſque, pilo
aſinino, & diſſimiles cæteris uoce. Megalthenes author eſt, cercopithecos
in India apud Praſios gigni maximis canibus maiores: & totos albos præter
faciem, quæ nigra eſt (quod aliis contra euenit) caudis longis ſupra duos cu-
Cercopithecus,
Celphus.
Cephus.

Caniceps. bitos: & præterea mitissimos. caniceps etiam (sic enim cynocephalum uo- E
Cynocephalus co) è numero simiarū, & eadem forma qua simia est: sed maior ualidiorq;
 & facie, caninæ similior, unde & nomen accepit: adhæc moribus ferocio-
 ribus est, & dente robustiore, caninōque propiore. Ad saltum uolenti sunt
 cynocephali, feri morsu, nunquam ita mansueti, ut non sint magis rabidi:
 in Æthiopiæ partibus frequentissimi. Cynocephalorum plura sunt genera.
Simia cyno- Sunt & cynocephalis similes quædam, rostro scilicet porrectiore, & quæ 3
phalo similis. dentes caninos, quos *καυιδοντες* uocamus, habent prominentiores. Hæ uix
καυιδοντες, binis cruribus erectæ insunt ut aliæ, tātum abest ut ita incedere aut cur-
Simia porcari- rere possint. Inter simias habentur & sphinges, uillose comis, & pilo fusco:
ria. mammis in pectore prominulis ac profundis, dociles ad feritatis obliuio-
Sphinx. nem. Æthiopia has generat. Cōdunt in thesauros maxillarū cibum sphin- F
Sphinxium. giorum & satyrorum genus: mox inde sensim ad mandēdum manibus ex-
Satyrus. primunt. Sunt etenim inter simias, & quas uocāt satyros facie admodum
Callitriches. grata gesticulatis motibus iniquitæ. natura his mitissima. Callitriches to-
 to pene aspectu à cæteris differunt. In facie barba est. cauda primore parte
 lata. Has capere non est arduum, sed proferre rarum. hoc enim animal ne- 4
 gatur uiuere in alio, nisi in Æthiopico quo gignitur cælo. Et quemadmo-
Simia marina. dum in terra, sic etiam in mari aliquod est simiarum genus, quod delphino
 medicinam in morbo affert. In mari rubro, aiunt, simia est, non piscis qui-
 dem illa, sed bestia cartilaginea, & uelut squamarum expers: eaque ipsa nō
 magna, colore & aspectu terrenæ simiæ: non pisceo tegmine, sed ueluti te-
 studinis cortice uestitur. Eadem similiter atq; terrestris resima est: reliquū G
 corpus instar torpedinis latū est, ut dicas auem esse alas explicantem. Cum
 natat, uolare uidetur. maculis quibusdam distinguitur.

1 Simiarum genera. Tria tātum genera notat Oppianus, sicut & Aristoteles. 2
καῖος, cæbus est apud Aristotelē, simia gerens eandam. Inter monstra Æthiopiæ cen-
 setur cæphus apud Solinum: & cæphus apud Plinium, quem Pompei Magni ludi pri-
 mum ostenderunt Romæ ex Æthiopia: cuius pedes posteriores pedibus humanis &
 cruribus, priores manibus fuisse similes. Hoc animal postea Roma non uidit. Cepum
 etiam refert Aelianus rostri forma cynocephalo similem, magnitudine canis Ery-
 rhien sis, colore perquam uario. Sunt apud Indos, inquit Plinius, simiæ roto corpore
 eandentes. 3 In hoc forsitan genere est, qui *καυιδοντες* ab Aristotele uocatur, id est
 simia porcaria, cui rostrum simile habet chameleon. 4 Quibus artibus capiantur
 simiæ, explicant Plinius, Solinus, Diodorus & Strabo, alique nonnulli.

De canibus.

Cap. LXXVII.

H

Canis, κύων.

EX iis quæ nobiscum degunt canes sunt, atq; hominibus fidelissimi. So-
 li dominum nouere: & ignotum quoque si repente ueniat intelligunt:
 soli nomina sua, soli uocem domesticam agnoscunt. Itinera quauis longa
 meminere: nec ulli præter hominem memoria maior. In uenatu sagacitas
 & solertia præcipua est. Plurima alia in his quotidie uita inuenit. Dētes ca-
 nibus ferrati sunt: ex quibus qui canini uocantur, decidunt sicuti & homi-
 ni, idq; quarto ætatis mense: & præter caninos illos nulli mutātur. unde fit,
 ut diuersa sit authorum sententia: alij enim cum hos mutari uiderint, cæte-
 ros quoque pari ratione mutari existimant: alij, quod duos tantūmodo mu-
 rant,

A tant, negant omnino ullos mutari, cum eos paucos reperire difficile sit. uerum hoc propterea latet, quia non ante decidunt, quàm alij intus enascantur. Iuuenibus dentes candidi & acuti: ætate prouectis nigriores atque obtusi: indeque fit, ut ætas uetustiorum recentiorumque canū dentibus iudicetur. Mammæ gerit canis, nec in pectore, ut homo, nec in sceminibus, ut ovis, sed in uentre. caudam sub alium flectunt, qui degeneres sunt. Pedes priores quinis distinctos digitis habet canis: posteriores quaternis. ungues canibus recti, præter eum, qui à crure plerisque dependet. Venter cani paruus, & qui non multo amplior sit quàm intestinum, sed quasi intestino similis, intus leuis. Inferior intestini pars arctior est: ideoque uehementi nixu, nec sine cruciatu eam partem leuat excremento. Ætas canum, ut modo di-

B ximus, dentibus iudicatur: sed & senescentibus uox grauior redditur. Coeunt canes aliorum more retro mingentium: diutiusque in coitu ligati coheret, etiam inuiti. Canes tam mares quàm sceminæ anniculi magna quidem ex parte coeunt, sed nonnunquā mense octauo, quod magis sceminæ euenit quàm mari: nonnullæ canes & semestres coitum patiuntur. Indiciū in sceminis in mammis apparet, cum ætatem coeundi iam habent: fit enim

Huius rei causam inuestigat Alexander Aphrodisens in problematum lib. primo.

perinde ac in hominibus tumor in papillis mammillarū, & ueluti cartilago quædā consistit: sed difficile id perceperis, nisi habeas usum rei: caret enim hac indicia magnitudine. hoc igitur sceminæ euenire certū est: mari nihil eiusmodi accidit. Tēpus quo toto sceminæ libidine tenetur, diebus quatuordecim magna ex parte describitur: uerū nonnullæ etiā ad sextūdecimum

C pruriunt. Canes non per totā coeunt ætatē, sed usq; ad quendā ætatis uigorem: iam annos enim duodecim magna ex parte & coeunt & implētur. uerum iam aliquibus tum sceminis tum maribus uel annū octauū & decimū, atq; etiam uigesimali natis, facultas nō defuit prolifici coitus. Laconicæ coeunt quandiu uiuunt & mares & sceminæ. Hæc Aristoteles: Columella uero, Nares, inquit, in uillatico & pastoralis canum genere iuueniliter usq; in annos decem progenerant. Post id tempus ineundis sceminis nō uidentur habiles: quoniā seniorum pigra soboles existit. Sceminæ concipiunt usq; in annos nouem: nec sunt utiles post decimum. Canes etiam cum alienigenis coire apertum est. In Cyrenensi agro, (uel apud Gallos, uti Plinius refert) lupi cum canibus coeunt. & Laconici canes ex uulpe & cane generātur. Impletur canis uno initu, quod in surticiis maxime constat initibus: implet enim qui semel inierint. Gerit uterū diebus fere sexaginta & uno aut duobus, aut ad summū tribus: nec minus quàm sexaginta diebus. Quòd si quid celerius prodierit, educari ac perfici nequit. Cū peperit, rursus sexto post mense, nec citius, coitu impletur. Catulos parit articulos quidem, sed cæcos: nec ante duodecimum diem uisum recipiunt. Quæ ante iustum tempus concepere, diutius cæcos habet catulos: nec omnes totidē diebus. Sunt quæ duobus & septuaginta diebus uterum ferant, quarum catelli quatuordecim diebus luce carent. Quidam tradunt, si unus gignatur, nono die cernere: si gemini, decimo: idēque in singulos adijci, totidēque esse tarditatis ad lucem dies. Quò largiore alūtur lacte, eò tardiorē uisum acci-

Pregnantes solent esse canes, inquit Varro, ternos menses.

*Canuli, inquit
Varro, diebus
uiginti uidere
incipiunt.*

Αἰψα, rabies.

*Laconici co-
nes.*

Alopecides.

*Sagaciores, ki-
phi, ὀφθαλμοί.
Canis uillaticus
domesticus.*

piunt: non tamen unquam ultra uicesimum primum diem, nec ante septi-
mum. Optimus in fœtu qui nouissimus cernere incipit: aut quem primum
fert in cubile fœta. Primos mares pariunt canicula: in cæteris alternant. Ca-
nes fœminæ à catulorum partu uehementer ferociunt, & canire tum dicu-
tur, quod Græci *μουζῆς* uocant. Et tantundem etiam temporis canire putan-
tur dum catelli luce carent. Parit canis duodecim cum plurimum, sed ma-
gna ex parte quinque aut sex: unum etiam aliquam peperisse certum est,
quod tamen prodigium putant, sicut omnes mares aut omnes fœminas gi-
gni: Laconicæ magna ex parte octo pariunt. Lac ante diebus quinque q̄
pariant, fœminæ habent magna ex parte: uerum nonnullis etiam septē die-
bus anticipat. Genus canum Laconicū post coitum diebus triginta habere
lac incipit: utile statim ut pepererint, est. Crassum inter initia omnium est: F
deinde processu temporis tenuius redditur: crassius canum quàm cætero-
rum animalium lac est, excepto serofæ ac leporis. Crus mares tollentes
mingunt, magna ex parte quidem sexto mense ætatis: sed nonnulli uel se-
rius, octauo scilicet mense id faciunt: atque etiā maturius quàm sexto: idq̄
signum est cōsummati uirium roboris. Quod autem simpliciter dixerim,
cum coire incipiunt, tollunt. Fœminæ omnes confidentes mingunt: uerum
in hoc etiam sexu nonnullæ crure elato minxerunt. Viuunt canes maxima
quidem ex parte ad annos quatuordecim: sed nonnulli uel ad uiginti pro-
trahunt uitam. Viuūt Laconici, inquit Plinius, annis denis, fœminæ duode-
nis: cætera genera quindecim annos, aliquando uiginti. Canes tribus præ-
cipue laborant uitis, rabie, angina, podagra. Facit rabies furem: intereūt G
canes hoc morbo, & quæ morsæ sunt omnia: solus homo non absque mor-
tis quoque periculo euadit. Angina etiam interimit. Et podagra tetati pau-
ci euadere possunt. Rabies canum Syrio ardente homini pestifera: ita mor-
bis lethalis aquæ metus. Quapropter obuiam itur per triginta eos dies gal-
linaceo maxime fimo mixto canū cibis: aut si præuenerit morbus, ueratro.
Canum plura sunt genera, quibus nomina fere regiones dedere, ut Laco-
nicum, Salentinum, Molossicum, Arcadicum, Indicum, Britannicum, Me-
litense. Quamquam & aliqui à nutritoribus appellantur, ut Castorij, Me-
nelaides. Laconicis catellis nares porrectæ longius: idēque olfactu ualent.
Coit Laconicum genus mense suæ ætatis octauo: & crus iam circa id tem-
pus attollentes nonnulli urinam reddunt. Gerunt Laconicæ uterum sexa-
H
genis diebus, aut uno uel altero plus minúsue, uti modo diximus: & post
coitum diebus triginta habere lac incipiunt. Magna ex parte octo pariunt:
coeunt quandiu uiuunt & mares & fœminæ. Sūt ex his quæ ex cane & uul-
pe procreantur, alopecides dictæ. Et peculiare generis Laconici est, ut cum
laborarint, coire melius quàm per otium possint. Viuit in hoc genere mas
ad annos decem, fœmina ad duodecim: fœminæ enim in hoc genere, quia
minus laborant quàm mares, uiuaciores maribus sunt. In hoc quoque ge-
nere fœminas sagaciores esse quàm mares apertum est. In canum generi-
bus triplex ratio est: nanque unum genus aduersus hominum insidias eli-
gitur: & id uillam quæque iuncta sunt uillæ custodit: uillaticū appellamus.
At alterum

- A At alterum propellendis iniuriis hominum ac ferarum: & id obferuat domi stabulum, foris pecora pascencia, pastorale uocamus & pecuarius. *Pastoralis. Pecuarius. Villaticus.* Ter tium uenandi gratia comparatur. Villaticus eligendus est amplissimi corporis, uasti latratus canorique, ut prius auditu maleficum, deinde etiam cōspectu terreat. Niger potius eligendus quàm albus aut uarius: siue enim luce clara sur aduenerit, terribilior niger conspicitur, siue nocte, ne conspicitur quidem propter umbrę similitudinē. Probatur quadratus potius quàm longus aut breuis, capite tam magno ut corporis uideatur pars maxima, deiectis & propendentibus auribus: nigris uel glaucis oculis acri lumine radiantibus: amplo uillosoque pectore, latis armis, cruribus crassis & hirtis: cauda breui, uestigiorum articulis & unguibus amplissimis. Hic erit uillatici canis status præcipue laudandus. Mores autem neque mitissimi, neque rursus truces: quod illi furem quoque adulantur, hi etiam domesticos inuadunt. Satis est leueros esse nec blandos, ut nonnunquam etiam conseruos irati intueantur: semper excandescant in exteros. Maxime autem debet in custodia uigilaces conspici, nec erronei, sed assidui & circumspecti magis quàm temerarij. Nam illi nisi quod certum compererunt, non indicant: hi uano strepitu & falsa suspitione concitantur. Nec multum refert an uillatici corporibus graues & parū ueloces sint: plus enim cominus & in gradu, quàm cminus & in spatioso cursu facere debent. Nam semper circa septa & intra ædificium consistere, imo ne longius quidem recedere debent. Satisque pulchre funguntur officio, si & aduenientem sagaciter adoriūtur, & latratu conterrent: uel si constantius appropinquantem uiolenter inuadunt. Atque hæc de domesticis custodibus: illa de pastoralibus. *Canis pecuarius. Pastoralis.*
- C & latratu conterrent: uel si constantius appropinquantem uiolenter inuadunt. Atque hæc de domesticis custodibus: illa de pastoralibus. *Canis pecuarius. Pastoralis.*
- D gatur albus potius quàm aut niger aut uarius: quoniam hic est fera dissimilis, magnoque opus interdum discrimine est in propulsandis lupis subobsuro mane, uel etiam crepusculo: ne si non sit albo colore conspicuus, pro lupo canem feriat pastor. Huic quadrupedi neque fœminę neque mari, nisi post annum, permittenda uenus est: quæ si teneris conceditur, carpit & corpus & uires, animosque degenerat. Hæc Columellæ sententia est. Duo canum genera M. Varro prodidit, unum uenaticum, & pertinet ad feras bestias ac syluestres: alterum quod custodiæ causâ paratur, & pertinet ad pastorem. Hi facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigrantibus aut ravis, naribus congruentibus, labris subnigris aut rubicundis, neque refemis superioribus, neque pendulis subtus: mento suppresso, & ex co ena-

DE DIFFERENTIIS

ris duobus dentibus dextra & sinistra paulo eminulis superioribus, directis E
potius quàm brochis, & acutis, quos habent labro tectos: capitibus & auriculis magnis ac flaccis, crassius ceruicibus ac collo, internodiis articularum longis, cruribus rectis, ac potius uaris quàm uacis, pedibus magnis & altis, qui ingredienti ei displodantur: digitis discretis, unguibus duris ac curuis. talo nec ut corneo nec nimium duro, sed ut fermentato ac molli: à scæminibus summis corpore suppresso: spina neq; eminula neq; curua, cauda crassa, latratu graui, hiatu magno, colore potissimum albo: præterea fœminas uolunt esse mammosas, æqualibus papillis. Venatici canum generis nō eadē est omniū species, iidēque mores: sed ut præclare cecinit Gratius,

Venaticus canis.

Mille canum patriæ, ductique ab origine mores
Cuique sua. - Siue indomitos uehementior hostis F
Nudo Marte premas, seu bellum ex arte ministros.

- Magna indocilis dat prælia Medus.

Medi canes.

Geloni canes.

Arma negant contrà, martēque odere Geloni,

Perfes canis.

Sed natura sagax, Perfes in utroque paratus.

Seres canis.

Sunt qui Seras alant genus intractabilis iræ.

Lycaones.

At contrà faciles magnique Lycaones armis.

Britan. canes.

Britannici non specie tantum & decore, quantum uiribus pollent, & taciturna solertia. Athamania canis, Acyrus, Pherea, Acarnan, uersutæ omnes,

Athamania canis.

- Et quæ subire periculum surto.

Acyrus.

Pherea.

Acarnan.

Ætolica.

Sicambri.

Petronius.

Vmber.

Canis hircan⁹.

Indicus.

Ætolica multo clangore feras insequitur. Sicambri uelocitate præstant: ita & Petronij, & præterea inuestigandarum ferarum sagacitate: sed quæ cum G multo fiat latratu. Canis Vmber naris quidē sagacitate ualet, sed imbellis est. At Hircani (quos & Indicos uocāt) ex paterno semine ferocissimi: Indicos enim canes ex tigride & cane gigni confirmant: uerum non statim, sed ex tertio coitu natos educant Indi: primo enim & secundo sætu beluinos adhuc catulos procreari aiunt. Alligantur canes locis desertis: & nisi belua incensa libidine sit, sæpe lacerantur. Forma quoque differunt uenatici canes: est enim ex his genus quoddam

Seu Lacedæmonia natum, seu rure molosso

Elegens, promptum ac strenuum: & qui sit

- Cursu facilis, facilisque recurso:

corpore longo ac robusto, capite leui, pulchris oculis, cæruleis, splendentibus, rostro porrectiore, dentibus eminulis, acutis: auribus paruis mollibusque, tenuibus & ueluti membraneis: collo lōgo, pectore amplo robustoque, cruribus gracilibus, altis, rigidis: coxis diductis, prioribus pedibus minoribus: latis armis, costarum ordine in obliquo magis tendente, &

Qui sensim rursus sicca se colligat aluo:

lumbis amplis & bene carnosis, sed minime obesis, cauda gracili, prælōga. In hoc uenaticorum canum genere sunt, quibus ceruos, dorcadæ, leporēque prosequimur: ut qui Petronij uocātur, & Sicambri, & quæ Vertrahā uocāt. Hanc elegantissimo carmine depinxit Gratius poëta. - Te leue si quæ

Petroni⁹ canis.

Sicambri.

Vertrahæ.

Tangit opus, pavidosque iuuat compellere dorcas,

Aut

A Aut uersuta sequi leporis uestigia parui,
 Petronios (sic fama) canes uolucrèſque Sicambros,
 Et pictum macula uerraham delige falsa:
 Ocyor affectu mentis pinnâque cucurrit:
 Sed premit inuentas, non inuentura latentis
 Illa feras, quæ petroniis bene gloria constat.

Hæc Gratius. E uenaticis autem canibus quibus tauros uenamur,
 fuſcque ſylueſtres atque id genus ferocia animalia: iis corpus robuſtius eſt,
 & pilis hirsutius, nares ſimæ magis, aſpectus trunculètior, fronte & ſuper-
 ciliis prominentibus, oculis acri lumine radiantibus, dorſum amplum: nec
 ſane uelox hoc genus eſt. Tertium uenaticorum genus, Britanni agafæum *Agafæum*
 B uocant: ſtrenuus generoſuſque hic eſt, uerum prædictis longe minor: ma-
 gnitudine potius ignobilioribus hiſce canibus, qui ſub mēſis in ædibus no-
 ſtris aluntur æqualis, gibbus, ſtrigoſus, hirsutus, aſpectu oculorum ignauo,
 unguibus duris rigidisque, dentibus iis qui canini uocantur, magnis, naris
 ſagacitate in perueſtigandis ferarum ueſtigiiſ cæteros omnes facile ſupe-
 rat. Tuſcos canes uocat Aurelius,

Tuſcum canis:

Forma quibus licet obſita uillo,
 Diſſimilèſque habeant catulis uelocibus artus,
 Haud tamen iniucunda dabunt tibi munera præda.

Nanque & odorato noſcunt ueſtigia prato:
 Atq; etiam leporum ſecreta cubilia monſtrant.

C Gratius glympicum nominat & metagona,
 Quem primum celſa lorum ceruice ferentem
 In ſyluis egit Beotius Hagnon. *Hic*

*Glympicus,
 Metagon.*

Vnus præſidium, atque operi ſpes magna petito
 Aſſumptus metagon, luſtrat per nota ferarum:

Pæſcua, per fontes, per quas triuere latebras

Primæ lucis opus: tum ſigna uapore ferino

Intemerata legens, ſi qua eſt qua fallitur eius

Turba loci, maiora ſecat ſpatia externa gyro:

Atque hic egreſſu iam tum ſine fraude reperto,

Incubuit ſpatiis.

D Sed ne qua ex nimio redeat iactura furore,
 Lex dicta officij neu uoce laceſſeret hoſtem,
 Néue leuam prædam aut propioris pignora lucri

Amplexus, primos ne quicquam offenderet actus.

Iam uero impenſum melior fortuna laborem

Cum ſequitur, iuxta domus quaſita ferarum

Vt ſciat, occultos & ſignis arguat hoſteis:

Aut effecta leui teſtatur gaudia cauda,

Aut ipſa infodiens uncis ueſtigia plantis

Mandit humum, celſæ uæ apprenſat naribus aures.

Et hæc quidè uenaticorum canum genera à ueteribus celebrata memini:

DE DIFFERENTIIS

*Molotticus
canis.
Pescarius.*

*Melite^o canis.
Melitenfis.*

*Quomodo cō-
buri debeat ca-
mini capitis of-
fa, docet Plin.*

mus. Sunt autē & in eodem genere canum, alij uenatici, alij pecuarij: ut in E genere molottico. Cum enim molotticum genus uenaticum nihilo à cate ris discrepat, quòd scilicet fœminæ moribus sint mollioribus quàm mares, pecuarium tamen magnitudine & animositate contra beluas præstat: insi- gnes uero & animo & industria, qui ex utroque, molotticis dico & laco- nics, prodicint. Sunt præter hæc nobilia canum genera, imbelles quidam paruique, & prope dixerim inutiles, qui in domibus nostris oberrāt, & sub mensis aluntur: ex quibus paucos admodum ab authoribus celebratos me- minimus: in quibus est quī catulus Meliteus à Melita insula dictus à Calli- macho est: paruus hic est, quàm sit uicinia maior. Hi stomachi dolorē se- dant applicati sæpius: transireque morbos, ægritudine corū intelligitur, ple- runque & morte. Præcordia uocamus uno nomine exta in homine: quo- F rum in dolore cuiuscunque partis, si catulus lactēs admoueat, apprima- tūque his partibus, transire in eum morbus dicitur: idq; exenterato perfu- sōque uino deprehendi, uitiatō uiscere illo quod doluerit hominis: & ob- rui tales religio est. Sunt occulti interaneorum morbi, de quibus item mi- rum proditur. Si catuli priusquam uideant applicentur triduo, stomacho maxime ac pectori, & ex ore egri suctum lactis accipiant, transire uim mor- bi: postremo exanimari, dissectisque palā fieri ægri causas: mori & humari debere eos obruta terra. Canis rabidi iecur si assum edatur, pro remedio iis qui ab ipso fuerint mori à nonnullis proditum est. Audiui autem quosdā, inquit Galenus, cum illi soli remedio fidem habuissent, postea statim mor- tuos. Multo tamen utilissime (ut tradit Plinius) iecur eius qui in rabie mo- G morderit, datur, si possit fieri, crudum mandendū: si minus, quoquo modo coctum: aut ius incoctis carnibus. quin & necesse catuli statim in aqua ad sexū eius qui momorderit, ut iecur crudum deuoretur ex iis. Hæc Plinius. Utuntur quoque ad arcendos aquæ pauores (ut author est Dioscorides) ca- nino dente eius, qui momorderit canis, folliculo includētes: quem brachio pro amuleto adnectunt. In canis rabidi morsu tuetur à pauore aquæ capi- tis canini cinis illitus uulneri: idem in potione proficit: quidam ob id edē- dum dederūt: aliqui & uermem de cadauere canino adalligauere. Est limus saluæ sub lingua rabiosi canis, qui datus in potu fieri hydrophobos non pa- titur. saluuntur & carnes eorum qui rabidi fuerunt, ad eadem remedia in cibo dandæ. Sanguine canino cōtra toxica nihil præstantius putatur: & ad H scabiem ante omnia ualeat sanguis caninus. Ossibus fractis caninum cere- brum linteolo illito superpositis lanis quæ subinde suffundantur, fere xiiii diebus solidat. Lendes tolluntur adipe canino: aurium grauitatem sedat a- deps cum absinthio & oleo uetere: caninque lactis instillatio sedat aurii dolorem. Stercus caninum anginis medetur, & dysenterię: necnon ulceri- bus, præcipue malignis.

1 Canes & c. Alios etiam canum morbos ostendūt rei rusticæ authores: sed quibus facilius remedia adhiberi possint: ut Collib. 7. Græti de uenatione. 2 Meliades. Petronij à petronibus dici putantur: quos ueteres rusticos appellarunt. 3 Olfactu ualent. Interpres Arabicus leucarium hunc uocat.

De lupis.

De lupis.

Cap. LXXVIII.

- A**ni pecuario magno simillima corporis figura lupus est. Collū illi u- *Lupus, λύκος.*
 Cnico osse perpetuo rigidum: cauda crassa, uillosa. Genitale ossis naturā
 sequitur. pedes habet priores quinis distinctos digitis, ut canis. Auerſi co-
 eunt lupi eodem modo quo canes, sed uno tempore tantum: & dies quibus
 coeunt toto anno non amplius duodecim. Fert etiam uterum lupa, & parit
 ut canis, tum tempore, tum fœtus numero. Cæcos etiam generat canis mo-
 do: parit incunte æstate. Animal est insidiosum & ferox: inertes tamen hos
 paruſque Africa & Ægyptus gignunt: asperos trucēſque frigidior plaga.
 Viſu præditus est lupus acutiſſimo, ut qui nocte intempeſta & tenebroſa, lu-
 ce tamen perfruitur: noctu itaque uagatur & pecora deuorat. Quin & tau-
 ros quoque inuadit & aſinos, atque etiam uulpes. Lupi hominem illi po-
 tius uorandum petunt, qui *μονοπαρής*, id est uniparæ aut ſolitarij ſunt, quam *πολυπαρής*,
 qui uenatores, *κυνήγεας* uocant. Lupos etiam aiunt terram quandam cum *κυνήγεας*,
 1 cſuriunt edere. Quinetiam apud paludem Mæotidem, lupos eſſe piſcatorū *Lupi piſcato-*
 familiares, eorūque ſocietate piſcari aiunt: & niſi partem ſuam eorum *res.*
 quos capiunt piſcium à piſcatoribus acceperint, retia cum in terra expanſa
 reſicantur, lacerare. In Italia creditur luporum uiſus eſſe noxiuſ: uocēmq;
 homini quem priorem contēplentur, adimere ad præſens. Lupi iecur tri-
 tum hepaticis datur, iſis qui febris ſunt expertes cum uino nigro calido: ſe-
 brientibus uero cum aqua calida. Oſſea ſunt lupis genitalia, uti diximus, &
 iſis calculo humano præcipua remedia. Plura ſunt luporum genera: pri-
 mum *πυλῶν* uocant, quaſi iaculatore in ſagittariū uoc dixeris, toto cor- *πυλῶν*.
 2 pore fuluo breuique. Caput habet lōge maius quā pro corporis ratione:
 uentrem ueluti canitie multa albicantem, curſu pernici, horrendo ululatu,
 aſpectu truculento, capite fere nutante. Alterum genus circum appellāt, *Circus, κύκλιος*,
 & *ἀγρῖος*, id eſt raptorem, priore maius, corpore oblongo, colore & in late *ἀγρῖος*.
 ribus & cauda candido, uelocitate cæteros lupos omnes facile ſuperat. mul-
 to cum ſtrepitu prima aurora & in ipſo crepuſculo ad prædam proficiſci-
 tur. In montibus degit: urgente uero acriore hyemis aſperitate, urbes pro-
 pius accedit, quo facilius è gregibus uictum paret. Eſt in Tauro, Amano,
 & Ciliciæ montibus, non lupus, ſed lupis belua longe præſtantior, prægrā- *Aureus lupus,*
 dis atque proceræ, aureum uocāt & *χρύσεος*, à pilorū fulgore, inter ſeras pul- *χρύσεος*.
 3 chritudine eximia: inſigni oris duritate roboreque, quo ferrum, æs, lapidēſ
 que uel duriffimos emollit atque frangit. Caniculæ ortū ſentit hæc belua
 metuſque: ſtatim nanque in terræ ſpeluncam quampiam abdit ſeſe, donec
 feruor ille ſolis deferbuerit. Duo item ſunt alia hiporū genera, *κύνες* uo-
 cant: collo breui, dorſo lato, cruribus pedibūſque uilloſis, roſtro toto & oculo- *κύνες*.
 rum duntaxat ambitu nigricat: hunc quidam *ἰκτινός* dicunt: alter uero colo- *ἰκτινός, πλῆθος*
 re nigricante inſignis, minor priore eſt, ſed uiribus nihilo inferior. Setarū *πλεθος dixit*
 in modum horrent undique pili, lepores frequenter inuadunt. Thoſ lu- *Oppianus.*
 puſ eſt Æthiopicuſ paruſ & deformiſ, ex lupo & panthera prognatuſ, qui *Thos, θῆος.*
 3 utrunque refert parētem, facie ſcilicet genitorem, reliquo corpore matrē.

DE DIFFERENTIIS

Corpus illi ad caudam porrectius est, sed minus procerum. Interna omnia lupi similia habet. Impletur ut canis, & catulos etiam cæcos generat. Velocitate præstat, saltuque ualet, quanuis crura habeat breuiora: mollis enim & agilis est, prosilireque longius ob eam rem potest. uenatu uiuit: hominē diligit, quem neque offendit neque metuit ualde. pugnat cum canibus & leonibus, imo leones ipsos superat: quod fit ne in eodem loco sint thoes & leones. Huius alij duo genera statuunt, alij tria, sed plura esse non uidentur: sed ut piscium, auium, quadrupedum genera aliqua, ita thoes quoque per tempora immutantur, & colorem diuersum hyeme æstatæue trahunt: atq;

*Nudi, aut for
sitan leues, uel
mildi.
Lupus ceru-
rius.*

æstate nudi, hyeme hirti redduntur: itaque habitum, nō colorem mutant, inquit Plinius. Lupus ceruarius (eūdem esse arbitrantur nōnulli, qui thos: alij chaum dici malunt,) insatiabilis est, ut cui à uentre protinus recto intestino transeunt cibi. Hic tamen, quāuis post longa ieiunia, repertas ægre carnes si mandare coeperit: ubi quid casu respiciat, obliuiscitur: & immemor præsentis copiar, abijt quæsitum quam reliquerat satietatem. Mittit

Lycæon.

Æthiopia & lycæonem & India quoque. lupus est ceruice iubatus, & tot modis uarius, ut nullum illi colorem dicant abesse. In hoc animalium genere numeratur à quibusdam & lynces. Duo eorum genera: animal utruq; paruum est, forma utrique similis, oculi splendētes, facies formosa, exiguum caput, auriculæ curuæ. Differūt magnitudine & colore: minori enim generi color rufus: maiori ad croceū uergit. Genus hoc maius ceruus orygasq;

*Vergil. Quid
lynxes Bacchi
uarias*

magna cum agilitate inuadit. Animal peregrinū lynx est, clarissime omnium quadrupedum cernit. In cruribus posterioribus simile quid semitalo habet. In auersum mingunt lynces, auersæque coeunt canum more. Harum urinas coire in geummas carbunculi similes & igneo colore fulgentes, fatentur, qui naturas lapidum exquisitius sunt persecuti: lyncurium uocatur (è maribus fuluum & igneum: à feminis languidius atque candidum.) Istud etiam ipsum lynces persensiscere hoc documento probatur: quod egestū liquorem ilico arenarum cumulis quantum ualent, cōtegunt, inuidia scilicet ne talis egeries transeat in usum nostrum, ut Theophrastus perhibet. Hoc non solia tantum & stramenta ad se rapere, sed æris etiam atque ferri lamnas contendunt: quod Diocles quidem & Theophrastus credidit: Ego falsum id totum arbitror (inquit Plinius) nec uisam in æuo nostro gemmā ullam ea appellatione. Et quod de medicina simul proditur, calculos uescic eo poto elidi, & morbo regio occurrī, si ex uino bibatur aut si portetur. Vngues earum omnes cum corio exuri efficacissime in Carpatho insula tradunt hoc cinere epoto, propudia uirorum, eiusdem aspersu, scæminarum libidines inhiberi. Item pruritus corporum, & urina, stillicidia uescicæ itaque eam protinus tera pedibus aggesta, obruere traditur. Eadem autem & iugulorum dolori monstratur in remedio. Alij dixere languriū, & esse in Italia bestias langurias: Zenoti mus lāgas uocat easdem, & circa Padum iis uitam affirmat. r. 36. lupum canarium uocauere quidam: animal est aspe-

*Lyncurium.
De lyncurio
plura apud Plin-
ium lib. 37.
cap. 2.*

ctu pulchrum, sed uirium expertus & imbellis. Catulos parit cæcos luporum ritu. Chaum galli raphium uocabant, effigie lupi, pardorum maculis.

*Langurium.
Languria.
Lang.
p. 36.
Lup. canari.*

*Chaum.
Raphium.*

1 Apud

- A** 1 Apud paludē Mæot. Secundū Mæotidis paludis Conopiū nuncupatū lupi, quos minime à domesticis canibus differre dicas, cum piscatoribus stultiose uersantur.
 2 Breui, *ῥωδία γῆς*, id est mēbrorū compage prope rotunda. 3 Reliquo corpore, *ῥωδία*, id est tergo, uel ut Gullio placet, pellis uarietate. 4 Igneo colore fulgētes, Esse autem qualē in igneis succinis colorem, scalpique refert Plinius. 5 *ῥωδία*, Pollux *ῥωδία* inter maiora numerat animalia. 6 Chaum eundē esse cum lupo ceruario cēset Hermolaus: & ex chao conceptas canes chaonidas nominari etiā si Iulius Pollux altiore de his fabulam recenseat.

De hyæna & crocuta.

Cap. LXXIX.

- V**T lupo non dissimilis, ita nec omnino similis hyæna est, quam nōnuli glanum dicunt: dorsum illi medium gibbum est. colore lupi prope, sed hirsutior, latere utrinque fusca distincto uilla: & iubam habet ut equus, sed quæ per totum dorsum porrecta est, & seta duriore longiorēque. Varietas multiplex inest oculis, ut qui in mille colores transeat subinde, in quorum pupilla lapis inuenitur, hyenium dictum, præditum illa potestate, ut cuius hominis fuerit linguæ subditus, prædicat futura. Spina illi riget, & collum continua unitate, flectique nequit, nisi toto corpore circūactō. Corpus illi non minus quàm lupi est, longum & gracile: & cauda quoque longagracilisque, sed hirsuta. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris & fœminæ candem habere, itaque inire & iniri alternis annis coniectitium est: sed uirile similiter atque in lupis & canibus habetur. Quod uerō fœmineum esse uidetur, tam in mari quàm fœmina sub cauda positum, est.
- C**linea quædam similis genitali fœminino, sed sine ullo meatu: sub hoc meatu excrementorum est, atque sub eo genitale uerum in fœmina continetur. Quæ quidem nota quauis utrique sexui communis sit, tamen in maribus potius cernitur: quia mares quàm fœminæ magis capiuntur, quòd iis ingenta est callidior altutia. Iam inter undecim numero, unam tātum cepisse uenator retulit quidam. Nocte grassatur, ut quæ noctu melius cernat. Molitur hæc insidias homini, sequiturque stabula pastorum, & auditu assiduo addiscit uocamen, quod exprimere possit imitatione uocis humanæ, ut in hominem astu accitū nocte sæuiat. Vomitus quoque humanos mentitur, falsisque singultibus sollicitatos sic canes deuorat. Sepulchra quoque effodit humanæ auida carnis, ac eruit. Præcipue pantheris esse in metu hyænæ dicuntur, ut ne conentur quidem resistere, & aliquid de corio earum habentem, non appeti. Mirūmque dictū, si pelles utriusque contrariæ suspendantur, decidere pilos pantheræ. Cum fugiunt uenantem, declinant ad dextram, ut prægressi hominis uestigia occupent. Quòd si successerit, alienari mente, ac uel ex equo hominem decidere: at si in læuam detorserit, deficientis argumentum esse, celeremque capturam. Hyænæ plurimæ gignuntur in Africa. Hyæna quemadmodum & uulpes in oleo elixæ oleum efficit diffusorium, articulari morbo utilissimum: usus omnino idem quem de uulpino docebimus. Hyænæ fel taurino efficacius est: suffusionem oculorum per initia digerit, aciemque eorum exacuit. Lippitudini fel illitum frontibus prodesse dicitur: aut ne lippiat decoctum cum mellis Attici cyathis

*Hyæna,
Glanus.**Aliis hyænæ,
ex oculis hyænæ,
inquit Plinius.*

DE DIFFERENTIIS

tribus & croci uncia illitum: sic & caligines discutit & suffusiones. Claritate excitari melius inueterato medicamento: asseruari autem in Cypria pyxide. Eodem sanari argema, scabritias, excrefcētia in oculis: itē cicatrices. glaucomata uero iocineris recentis inafflati sanie cum dispumato melle inunctis. Dētes eius dentium doloribus tactu prodesse: (si credimus) uel alligatos ordine humeros, humerorum & lacertorum doloribus. Pulmones in cibo sumptos cōliacis: uētriculis, cinerem cum oleo illitum: nervis, medullas ē dorso cum oleo uetere ac felle. Febribus quartanis, iecur degustatum ante accessiones: lumborum doloribus, carnes ē lumbis edendas, illinendāsque cum oleo: uenerem stimulari, genitali ad sexus suos in melle sumpto, etiam si uiri mulierum coitus oderint. Hyæna quodcunque animal ter lustrauerit, mouere se non posse, sed in uestigio hædere traditur: F quapropter magicam scientiam inesse ei pronuntiauerunt, quam & magi ex omnibus animalibus in maxima admiratione posuerunt. In Æthiopix parte coit cum læna, unde nascitur monstrum, cui crocutæ nomē est: uoces hominum pecorūque & ipsa pariter affectat. Nunquam conuiuet aciem orbium, sed in obtutum sine nictatione cōtendit. In ore gingiua nulla, dens unus atque perpetuus: qui ut nunquam contrario cursu hebetetur, naturaliter capfularum modo clauditur. Crocutas etiam generat Æthiopia ex cane lupōque conceptos, omnia dentibus frangentes, protinūsque deuorata conhicentes uentre.

*Culiacis, aliis
diacis.*

*Crocota, κρο-
κωτῆς.
Alias crocota,*

1 Genitale, Nec minus stulte, inquit Aristoteles, magnōque errore trochum. Herodotus Heracleota scribit duplex genitale habere, matris ac fœminæ: atque trochum G seipsum inire.

De leonibus.

Cap. LXXX.

Λέων, leo.

Leo rarum genus animalis est, nec multis nascitur locis. In Europa potius quàm in Asia inueniuntur leones: & in Europæ ea parte quæ inter Acheloum tantum & Nestum amnes est: & ij uiribus longe præstantiores sunt iis, quos Africa aut Syria gignant. Qui uero prope Istrum Europæ amnem, quique in Armenia aut Parthia procreantur, non adeo uiribus pol-

*Leones fului
sunt omnes,
inquit Aristoteles, πυρρόλοι.*

lent. Leones ita depinxit Ouidius,
- His leuia fuluæ
Colla iubæ uelant, digiti curuantur in ungues:
Próque humeris armi fiunt. in pectora totum
Pondus abit, summæ cauda uerruntur arena:
Iram uultus habet. pro uerbis murmura reddunt.
Pro thalamis celebrant syluas.

- His leuia fuluæ

H

Verum pro regionum, in quibus gignuntur uarietate, eorum quoque forma diuersa est. In Parthia nanque & Armenia nascuntur colore fuluo, crasso collo, capite magno, oculis splendore radiantibus, superciliis extantibus, & fere ad nares usque propendentibus, collo simul & mento, plurimo pilo luxuriantibus. Qui in Erebis gignuntur, collo quoque & pectore nō minus iubati sunt, & oculis item splendore fulgentibus: uerum ex iis pauci, uel in regione ampla reperiuntur, & supra modum pugnares: in Africa autē plu-

res,

A res, uerum non ita hirsuti pilosius: sed neque oculis adeo radiantibus, aspectu tamen terribili. Totius corporis color nigricās his fuscusue, ac si nigrū cœruleo permisceas: corporis robur eximium. Ex Æthiopia migrant nonnunquā leones, cætero nigricantes, solo rictu fuluo colore rufescentes, plurima iuba, capite grandiore, oculis nigricatibus: ut uero Plinius scribit color leonum tantum in Syria niger. Abundat Æthiopia & leonibus qui *Μῆρμυκας*, *Formica Indica*. autem hoc genus genitale auersum, colorem aureum, glabriores hi sunt quàm Arabici. Ipsis, inquit Plinius, color felium, magnitudo Ægypti luporum, uel ut Solino placet, ad formam canis maximi: ut uero Herodoto quā sit canum magnitudo minor, uulpiū uero maior, pernicitate miranda: uenatu uiuunt, pedibus quos leoninos habent, arenas aureas ex cauernis egerunt terre, talparū more, quas uigilantissime custodiunt, ne quis auferat: captantesque ad necem persequuntur: in cauernis aestu conduntur. Nearchus uidisse se scribit formicarum ferarum pelles pātherarum pellibus similes. Herodotus corporis specie formicis Græcis similes esse tradit: eodēque modo arenā ab illis effodi. Plinius, Indicæ formicæ cornua, inquit, Erythris in æde Herculis fixa, miraculo fuere. Dentes leonibus omnibus ferrati: & ex iis eos tantūmodo mutant, qui canini uocantur quatuor, duos superius, toridēque inferius: idē: sexto ætatis mense fit. Lingua leonibus imbricatæ asperitatis est, & limæ similis, attenuānsque lambendo cutem hominis: ceruix ossē uno rigida cōstat, nec uertebreis ullis iungitur. Iuba caret leona: C maris enim hæc propria est, ut scilicet pili in armis largi depēdeant: at quos pardi genera uere, semper insigni hoc carent. Binas tantum gerūt mammas in medio uentre: quæ etiam in feminis paruo abundant lacte. In cruribus posterioribus talem gerunt in anfractum tortuosum: pedes priores quinis distinctos digitis habent, posteriores quaternis: ungues iis adunci, quorum mucrones cum ingrediuntur, uaginis corporū claudunt, ne acutina attritu retundantur: nec nisi appetendo prætenduntur. Pedatim incedit leo, hoc est ut sinister pes non transeat dextrum, sed subsequatur. cauda leoni, infima parte ut bubus hirta: Leonis ossa exigua admodum, & perobscuram habent medullam, eamque solis in fortioribus & brachiis: eius ossa adeo dura sunt, ut ex iis concussis, ignis quasi ex silice excutiat. Ventrem habet leo ut canis arctiorem: & interiora item omnia canibus similia continet. Leo auersus coit, urināque retro reddit. Coit & parit nō omni tempore: singulis tamē annis uere parit, & magna ex parte geminos: sed cum plurimum sex catulos: nonnunquam etiam unum. parit autem catulos informes inarticulatosque, in initio magnitudine mustellarum, & cæcos: sed qui uident protinus atque nascuntur, soli in eo genere quod dentes habet ferratos. Sunt uero cum in lucem eduntur adeo parui, ut semestres uix ingredi possint, nec nisi bimestres moueri. Leones terræ Syriæ quinquies uita pariunt: primum quinque, post uno subinde pauciores: anno enim secundo quatuor, mox tres: deinde pari modo per annos singulos minus uno, postremo nullum: atque ita leonæ partus multitudine sterilesceit, Semel in uita

DE DIFFERENTIIS

leānam parere scribit Herodotus, unāque cum sætu uterū emittere, quod E fabulosum esse asserit Aristoteles. Vescitur quidem carne leo ritu cætero- rum sylvestrium ferratorum: sed cibo incontīnēter admodum utitur, mul- tāque deuorat solida, sine ullo dissectu. Mox nihil biduo, aut certe triduo edicit: ferre enim in ediam potest, ut qui iam ad multam satietatem repletus est. Parum bibit: excrementum uero emittit tertio die: uel utcunque acci- dit egerit, idq; durum, aridum, & simile ut canis. Flatum etiam acerrimum emittit, & urinam grauiter olētem. Mingit crure elato ut canes ad stipites: sædum quoque odorem in cibo relinquit ex suo halitu: proscissio nanque leonæ, interiora grauius olent. Leo quanuis in edendo ferocissimus sit, ta- men pascus & fame iam uacans, facilis mitisque maiorem in modum est. Clementię in iis indicia multa sunt: prostratis parcūt: in uiros potius quā F in fœminas sæuiunt: infantes non nisi magna fame perimūt. Animos leo- num frons & cauda indicant: sicut motus equini de auribus intelliguntur: immota enim cauda est placido, clemens blandientq; similis, quod rarum est: crebrior enim iracundia eius. In principio terra uerberatur: incremen- to terga seu quodam incitamento flagellantur. Vis summa leoni in pectore est, firmitas in capite præcipua. Infirmitas parte ilium est cōtra ictus: sed reli- quo corpore multas patitur plagas. Leonum genus trifariā scinditur: nam breuiores & iubis crispi, plerumque ignaui sunt & imbelles: longiores & co- ma simplici, generosi acresque magis ac potentes. Leoni præcipua gencro- sitas tunc, cum colla armosque uestiunt iubæ: id enim ætate cōtingit ē leo- ne conceptis: at hi quos creant pardi, in plebe remanent iubarum inopes. G Adulterinis enim coitibus degenerantur quandoque partus leānarum: & leones quidem procreantur, sed ignobiles. Leones cum premuntur à cani- bus aut uenātiū multitudine, cōtemptim recedunt sensim pedatimq; sub- sistentesque interdum ac respectantes dissimulant timorem. Idq; agunt, si in campis patentibus ac nudis urgeātur: nam sylvestribus opacisque locis, quanta possunt se fuga subtrahunt. Cum insequuntur nifum saltu adiuuāt: & ubi iam prædæ appropinquarint, insiliunt: cum fugiunt, non possunt sa- lire, sed cursus eorum continens, ut canum intēditur: fugiunt nonnunquā leones demissa inter etura cauda, ut canes. Iam uisus est leo, qui cum suem aggredederetur, ut fetis horrentem aspexit, fugeret. Ignem præcipue formi- dant, & cantus gallinaceorum, & rotarum strepitus: sed ignes magis. Leo- H nis adeps cæteros & caliditate exuperat, & partium tenuitate: ac proinde digerendi facultate habet maiorem. Leonis adeps cum rosaceo cutem in facie custodit à uitiiis, candoremque seruat, & sanat adusta niuibis, articu- lorūque tumores. Fel aqua addita, claritate oculis inunctis facit: & cum adipe eiusdē comitiales morbos discutit leui gustu, & ut protinus qui sum- psere cursu id digerant. Gor in cibo sumptum, quartanis medetur: adeps cū rosaceo quotidianis febribus. Leontophonos uocari accepimus bestias modicas, nec aliubi nascentes, quā ubi leo gignitur: quarum urina asper- sa leoni exitialis est: quæ & capræ exuruntur, ut earum cineres pollutæ ia- ctæq; per compita concurrentium semitarum leones neccēt, si quantulun- cunque

Parte illius,
de uelō tū
κιδνα.

Leontophoni.

A cunque ex illis sumplerint: Propterea leones naturali eas premunt odio: atque ubi facultas data est, morſu quidē abſtinent, ſed dilaniatam exanimāt pedum niſibus. Illa contrā urinā ſpargit prudens, hanc quoq; leoni extialē.

De tigride.

Cap. LXXXI.

Tigrin Hircani & Indi ferunt. Hoc beſtiarum genus inſignes maculis Tigriſ. notæ & pernitas memorabile reddiderunt. Aſpectus pulchritudine reliquas omnes quadrupedes non minus ſuperat tigriſ, quā pauo alites, corporis magnitudine, oculorum intuitu, ſuperciliis prominentibus, caudæ longitudine, toto denique corporis habitu, præterquam coloris uarietate. leonē ſimillima tigriſ ſcēmina eſt, (nam mas canī ſimilior extat.) Fuluo nitet corpus: hoc fuluum nigrantibus ſegmentis interundatum, uarietate apprime decet. Velocitatis tremendæ ſunt tigres: nihil enim tam longum quod non breui penetrent: nihil adeo antecedit, quod nō ilico aſſequatur: at maxime potentia earum probatur, cum maternis curis incitantur, cum catulorum inſiſtunt raptoribus. Succedant ſibi equites licet, & aſtu quārolibet amoliri prædā uelint, niſi in præſidio maria fuerint, fruſtra eſt auſum omne. Totus tamen eius ſcetus, qui numerofus eſt, ab inſidiante rapitur, e quo quā maxime perniti: atque in recentem ſubinde transfertur: at ubi uacuum cubile reperit ſerta (maribus enim cura non eſt ſobolis, ſed nec eos aliās temere conſpexeris) fertur præceps odore ueſtigans. Raptor appropinquante fremitu, abiicit unū ex catulis: tollit illa morſu, & ponde re etiā C ocyor acta, remeat: iterū conſequitur, & ſubinde, donec in nauim reſſo, irrita ſeritas ſequit in litore. Notantur enim frequentiffime, ſi quando raptoreſ, ſuis aſportatis catulis, re nauigātes uident, in litore irrita rabie ſe dare præcipites, uelut propriam tarditatem uoluntaria caſtigantes ruina. Tigres apud Præſios maximas gigni Megalthenes author eſt: quippe quæ leones magnitudine dupla fere luperant. Tigres Arrianus (qui Alexandri reſ geſtas conſcripſit) magnitudine equum maximum æquare, cæteras uero quas uulguſ tigres nominat, non tigres, ſed thoas eſſe maiores prodidit.

De panthera pardo & cepto.

Cap. LXXXII.

Panthera & tigris macularū uarietate prope ſolæ beſtiarum ſpectātur. Panthera. *ῥάγδιλος, τίγρις δὲ λευκὸς*
D Ferox animal pāthera eſt, & in homines ſequit. Macularum, ut diximus uarietate ſpectabilis eſt, & minutis orbiculis picta, ita ut ocularis ex ſuluo aut nigro circulis, uel cœrulea, uel alba diſtinguatur tergi ſupellex. Sunt qui tradant in armo iis ſimilem lunę eſſe maculam eſcendentem in orbes, & cauātem pari modo cornua. Duplex pantherarum genus, alterum maius, quod & dorſum latius habet: alterum minus quidem, & corpore gracilior, at uiribus nihilo inferius. Similes ſunt utræq; præterquam quod caudis differunt: minori enim maior eſt cauda, maiori uero minor. Corpus utriq; oblongum maculiſque uarium, ut modo diximus. Oculi ſplendore radiantes: dentes habent ſerratos: mammaſ in medio uentre quaternas, crura cōpacta firmæque: pedes priores quinque digitis diſtinctos, poſteriores quater-

DE DIFFERENTIIS

nis. Ingrediuntur leonum more, cōdito scilicet in corporis uaginis unguiū E mucrone, nec nisi appetendo prætendunt. cor habent pro corporis ratione magnum. Animalium nullum odoratum, inquit Plinius, nisi si de pantheris quod dictum est credimus. Tradunt odore earum, & contemplatione armenta mire affici: atque ubi eas perferant, præparato conuenire: nec terreri, nisi sola oris toruitate. quam ob causam pantheræ absconditis ca- 2 pitibus, quæ corporis reliqua sunt, spectanda præbent, ut pecuarios greges stupidos in obtutu populentur secuta uastatione. Pantheræ in Europa nullæ sunt: in Hircania numerosæ. uino plurimū delectantur. Capiuntur ma- 3 xime, non agno aut hædo, sed canicula palo alligata: uerum Hircani, ut hominibus intentatum nihil est, frequentius eas ueneno quàm ferro necant: aconito carnes illinunt, atque ita per compita spargunt semitarum: F quæ ubi eas sunt, fauces earum angina obsecuntur, ideo & gramen *ωραδαιόγης* appellauerunt: sed pantheræ aduersus hoc uirus, excrementa humana deuorant, & suo pte ingenio, pesti resistunt. Quocirca uenatores stercus in uasculo suspendunt ex arbore aliqua, ne procul belua abeat petēs suum medicamentum, idq; altius quàm ut queat saltu contingere. itaque insiliens ibidem, & spe capiendi perseuerans, in se efferenda emoritur. In pantherarum genere scēminam animosiores esse quàm marem apertum est. Nunc & uarias, & pardos qui mares sunt, appellant, in eo omni genere, creberrimo in Africa Syriæque. Quidam ab iis pantheras solo candore discernunt, nec adhuc aliam differentiam inueni, inquit Plinius. Insidunt in 4 Africa pardi cōdensa arbore: occultatque eius ramis, in prætereuntia desig- G liunt, atque è uolucrū sede grassantur. Est in Æthiopia cepus, reliquo quidem corpore pantheræ similis, sed facie leonina, magnitudine dorcadis.

Varia.
Pardi.

Cepus, *αἰπός*,
αιπός.

1 Pantheris in candido breues macularum oculi, inquit Plinius. Cærulea uel alba dixit Solinus, quod Oppianus *ἀδανειστικόν, ἰσπίς*. 2 Quo modo pantheræ simias captant, ostendit Gillius, ut ait, ex Æliano: item hinnulos, dorcadas, capras sylvestres, atque alia ciusmodi animalia. 3 Quo pacto capiantur ostendit Oppianus lib. 3. De uenatione, & 3. De pisc. 4 Solinus. In his syluestribus & pardi sunt, secundum à pantheris genus, noti satis: quorum adulterinis coitibus degenerantur partus leonarum: & leones quidem procreantur, sed ignobiles. 5 Cepus, *αἰπός* colunt Babylonij, qui sunt iuxta Memphim, faciem habet saryro similē, cætera inter canem & ursum nascitur in Æthiopia.

De urso.

Cap. LXXXIII.

H

Vrsus.
Vrsus.
ἄρκτος.

V Rsus animal est aspectu horridum, corpore latiore, hirsuto uillo, & -Ora illi lato deformia rictu. -Vox iracunda minaxque, Plenæque terroris rauco de gutture fertur.

Dentes illi ferrati, naris nigra, mammas habet quaternas, & pedes hominis manibus pedibusque similes. Cauda urso tam exigua ut uix dignosci à sensu possit. urso simul ut expirauerit genitale cornescere aiunt. Ventrem intus amplum habet. ueneris mirum in modum nocte diæque appetens est: & scēminæ sapissime mares ad coitum incitant: quæ & dum utero gerunt, in libidinem exardescunt: & statim post editos fœtus, simul & rei ueneræ dant

- A** dant operam & catulis alendis: & defyderium ueneris etiam hyems fufcit. Cocunt non uulgari quæ rupedum more, fed amplexibus mutuis, am-
 bobus cubantibus, uelut humanis coniugationibus copulantur: deinde fe- *Cocunt huma-
 nini strati, Plu-
 nius.*
 cessus in specus separatim: specus si non habuere, ramorum fruticūque
 congerie ædificant impenetrabiles imbribus, mollique fronde conſtratos.
 Secreti honore reuerentur mares grauidas, & in iisdem licet foueis, parti-
 tis tamen per ſerobes ſecubationibus diuiduntur. In iis ſpecubus pariunt ur-
 ſæ (nec enim quicquam homini rarius, quàm parientem uidere urſam.) tri-
 ceſimo die, tum unum, tum etiã duos: ſed cum plurimū quinque. Hi ſunt
 candida informiſque caro, paulo muribus maior, ſine oculis, ſine pilo: un-
 guum tantum liniamenta prominent. Hanc lambendo paulatim figurât,
 & interdum ad pectora fouet, non alio incubitu quàm oua uolucres: ut af-
 ſiduo incubatu calfaſta, animale trahant ſpiritum. Mares quadragenis
 diebus latent: ſemina enixa, quaternis menſibus. Et ſane diebus primis
 quatuordecim tam graui ſomno premuntur, ut fertur, ut ne uulneribus ex-
 citari queant: tum mirum in modum ueterno pingueſcunt. Cibi tunc nul-
 la argumeta: nec niſi humoris minimum in aluo inueniri aiunt: ſanguinis
 exiguas circa corda tantum guttas, reliquo corpori nihil inefſe. Procedunt
 uere, ſed mares præpingues. Oculi eorum hebetantur, ſero, qua maxime
 fauos cauſa expetunt, ut conuulſeratum ab apibus os, leuet ſanguine gra-
 uedinem illam. Inualidiſſimum urſo caput: ideo urgente ui, præcipitaturi
 ſe ex aliqua rupe, manibus eo operto iaciunt: ac ſæpe in arena colaphis in-
 ſiſtis exanimantur. uis maxima in brachiis & lumbis: unde interdum po-
 ſticiſ pedibus inſiſtunt. *Urſi dimicatio
 cum tauro de-
 ſcribitur ab A-
 riſtotele lib. 8.
 de hyſt. anima-
 lium.*
C urſus animal omniuorum eſt, quippe qui & fru-
 ctus arborum edat, & legumina, & mel perfringens alucos, & caneros, &
 formicas. carne etiam uelcitur: uiribus enim ſuis conſidens, inuadit non ſo-
 lum ceruos, ſed etiam ſues ſeros, ſi clàm repenteque potuerit agere. Tauros
 aperto Marte aggrediuntur urſi, quos ex ore cornibuſque eorum pedibus
 omnibus ſuſpenſi, pondere fatigant. Urſæ cum fugiunt, ſuos catulos ante
 ſe compellunt, ſuſceptoſque portant: cum ab inſectante iam occupantur,
 inſiliunt in arbores. Urſinus adeps alopecias curat, pernionibus ſubuenit.
 Ab hyberno ſomno mirum in modum pingueſcunt urſi, ut diximus: illi ſunt
 adipēs medicaminibus apti, contraque deſluuium capilli tenaces. Pulmo
 urſinus, attritus qui à calciamentis fiunt, ab inflammatione tuetur. Cere-
D bro ueneficium eſſe Hiſpaniæ credunt: occiſorumque in ſpectaculis capita
 cremant, teſtato, quoniam potum, in urſinam rabiem agat.

De hyſtrice, erinaceo, & ſcyuro.

Cap. LXXXIII.

HYſtrix etiam later, cotidemque diebus fert utero, & reliqua facit per-
 inde ut urſa. Hyſtrix in Æthiopia frequentiffima: eam generat & In-
 dia & Africa. Eſt autem ex erinaceorum genere, & erinaccis ſimilis: ſpinis
 tergum hiſpidâ, (aculeos nanque pilorum uice gerit, ut erinacei, ſed lon-
 giores) quas plerumque cum intedit cutem, laxatas iaculatione emittit uo-
 luntaria, ut aliſiduis aculeorum nimbis canes uulneret ingruentes. Magni-

*Hyſtrix**AN**378 611*

DE DIFFERENTIIS

Erinaceus.

Herinaceus.

Erinaceuster-

restis.

ἑρίνος.

ἑρίνος ἁδ-

σπίος.

Erinacei pr-

gnā cū serpēte

describit Opp.

lib. 2. de pisc.

Amplius.

ἡ δὲ τῶ γῆ.

ὀπῆ; πῶ τῆ

μῆαναιον.

Cyzici Plutar-

chus.

Aliis, in se.

Sciurus.

Vulpes.

ἄλλωτ.

tudine paulo minor lupo est, qua haud facile inter feras aspectu magis horribilem inuenias ullam. Quæ uero de medicinis produntur, quæcunque de erinaceis dicuntur, omnia tanto magis ualebunt in hystrice. Aculeos quoque pilorum uice gerunt erinacei: uerum parte omni inferiore rarâ & innocuam habent lanuginem. Erinaceorum alij maiores sunt (inquit Oppianus) & maioribus aculeis horrentes: alij minores, spinis minoribus minutisque nocuis armati. Testes erinaceo non qui foris pendeant, sed intus lumbis adhaereant. Dum coeunt erinacei, non superueniunt tergis more quadrupedum, propter aculeos: sed stantes ambo inter se complexi coniunguntur partibus supinis hærentibus sibi aduersis. Pugnant cum serpentibus erinacei. Præparant hyemi & erinacei cibos, ac uolutati super iacentia poma affixa spinis, unum non amplius tenentes ore, portant in cauas arbores. Idem mutatione aquilonis in austrum, condentes se in cubile, præfagiunt. Et qui in cauernis sunt, commutant sua cubilia aquilonum & austrorum: qui autem intra tectum aluntur, ad parietes discedunt: quod ita fieri cum Bizantijs quidam animaduertissent, cōsecutus existimationem est, ut tempus futurum posset præfagire. Vbi uero sensere uenantem erinacei, contracto ore pedibusque ac parte omni inferiore, conduntur in formam pilæ, ne quid comprehendi possit præter aculeos. in desperatione uero urinam ex se reddunt. Erinacei terrestres combusti cinis uim habet extergentem digerentemque: quo fit ut eo nonnulli ad ulcera sordida carnemque in ulceribus excrecentem sint usi. eius itaque cinis cum melle, aut corium combustum cum pice liquida alopecias emendat. Caput quidē eius uisum per se etiam cicatricibus pilos reddit: alopecias autem in ea curatione præparare oportet nouacula & sinapi: quidam ex aceto uti maluerunt. Caro erinacei inueterata adseruatâque cum aceto mulso epota, renum uitio laborantibus (nephreticos uocant) auxilio est: aquam intercutem habentibus, conuulsionibus, elephantie, malo corporis habitu affectis: fluxiones quibus uiscera obnoxia sunt, exsiccat. Eiusdem iecur testa solibus excocta arefactū ad eisdem usus datur. Hæc ex Dioscoride. Alij erinacei carnem iucundam esse aiunt, si capite percusso uno ictu interficiatur, priusquam in se urinam reddat: eos qui carnem ederint, stranguriæ morbum contrahere minime posse. Hæc caro ad hunc modum occisa, stillicidia uesciæ emēdat. item suffitus ex eodem. Quod si urinam in se reddiderint, eos qui carnem ederint, H stranguriæ morbum contrahere traditur. Pilos in palpebris incommodos euulso renasci non patitur fel erinacei. Præuident tempestatem & sciuri: obturatisque qua spiraturus est uentus cauernis, & alia parte aperiunt fores. Sciurus animalculum est pilosum, cui uillosior cauda pro tegumento est: nam in folis præsertim æstu cauda se obtegit. Manibus utitur priorum ministerio pedum, sedetque ad os illis admouens cibos.

De uulpe & leporibus.

Cap. LXXXV.

Vulpes quoque non aliter quàm ursa catulos parit, cæcos atque informes inarticulatosque: quos cum ediderit, lingua lambendo resouet & conco-

A concoquit atque figuratur: caudam gerit uillosam. mas genitalis officium habet. Cocunt uulpes, ut Plinius refert, in latera proiectæ, matremque femina amplexa: ut uero Aristoteles, uulpes superueniens coit. Parturiens ita secedit, ut raro grauidæ capiatur. parit cum plurimos quatuor. Animal astutū
1 uulpes est & maleficum. insidiatur plurimū auibz atque leporibus. Foucā incolit altam, & quæ multos habeat exitus procul inter se distātes, ne uno in loco insidiis à uenatoribus locatis, facile cōprehēdatur. Vulpiū carnibus autumno uenatores in Asia uescuntur: eo nanq; tēpore uuarū cibo pinguescunt. Est autem eius caro quantū coniciere licet, inquit Galenus, eiusdem cū leporina facultatis: & animal ipsum tēperatura siccū ut & canis. Vulpes & uiua & mortua in oleo elixata, digerētē facultatem addit oleo, facitq;
B ut ad corporis extremam superficiem euocet quæ in alto dolorem excitet: quo fit, ut articulari morbo laborantes, si sæpe atq; diutius in eo insederint, in principio quidem à p̄turbo liberētur: leuamen quoq; in diuturnis morbis sentiant. Pulmo uulpi, nus si in puluere redactus bibatur, asthmaticos iuuat. Adeps liquis infususque, auris dolorem sedat. Ossea uulpibus, uti modo diximus, genitalia, & iis calculo humano remedia præcipua. Sunt in leporum genere, quæ & in specubus degunt subterraneis, ut mox
2 explicabimus. Est uero lepus animalculū pilosum, auribus longis, cruribus breuius & minime æqualibus: priora enim posticis breuiora sunt. Color non omnibus idem est. lepori uni pili & in bucca intus, & sub pedibus sunt, inquit Aristoteles: cum cætera animalia nec intra os habeāt pilos, nec par-
C te pedum resupina, sed prona. ut uero Plinius scribit, pili dasypodi & in buccis intus & in pedibus: quæ utraque Trogus & in lepore tradit. Cor habet lepus pro corporis ratione magnum. Iecur cuidam leporum generi & locis quibusdam ita fissum est, ut bina esse iocinera credideris: nam cuniculorū exta in Betica gemina sæpe reperiuntur. Sanguis leporum non concrefcit, coitu scilicet firmiore: sed aliquantulum spissatur eo modo quo lac quod iniecto coagulo coierit. non pinguescere lepores tradit Plinius. Lepores
3 & auersi cocunt, & retro mares urinam reddunt: & femina sæpenumero prior marem superuenit. Cocunt & pariunt quoque tempore: dumque uterum ferunt superstant, & singulis mensibus generant: sed foetus edunt non uniuersos: interpositis enim diebus quot res tulit, peragūt portionē:
D sæpenumero nanque euenit ut foetus alios imperfectos gestent, alios p̄fectos iam edant. Partū autē (ut maior fidi pedum pars) cæcū edit. Habet femina lac priusq; pariat: & statim à partu repetit coitū: & lactans adhuc cōcipit foetum. lac luillo simile sua crassitudine est. Coagulū habet lepus inter ea quæ unicū habēt uentrē. Et unū animal digitos habentiū, herba alitur lepus: ruminare quoque illi in more est. patētibus oculis dormiunt lepores. Horum genera, ut quibusdam placet, duo sunt, maius scilicet & minus. M. Varro tria distinguit genera: unum Italicum pedibus primis humilibus, posterioris altis, superiore parte pulla, uentrē albo, auribus longis, qui lepus dicitur, cum pręgnans sit tamen concipere. In Gallia transalpina & Macedonia fiunt permagni: in Hispania & in Italia mediocres. Alterius generis

Cuniculus,
Καυίλος.

Laurices.

est, quod in Gallia nascitur ad Alpes: qui hoc fere mutant, quod toto cadi- E
di sunt. quibus hybernis mensibus, pro cibatu niuem credant esse: certe li-
quescente ea rutescunt annis omnibus: & est alioqui animal intolerandi
frigoris alumnum. Tertiij generis est, quod in Hispania nascitur, simile no- 4
stro lepori ex quadam parte, sed humile, quem cuniculū appellant. & lon-
gius quidem prospicienti paruulus uidetur esse lepus: at si manibus contre-
ctaueris, non paruam ostendit differentiam. Et maxima ex parte in subter-
rancis specubus degit: animal fecunditatis innumera: quatuor enim si in-
tromiseris in leporarium, breui solet repleri: ut olim in Astypalæa insula,
cum prius non essent: ex duobus tantum in insulā immisissis, in eam creuisse
multitudinem feruntur, ut uno anno supra sex millia uenatione caperetur.
Leporum fœtus uentre exectos, uel uberibus ablatis non repurgatis inte- F
rancis, gratissimo in cibatu habent: laurices uocāt. Leporum ipsorum caro
sanguinem gignit crassiorem: meliorem tamē procreat succum quā aut
bubula aut ouilla: estq; nonnunquam ad siccam uictus rationem idonea.
Sanguis leporinus ceteris præfertur omnibus, ut qui suauissimus est: quem
& nonnulli cum iecinore, alij unā cum reliquis quoque uisceribus coctum
edunt. Sartagine inassatus dysenterias, & celiaca profluvia sistit: in uino
potus, contra toxica efficax est: si tepidus illinatur, uitia cutis in facie, quæ
iœchias dicuntur, & lentigines emendat. Cerebrū leporis (capite scilicet to-
to elixo) & attritum & commansum pueris dentientibus utile est: non ta-
men eximia uis eius est, sed similis melli & butyro atq; id genus aliis. qui-
dam etiam aduersum metum utiliter edi cerebrū hoc prodidere. Assatum G
nonnulli cerebrum exhibent, edendū aduersus tremores, qui ex mala affe-
ctione corporis sunt contracti. Caput leporis ustum cum adipe urfino alo-
pecis nonnulli imposuere. Coagulum leporis ad lac sanguinemue dissecā-
dum quod in uentre concretum est, cæteris præfertur omnibus. Comitia-
lem quoque morbum, si cum aceto bibatur, & præterea profluuium mu-
liebre sanare traditur.

Dasypros.
Lepus,
Λεπὺς.
λεβρίδης.
λεβρίδης κα-
ρίδης.
λεβρίδης.
Chelidonia.

1 Quibus attribus uolucres decipiat uulpes, explicat Oppianus lib. 2. De pisc. quo-
modo lepores capiat, ostendit Gillius ex Æliano lib. 7: uerum quæ refert Gillius, aga-
fæo cani magis propria uidetur. 2 Villosissimus animalū lepus est, inquit Plinius.

3 Dasyposes omni mense patiunt, inquit Plinius, & superferant sicut lepores.

4 Cuniculum nonnunquam Theodorus pro λεβρίδης uertit, ut dasypros quādo- H
que speciem significet: sed confunduntur hæc nomina lepus & dasypros, ut utrunque
& pro genere & pro specie quandoq; accipiat. λεπὺς fere genus est. Cuniculos Sira-
bo λεβρίδης à quibusdam appellari tradit: qui & λεβρίδης καρίδης, id est lepusculi fossio-
res ab ipso cognominantur, & λεβρίδης. Chelidoniam uocauit Diphilus etiam leporis
genus quoddam.

De uiueris, mustelarum generibus, & de sele. Cap. LXXXVI.

Vinerra.

Magna propter uenatum cuniculorum uiueris gratia est. Iniciunt eas
in specus, qui sunt multifores in terris, nonnunquam & funiculis li-
gatas: at illæ quos deprehendunt, aut unguibus extrahunt, aut in apertum
egredi cogunt: atque ita ciectos superne capiunt uenatores. Ossea sunt ui-
ueris

A uerris genitalia: & iis calculo humano remedia præcipua. Iocinerum doloribus medetur uiuerra porcelli modo inassata. Sunt qui eas *ictis* uocant: est uero ictis in mustelarum syluestrium genere: sunt enim mustelarum genera duos: alterum domesticum, alterum sylvestre. Hæc autem quæ in domibus nostris oberrat, & carulos ore suo susceptos (ut author est Cicero) quotidie transfert, mutatq; sedem, (atque hinc eas ore parere nonnulli putarunt): hæc inquam & serpentes prosequitur, & aues quoque uenatur & mures. Mustelæ sylvestres magnitudine distant. Cor habet mustela pro corporis ratione magnum. Ossea sunt mustelis genitalia, & iis quoque calculo humano remedia præcipua. Ex mustela ipsa inueterata sale denarij pōdus, ut Plinius docet, in uini cyathis tribus datur à serpente percussis: ut uero Dio

B scorides, mustela flammis depilata, deinde exēterata, salēque inueterata, in umbra siccat. Ea binis drachmis in uino pota præsentaneo est remedio aduersum omnia reptilium uenena: & ad toxicū quoque similiter datur. Eius uenterculus coriandro fartus inueteratusque serpentum morsui & comitali morbo in potu auxiliatur: & catulus mustelæ etiā efficacijs. Mustelæ cinerem cum aceto illitum sunt qui tradant podagricos arthriticōsque iuuare: & cum melle aut terebinthina, aut butyro impositum, strumas discutere: ut quod uehementem digerendi uim possideat. Cinere mustelæ uel felis diluto & semine sparso, mures à segetibus abigūt: uel decoctarum aqua: sed redolet uirus animalium eorum etiam in pane. Sanguis mustelæ strumis utiliter illinitur: qui & comitalibus prodest. Iocinerum doloribus

C medetur mustela sylvestris in cibo sumpta, uel iocinera eius. Ex hoc genere ictis est, id est mustela rustica, magnitudine quā paruus catellus Meli-

2 tensis minor: sed pilo, forma, albedine partis inferioris, & morum astutia mustelæ domesticæ similis. Mansuescit mirum in modum: officit alucribus: mellis enim auida est: aues etiam petit ut feles. Genitale quoque ossum habet ictis. Fel ictidis contra aspides dicitur efficax, cetero uenenum. Fel ca-

3 prinum (ait Plinius) ueneficijs ex mustela rustica factis contrarium est. Illa solertia in metu melibus, sufflata cute distentæ ictus hominum, & morsus canum arcet: leporibus plurimū insidiantur. Iecur melis ex aqua oris grauitatem sanat. Feles quoque & leporibus insidias moliuntur, & auibus,

D ac nouissimū muribus. Quo uero silentio, quā leuibus uestigijs obrepūt auibus, quā occulto speculatu in musculos exiliunt: imbelles aliās animal & ignobile. Excrementa sua effossa obruunt in terra, intelligentes odorem illum indicem sui esse. Nocturnum animal feles est, & in tenebris illi fulgent radiāntque oculi. Felem marē Ægyptij dicunt pupillas ad solis rationem uariare: cum enim exoritur sol, tum longæ fiunt: in meridie rotundæ uidentur: ad uesperam autem obscurantur. Lingua feli imbricatæ asperitatis & limæ similis, attenuansque cutem hominis. In coitu feles non parte posteriore se coniungūt: sed mas stat erectus, scēmina subiacet. Sunt porro in eo genere scēmina ipsæ libidinosæ & salaces: itaque mares ad coitū ipsæ frequentes alliciunt, inuitant, cogūt: puniunt etiā nisi pareant. Feles tor nūmero pariunt, quot canes: uescunturq; eisdem: & felium reliqua ut canum,

DE DIFFERENTIIS

Viuunt circiter annos sex. Duplex earū genus: nam sunt & ex iis syluestres E
quādā, sicuti & aliæ quæ in domibus uersantur. Spinā aliūduē quid fauci-
bus adharēt, felis extrinsecus fimo perfricatis, aut reddi, aut delabi tradūt.

Viueria.

Γαλι πρην.

Genus sylue-

stris.

Martes.

Mars.

1 Viueriam Strabo γαλι πρην uocat: at Theodorus apud Aristotelem, γαλι
πρην, catum syluestrem uertit. 2 Theodorus etiam uiueriam interpretatur lib. 9
histor. animal. 3 M. Varro lib. 3 De re rustica admonet, oportere leporarij septa te-
riorio esse testā, ne meles aut feles intrare possit: mustelæ genus quoddam procul du-
bio intelligens: sicuti & aliud genus, martes aut mars uocatur: de quo Martialis: Ve-
nator capta Marte superbus adest.

De mure, & murium generibus.

Cap. LXXXVII.

Mus.

Mūs.

Sunt & in murium genere quidam domus incolæ, qui nec feræ iure dici
possunt, nec placidi, sed mediæ inter utrunque naturæ: plane tamen in F
dociles sunt. Dentes habent mures continuos, & bibunt lambendo, ut ca-
nes: in Africa tamen mures cum biberint moriuntur. cor habēt mures pro
corporis ratione magnum: & nonnullis fel inesse, aliis uero deesse notatum
est. In murium iecusculis fibræ ad numerum lunæ dierum in mense con-
gruere dicuntur, totidēmq; inueniri, quotum lumen eius sit: præterea bru-
ma incrementum animal mus est: & fœminam murem maiore
ueneris rabie flagrare dicunt. Murium generatio mirabilis præter cetera a-
nimalia maiorem in modum est: iam enim fœmina prægnante in uase mi-
liario occupata, paulo post referato uase, musculi numero uiginti & centū
reperiuntur. Mirum etiam percipimus ortum redundantis agrestis muriū

Sorex.

Κεραιος μῦς.

Mus syluestris.

Mus agrestis.

generis: (forices uocant & ἀγροειὴς μῦς:) locis enim compluribus agri fru- G
mentarij, tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti
relinquatur: tam cito absumitur, ut nonnulli mediocres agricolæ cum pri-
die metendum statuerint, postridie mane cum messoribus accedentes ad se-
getem, absumptam inueniant totam. Terræ Persicæ parte quadā, mure fœ-
mina rescissa, fœtus fœminini prægnantes comperiri traduntur. Sunt qui
uehementer confirmant, mures si salem lambant, impleri sine coitu. Pro-
uentus eorum siccitatis tradunt: uerum illud adhuc latet, quoniam mo-
do illa multitudo repente occidat: nam nec exanimis reperiuntur, neq; ex-
tat, qui murem hyeme in agro effoderit: paucis tamē diebus omnino abo-
lentur. Nō aliud quicquam omnium superare copiam & celeritatem pro-
uentus ualet nisi imbres: iis enim quàm primum intereunt. Deturgente H
ab inundatione Nilo, musculi reperiuntur inchoato opere genitilis aquæ
terræque, iam parte corporis uiuentes, nouissima effigie etiamnum terre-
na, ut cecinit Ouidius,

Altera pars uiuit, rudis est pars altera tellus.

Muribus iam obituris uermiculum in capite gigni tradūt. Ex panibus mul-
tis & uariis simul positis optimum quenque seligentes aiunt circunrodere
mures: quare optimi panis indicium in iis existimatur esse. Mures in insula
Paro ferrum exedere & conficere dicuntur: Amyntas in Teredone Baby-
lonica scribit eodem cibo uti. Pericula nobis imminencia præmonent mu-
sculi: ruinis imminentibus præmigrant. Mures à segetibus abigunt cinere
mustelæ

Musculi.

A mustelæ uel felis diluto & semine sparso, uel decoctarum aqua. Sorices fû- *Sorices.*
gari aiunt si unus castratus emittatur. soricibus pilosæ sunt aures: soricum fi-
bras respondere numero lunæ exquisiuere diligentiores: sorices & ipsos
condi author est Nigidius: sorices & ardeolæ inuicem fortibus insidiantur.
Pulmonum uitis medentur mures, & maxime Africani detracta cute, in
oleo & sale decocti, atque in cibo sumpti. eadem res & purulentis uel cru-
entis excreationibus medetur. Muribus elixis in cibo datis urina infantium co-
hibetur. Murem domesticum dissectum scorpionum ictibus utilissime im-
poni tradunt. assatos si infantes ederint, oris saluam exsiccati. Si mus ara-
neus iumenta momorderit, mus recens cum sale imponitur. murium cinis
cum melle instillatus, aut cum rosaceo decoctus aurium dolores sedat. Si

B aliquod animal in aurem intrauerit, præcipuum remedium est murium
fel aceto dilutum. Ossibus fractis, cinis syluestris muris cum melle, aut cū
uermium terrenorum cinere linteolo illito, superpositis lanis quæ subinde
suffundantur, fere xiiii diebus solidat. Arûdines & tela quæque alia extra-
henda sunt corpori, euocat mus dissectus impositus. alopecias cinis è mu-
rium capitibus caudisque: & totius muris emendat: præcipue si ueneficio
acciderit hæc iniuria. Murinum simum (quod item muscerdas uocant) a- *Muscerde.*
ceto tritum atque illitum alopeciiis medetur. Subdixit infantibus muscer- ** Fortasse hic
pro uipera legē
dum erat echin-
nicalias erima-
cei & echina-*
dæ, alui deiectionem moliantur. In Cyrene tum colore tum forma diuer-
sa murium genera nasci ferunt: & quosdam ipsorum quemadmodum
feles, ita lata facie esse: alios uiperæ ** speciei gerentes, acutas habere spinas:*

C quos indigenæ echenatas uocant. Sunt è muribus qui erecti bipedes am- *Echephates
mus.*
bulent, ceu Alpini: habent enim crura posteriora magna, priora parua. Cō-
duntur etiam Alpini, quibus magnitudo media est: sed pabulo ante in spe-
cus conuecto: cum quidam narrent alternos, marem ac fœminam, supra
se complexo fasce herbar, supinos cauda mordicus apprehensa inuicem de-
trahere ad specum: idèoque illo tempore detricto esse dorso. Sunt his pares
& in Ægypto, quibus prædurus fere ut erinaceis pilus est: similiter resident *Ægyptij mu-
res.*
in clunes, & binis pedibus gradiuntur, prioribusque ut manibus utuntur.

& ortus horum quoque numerosus est. Conduntur hyeme & Pontici mu- *Mus Ponicus.*
res, hi duntaxat albi. Dentes utrinque habet mus Ponticus, & tamen rumi-
nare solet. Sunt uel alia genera murium plura: nam & in Cyrenaica regio-

D ne alij lata sunt fronte, alij acuta, alij erinaceorum genere pungentibus pi- *Mus Africa-
nus.*
lis. In Africa quoque tria sunt murium genera, quorum alij bipedes uocan-

4 tur, alij zegeries Punica lingua, quos græcè *ζωοίς* dixeris, alij *τῆρας*. Condi- *Zegeries.
Bouwal.
ἐχῆρας.
Glis.
ἐλαφί.
Μουσῶς*
ti & glires tota hyeme cubant in arboribus tãquam mortui, nihilque edunt:
pinguescunt tamen per id tempus uehementer: rursus æstate iuuenescunt:
semiferum & ipsum animal, paruum, molle & imbecillum. In uiuariis ser-
uantur, ubi non aqua, sed maceria locus sepitur. In iis arbusculas esse opor-
tet, quæ ferant glandem: quæ cum fructum non ferunt, intra maceriam ia-
cere oportet glandem & castaneam, unde saturi fiant. aquam oportet esse
tenuem, quod ea non utuntur multum, & aridum locum querunt. In iis no-
tatum, non congregari nisi populares eiusdem syluæ: & si misceantur alie-

DE DIFFERENTIIS

nigenæ, amne uel monte discreti, interire dimicando: hi saginantur in do-
 liis quæ figuli faciunt. In hoc dolium addunt glandem & nuces iuglandes,
 aut castaneam: quibus in tenebris cum cumulatim positum est in dolis, fiunt
 pingues. Genitores suos fessos senecta alunt insigni pietate. senium finitur
 hyberna quiete. Gliris detracta pelle intestinisque exemptis, decoquitur
 melle in uase nouo: sed medici malunt nardo decoqui usque ad tertias, at-
 que ita asseruari: deinde cum opus sit, strigili tepefacta infundere. Constat
 deplorata aurium uicia eo remedio sanari. Murem araneum *μυρμήλη* uo-
 cant: magnitudine muri æqualis est, colore mustelæ similis, unde & nomē
 illi *μυρμήλη*. Os illi oblongum, cauda parua, dentes quoque exigui, & utraq;
 maxilla duplici ordine digesti: indeque fit ut à mure araneo morfi facilli-
 me dinoscantur: quadruplici nanque ordine morfus impressio cernitur. **F**
 Hoc animal plerunque testes impetere solet, non hominis modo, sed cuius
 uis etiam aliorum animalium, morfu nonnunquam pernicioso: quando-
 quidem in Italia muribus araneis uenenatus est morfus: eosdem ulterior
 Apennina regio non habet. Cæca traditur à Nicandro *μυρμήλη*, indeque non
 transiri rotarum orbitam: sed si forte in eam conciderit, ibidem emori.
 Ipse mus araneus contra se remedio est diuulsus & impositus: optimum, si
 is imponatur qui momorderit: sed & alios ad hunc usum seruant in oleo
 aut luto circumlitos. est & contra morsum eius remedio terra ex orbita: fe-
 runt enim nō transiri ab eo orbitam torpore quodam naturæ. In Palæsti-
 na frequens animal est, non maius erinaceo, habens similitudinem muris
 & ursi, seræque in cauernis petrarum & terræ foueis degere cōsuevit: *ἀράχνη*. **G**
ἀράχνη incolis dicitur: *χρυσόλιος* hunc esse opinatur D. Hieronymus, qui inter ea
 7 numeratur animalia, quæ cum ungulam non habent bisulcam diuisamue,
 ruminant tamen. In Lucania Italiæ ora, inquit Galenus, animal quoddam
 est, quo & uescuntur incolæ, quod mediam quandam formam habet inter
 8 ursum & suem: sicuti & aliud in eadē regione, & aliàs quoque, reperitur in-
 ter murem & glirem medium.

Mus araneus.
μυρμήλη.

Alias Apen-
nino.

ἀράχνη.
χρυσόλιος.

Cyrogryllus.
Chyrogryllus.

ἀρετιμύς.
ἀρετιμύς.

1 In utroque genere tam morium quàm foricem reperiri uidetur & domesticum
 & agreste. Columella lib. 13. Vites quæ se euodum ædificia sunt, à foricibus & muribus
 infestantur. Plin. lib. 10. Sorices & ardeolæ inuicem foricibus insidiantur. 2 Alpioi,
 quos aliqui marmotas uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominentibus, media
 magnitudine. Hæc Hermolaus. Sūt qui legant, quibus magnitudo meliù est. 3 Sunt
 Pontici mures, inquit Hermolaus, uolus coloris: sunt & uarij. Parte tantum proœa, ua-
 rij candieant, uenetus in dorso eolor quādoque ferrugineus deterior priore. 4 Ea-
 dem fere *μυρμήλη* Oppiaous, quæ Plinius gliribus tribuit: uidetur tamē ex Galeno diuer-
 sa esse animalcula: nēpe quod *μυρμήλη* idem potius sit qui mus agrestis lib. 1. De alimēt.
 5 Nieandri interpres in Theriac. Amynta authore *μυρμήλη* ex mure & mustela
 procreari scribit: unde *μυρμήλη* dicta est. 6 Muris atæci morfus temedia tradūt præ-
 cipue Plinius, Aëtius, Paulus & Dioscorides: & pro inmentis Columella. 7 *χρυσό-*
λιος, in quibudam codicibus habetur cyrogryllus in Leurtica lege: sed nescio an cor-
 rupte. Ischius in illo loco chyrogryllus, inquit, animal rapax est. 8 Vide an teste le-
 gatur apud Galenum *μυρμήλη* *ἀρετιμύς* *ἀρετιμύς*, an potius legendum sit *ἀρετιμύς* *ἀρετιμύς*,
 ut idem intelligatur animal cum *ἀρετιμύς*: an idem fortasse sit animal *ἀρετιμύς* & *ἀρε-*
τιμύς, an etiam distincta.

De qua-

A De quadrupedibus aquaticis, ut de fibro, lutra, & quibusdam aliis.

Cap. LXXXVIII.

Sunt inter quadrupedes feræque, quæ uictum ex lacu & fluuiis petant: Sin hoc genere sunt fiber, fathcrium, fatyriū, lutra, & latrax. Per uniuersum Pontum fiber plurimus est, quem alio uocabulo dicunt castorem. Circa fluuios etiam Hispaniæ frequentes inueniuntur fibri: uerum ex eis castoreum quod uocant, non eandem habet cū Pontico uim. Ambigit fiber terra & aqua: sed maxima ex parte in aquis uictū quæritat ex piscibus & cancris. Animal est horrendi morfus: quippe quod hominis partē cōprehensa, non antequam fracta cōcrepauerint ossa morſu resoluit. Cauda huic pisciū, cætera lutræ similis: utriusque mollior pluma pilus. Euomite castor fel suum

B ad multa medicamenta utile: item coagulum ad comitiales morbos, ob ea se peti prudens. Pontici castoris testiculi potissimum appetuntur in usum medelarum (castoreum uocāt medici: & efficacissimum ē Ponto Galatiæ, mox Africæ:) idcirco cum urgeri se intelligit, eas partes sibi amputare ferunt: ob hoc quoque se peti gnarus. uerum amputari hos ab ipsis cum capiuntur, negat Seltius diligentissimus medicinar: quinimo paruos osse substrictosque & adhærentes spinæ, nec adimi sine uita animalis posse. Adulterari autem renibus eiusdem, quæ sint grandes, cum ueri testes parui admodum reperiantur. Præterea ne uescas quidem esse cū sint geminæ, quod nulli animalium: itaque inter probationes falsi, esse folliculos geminos ex uno nexu dependentes: fieri enim non potest ut gemini folliculi uescas: uel

C in una membrana coniuncti reperiantur. Dioscorides quoque frustra hæc credi prodiit: non posse enim fibrum testes ore contingere, cum adeo natiuis adhæreant aprorum more. Ad medicamenta eligi debent testes cōnexi, ex uno ortu dependentes, liquore intus ceroso: uel (ut Plinius scribit) liquore ueluti mellis cerosi, odoris grauis uirosiq; gustu amaro & acri mordaci que, ac friabiles. asseruātur sale. Dissecta cute (inquit Galenus) melleus liquor unā cum membrana ambiente eximitur, siccaturq; ac potui datur. Calidum est & siccum castoreum. partibusque cōstat admodum tenuibus, & ob hoc in uniuersum uarios obtinet usus: siquidem mēses ac partus ciet, secundasque eiicit cum pulegio aut calaminthe. Contra inflationes, tormina & singultus, qui à frigidorum crassorumque humorum multitudine oriuntur, ex aceto mulso bibitur. Lethargicos & utrunque ueternosos, colli capitisque irrigatione cum aceto & rosaceo excitat, aut odoris suffitu: tremulis quoque & conuulsionibus: ac ubi partem quampiam sensu mortuæ priuatam esse contigerit, aut ægre sentire moueriue, & omnibus neruorum uitiiis prodest, & epotum & illitum. Nec sane febrientibus nocet, ubi febris lenta mediocriusue contigerit, qualis cathaphoram & lethargum comitari solet. Ac multis certe castorium exhibuimus, inquit Galenus, cum pipere albo, utrunque cochlearij mensura, ex aqua mulsā: nec quispiam inde ullam sensit noxam. Sternutamentum olfactu mouet. somnum conciliat cum rosaceo & peucedano peruncto capite: uuluarum exanimationes uel subditum excitat. Medetur & dentibus infusum, cum olco tri-

Satherium.
alias, Satherō.
Satyrium.
Fiber.
Castor.

Castoreum.
alias castorini.
Kastorei.
alias Sextina.

DE DIFFERENTIIS

tum in aurem à cuius parte doleant: aurium doloribus melius si cū meco-
nio: claritatē uisus facit cum melle Attico inunctum: capitis doloribus uti-
liter illinitur cum peucedano & rosaceo. Suspiriosis castoreum cū ammo-
niaci exigua portione ex aceto mulso ieiunis utilissime potatur: eadem po-
tio spasmos stomachi sedat ex aceto mulso calido. Ileos & inflationes pellit
castoreum cum dauci semine & petroselini, quantum ternis digitis suma-
tur ex mulsi calidi cyathis quatuor: tormina uero cū aceto uino mixto. Co-
mitiales morbos pellit castoreum in aceti mulsi cyathis tribus ieiunis da-
tum: iis uero qui sæpius corripiuntur, clystere infusum mirifice prodest: ca-
storei drachmæ duæ esse debebunt, mellis & olei sextarius, & aquæ tantun-
dem: ad præfens uero correptis, olfactu subuenit cum aceto. Castoreum ex
mulso potum, mulierum purgationibus prodest: cōtrāque uuluum olfactu F
cum aceto & pice, aut subditum pastillis. Ad secundas etiam uti eodē pro-
dest cū panace in quatuor cyathis uini: & à frigore laborantibus ternis obo-
lis. Lutra, quæ & *αὐτοπῆς* græce dicitur, & è fibrorum genere est, castori præ-
terquam cauda similis est, & utrique mollior pluma pilus: nunquam mari
immergitur lutra. Hæc & homine mordet, nec desistit, ut ferunt, nisi fracti
ossis crepitum senserit. Latax quoque; dētes habet robustos: & noctu plerūque;
egrediens, uirgulta fluuiis proxima, suis dētibus ut ferro præcidit. Hęc, in-
quā, lutra latior est: pilum habet durum, specie inter pilum uituli marini &
cerui. Ichneumon in ripis & arundinetis uiſcitatur, animal paruū, forma mu;
stele iſtidi proxima, cauda oblonga. Iſde uescitur quibus canis: & tot nu-
mero pariunt ichneumones quor canes: & eorū reliqua ut canum. Viuunt G
circiter annos sex. Pugnat cum aspidē & crocodilo, & utrunque interficit.
Ichneumon Ægypti cum aspidē pugnaturus, flumē ingressus mergit se li-
mo sæpius siccatque sole: mox ubi pluribus eodem modo se corius lorica-
uit, in dimicationem pergit: in ea caudam attollēs, ictus irritos auersus ex-
cipit. Sūt uero qui tradant enhydrium alterum ichneumonum genus esse,
qui crocodilum interimat. Sunt & fluuiatiles caniculæ, terrestriū canum
paruulorum similes: pilosa his cauda. Horū sanguis aqua & aceto mixtus,
intumescens hominum neruos lenire existimatur: atque ex pelle ipsorum
calcei conficiuntur, qui neruis salutare esse dicuntur.

Lutra.

Lutris.

αὐτοπῆς.

Latax.

Ichneumon.

Enhydrium.

*Canis fluuiati-
lis.*

Lytra.

1 Satherion. Satheron legit Hermolaus. 2 Quæ alij partim lutræ, par-
tim lataci, ea Plinius fibris tribuit: nempe quodd sit animal horrendi morſus: arbores
iuxta flumina, ut ferro cedit. hominis parte comprehensa non antequam fracta con-
crepuerint ossa morſus resoluit. Quod idem & Varro quoque facere in lytra uide-
tur: qui lytram potius eam quàm lytram uult dici: quoniam succidat dissoluaturque in
ripis arborum radices, ut non longe diuersa uideantur hæc animalia. 3 Hac æta-
re (quodd murinam speciem similitudinēque gerit) uulgo murem Indicū uocant.
Hæc Gillius, ex auctore quopiam, sed incerto. 4 Ichneumonis pugnam cum aspi-
de & crocodilo pulcherrime describunt Oppianus, Plinius & Strabo.

De uitulo marino.

Cap. LXXXIX.

*Vitulus mari-
nus, φάνα.*

QVæ à mari uictum petat, nulla fera quadrupes est, præterquā uirulus
marinus. Hic uero generis ambigui est: nam & in mari degit, quan-
quam humorem non recipit, sed spirat ac dormit, & egressus in
terram

- A terram parit in litore ut terrestris: sed quoniam plus temporis mari quam terra immoretur, cibumque ex humore petat, ideoque inter aquatica fere numeratur. Auriculas non habet, sed meatus continet manifestos qua audit. Oculi in mille colores transeunt subinde. Dentes habet serratos acutosque, ut generi piscium affinis: linguam autem bisulcam. Cruribus tamquam lesa imperfectaque quadrupes est: quippe quæ continuo à scapulis pedes habeat manibus similes modo ursæ: in quinos enim funditur digitos, qui singuli ternis articulis flectantur, & unguibus muniuntur non magnis. Pedes quoque posteriores quinis discretos digitis habet, & curvatura & unguibus cum prioribus conuenientes, uerum forma proximos piscium caudis aut pinnis: his in mari, ut pinnis utitur: & humi quoque uice pedum serpit.
- B Caudam habet uitulus exigua. genitale maribus grande est: foemina simile raiæ est, aut mulieris. Fel non habet uitulus marinus: sed renes solidissimos, & forma bubulis similes. cartilaginem habet, non ossa. Cocunt uituli marini modo animalium retro mingentium: & diu ligati in coitu coherent. Animal non ouum statim intra se concipit, & parit foemina, & lac reddet modo pecudum. parit singulos aut geminos, & cum plurimum treis. Mammis quas geminas habet, educat foetum ritu quadrupedum. parit ut homo omni tempore, sed maxime cum primis capris. Prole circa duodecimum diem à partu deducit in mare, subinde assuefaciens: illa precipitater fertur, nec ambulat: cum nodum inniti suis pedibus ualeat. Colligere se ipse uitulus, & contrahere potest: carne enim abundat mollisque est, atque ossibus
- C cartilaginosis constat, ut modo diximus. Interficiuntur difficile, nisi elisis temporibus capitis: corpus enim totum carnosum est. Mugitus ei in sono boui similis est: unde nomen uituli accepit. nullum animal grauiore somno premitur. Canis rabidi morfu potum expauescentibus, faciem perungunt adipe uituli marini: efficacius si medulla hyemæ, & oleum è lentisco & cera misceatur. lichenas & lepras tollit adeps uituli marini: & instillatur igni naribus intermortuarum uulua uitio: & cum coagulo eiusdem in uellere imponitur. Vituli marini coagulum tradidere quidam uiribus simile esse castorio: ac proinde comitialibus motibus uuluaque strangulationi conuenire eorum: excipitur autem catulis, ut præcipit Dioscorides, qui nondum natate possunt. Coagulum uituli marini bibunt cum lacte equino asininoue, aut cum
- D punici succo: quidam ex aceto mulso: necnon aliqui per se pilulas deuorant. In lethargum uergentibus, coagulo uituli marini ad olfactum utuntur: & lethargicos coagulum uituli adiuuat in uino potum oboli pondere.

*Nonnunquam
& inter terre-
stris, ut lib. 1
hystor. animal.*

*Tertiodecimo
die, ut multis Op-
pianus.*

De talpa & uespertilione.

Cap. XC.

Mutilum animal & talpa est: quippe qui omnino quidem nec uideat, nec perspicuos habeat oculos: sed cæcitatis perpetuæ animal est terræque obrutum, & tenebris etiamnum defossum, sepultisque simile: uerum si quis prætentam membranam detraxerit, locus oculorum apparet, & pars nigra eorundem: situs denique & descriptio eadē, quam legitimam conspicui oculi obtinent: ac si obducta cute oculi pressi, confusi, obliques

*Talpa, κωρὸν
λαί.*

DE DIFFERENTIIS

essent dum crearentur. In tanta hæc tamen cæcitate, liquidius audiunt talpæ uel in terra, tam denso atque surdo naturæ elemento. Talpæ cinere strumas illinunt ex melle: alij iecur eiusdem contritum inter manus illinunt, & triduo non abluunt. Dextrum quoque pedem eius remedio esse strumis affirmant: alij præcidunt eaput, & cum terra à talpis excitata tusum, digerunt in pastillos pixide stannea, & utuntur ad omnia quæ intumescunt, & quæ apostemata uocant, quæque in ceruicæ sunt. Ambigunt & uespertiliones cum uolucris & pedestribus: quemadmodum uituli marini cum aquatilibus & terrestribus. Et quadrupes est uespertilio, sed mæca: ut sit ad quadrupes comparata, uolucris: ad aues uero, quadrupes. Cauda tam quadrupedis quam uolucris caret. uolat, sed cuteis pennis membranæ. Horum quoque alij articulos habent: & uoluerum animal parit uespertilio tantum. F Dentes habet ut quadrupes, & lacte scetum nutrit, admouens ubera quæ in pectore gestat. geminos uolitat amplexa infantes, secumque deportat. Noctu uidetur sibi quarunt: & in cibatu culices gratissimi.

- Minimam pro corpore uocem

Emittunt: peraguntque leui stridore querelas.

Tectaque non syluas celebrant, lucemque perosa

Nocte uolant, seroque tenent à uespere nomen.

In Assyria circa Borsyppum gignuntur prægrandes: quæ sunt apud incolas in usu cibario. Cor uespertilionis solifugis contrarium est: omnibusque formicis & salamandris resistit. Somnū areet uespertilionis caput aridum adalligatum. In paludibus circaque paludes Arabiæ, in quibus nascitur casia, G degunt ferè alata uespertilionibus simillima, stridore diro, & uiribus eximii: quas ægre ab oculis arentes Arabes casiam colligunt. Est & quod cuteis pennis uolat aliud animal: ἀλόνις à Græcis uocatur.

De monstrosis quibusdam aliis animalibus in India aut Æthiopia prognatis.

Cap. XCI.

*Plinius in Æthiopia.
Manichoras.*

A Pud Indos (si Ctesia credendum est) belua gignitur, cui nomen manichoræ: dentes triplici utrinque ordine: magnitudo & aurium hirtitudo, & pedes leonis: facies & aures hominis, oculi cælij, color rubricæ. Cauda, scorpionis modo terrestris, aculeo armata, spiculæque adnata iaculans. Vox tam sibila, ut imitetur fistularum modulos, tubarumque concentum: Hic cursus non minoris pernicietatis, quam ceruis. humanas carnes audissimè affecit. hominū sermones imitari & manichoram in Æthiopia author est Iuba. In India quoque fera traditur nomine axis, hinnuli pelle, pluribus candidioribusque maculis. Sed atrocissimum monoceros monstrum est, quem & cartazonon uocant, reliquo corpore equo simile, capite ceruino, pedibus elephanto, digitis seilicet indiuisis, cauda apro, mugitu horrido: cornu unum nigrum è media eius fronte protenditur cubitorum duum, splendore mirifico, ita acutum, ut quicquid impetat, facile ictu eius perforaretur: nec leue quidem hoc, sed uersuras quasdam naturales habet. Hanc feram uiuam negant capi: quippe quæ in intimis Indiæ & desertissimis regionibus

Axis.

Monoceros.

Cartazonon.

Ad longitudinem pedum quatuor. Solinus.

Agrionibus degit. Apud Hesperios Æthiopus fons est Nigris, ut plerique existimauere, Nili caput: iuxta hunc catoblepa nascitur, modica & incers bestia, caput prægrauè ægre ferens, idque deiectum semper in tetram, aspectu hominibus pestilenti, omnibus qui in oculos eius offenderint, cõfessum exspirantibus. De onocentauro Pythagoram hæc narrasse testatur Crates Pergamenus: homini ipsum ore & promissa barba simile esse, simul & collum & pectus humanam speciem similitudinẽque gerere: mammas distantes ex pectore pendere: humeros, brachia humanam figuram habere: dorsum, uentrem, posteriores pedes asino perfimiles esse: & quemadmodum asinum, sic cinereo colore esse: anum uentrẽ leuiter exalbescere. Duplicem usum ei nuanus præstare: nam celeritate ubi sit opus, pedum loco illis utitur: ex quo fit ut cæterarum quadrupedum cursu non superetur: ac ubi rursus necesse fuerit uel cibum capere, uel aliud quiddam tollere, qui antea pedes erant, manus efficiuntur. Animal est graui animi acerbitate: nam si capiatur, non ferens seruitutem, libertatis desiderio ab omni cibo abhorret, & fame cibi mortem consciscit. Hactenus de multifidis dixisse abunde est.

¶ Quæ in hoc capite continentur animalia, an multifida sint omnia, nondum satis constat. 2. Color rubricæ, *ῥοδία καὶ κόκκινα*: Plinius & Solinus colore sanguineo. 3. Pedibus sic uiget, inquit Solinus, saltu sic potest, ut morari eam nec extentissimæ spatia possint, nec obstacula latissima.

De quadrupedibus bifulcis, & primò de boue & boum generibus.

Cap. XCII.

Croximum est ut de bifulcis doceamus, quæ unguium loco & ungularum chelas forcipemue habere, eadẽque fere cornigera esse diximus. Inter hæc primas partes iure boui tribuere maiores: cuius tanta fuit apud antiquos ueneratio, ut tam capitale esset bouem necasse, quàm ciuem. De hoc igitur genere primum dicemus, cuius potissimum usus nostri laboris est particeps, & quod laboriosissimus sit bos hominis socius in agricultura. Primum in bubulo genere ætatis gradus dicuntur quatuor: prima, uitulorum: secunda, iuuenorum: tertia, boum nouellarum: quarta, uetulorum. Discernuntur in prima, uitulus & uitula: in secunda, iuencus & iuena: in tertia & quarta, taurus & uacca. Quæ sterilis est uacca, taura appellatur: quæ prægnans, horda fordæue. Boues pro regionibus calique statu, & habitum corporis, & ingenium animi, & pili colorem gerunt. Aliæ formæ sunt Asiaticæ, aliæ Gallicis, Epiroticis aliæ. Circa paludem Mæotim boues sunt sine cornibus: & apud Myfios quoque, bubus Indici camelorum altitudo traditur, cornua in latitudinem quatuor pedum. Sunt & Indici boues unicornes tricornesque, solidis ungulis nec bihdis. Æonij quoque boues solidipedes sunt, singulaque habent cornua, & hæc medio capite. In Hercynia sylua est bos cerui figura, cuius à media fronte inter aures unum cornu existit excelsius magisque directum iis, quæ nobis nota sunt cornibus. Ab eius summo sicut palmæ ramique lati diffunduntur. Eadẽ est fœminæ ramisque natura: eadem forma magnitudóque cornuum. Armeniis, bina

Catoblepa.

Plinius, omnibus qui oculos eius uident.

Onocentauro.

Bos, bœf.

Vitulus, mœf.

Iuencus, iuena.

Taurus, taur.

Uacca.

Taura.

Horda, uel

Forda.

Mæotici boues

Indici boues.

Boues unicornes.

Boues tricornes.

Æonius bos.

Hercynia sylua bos.

Armeniis.

Armenius bos. quidem cornua, sed in anfractum conuoluta. *Ægyptus* boues gignit can- F.
Ægyptius bos. didos maximosque & mites: *Phrygia* uero fuluos & rufos, quibus prolixa
Phrygius bos. à ceruice dependent palearia. Cornua quoque iis capiti nequaquam affixa,
Syriacus bos. sed ut aures mobilia. *Syriaci* Pelleique nigri, robusti, feroces, fronte lata, a- 3
Pelleus bos. spectu horrido: suaque natura neque obeli nimium neque strigosi: ac pro-
Scythicus bos. inde & ad pugnam & ad cursum idonei. *Scythici*, quorum in dorso gibber
est, & procerissimi, & ex omni parte cædidi, per paruis cornibus sunt, & mi-
nime acutis: similiterque ut cameli eminenti dorso existunt: simul & cum
dorso clitellæ imponuntur, perinde ut cameli genua flectunt: rursumque su-
cepto onere surgunt, ab hominibus nimirum edocti. *Syriaci* non propen-
dent palearia, sed in dorso gibber est. *Carici* quoque in parte Asiæ sædi ui-
Caricus bos. su, tubere super armos à ceruicibus eminente, laxatis cornibus, excellentes F
in opere narrantur: cæteri nigri coloris candidiue ad laborem damnantur.
Bistones. Bistones iuba uisu horrenda à ceruice utrinque & pectore leonum in mo- 4
re dependente insignes, cornua habent peracuta, & nequaquam aliorum
more in aduersum sese spectantia, sed supina & plane recta. Lingua his an-
guستا, sed asperrima, & quæ linctû sanguine eliciat. In *Pæonia* boues si-
Pæonicus bos. inquit *Pausanias*, toto quidè corpore pilis hirsuti, sed pectore m-
xime circa maxillas. *Trogodytarum* bouum cornua in terram directa sunt: qua-
de causa obliqua ceruice pascuntur. Feruntur & in *Africa* boues, qui retro
ambulant pascuntur, indeque *ἰνδίοι* dicti: neque enim aliter ob cornua
pasci possunt, quæ illis antrorsum & in terrâ directa sunt: uerû hoc fabulo-
sum arbitrat *Vlpianus*. *Phœnicû* libri testantur indigenas uaccas ea esse G
magnitudine, ut uel procerissimi pastores cû mulgent, stare, atque adeo in
scabellû ascendere habeant necesse, ubera ut possint perungere. In nostro or-
be *Epiroticis* laus magna: ac *Pyrrii* (ut ferût) iam inde regis cura prægran-
des fuere, hodièque reliquæ stirpiû durant. *Epiroticæ* uaccæ præ sua præ-
cipua magnitudine amphoras singulas singule implēt lactis: mēsuræq; eius
dimidium mammis duabus præstant. Erectus stat qui mulget, aut paululû
se inclinat: quoniâ sedendo ubera contingere nequeat. Nec tantû diuer-
sitas prouinciarum, sed eadē quoque regio, ut *Italia* ipsa partibus suis dis-
crepat. *Campania* plerunque boues progenerat albos & exiles: *Umbria* ua-
stos & albos, eadēq; rubros, nec minus probabiles animis q̃ corporibus:
Hetruria & *Latium* compactos & ad opera fortes: *Apenninus* durissimos, H
omnēq; difficultatem tolerantes, nec ab aspectu decoros. *Altinæ* uaccæ,
quas eius regionis incolæ ceuas appellant, humilis sunt staturæ, lactis abun-
dantes. In bouum genere cornua scire habent tam mares quàm scæminē: sed
uaccarum cornua & taurorum inter se dissident: tauris enim minora sunt
cornua tenuioraque. Dentes habet bos, ut & reliquæ cornigera continui:
bimûsque dentes amittit, non tamen uniuersos. Bouum caudis longissimus
caulis, atque in ima parte hirtus. Huic tantum animali omniû quibus pro-
cerior cauda, non statim nato, consummata ut cæteris mēsuræ: crescit uni,
donec ad uestigia ima perueniat. Renes boui quasi ex multis exiguis reni-
bus cōstituti. Taurorum sanguis ubi è uena effluxerit, crassissimus est & ni-
gerrimus

Agerimus: celerrime omnium coit durescitque, ideoque pestifer potu. Coire tum mares tum forminae anno ætatis primo peractò incipiunt, ita ut etiã nonnunquam generent: uerum quod magna ex parte fit, uel anniculi, uel naçti octauum mensem uenerem adeunt. Iuuenta recentior quàm annicula non patitur uenerem, nisi ostento: iam enim uel quarto ætatis mense coisse perspectum est: sed enim quod maxime confessum habemus, bimatu generant: sed tauri generationem quadrimi implent. Et qui quadrimis minores sunt, prohibentur admissura: sicuti & qui maiores quàm duodecim annorum: illi quoniam quasi puerili ætate seminandis armentis parum habentur idonei, hi quia senio sunt effecti. Et tauris singulis forminae denegandum anno traduntur: uel (ut aliis placet) unus mas quindecim uaccis sufficit. Apud Magonem duo tauri in septuaginta matribus sunt. Maxime idoneum tempus ad concipiendum, à delphini exortu (ad quartum scilicet idus Iunii) usque ad dies triginta, ut sentit Plinius: uel XL, aut paulo plus ut Varro. Quæ enim ita conceperint, temperatissimo anni tempore, & adultis iam pabulis pariunt. uerum Aristoteles initium coitus plurimis quidem mense Aprili & Maio prodidit: sed nonnullæ uaccæ etiam ad autumnum usque tempus cocundi deducunt. Et gentibus quidem quæ lacte uiuunt, ita dispensatur, ut omni tẽpore anni supersit id alimenrum. Bos uno initu implet, agiturque uehementer, ita ut femina uix tolerans succumbat. Et quidem uaccæ tauros in coitu non patiuntur nisi raro, propter rigorem genitalis: eaque causa gradiuntur in coitu, clunibusque subductis semen recipiunt.

C genitale. Si forte conceptio pererrauerit, uicesimo post die marem formina repetit. Seniores tauri nec sæpius quidem forminam eandem eodem superueniunt die, nisi fortasse ex intervallo: & nõ sæpius quàm bis die ineunt: at uero iuniores & eandem sæpius cogunt, & plures petunt ac superueniunt uigore suæ ætatis. Salax minime inter mares taurus est: at ex forminis intenduntur libidine, post equas, potissimum uaccæ: tempore enim coitus libidine quandoque adeo incendantur, ut bubulci eas tenere aut capere nequeant: ad hæc uaccæ tauros superueniunt, & sequuntur sedulo, & assistunt. Ferunt uterum uaccæ menses nouem: decimo pariunt. sunt qui decem totos menses, exceptis paucis diebus, uterum gestare affirmant. Quod autem in lucem præcurrit hæc tẽpora, id abortiuum est, uitalẽque minime, etiam si paulo maturauerit partum: præmolli nanque imperfectaq; ungula prodit. Boues grauidas negant, præterquam in dextro uulue sinu ferre, etiam cum geminos ferant. Pariunt singulos, geminos raro. Lac à partu utile est: ante partum lac non habet bos. Ex primo semper à partu colostrum sunt: ni admisceatur aqua, in pumicis modum cocunt duritia: uel perinde ut lapis durescit, ut Aristoteli placet. Quandiu uiuunt, & coire solent & parere. uiuunt magna ex parte læminæ annos quindecim, atque etiam mares excisi. Nonnullis ætas uel ad uiginti annos, atque etiam plures, si corpore bene habito sint: nam & excisi plus temporis quàm cæteri uiuunt, usu exercitij & copia pabuli. Viget quinquennes maxime. domicura bouum in trimatu, antè præmatura. Boues & pascunt per societates atque cõsuetudines: & si unus ab-

Colostrum.

Vita forminis
(Plinio antho
re) xv annis
longissima, ma
ribus xx.

DE DIFFERENTIIS

errauerit, reliqui sequuntur: quapropter boarii, nisi praeuenerint, totum armentum requirant necesse est. Boues & fruge & herba uescuntur: pascuntur etiam commodissime in nemoribus, ubi uirgulta & frons multa. Pinguescunt iis quæ statum cient, ut cruo & faba frefis, atque etiam fabarum herba. Lauatione quoque calidæ aquæ traduntur pinguescere. Boues animalium soli, & retro ambulantes pascuntur: & sunt in Africa qui ita perpetuo pasci ferantur, neque aliter quam recedendo in auersum pasci solere. Bibunt boues sorbendo, & claram bibere gestiunt: adeo ut nisi aqua sit clara, frigida & lymphida, libenter bibere nolint. Augentur iuuençæ amplius, cum plus temporis expertes ueneris degunt: quapropter terræ Epiri incolæ boues quas Pyrrhicas uocant, annis nouem intactas uenere seruât. Laborant

*Non ante quam
drimatum. Plu
uius.*

armenta uehemētius pruina sollicitata quam niue. Boues gregales morbis **F** duobus tentantur, podagra & struma (αρεωρῆσι Græci dicunt:) facit podagra, ut pedibus intumescant, & quanuis non intereant, tamen ungulas amittât. Euenit in αρεωρῆσι, ut calidius frequētiusque spiretur. Quod deniq; in homine febris, idem in boue est αρεωρῆσι (febrem uocat Columella:) iudiciū morbi, ut aures flacceant, & ut comedere nequeât: sed breui moriuntur. Boues celum olfactantes, seque lambentes contra pilum, hyemem præfagiunt. Qui gregem armentorum emere uult, hæc quasi communia & certa in emendis bobus præcepta sequi debet. Parandi sunt boues nouelli, quadrati, grandibus mēbris, cornibus proceris, ac nigrātibus & robustis, ac sine curuaturæ prauitate lunatis, frōte lata & crispa, magnis & hirtis auribus, oculis & labiis nigris, naribus refimis patulisque, ceruice torosa & cōpacta, palearibus amplis & pene ad genua promissis, pectore magno, armis uastis, uentre non paruo, sed capaci & tanquam implente utero, lateribus porre: 5 ctis, lumbis latis, dorso recto planoque, uel etiam subsidente, clunibus rotundis, cruribus compactis ac rectis, sed breuioribus potius quam longis, 6 genibus eminulis, distantibus inter se, ungulis magnis, caudis lōgissimis & 7 setosis pilosisq; , pilo totius corporis denso ac breui: colore rubeo uel fusco, tactu corporis mollissimo, non aspero ac duro. At uero colore, ut Varroni placet, potissimum nigro, deinde rubeo, tertio heluo, quarto albo: mollissimus enim hic & durissimus primus: de mediis duobus, prior quam posterior melior, utrique pluris, quam nigri & albi. Hęc maris forma spectanda est: neque enim alio distat bonus taurus à castrato, nisi quòd tauris in aspectu generositas: torus fronte, auribus setosis, torosiore ceruice: uentre paulo substrictiore, cornibus breuioribus & in prociñctu dimicatione polcentibus: sed tota comminatio prioribus in pedibus statira gliscente alternos replicans, spargensque in altum arenam, & solus animalium eo stimulo ardescens. Vacca probantur altissimæ formæ longæque, maximis uteris, frontibus latissimis, oculis nigris & patentibus, cornibus uenustis, & leuibus, & nigricantibus, pilosis auribus, compressis malis, palearibus & caudis amplissimis, ungulis modicis & cruribus. Cætera quoque eadē fere in feminis, quæ & in maribus desiderantur. Boues hyeme ac uere primo mediocresque graciles sunt: prauumque succū in cibo præbent: procedente uero anni tempore

Taurus.

Vacca.

- A tempore, obefiores et adunt succiq; melioris, cum scilicet aucta fuerit herba. Bubula caro plurimum nutrit, sed sanguinem generat, uel quam suilla crassiore; nam bos temperamento longe siccior est quam ius. Scibus minime, sed nec ulli alij utiles sunt carnes bouille, inquit Galenus. Bubulas carnes additi caules caprifici magno ligni compedio percoquunt. Ad eam quæ in uentriculo fit concoctionem, uitulina bouillæ præstat: meliusque nutrit, ac minime mucosa est, & secundum hœdinam optima. Lac bubulum pinguisimum omnium est & crassum, eoque minus aluum mouet, si Galeno credimus: alijs uero aluus maxime soluitur bubulo. Casco fertilius est bubulum quam caprinum ex eadem mensura pene altero tanto: & ut caseum, ita & butyrum habet plurimum, ualentiusque nutrit. Datur
- B priuatim iis qui colchicon biberint, aut cicutam, aut doricium, aut leporem marinum. bubuli lactis serum orthopnoicis prodest ante cætera addito nasturtio. Taurinus sanguis recens, inter uenena est, ut modo diximus: cum polenta illitus duritias emollit ac discutit. Taurinus adeps calore siccitatēque suillam longe superat: sed leonino inferior est: ut inter utrumque medium locum tenere uideatur. Non inepte igitur medicamenti admiscetur, & quæ scirrhis medetur affectibus, & quæ phlegmonas concoquunt. Medulla uitulina uterum emollit tum appositum, tum in pello inditum. Felle taurino priuatim anginæ cum melle perunguntur. Sedis ulcera sanat, inquit Dioscorides, & ad cicatricem usque perducit. medetur & aurium sibilo ex porri succo instillatū. Felle bubulo femina attingi utile putant, quo mures à segetibus abigantur. Taurino felli præcipua potentia etiam in ære pellibusque colore aureo ducendis. In iuuenarum secundo uentre, inquit Plinius, reperitur pilæ rotunditate nigricans tophus, nullo pondere, singulare (ut putant) remedium ægre parientibus, si telluræ non attigerit. Talum bouis combustum dentes mobiles firmare tradunt: cum melle autem epotum teretes lumbricos expellere: cum oxymelite lienem minuere: & uenerem quoque excitare. Femoris ossa cremata, sanguinis fluxiones epota sistunt, & uentris quoque. Bouis armentarij simū, dum uiridi herba pascitur, si recens apponatur, uulnere inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, cinereque feruente calfactum apponitur. coxendicis dolores metu compescit. illitum ex aceto duritias, strumas, pauosque discutit. Eorum uero qui paleis uescuntur fimo oblinuntur aqua intercute laborantes, ita ut mox in sole reclinentur. Habet enim sterces bouinum uim etiam attrahentem: qua ratione apum uespærumque ictibus medetur. Priuatim autem suffitu fimi, quod à masculo boue collectum est, procidentes uulua reprimuntur: eiusque nidore culices (*uulua dicti*) fugantur. Boui coriis glutinum excoquitur, taurorumque, & id præcipuum: xylocollam hoc uocant, & taurocollam: præstantissimū candidū & translucens: nigrum uero deterius est, & lignosum quoque damnatur. Præstantissimum hinc ex auribus taurorum & genitalibus: nec quicquam efficacius prodest ambustis. Ex aqua calida dilutum atque illitum pustulas erumpere non patitur. Sed adulteratur nihil æque quibusuis pellibus inueteratis

*Xylocolla.
Taurocolla.*

DE DIFFERENTIIS

calciamentis que etiam decoctis: Rhodiacum uero fidelissimum, eo que pi- E
ctores & medici utuntur. Glutinum in aceto resolutum, impetigines cu-
tis que lepras delet: melle & aceto dissolutum uulneribus prodest. In boum
Bos sylvestris. genere sunt apud Arachotas boues syluestres, qui differunt ab urbanis, quā-
tum inter suos urbanos & syluestres interest. Sunt colore atro, corpore ro-
Taurus Ac-
thiopicus. busto, rictu leuiter adunco, cornua gerunt resupinatiores. Atrocissimos ha- 9
bet Æthiopia tauros syluestres, maiores agrestibus, uelocitate ante omnes, 10
colore fuluos, oculis cæruleis, pilo in contrarium uerso, rictu ad aures dehi- 11
scente iuxta cornua mobilia: tergoris duritiam filicis, omne respuens uul-
Furore. Solin. nus. feras omnes uenantur: ipsi non aliter quam foueis capti feritate sem-
Bonafus,
Bianapog.
Monapos. per intereunt. Bonafus gignitur in terra Pæonia monte Mefapo, qui Pæo-
niæ & Mediæ terræ collimitium est, & Monapos à Pæonibus appellatur: ma- F
gnitudine tauri, sed corpore quam bos latiore: nequaquam enim oblongior,
sed in latera auctior est. Tergus distentum eius locum septem accubantiū
occupat: cætera forma bouis similis est, nisi quod ceruix iubata armorum
Compositiore,
περυσμυλίου. tenuis ut equi est: sed pilo molliore quam sit equinus & compositiore. Color
pili totius corporis flauus, iuba proluxa, & ad oculos usque demissa & fre-
quens: colore inter cinereum & rufum, non qualis equorum, sed uillo su-
pra squalidior, subter lanario. Nigri aut admodum rufi nulli sunt, uocem
similem boui emittunt. Cornua adunca in se flexa, orbem que inter se colli-
gentia, & pugna inutilia: magnitudine dodrantali aut paulo maiora: am- 12
plitudine non multo arctiore quam ut singula sex sextarios capiant: nigri-
Anciæ, πε-
ρυσμυλίου. tie pulchra & splendescente. Anciæ (περυσμυλίου uocant Græci) ad oculos us- G
que demissa. caret superiore dentium ordine, ut bos & reliqua cornigera
omnia. crura hirsuta atque bisulca habet. Caudam minorē quam pro cor-
poris sui magnitudine similem bubulæ, interiora omnia bubus similia con-
tinet. Carnem habet gustu suauem: quam obrem in usu uenandi est. Cum
percutsus est, fugit, & defatigatus consistit: repugnat calcitrans, & proluuiē
alui, uel ad quatuor passus proiciens: quo præsidio facile utitur, & plerun- 13
que ita adurit, ut pili insectantium canum tanquam ab igne absumantur:
sed tunc ea uis est in fimo cum belua excitatur & metuit: nam si quiescit,
nihil urere potest. Tempore pariendi uniuerſi simul in montibus enituntur:
sed prius quam fortum edant, excremento alui circiter cum locum, in quo
pariant, se quasi uallo circundant & muniunt: largam enim quandam eius H
excrementi copiam hæc belua gerit. Paucissima Scythia gignit: pauca cō-
termina illi Germania, insignia tamen boum ferarū genera: iubatos bisō-
Bisontes,
Vri.
Bubali. nes, excellentesque ui & uelocitate uros: quibus imperitum uulgus bubalo- 14
rum nomen imponit. Sunt uero uri magnitudine paulo infra elephantos
specie, & colore, & figura tauri. Neque homini, neque sceminæ quam con-
spexere parcunt. hos studiose foueis captos interficiunt. Hoc se labore du-
rant adolēcentes: atque hoc genere uenationis exercent: & qui plurimos
ex iis interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quæ sint testimonio, ma-
gnam ferunt laudem. Sed assuescere ad homines & mansueti fieri, ne par-
uuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuū & figura & species mul-
tum no-

A tum nostrorum boum cornibus differt. Hæc Cæsar. Cornua iis taurina, inquit Solinus, in tantum modum protenduntur, ut dempta, ob insignem capacitatem, inter regias mensas potuum gerula fiant: urnasque binas capitis unius cornua impleant. Hæc studiose conquisita, ab labris argento circumcludunt, atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur. In Hercynia sylva gignuntur: rhinoceros uocant, & taurum Æthiopicum. Huic in capite non sunt cornua: sed in naribus unicum est, & repandum quouis osse durius: quod subinde ad saxa limatum in mucronem excitat, eoque aduersus elephantos utitur in dimicatione, alium maxime petens, quam scit esse molliorem: par ipsi prope corporis longitudine, sed cruribus multo brevioribus: magnitudo tauri est: foris uero apri, præterquam quod in summis naribus, ut iam diximus, cornu est. Color illi buxeus, uel eburneus potius: uel ut Oppianus placet, fuluus, raris inspersis maculis nigricantibus. Habet autem duo ueluti cingula, figura serpentis flexibus haud dissimilia, quæ à dorsum spina ad uentrem usque pertenduntur: quorum alterum prope iubam oritur, alterum ad lumbos. In hoc genere nullæ conspiciuntur feminae, sed mares omnes. Author est Iphicrates, in Africa gigni qui rhizes uocantur, forma tauris proxima: at uictu magnitudinæque ac uiribus ad pugnam, elephantis similiores.

*Alias, urnasque
bina capitis
eius cornua
impleant.
Rhinoceros.
Taurus Æthiopicus.*

*Ut Oppianus
prodicit, non
multo maior
est quam oxus*

Rhizes, gignit

1 Vitulus, *μῦς*, qui adhuc sub matre est & lactet. *ἀμμάλη δὲ δαμάλη*, & *πέπτε*, quæ needum coiuert, nec ad iugum idonea est. Hæc ex Theocriti interprete. 2 Erythraei boues, inquit Ælianus, mobilia similiter cornua ut aures habent. 3 Pelleus bos, à Pella, ut arbitror, Macedoniæ oppido. 4 Bistones, à Bistonide Thraciæ palude & regione. 5 Gibberi spina leniter remissa. Varro. 6 Cruribus solidis, nervosis ac breuib. Palladius. 7 Pedibus, inquit Varro, non latis, neque ingredientibus, qui displodantur, nec cuius ungulæ diuarciet, & cnius ungues sint lenes & pares. 8 Alhis, ut Plinio & Dioscorid. bubulum, asininum, & equinum magis aluum soluunt, *ἀκιδόνη*. 9 Indicos tauros uocat Solinus. Taurum ferum hunc uocat Gillius ex Oppiano, quem apud Troglodytas nasci ait. & alium quoque huic haud dissimilem habet taurum ferum Æthiopicum. 10 Volueris pernicietas. Solinus. 11 Hiatus omne quod caput. Solinus. 12 Dodrantali, *πενήμιον*, id est, unciarum nouem, magnitudine palmari, ut interpretatur Theodorus, aut paulo maiore: amplitudine non multo auctiore quam ut singula semisextarium capiant: *μῦς*, id est, congi dimidium, id est sex sextarios, nisi fortasse mēdosus sit codex. 13 *ἐκ πλάκας ὀργων*, ad quatuor passus, uel trium iugerum longitudine, ut refert Plinius: ut uero hæc coherere possint ostendit Claymondus in scholiis in Plin. 14 Martial. lib. 1. iungit bubulum cum bisonem, hoc uersu: Illi celsit atrox bubalus atque bison. Biso (uti fertur) cerui speciem habet: cuius à media fronte inter aures unum cornu in excelsum magis dirigitur, quam ea quæ nobis nota sunt cornua. Ab eius summo, sicut palmæ, sic rami late diffunduntur. Eadem natura femina qua mas prædita est: eadem etiam forma, eademque magnitudine cornuum. Hæc Gillius, ex auctore quodam, sed incerto. 15 Paulanias uero scribit, in extema nare unicum esse cornu, & paulo supra alterum, sed quod minus sit.

*ἀμμάλη δὲ
δαμάλη.
πέπτε.
Erythraei bo-
ves.*

Taurus Indicus.

De ouibus.

Cap. XCIII.

UT boues sumptum hominum excolunt, ita corporum tutela pecori debetur. Iraque post boues ouilli pecoris secunda ratio est: ut quod præcipue nos contra frigoris uiolentiam protegit, corporibusque nostris libera-

*Ovis, ὄψις.
προβάτις.*

DE DIFFERENTIIS

lora præbet uelamina. In hoc quoque genere cornua uel fœminis natura E
tribuit, sed ea conuoluta in anfractum arietum generi, ceu cestus daret.
Dentes quoque plures maribus quàm fœminis dati. Ovis binas gerit inter
fœmina mammas. Ouium pars maxima fel habet: & quidem terris quibus
dam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo: sed aliis
quibusdam locis omnino caret, ut apud Chalcidem Euboicâ parte quadâ
agri. In renibus sebo opimandis maxime omnium luxuriant: quippe quæ
renibus pingui undique obductis intereant, quod ubertate pabuli fit: quo
fit ut quanquam pingues admodum sint, tamen aliquid desit oportet, si nō
utrique reni, at dextro saltem. Aries ad utrunq; æquinoctiū cubâdi rationē
mutat: quippe qui sex hybernis mensibus in læuum latus iacens quietē ca-
pit: contrâque ab æquinoctio uerno in dextrū incubans dormit. Oues an- F
niculæ coeunt atque utero ferunt: mares quoque eodem illo tempore in-
eunt, sed proles differt, quatenus præstantior ea est, quam senescentes ma-
res & fœminæ procreant. Neque pati oportet, ut præcipit Varro, mino-
res quàm bimas saliri: quòd neque natum ex his idoneum est, necnon ipsæ
fiunt etiâ deteriores quàm trimæ admissæ. Arietes primū uetustiores fœmi-
nas incunt: agnas enim fastidiunt. Coitus omnibus ab arcturi occasu, id est
à tertio idus Maias, ad aquilæ occasum, id est xiii Cal. Augusti: quòd que
postea concipiunt, fiunt uegrandes atq; imbecillæ, ut ait Varro. Oues terno
aut quaterno coitu implentur: & si à coitu imber accessit, abortum infert.
Pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquândo & binos & ternos & qua- G
ternos. pariunt geminos tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater uim
eam geminandi per naturam obtineat. Mares autem aut fœminæ generân-
tur ui tum aquarum, tum etiâ propter admissionis tempus: nam & aquæ
faciunt ut fœminæ maræue cōcipiantur. Ad hæc aquilonis flatu mares po-
tius concipiuntur, austri fœminæ. Vistanta est aquilonis, ut uel eas quæ
non nisi fœminas pariât, immutet ad proles masculæ procreationem. Spe-
ctare ad aquilonē oportet cum cocant fœminæ. Dextro teste maribus præ-
ligato, fœminas generari aiunt, leuo, mares. Ferunt uterum quinque mensi-
bus (diebus C L inquit Plinius:) & cordos aut chordos uocabat antiqui post 2
id tempus natos agnos. Itaque fit ut partus exitu autumnali fiat: contingit
tamen ut locis nonnullis, quibus cæli clementia & pabuli copia est, bis pa-
riant. Pariunt iuniores pauciores, quàm uetustiores. Oues parere usque ad H
annum octauum possunt: & si bene curentur, uel in undecimū facultas pa-
riendi protrahitur. Et quidem fieri potest, ut etiam per totam fere uitâ co-
cant tam mares quàm fœminæ. Multi hybernos agnos præferunt uernis:
quoniam magis interfit ante solstitium quàm ante brumâ, firmos esse: so-
lūmque hoc animal utiliter bruma nasci: castrari agnos, nisi quinque me-
stres, præmaturum existimant. Vita ouibus ad denos annos: sed magna ex
parte ad pauciores: duces pecoris tamen, uel ad quindenos protrahunt ui-
tam. Singulis ouilibus singuli mares duces constituuntur. Oves Æthiopæ
uel ad duodecim & tredecim annos uitâ agunt: quæ mane iniri solent, ma-
rem si sero diei admiseris, non patiuntur. Candidi nigriue efficiuntur fœtus,
si sub

*he cœcepi in-
nalidi. Plinius.*

*Cordi.
Chordi.*

A si sub lingua arietis uenæ nigræ aut candidæ habentur : cuius enim coloris sunt uenæ, eiusdem & uellus est: uarium etiam, si plures uenarum colores sunt: & rufum, si uenæ rubræ fuerint: si palatum quoq; nigrum fuerit, aut maculosum uel lingua ipsa, pulla, uel etiam uaria nascitur proles. Quâdiu admixtura sit, eadem aqua uti oportet: quod cōmutatio & sanam facit uariam, & uterum corrumpit. Oues herba uescuntur: & pascere sedulæ atque stabiles solent. Pinguescunt potissimum ex potu: quamobrem estate salem dare die quinto soliti sunt, singulis centenis singulos modios, ut sitibundæ plus aquæ hauriant: sic enim pecus incolume atque pinguius redditur. Opimat pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba: quæ omnia efficaciora sunt ex sanguine respersa. Oues si grauidæ glandem copiosius ederint, abortum

B faciunt. Homines usu periti totidē fere morbis ouem infestari, quot hominem referunt: & frequentius quàm ullum aliud animal infestatur scabie. Mollissimū pecus est: & quanuis ex omnibus animalibus sit uestitissimū, frigoris tamen impatientissimū est, nec minus æstiuū uaporis. Genus ouile amēs est, moribusque (ut dici solet) inter omnia animalia stultissimis. Repit in deserta sine causa: & hyeme obstante ipsum sæpe egreditur stabulo: occupatum à niue, nisi pastor compulerit, abire non uult: sed perit desistens, nisi mares à pastore ducantur: ita enim reliquus grex consequitur, adeo ut etiam quā timuere ingredi, unum cornu raptū lequantur. Pecora exultantia & indecora lasciuia ludentia pluuiam præfagiunt. Pro loci natura differunt oues, non magnitudine solū, sed & aliis discriminibus. Pinguis & cæ-

C pestris situs, proceras oues tolerat: gracilis & collinus, quadratas: syluestris & mōtosus, exiguas: pratis planisque noualibus tectum pecus commodissime pascitur: idq; nō solum generibus, sed etiam coloribus plurimum refert. Magnæ oues circa Meotim paludem gignuntur: generis eximij Milesias, Calabras, Apulasque nostri existimabant, inquit Columella, earūmq; optimas Tarētinās: nunc Gallicæ pretiosiores habentur: earūque præcipue Alcinates: item quæ circa Parmam & Mutinam macris stabulantur cæpis. Color albus quanuis sit optimus, sunt tamen suapte natura pretio cōmendabiles pullus atque fuscus: quos præbent in Italia, Pollentia: in Betica, Corduba: nec minus Asia rutilos quos uocāt *ἐρυθροί*. Sed & alias uarietates in hoc pecoris genere docuit usus exprimere: ut cū uarij coloris syluestres

D ac feros arietes māsufactos tectis ouibus quispiam admisisset, eæ primum hirtæ, sed paterni coloris agnos ediderunt: qui & ipsi deinde Tarētinis ouibus impositi, tenuioris uelleris arietes progenauerūt. Ex his rursus quicquid conceptum est, maternam molliem, paternum & autum retulit colorem: itaque oues quas pascimus, ortæ sunt ab ouibus feris. Ouium alix sunt uillaticæ, alix in saltibus pascuntur: itaque ouium summa genera duo, 3 tectum & colonicum: uel uti Columella nominat molle, & hirsutum: illud mollius, hoc in pascuo elegantius. Mollissimum genus ouium quod Græcū pecus, & plerique Tarentinum uocant, nisi cum domini præsentia est, uix expedit haberi: siquidem & curam & cibum maiorem desiderat: nec ullam domini aut magistrorum inertiam sustinet, multoque minus auaritiā nec

De omni morbis Columella lib. 7, & Vergil. 3 Georgic.

Ep. 3, oues.

Ovis uillatica. Ovis tecta. Ovis colonica. Ovis mollis. Ovis hirsuta. Græcū pecus. Tarentina oues.

DE DIFFERENTIIS

aestus nec frigoris patiens. Raro foris, plerumque domi alitur: & est audivissimum cibi: cui si detrahatur fraude uillici, clades sequitur gregē. Plures autē in eiusmodi gregibus, quā in hirtis, masculos enutrire oportet: nā prius quā feminas inire possint mares, castrati cum bimatū expleuerint enecantur: & pelles eorum propter pulchritudinem lanæ maiore pretio quā

Hirsute oues.

Hirtæ oues.

Colonicæ oues.

alia uellera mercantibus traduntur. Hirsutum uero ouium genus (quod 4 colonicum appellauimus) in saltibus pascuntur, & à tectis absunt longe: & quod late longēque in diuersis locis pasci solent, idcirco portant secum crates aut retia pastores, quibus cohortes septāque secreta in solitudine faciāt.

Ego (inquit M. Varro) in octogenas hirtas oues singulos pastores constitui: Atticus in centenas. In gregibus ouium magnis, quos miliarios faciūt quidam, facilius de summa hominum detrahere possunt. Pascua ouillo generi F utilia sunt, quæ uel in noualibus, uel in pratis siccioribus excitātur: palustria uero noxia sunt, syluestria damnoſa lanis. Per hyemem si penuria est, scēnū uel palea, uel uicia, uel facilior uictus nilmiſeruatīs frōdibus præbeatur, aut

fraxini. In ouium gregibus comparandis in primis uidendum, ut boni feminis pecus habeas: id fere ex duabus rebus potest animaduerti, ex forma & ex progenie: si uidelicet agnos procreent formosos. de forma, ouem esse oportet corpore amplo, quæ lana multa sit & molli, uillis altis & densis toto corpore, maxime circum ceruicem & collum. uentrem quoque ut habeat pilosum: itaque quæ id non haberēt, maiores nostri apricas aut apicas appellabant ac reiciebāt. Esse oportet cruribus humilibus. caudis obserua-

Aprica, aliās

Apricæ oues.

re, ut sint aliubi, ut in Italia prolixis, in Syria breuibus, ut tradit Varro. At G Plinio, Syria cubitales ouium caudæ, plurimūq; in ea parte lanicij. Sint præterea uellere candido: uariam autem & canam comā improbabis. Arietis uero habitus maxime probatur, cum est altus atque procerus, uentre promisso atque lauato: cauda longissima densiq; uelleris atq; candidi: frōte lata, testibus amplis, intortis cornibus potius quā surrectis, patulisque & pronis ad rostrū, ravis oculis, auribus amplis, pectore & scapulis & clunibus latis. Aduertendūq; lingua ne nigra aut uaria sit: quod fere qui talem habent, nigros aut uarios, ut dictum est, procreant agnos. Atq; hæc cōmunia sunt in comparandis ouibus quas pascimus. Præstantissima est ouiu

Arietis forma

caro primo ac medio uere. Melior item quæ est unius anni quā quæ uetustior: quæ & difficulter concoquitur, & malum procreat succum: nocētque H iis qui stomacho sunt humido & pituitosis. Est enim caro ipsa ouium frigi 6 da ac humida, excrementosāq; & mali succi. Iuuenibus quidē nō omnino malus est cibus: senibus uero nec ea est commoda: atque etiam hac multo minus agnina: quippe quæ humida, & mucosa, & glutinosa, & pituitosa est. Ouilla caro, præsertim arietina post solstitium elixa, grauius olet: grauius etiam si assetur: quo circa dum coquitur, operculum olæ auferre, a-

Ouilla caro.

quam copiosā infundere, & condimēta quoque addere præcepit Rufus. Lac ouillum caprino crassius est pinguiusque, & dulcius, ac magis alit: stomacho tamen minus utile. priuatim tonsillas & fauces lactis ouilli gargarizatio adiuvat. Dysentericos recreat caseus ouillus uetus. Coagulū agninaū

Agnina caro.

aduersus

A aduersus omnia mala medicamēta pollet. Phreneticis prodesse uidetur & le-
thargicis pulmo pecudū calidus circa caput alligatus. Pulmo agninus inter-
trigines quæ à calciamētis fiunt sanare creditur. Dysentericos recreat seuū
ouillū decoctum in uino austero: hoc & ileo medetur & tussi ueteri. Aures
purgat fel pecudis cum melle. Verberū uulnera & uibices pellibus ouium
recētibus impositis obliterātur, idq; nocte ac die una, uti Galenus prodidit.
Lana præter cultum & tutelam contra frigora, succidæ plurima præstant
remedia ex oleo uinōque aut aceto, prout quæque mulceri morderique o-
pus sit, & astringi laxariue. Succida lana mollis è collo scēminibūsq; lau-
datissima habetur. Hæc succos quibus fiant irrigationes facile combibit: &
ob pinguitudinē illam, quam œsypum uocant, emolliēdi uim habet. Con-
B tuis imponitur & quoquo modo percussis: luxatis membris dolentibūsq;
que neruis ac ossibus fractis inter initia crebrōque suffunditur, ex oleo ui-
nōque aut aceto. Facir & ad capitis, stomachi, aliarūque omnium par-
tium dolores cum aceto & rosaceo imposita. Succida lana imposita subdi-
tāque mortuos partus euocat. Eadem nitro, sulphure, oleo, aceto, pice liqui-
da feruentibus tincta, quā calidissima imposita bis die lumborum dolo-
res sedat. Cum uero lota fuerit lana, nec amplius œsypum in se habeat, suc-
cis ad irrigationes excipiendis, idoneum habetur. Arietis uellera lota frigi-
dāque ex oleo madefacta in muliebribus malis inflammationes uulū sed-
dant: & si procident, suffutū reprimunt. Crematæ lanæ cinis uim habet cali-
dam & acrem: crustas ulceribus obducit, excreſcentias in carne cohibet, &
C cicatricem inducit. Illinitur attritis, uulneratis, ambustis: & in oculorum
medicamenta additur, in fistulas aurēsq; suppuratas. Vis eius septica est,
inquit Plinius, efficacissimēque genas purgat. Quin & ipsæ sordes pecu-
dum sudōrque forminum & alarum adhærētes lanis (œsypum uocant) in-
numeros prope usus habet. In Atticis ouibus genito palma. excalfacit, ex-
plet ulcera & emollit: præsertim quæ circa sedem aut uuluam contingunt
cum meliloto & butyro. Menſes & fœtum euocat cum lana inditum. ulce-
ribus aurium genitaliūque atque oris etiam imponitur cū anserino adipe.
Contra erosos oculorum angulos scabiososque, & palpebras quæ callū
contraxere, & ciliorum defluuia efficax est. Oesypum cum melle Corsico,
quod asperrimum est, maculas in facie extenuat: item scobem cutis in fa-
D cie cum rosaceo impositum uellere: quidam & butyrum addunt. Sordes
quoque caudarum cōcretæ in pilulas, ac siccæ per se, tūsque in farinam,
& illitæ, dentibus mire profunt etiam labentibus, gingiuisq; si carcinoma
serpat. Iam uero pura uellera aut per se imposita cæcis doloribus, aut acce-
pto sulphure & cinis eorum genitalium uitii: tantūque pollent, ut medi-
camentis quoque superponantur. Medentur ante omnia & pecori ipsi, si fa-
stidio non pascatur. Cauda enim quā artissime præligata, euulsa inde la-
na, statim uescuntur: tradūntque quod extra nodum sit è cauda præmori.
Epinyctidas sanat & clauos, thyinos, uerrucas penſiles: & ambusta igni ro-
saceo cerato exceptum fimum. Pecudum fimi cinis illitus ex aceto contra
omnium phalangiorum morsus remedium est: alopecias replet cum oleo

*Sanare. Dio-
scorides, ab in-
flammatione
tueri.*

Lana, uellera.

*Quonam mo-
do cremari de-
beat, docet Ga-
lenus, Diosco-
rides & Plin.
Oesypus,
diuinus.
Oesypum.
Quibus modis
colligi debeat,
explicat Dio-
scorides & Pla-
nius.*

DE DIFFERENTIIS

cyprino & melle. Inuenio nasci, inquit Plinius, & arietis cornibus tufis atq; E
defossis syluestrem asparagum, quem Græci ormynam aut myacantham
uocant, aliisue nominibus. Oues quas pascimus, primum ortas esse ab o-
uibus feris iam diximus. Sunt autem oues feræ nostris hisce non multo ma-
iores, sed cursu uelociiores, atque in dimicando acriores: ut nonnunquam
uel apros ictibus prosternant cornuum, quæ etiam in anfractum contorta
gerunt. Est in Creta Gortynæ agro ouium genus, quod cornu gerit quadru-
plex: colore fuluo, uillo potius quàm lana duro atque aspero, caprino ma-
gis quàm ouillo simili. Non dissimili huic colore, fuluo scilicet, conspicitur
& subus: lana tamen non adeo hirsuta, & cornibus binis non quaternis. Na-
tat quandoque hoc animal (ambigit nâque & terra & aqua): ipsûmque in-
ter natandum comitatur plura tum piscium, tum aliorum aquatiliûm ge- F
nera, cuiusque societate gaudent plurimum: in primis uero phagri, melanu-
ri, acus, mulli atque astaci. Est in Hispania & maxime in Corsica non absi-
mile pecori genus musimonum, caprino uillo quàm pecoris uelleri pro-
pius: quorum è genere & ouibus natos, prisca umbros uocauerunt. Sunt in
Arabia duo ouium genera admiratione digna, neque alibi usquam uisâ: al-
terum caudam gerit longam adeo, ut non sit tribus cubitis breuior: alterû
cubitali latitudine caudam habet. Gorgona uocant Nomades Africæ (ut
author est Alexander Myndius) animal ouî feræ simile: uel, ut aliis placet, 8
uitulo. caput gerit semper in terram deiectum. à fronte ad oculos usque iu-
ba uilliusue dependet: hac si quando ab oculis excussa (id quod ægre ob ca-
pitis grauitatem facere potest) hominem quęquam aspexerit, protinus in- G
terficit.

Aries, ἀρις. 1 Ovis nonnunquam sceminam tantum significat, ut aries matrem. Agni, ἀγνός.
Agni, ἀγνός. 2 Iuxta agnός, qui à matribus iam separati pascuntur. Veruex, aries castratus. 3 Di-
*Ἰακίμης ἀγρ-
νός.* cuntur agni chordi, inquit Varro, qui post tēpus nascuntur & remanserunt in uoluis
intimis: quæ Græci uocant χείρ, à quo chordi appellati. 4 Tecta ouis ideo for-
Veruex. tasse dicitur, quod pelle iniecta aut alio tali uelamine tegumentoue protegitur, & ple-
runque domi alitur. Hæc Varro. 5 Vellera, alij uelamina appellant, lanam post
confuram ademptam & conglobatam. Ex quo animaduerti licet (inquit Varro) prius
lanæ uulsuram quàm confuram inuentam. 6 In ipsa oue, inquit Plinius, satis ge-
nerositaris ostenditur breuitate erurum, uentris uestitu. 7 Hæc Galeni est senten-
tia: sed sunt qui carnem ouillam succum melancholicum gignere produnt. 8 Me-
deter, inquit Plinius, & uulux inflammatio nibus, & sedis rhagadis & condylomatis
eum meliloto ac butyro. 8 Bestiola quædam apud Pollucem legitur, quæ τειγέ- H
ῆς ὄνδρ dicitur, quod sætas conueniat.

De capris.

Cap. XCIIII.

Capra.
*Vsum in castro-
ram & misse-
ris uelamina
nautis. Vergil.*

Caspia capra.

UT fructum ouis è lana ad uestimentum, sic capra pilos ministrat ad u-
sum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilia uasa. Tondentur ca-
præ, quod magnis uillis sunt, in magna parte Phrygiæ, unde Cilicia ferri so-
lent: sed quod primum ea confura in Cilicia sit instituta, nomen id Cilicas
adiiecisse dicunt. Neque non quædam nationes harum pellibus sunt uesti-
tæ, ut in Gerulia & Sardinia. Caspia capra, inquit Ælianus, & albilima
sunt, cornibus mutilæ, & ad maximorum equorum magnitudinem acce-
dunt.

A dunt. Earum uilli adeo molles, cum Milesiis lanis ut mollitudine comparari possunt. Capris non omnibus cornua: sed quibus sunt, in his & indicia annorum per incrementa nodorum. Mutilis, lactis maior ubertas. Mutilum in utroque sexu utilius, inquit Plinius. Et Columella quoque: In omni, inquit, regione maritòs gregum mutilos esse oportebit: quoniam cornuti fere perniciosi sunt propter petulantiam. Et scēminam quoque mutilam parabimus quieto celi statu: nā procelloso atque imbrifero, cornutam semper. Capræ superiores dentes non sunt, præter primores geminos. Dependet omnium mento uillus, quē aruncum uocant: hoc si quis apprehensam unam ex grege trahat, cæteræ stupentes spectant. Caprarum sanguis non spissatur, inquit Plinius. Capræ herba uescuntur ut oues, sed loca crebro B permutant, summæque tantum contingunt. Dumeta potius quàm campestrē situm desiderat hoc animalis genus: asperisque etiam locis ac syluestribus optime pascitur: nam nec rubos auersatur, nec uepribus offenditur, & arbutulis frutetisque maxime gaudet, nec minus iligneis querneisque fruticibus, qui in altitudine nō prosiunt: uerum morsus earum arbori exitialis est. oliuam lambēdo quoque sterilem faciunt. Odoratorum uero fruticum expetentius hoc animal est: cūmque cisthi fronde pascitur, pinguedinem barbæ cruribusque uillosis adhærentem reportat, ex qua ladanum in ossas cogunt pastores. Capras in occasum decliui sole, in pascuis negant contueri inter sese, sed auersas iacere: reliquis autem horis, inter se aduersas. Tradunt & noctu non minus cernere quàm interdiu: & ideo caprinū C iecur, si uescantur, restituit uespertinam aciem iis quos nyctilopas uocant. Capræ anniculæ aliquando coeunt, atque utero ferūt: mares quoque illo eodem tempore ineunt. Est autem mas uel mensium septem satis habilis ad procreandum: quoniam immodicus libidinis, dum adhuc uberibus alitur, matrem stupro superuenit: & ideo celeriter & ante sex annos consensescit, quod immatura ueneris cupidine primis pueritiæ temporibus exhaustus est. Itaque quinquennis parum idoneus habetur scēminis implendis. Et tri mi quoque minus utiliter generant: & in senectā ultra quadriennium. Capellæ bimæ, aliquādo & anniculæ, ut diximus, partum edunt: sed in trimatu gregi augendo utiles sunt: neque enim educare nisi trima debet. neque tamen ultra octo annos matres seruandæ sunt: quod assiduo partu fatigatæ steriles existant. Parit autē capra, si est generosa proles, frequenter duos, nonnunquam trigeminos: parit & quaternos, sed raro admodum: at Ægyptias capras quinque parere ferunt. Tempus admissuræ per autumnum ferre ante mensem Decembrem præcipiunt: ut propinquantē uere pariāt turgescentibus uirgultis: ferunt enim quinque mensibus ut oues. Vita earum longissima, annis in Æthiopia xi, in reliquo orbe plurimum octo. Nunquam sanæ degunt capræ: nunquam enim febri eas carere Archelaus auctor est. Alia pecorum genera cum pestilentia uexantur, prius morbo & languoribus macescunt: solæ capellæ quanuis optimæ atque hilares, subito cōcidunt: id accidere maxime solet ubertate pabuli. Pinguedine etiam sterilesunt capræ. Qui caprinum gtegem cōstituere uult, in eligēdo animad-

*Aruncus, æquifolius
Caprarū, alias
caprearum, sed
utrunque for-
tasse nendum
fuit.*

Ladanum.

*Nonobrimen-
se Plin.*

DE DIFFERENTIIS

*Capr.
Hircus.
Tepalos.
Xiphiagros.*

Capella.

uertat oportet. Caper cui sub maxillis duæ uerruculae collo dependent, opti-
mus habetur: amplissimi corporis, cruribus crassiss, plena & breui ceruice, 1
flaccidis & prægrauantibus auribus longisque, exiguo capite, quàm maxi-
me simus, nitido, nigro, densoque atque longissimo pilo: ut autem Varro-
ni placet, hircus molliore sit pilo & potissimū albo. Capella præcipue pro- 2
batur, simillima hirco quæ descriptimus: si etiā est uberis maximi & lactis
abundantissimi. Tondetur capræ, ut dictū est, nisi si glabræ sunt: duo enim ge-
nera earū. Capra tēperamento est longe sicciore q̄ sus, minus tamē sicco q̄
bos. Caprina caro ætate prima ac media (cum scilicet fruticum germina,
quibus capræ auidius uelci solent, sunt frequentissima) optima est: sed post
solstitium æstiuum uirus olet, præsertim hircorum: tum uero maxime as-
sa. Quo circa etiam dum elixatur, ut in ouilla dictum est, ollæ operculum au- F
ferre, copiosamque infundere aquam, & condimenta cocturæ addere, præ-
cepit Rufus. Succum præstat caro caprina uitiosum acrimque: sed hircina
omnium est deterrima tum ad concoctionem, tum etiam ad succi probita-
tem: quæ minime quidem pituitosa lentāue est, sed nocet maxime ob du-
ritiem & in alterādo difficultatem. Hædina caro concoctu facilis est, neq;
mucosa: sed probum generat succum, & secundū suillam optimum. Inter
cetera lactis genera caprinum mediocritatem obtinet: ut quod nec pingue
admodum nec crassum sit: estque co bubulū caseo fertilius pene altero tan-
to. Stomacho accommodatissimum est lac caprinum, aluūque minus cæ-
teris tentat: quoniā pecus hoc astringentibus pabulis maxima ex parte ue-
scitur: nempe fronde magis quàm herba. Caprino lacte lienes sanātur, post G
bidui inedia tertio die hædera pastis capris, potio sine alio cibo. Iecoris ca-
prini assū, sunt qui distillantem saniem accipiunt, qua ad nyctalopas utun-
tur: elixi autem uaporem oculis apertis accipiendū præcipiūt. asium quo-
que si edatur, ad eisdem affectus accommodatum aiunt: & præterea comi-
tiales morbū ostendere. Sanguis hœdi antidotis miscetur. Capræ & hirci
sanguis sartagine inasflatus, dysenterias & cœliacos fluxus sistit: in uino po-
tus contra toxica efficax est. Sunt qui sanguinem hirci arefactum calculo-
sis propinent præsentissimo remedio. Cornu caprinum ustum, tum ad dē-
tium candorem, tum ad contrahēdas gingiuas mollitiæ fluidas utiliter ad-
fricatur. Caprarū cornu uel pilis accensis, fugari serpētes dicuntur. Capra-
rum ungulas crematas, mōxque aceto perfusas alopecii illinunt quidā: est H
itaque cinis hic facultatis extenuantis. Fimum caprinum lienis aliarūmq;
partium duritiem soluit: ustū, tenuius efficitur. alopecii medetur aliisque
quæ abstersione indigent affectionibus, ut lepræ, ploræ, licheni, & hoc ge-
nus aliis. Miscetur & cataplasmatibus, quæ parotidas diuturnioresque bubo-
nas digerunt. Imponitur in aceto decoctum serpētum morsibus, ulceribus
quæ serpunt, & erisipelatiuim nanque habet & abstergerendi digerendique:
cum axungia impolutum iis qui podagra tentantur, auxilio est. Ex uino po-
tum caprarum fimum, præsertim in montibus degentium, regiū morbū
emendat: menses ciet cum aromatibus haustum, partūsque euocat: siccum
uero in farinam tritum, & cum thure in lana inditum, profluuium mulie-
bre

*Quomodo præ-
parari debeat
hirci sanguis,
docet Aetius
lib. 11.*

Abre sistit: cæteras sanguinis fluxiones ex aceto cohibet. Capræ quas alimus à capris feris sunt ortæ: à quibus propter Italiâ capraria insula est nominata: sunt autē capræ syluestres, his nostris haud multo maiores, sed uelociiores atque in pugna aciores. In Samothrace habentur greges capratum syluestrium, quas rotas uocant. Sunt etiā in Italia circa Fiscellum & Tetricam multæ. Capræ feræ in plurimas similitudines transfigurantur: sunt capræ, sunt rupicapræ, sunt ibyces: quæ genera omnia alpes nobis transmittunt: sunt & oryges, soli à quibusdam dicti: sunt & damæ & pygargi & strepsicerotes, multæque alia haud dissimilia: sed hæc transmarini situs mittunt. Ibyces prærupta & inaccessa montiū incolunt, pernicitatis mirandæ quam onerato capite uastis cornibus, gladiatorumque uaginis. In hæc se librant, ut tormento aliquo rotati, in petras potissimum è monte aliquo in alium transilire cupientes, atque recurso pernici quo libuerit exultant. Capreis ramosa cornua dedit natura, sed parua, nec fecit, ut ceruis, decidua. In Africa capræ non sunt: rupicapris cornua in dorsum adunca, damis in aduersum: sunt etenim & damæ in caprarum genere, sicuti & qui pygargi dicuntur. Damas mittunt transmarini situs: hæc mansuescunt raro, cum feræ iure dici non possint: ita nec placidæ nec feræ, sed mediæ inter utrumque naturæ, ut in mari delphini. Transmarini sunt & strepsicerotes, quibus cornua erecta rugarumque ambitu cōtorta sunt, & in leue fastigium exacuta, addacem Africa appellat. Orygem perpetuo sitiētē Africa generat, solum à quibusdam dictum, contrario pilo uestitum, & ad caput uersō. Color illi in facie niger, cætera cādīdus: cornua nigra, caua, erecta, mucrone acuto & præduro: dorsum latum & obesum. Velox animal est & ferox: ut quod neque canem timet, aut syluestrem aprū taurūque, aut pantheram: sed neque leonem, nec hominem uenatorem: elephātum unum animalium metuit. Orygem, ut diximus, Africa generat, ex natura loci potu carētē, cum mirabili modo ad remedia sitiētē. nanque Getuli latrones eo durant auxilio, repertis in corpore eorum saluberrimi liquoris uesicis. Orygem appellat Ægyptus feram, quam in caniculæ exortu contrastare & contueri tradit, & uelut adorare cum sternuerit.

Capra syluestres.
Fera.

Rota.
Alias fiscellum
Plin.

Ibyces.

Caprea.
Rupicapra.
Dama.
Pygargi.

Strepsicerotes.

Addax.
Oryx.
Solmi.

Duz uetruculæ. Duas ueluti mammillas penfiles appellat Varco: & Plinius, ni fallor, lacinias binas dependentes: sed in fœminis modo. 2. Εειφας dicitur usque ad tertium aut quatum mensem, χμαρ in genere fœmineo usque ad ætatem unius anni. Theophrastus: - Επ' αὐτῶν δὲ χμαρ, χμαρ δὲ καλὸν καὶ τὸ καμῖν. 3. Rotas. Sunt qui apud Varconem legi malint platycerotas: ego uero nusquam memini legisse platycerotas esse caprini generis, sed ceruini. An idem forsitan genus rota est cum ibicet de quo mox dicetur. 4. Capreolos uocat hos Columella, opinor lib. 9. 5. Non me latet hunc Plinij locum aliter à quibusdam legi: uerū satis placet hæc uetus lectio. 6. Aliās, Perpetuo sitiētia Africæ generant. 7. Oryx, ut Aristoteli placet, animal est bisulcū & unicomē, quod scilicet medio sui capitis unum cornu fixum habet: an idem sit cum oryge Plinij & Oppiani consideret studiosus lector. Oryx item apud Columellā intec eas numeratur feras, quæ uiuariis inclusæ seruantur.

Kis.
Χμαρ.
Χμαρ, δ.
Χμαρ, δ.
Εειφας.

Capreoli.

Cervus, ἑλαφός.

Subulones, παρταλῖαι.

Adminicula, κνωπῖται.

Numero circiter viginti. Plinius et Arist.

Achaine cervina.

Inter feras quæ cornua gestant, reliqua facile superat ceruinum genus, siue formæ pulchritudinem, siue cornuum amplitudinem, ramorumque in iisdem uarietatem spectes. Hæc anniculis nondum nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam prætuberans, quod breue hirtumque est. Bimis primum cornua oriuntur simplicia & recta ad subularum similitudinem: quamobrem subulones per id tempus eos uocât. Trimis bifida ex-
eunt, quadrimis trifida: atque deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum: ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dinoscere ætatem ramorum numero: sed senes cognoscimus maxime indicio duplici illo, quod scilicet dentes aut nullos aut paucos habent: atque adminiculis carent: uocantur adminicula rami, qui imis cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores: senes autem carent. Soli animalium cerui cornua tota solida habent (cum cæteris cornigeris omnibus caua sint): atque ea omnibus annis statuto ueris tempore, mense scilicet Aprilis fere amittunt: quæ cum amiserint, occultant sese interdiu uelut inermes: idque asperis opacisque faciunt locis, ut muscarum tædio uacent. Et quandiu carent iis, nocte procedunt ad pabula, donec recipiant cornua: quæ primum quasi cute uestita, & molli lanugine hirtiuscula emittunt: sed cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur & sicceant: ubi iam nihil attritu arborum, cum ea scalpunt, indolent, tunc ea relinquunt loca, confisi habere iam quo repugnare possint, cum res exigit: contra nonnulla enim animalia quandoque resistunt & cornibus se defendunt, quanquam feroces beluas fugiunt. Sunt etenim & cornuum mucrones heretiores: & cornua ipsa præ nimio excessu fere superuacua sunt: grandis enim illa & multifida cornuum magnitudo, in pugna sæpe obest potius quàm prodest. Fœmina in hoc genere cornuum inops mutilaque est. Cerui si cum per ætatem nondum cornua gerunt castrentur, non edunt cornua: sed si cornigeri exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Corpus ceruo obesum est, & maculoso uellere tectum, fuluum aliàs: fuit aliquando & candido colore. Collum gerit procerum atque erectum: summâque cacuminat aures. In monte Asiæ Elapho nomine apud Arginusam, ceruæ omnes scissæ ac uelut diuisæ aure sunt: qua nota uel alibi, si loca mutarint, dinoscuntur. & quidem fœtus iam inde à primo ortu in utero idem contrahit signum. Crura habet ceruus gracilia. dentium ordine superiore caret aliorum ritu cornigerorum, & ruminat. Nares ita diuisæ apparent, ut quadruplices uideantur. Genitale mari neuosum est: ubera fœminis quaterna ut uaccis. Vermes cerui continere produntur suo in capite plurimos uiuos: magnitudine haud minores iis uermibus quos maximos carnes putres ediderint, qui gigni uniuersi atque contigui solent sub linguæ inanitate. Cor habet ceruus, pro ratione magnum. felle uacat: quâquam eius intestinum amarum adeo est, ut ne à canibus quidem attingatur, nisi ceruus præpinguis sit. Ceruis Achænis cognominatis, sel contineri in cauda creditur. Est uero quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli: sed non ita ut fel humidum,

A humidum, sed licni simile parte interiore. Sunt, inquit Plinius, qui ceruo fel in cauda inesse putent, aut intestinis: ideo tantam habet amaritudinem ut à canibus non attingatur. in Brileto & Therne quaterni renes ceruis. *Aliis Tharne.* Ceruorum sanguis fibras non habet: quocirca non conerescit, coitu scilicet firmiore, ut cæterorum: sed perinde ut leporum sanguis spissari aliquantulum solet, eodem fere modo quo lac, quod iniecto coagulo coiuerit. Ceruæ in coitu mares suos non patiuntur, nisi raro, propter rigorem genitalis: atque ea de causa gradiuntur in coitu, subductisque clunibus semen recipiunt genitalale. Mas non uni feminae iungitur adheretue, sed mutat, breuique interposito tempore aliam atque aliam supergreditur: quo fit, ut ab eodem multæ impleantur. Coitus plurimum & conceptus earum post æsturi sydus

B mense Augusto & Septembri. uterum ferunt octo menses. At mares relictæ, rabie sæuiunt, fodiunt scrobes: tunc quoque rostra eorum nigrescunt. Pariunt feminæ magna ex parte unum, & interdum geminos. parere autem iuxta vias maxime solent, quod scilicet propter homines beluæ minus accedunt. Incrementum hinnuli celere. Editos partus studiose occulunt, & absconditos inter profunda fruticum uel herbarum, pedum uerberare castigant ad latendum. Cum maturuerit ad fugam robur, exercent cursu, & fugam menditari docent: ad prærupta ducunt, & per ea salire assuescunt. Vita esse perquam longa hoc animal fertur: quanquam nihil certi eorum quæ narrantur uidemus, inquit Aristoteles. Ad dignoscendam autem eorum uiuacitatem Alexander Magnus torqueis aureos plurimis ceruis innexuit: qui post annum centesimum capri, ad opertis iam cute torquibus, nec dum lenij indicium præ se ferebant. Pinguescunt cerui æstate supra modum: quam obrem nec currere quidem possunt: secundo aut tertio cursu capiuntur ab iis, qui pedibus insectantur. Fugiunt etiam in aquas propter æstum & anhelitum: quin & latebras quærunt, ubi se præpingues sensere, fatentes incommodum pondus. Caro eorum libidinis tempore uiciatur & fortet: cum itaque mares impleuerint feminas, separantur, ut modo diximus, per seipsos, propter graueolentiam: fortet enim ut hirci: & facies quoque eorum nigrescit ut hircorum. Degunt ita quousque imber accedat: tum pascua repetunt. Hyeme extenuantur debilitanturque: uere autem uigent maxime ad cursum. Cum fugiunt, etiam in fuga acquiescunt: stantisque respiciunt at-

D que manent, dum qui insequitur appropinquet: tum fugæ præsidia repetunt: quod ideo facere uidentur, quia interiora laborant: intestinum enim tam tenue imbecilleque habet, ut etiam si leuiter percussis, possit rumpi, cute adhuc integra. Vocem mares grauiorem quam feminæ mittunt. uox autem maribus in hoc genere est, cum tempus coeundi est: feminis autem cum metuerint. breuis uox feminæ est, maris productior. Fugiunt cerui latratu canum audito, aura semper secunda, ut odor cum ipsis recedat. Mulcentur sibilo & cantu uenantium: itaque alter uenantium palam aut sibilat, alter clam ferit à tergo, ubi socius tempus iam esse significarit. Sed cum erexere aures, acerrimi sunt auditus, nec latere insidiæ possunt: cum remisere, surdi, & facile interimuntur. Animal simplex est, & omnium rerum miracu-

*Mulcentur si-
stula pastora-
li, inquit Plin.*

lo stupens: intantum ut equo aut bucula accedente propius, hominem iuxta uenantem non cernant, arcum ipsum sagittasque mirentur. Serpnetibus inimicus ceruus est, anhelitu nanque, si quæ sint, extractas cauernis, mandit. Febrium morbos non sentit hoc animal: quin & medetur huic timori, ut fertur: legimus enim plurimos matutinis diebus ceruiam carnem degustare solitos, sine febribus longæuos fuisse: quod ita dentum existimant, si uulnere uno fuerint interempti. Quanquã alioqui succum procreat ceruina caro (uti Galenus prodidit) non minus uitiosum concoctumque difficilem quàm sit bubula aut ouilla: imo asinæ carni proxima esse censetur, ut fere nullum (quod ad alimentum rationem attingat) usum præstet. Cerninus sanguis fartagine inassatus dysenterias fluxionesque cœliacas sistit. in uino potus cōtra toxica efficax est. Aduersus uenena serpentiumque morsus mirificū est hinnuli coagulum occisi in matris utero. Ceruina medulla utrum emollit tum in pello, tum etiã extrinsecus imposita. Ceruina medulla perunctos uenenata fugiunt, inquit Dioscorides. Cornus ceruini cinis cadmiæ in morem elotus, ulceribus oculorum & distillationibus utilis est: infusus dentes expurgat, fluidasque ginginas contrahit; binis cochleariis epotus prodest dysentericis: sanguine excreantibus, cœliacis, morbo regio. Datur & in uesciæ doloribus cum tragacatha: in muliebribus fluxionibus cum liquore quopiam illi rei accommodato. Accēsi cornus odore serpentes fugantur, & comitiales morbi deprehenduntur. Cornu in aceto coctum, si eo gingiux colluantur, dolores ex molariū dentione factos adimit. Genitale cerui tritum & in uino potum, uiperarum moribus auxiliatur. Cerui generis sunt, & cerui quoque dicuntur, qui platycerotes & eurycerotes appellantur, à summorum cornuum latitudine, quæ in palmas finxit natura, digitosque emisit ex iis. Corporis forma cerui est: sed tergus omne nō minus quàm sit pantherarū uarium: uerum in his albicans macula, quæ in pantheris nigra sunt: & huius quoque sanguis fibris caret, quocirca neque spissatur. Bubali pene ad ceruinam faciem in Africa procreantur: corporis magnitudine bubalus eurycerote minor est, at dorcade maior, oculis splendidis, aspectu pulchro atque alacri. Cornuum exortus statim à capite recti, superiores uero eorum partes retro ad dorsum flectuntur. Bubalis cornua interdum inutilia sunt: nam etsi contra nonnulla sese defendunt, feroces tamen pugnacesque beluas fugiunt. Cum uero leonē metuat bubalus, caput tantum abscondit, reliquo corpore neglecto: itaque totū corpus latere putat. Sanguis quoque eorū fibras non habet: ideo neque concrefcit. Patrij solū amantissimū animal est: nam si forsan à uenatoribus captus, in alienū solū quanuis longinquum abducatur, solutus ad loca consueta reuertetur. Inter cornigera, omnium quæ explorata habemus, minimum dorcas est, in ceruino quoque genere numerandus, ut qui cornua habeat omnibus annis decidua, quæ & iis quoque interdum inutilia sunt: nam etsi contra nonnulla resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pugnacesque beluas fugiunt. Timidum animal dorcas est, & cursus uelocissimi: noctu æque cernere, atque interdiu creditur. In uenatione interdum, uel in media fuga consistit

Quoniam modo uirum cornu ceruinum, monstrat Dioscorides.

Platyceros.
Euryceros.

Bubalus,
Βύβλος.
Βύβλις.

Dorcas.
Dorcalis.
Dorc.
ζεί.
Dorcus.

A consistit: quòd si tunc temporis otium detur reddendæ urinæ, adeo recreantur illi uires, ut denuo ad cursum reddatur alacrior. Dorcades in Hispania sunt frequentes: in Lycia non transeunt montes Syriæ uicinos.

*Cilicia forsitum
pro Lycia, ex
Claymond.*

1 Hinnulus cerui *νεφέριος* dicitur & *κυμας*: quāquam *κυμας* nondum progreditur in pascua. Hæc Hermolaus. 2 Aristoteles achainas uocat: Græci genus ceruorum Echeineas ab oppido cognominant. Hæc ex Hermolao. 3 Viram esse ceruis longiorē quàm elephantis ostendit Pausanias in Areadicis. Ex Hesiodo, Ter tria secula hominis transmittit gartula cotnix, Quatuor & peragit cornicis tempora ceruus.

*Hinnulus.
νεφέριος.
κυμας.
Echeinea cer-
uus.
νεφέριος.*

4 *νεφέριος*, quem felle caret scribit Aristoteles, damā interpretantur & Theodorus & Hermolaus, cæterisque quos uidisse memini, recentiores omnes. Verū dama, ut ante monstrauimus, in caprarum genere numeratur à Plinio: proea nero, ut etiam fate-
tur Hermolaus, à ceruo non distinxit Aristoteles. Adde quòd eadem insula quæ Pro-
connesus ab animalum eorum copia, eadem & Elaphonnesus nominatur: de qua Plinius lib. 5. Præterea paucos reperias auctores, uel nullos potius, qui simul *νεφέριος* memi-
nerint, & platycerotis & eurycerotis. Atque inde coniciamus idem esse animal, quod
νεφέριος ab Aristotele uocatur, & platyceros siue euryceros ab aliis. 5 Dorcade, ca-
pream uertit Theodorus: arnos Plinium secuti capream in caprarum syluestrium ge-
nere locauimus. Dorcus apud Oppianum idem cum dorcade est: Dioscorides tāquam
diuersum enumerat. Dorcades Lybicæ (ut ex Æliano narrat Gillius) quanquam uelo-
citate sunt mirabili, tamen inferiores sunt in currendo equis Lybieis. Earum aluus ni-
gris uitris distinguitur, reliqui corporis color rubet, & pedes quidē eis longi sunt. Cor-
nibus caput ornatur, oculi nigri, longissimæ aures habentur. *κυμας* à poetis nūcupa-
ta (ut aliud sit animal à dorcade Lybica) turbinis instar celerrime fertur: flauis pilis spe-
ciatur: cauda est tum pilosissima, tum exalbens: eius oculi cyaneo colore tincti uiden-
tur, aures præaltis pilis resectæ: neque modo in terra pedum celeritatem ostendit, sed
etiam cum in fluuij confluentem inciderit, ungulis pedum remigans, fluctus perumpit.
Cpit. & uero in lacubus natare gaudet, unde sibi uitium cōparat: uitides iuncos, & cy-
perum depascitur.

*Cervi palmati
forte à Iulio
Capitolino di-
cuntur in Ger-
diani.*

*Dorcades Ly-
bica.*

*κυμας, co-
mas.*

De tragelapho, tarando, ophio, leucocruta & colo. Cap. XCVI.

EAdem pene cum ceruo specie sunt, quos tragelaphos dicunt: sed non a-
libi quàm circa Phasidem amnem nascuntur. Distāt tantum, quòd uil-
losos habent armos, & menta promissis hirta barbis. Tarando magnitudo
quæ boui: caput maius ceruino, nec absimile, cornua ramosa, ungula bifi-
da, uillus profundus magnitudine urforum: tergori tanta duritia, ut thora-
ces ex eo faciant. Hunc tarandū affirmant habitū metu uertere, & cum de-
litescat fieri assimilem cuiusque rei proximauerit: colorēmque omnium
arborum, fruticum, florum, locorumque reddere metuentem in quibus la-

Tragelaphus.

Tarandus.

Dtetideoque raro capitur, sed cū libuit sui coloris esse, asino similis. Scythia
hunc mittit. Ophion Sardinia quondam ferebat, nec alibi nascebatur: ani-
mal ceruo minus, sed pilo demum ac dente simile ceruo. Hoc interiisse ar-
bitror, inquit Plinius: & ideo medicinas ex eo omitto. Cruribus ceruinis &
ungula quoq; bifidula apud Æthiops leucocruta est perniciosissima fera, asi-
ni fere magnitudine, collo, cauda, pectore leonis, capite melium, ore ad au-
res usque rescisso, dentium locis osse perpetuo. hanc ferā tradunt humanas
uoces imitari. Gignitur apud Scythas quæ circa Meotim paludē sunt Co-
los, candido colore, magnitudine inter ceruum & arietem, sed qui ueloci-
tate utrūque facile superat. Potat naribus ad caput usque immerfis: cōque
potu diebus pluribus contentus, siccioribus locis pascitur.

*Colore asine.
Solinus.
Æthiopia mit-
tit, Solinus.
Ophion.
Cruentibus cerui-
nis, & cruribus
leonis, Solinus.
Apud Indos.
Truncata, ut
leucocruta,
Alia, asini fere
magnitudine.
Capite cameli-
ni, Solinus.
Colos, νεφέριος.*

DE DIFFERENTIIS

De hippelapho, hippardio, hippagro, hippopotamo, & eale.

E

Cap. XC VII.

*Hippelaphus.
Hippardium.*

Magnitudo hippelaphi ceruo comparatur. cornua dorcadi similia. iu-
bani summis continet armis. nec non & fera quæ hippardium no-
minata est, parte etiam cadem: sed utrunque hoc genus tenuissimo iuba
ordine à capite ad summos armos crinescit. Gerit cornua utrūque, excepta
fœmina hippelapho, & pedes habet bisulcos. Proprium hippelapho uillus
qui ab eius gutture modo barbæ dependet. Gignitur apud Arachotas. Vn-
gulas quoque bisulcas habet hippagros, ceruinis similes. dentes excro-
tinos. Spina tota ad caudam usque perpulchra ornatur iuba. Viuit in præ-
ruptis Æthiopiarum Indiæque locis, feruitutem non tolerat: nam si forte ca-
ptus seruetur, fame sese cruciat, sponteque moritur. Bisulcum animal & F
hippopotamus est, sed quod ambigat terræ, mari, atque amni cōmune: na-
tura enim hippopotami ita constat, ut uiuere nisi in humore diu non pos-
sit. Hunc gignit Ægyptus, malum hominibus non minus infestum quàm
sit crocodilus. Plurimi sunt super Saiticam, inter Ægypti præfecturas. Iuba
illi equina, ungula qualis bubus, rostrum resimum, dentes exerti & apro-
mure adunci, sed leuiter & minus noxij. Cauda etiam apri, tortuosa. Talus
quoque inest bisulcorum modo: magnitudo asini, hinnitus equi. Tergus
ad scuta galeasque impenetrabilis, præterquam si humore madeat. Inte-
riora omnia equi & asini similia. Noctibus segetes depascitur, ad quas per-
git auersus astu dolofo, ut fallente uestigio, reuertenti nullæ ei insidiæ præ-
parentur. Carnem habet hippopotamus durissimam, & concoctu difficil- G
limam. Hippopotami testes exsiccati ac triti, contra serpentium morsus bi-
buntur. Cinis corij cum aqua illitus panos sanat: adeps, frigidas febres. item
simum sufficit. Pellis eius è sinistra parte frontis in inguina adalligata uene-
rem inhihet: eiusdem cinis alopecias explet. Est apud Æthiopas Indosque
eale, aliàs ut equus fluuiatilis, cauda uero elephanti, colore nigro uel fuluo,
maxillis aprinis, maiora cubitalibus cornua habes mobilia, & ad obsequiū
cuius uelit motus accommodata: neque enim riget, sed deflectuntur, ut u-
sus exigit præliandi: quorum alterum cum pugnat protendit, alterum re-
plicat, ut si ictu aliquo alterius acumen obtusum fuerit, acies succedat alte-
rius. Hippopotamis comparatur, & ipsa sane aquis fluminum gaudet.

*Perpita uersus.
aliter hoc ex-
plicat Gillius,
ut uidetur ex
Aeliano.
Plin. Testiculi
drachma ex a-
qua cœtera ser-
pentes bibuntur.
Eale.*

Equicervum.

1 Hippelaphum Theodorus equicervum uocat, à forma equi & cerui quam ha-
bet, compositum nomen accepit. 2 Cauda, ut refert Herodorus, equina & magni-
tudo eius est bouis maximi. 3 Tergoris crassitudo tanra, inquit Herodorus, ut ex
eo cum aridum fuerit, uenabula fiant: &, ut Plinius refert, hastæ torquentur.

H

De camelo, & camelo pardali.

Cap. XC VIII.

*Camelus, κά-
μηλος.*

Inter quadrupedes quæ animal generant, post elephatū maxima mole
camelus est, idemque bisulcum: cornu tamen uacat. Bactri camelos for-
tissimos mittunt, licet Arabia plurimos gignat. inde duo camelorum gene-
ra, Bactrianum atque Arabicum. Differūt, quod illi bina habent tubera in
dorso, hi singula: camelus enim proprium inter ceteras quadrupedes habet
in dor-

- A** in dorso, quod tuber appellant. Sūt & omnibus camelis singula parte ima: in pectore scilicet, quale in dorso tubera, quibus incumbat reliquū corpus, & firmetur quoties in genua inclinantur. Dentium superiore ordine ut boves carent in utroque genere. Caudam habent asino similem. Genitale maribus nervo ita cōstat, ut uel ex eo cōfici possit, quo arcus fidiissime intenda tur: iidēque in auerfum mingunt: genitale enim inter crura posteriora caudam uersus spectat. Fœminæ in uentre mammas binas cū papillis quaternis habent, ut boves. Clunes habet camelus proportionē magnitudinis paruos. Camelo tali similes bubulis, sed minores paulo: est enim bisulcum uti modo diximus: sed bisulcum sic est, ut pes parte posteriore scissus paululum sit ad flexum digiti secundum: parte autē priore summa, quadriflexum. Et inter fissuras quiddam perinde ut in anserum pedibus continetur: eōq; fit ut alij minime bisulcum animal esse uoluerint. Pes uestigio est carnosus ursæ modo: qua de causa in lōgiore itinere sine calciatu fatiscunt. Pedatim incedit camelus, hoc est, ut sinister pes non transeat dextrum, sed subsequatur. Ventres habet camelus plures: & ruminat quemadmodū cor nigra. Fel non uasē aliquo discretum, sed uenulis quibusdam conclusum habet. Cocunt cameli sedente fœmina, nec auersi, ut sentit Aristoteles: (quanquam auersis, inquit Plinius, camelis coitus) sed complectente mare, ut ceteræ quadrupedes agunt, & coitum toto die exercent. Petunt recessuū solitudines cum libet coire: nec aliquis eō potest tuto accedere, præterquā
- C** pastor armenti: sœuit enim mas tempore coitus, siue homo accedat, siue camelus: nam odium aduersus equos gerunt naturale. Tēpus cocundi in terra Arabia mense Septembri. fert uentrem menses duodecim, uel ut aliis uidetur, menses decem. parit singulos: uniparum nanque est. Incipit & mas & fœmina coire in trimatu: fœmina post partū uno interposito anno coit. Cameli, matres nunquam superueniunt suas: sed etiā si quis cogat, ipsi non pariuntur. Camelus lac suum usque eō seruat, quō iam cōceperit: atque eo tempore, tum lac, tum caro cameli suauissima omniū est. Prolem à parente separant anniculam. Viunt cameli magna quidem ex parte annos triginta: sed nonnulli quinquagenis annis: quidam & centenis. utcunque & rabiem quandoque sentiunt. Castrandi genus etiā fœminas quæ bello
- D** præparentur, inuentum est: castratæ nanque auctiores & fortiores fiunt, coitu negato. Habentur in duplex ministerium: sunt alij oneri ferendo accommodati: alij leues ad perniciatē: uelocitas enim illis inter equos, sed sua cuique mensura sicuti uires: nec ultra assuetum procedit spatium, nec plus instituto onere recipit. Sitim quadriduo tolerant: uerum cum occasio bibendi data est, tantum implentur, quantum satiet desideria præterita, & in futurum diu proffit. lutulentas aquas captant, puras refugiunt: denique nisi cœnosior liquor fuerit, ipsi assidua conculcatione limum excitant, ut turbetur. Cameli tum caro, ut modo diximus, tum lac ab hominis dulcissimum est: suauissimum autem hoc existimatur, ad unam mēsuram duabus aut tribus aquæ additis. Cameli cerebrum arefactum potūque ex aceto

DE DIFFERENTIIS

comitialibus morbis aiunt mederi : item fel cū melle potū: hoc & anginæ. E capda arefacta solui aluum .fimi cinere crispari capillum cum oleo. Et dysentericis prodest illitus cinis, potūsque quantum tribus digitis capitur, etiam comitialibus morbis. Vrinam fullonibus utilissimam esse tradunt: itēque ulceribus manantibus. Barbaros eam seruare quinquennio, & heminis potam ciere aluum. Camelino capite est quam nabim Æthiopes uocant, nos camelopardalim dicimus. Collo equis similis, pedibus & cruribus boui, colore rutilo, candidis maculis in hinnulorū morem dispersa. Posteriora corporis anterioribus humilia: adeo ut iis partibus humi sedere uideatur, quæ bouis altitudinem non superant: cum partes priores camelorum crura proceritate æquent, simul & quæ circa armos sunt atque pectus ipsum proceriora uideantur, quàm pro reliqua corporis ratione: ut F uero Heliodorus prodidit, caput cameli simile, maius duplo aut paulo amplius quàm Lybici struthij: collum, ut oloris longum. Animal aspectu magis quàm feritate conspicuum: nullam enim præ se fert sæuitiam, tractatūque tam facile, ut funiculo eius capiti alligato, ubiuis ducatur à præfecto: ut non inter feras, sed inter pecora potius numerari debeat: quare etiam ouis feræ nomen inuenit, Æthiopia hanc gignit. Nullam habet cum pardale similitudinem.

Nabis.
Camelopardalis.

Ovis fera.

Dromades.
Dromedarij.
Ouifera.

1 Curtunt cameli, inquit Aristoteles, celerius quàm equi Nissani. Veloces istos camelos dromadas uocauit Liuius Deeade quarta: & dromedarios Esaiæ, ut arbitror, interpretres Latinus. 2 Ovis fera, aliàs ouifera.

De suisibus.

Cap. XCIX.

G

Sus, ūs.

SVillum genus cum sit aliàs bisulcum, in Illyrico quibusdam locis & Præonia, atque nonnullis aliis regionibus, solidas habent ungulas sues: 1 quo fit ut ex utroque genere existimentur, solipedum scilicet & bisulcorum. Dentem nullum mutat sus: & mas plures habet dentes quàm fœmina. Mas item dentes habet exertos, quibus fœmina uacat. Rostrum habet sus repandum, collum crassum, & fetis horret. Testes maribus hærent retro, nec tremuli pendent. Mammæ gerit fœmina, nec in pectore nec in fœminibus, sed in uentre, generosa duodenas, uulgaris binas minus. genitale uero ea continet parte qua pecoris ubera habentur: & cum per libidinem turget ac prurit ad coitum, lursum tantisper hoc retrahitur, uertitque fo- H ras, ut inde mari coitus sit facilius. Cauda sui intorta: id etiam notatum, facilius iacere in dextrum quàm læuū intortam. Lienem habet angustum & oblongum: uentrem ampliorem, in quo rugæ cancelliue (quas *males* uocant) insunt nonnullæ leues: hunc intestinum excipit longissimum & multis conuolutum anfractibus. Vulua porcina anfractuosa sinuosaque est: quandoquidem animal multiparum sus est, & in sinibus fœtum gerit. Suum ossa medullæ parum in se continent. aprorum sanguis non spissatur. Coire incipiunt sues tam mares quàm fœminæ menle suæ ætatis octauo: quanquam mas antequam sit anniculus prolem generat uitiosam: fœmina annicula parit: sed non omnibus locis eadem ætatis ratio est. iam

A iam enim sues nonnusquā tam mares quā mares quarto coeunt mense: sexto tamen ita ut uel prognerare & educare possint. Nonnusquam apri mense decimo inire incipiunt. Valent ij coitu ad triennium. uetustioribus proles deterior gignitur: nullus enim profectus accedit, nulla uirium recreatio. Paucissima edit sus prima partione, uiget secunda: nec senescens copia foetus deficitur, quāquam lentius coit. Vt autem Varro prodidit, sus ad foeturam quā sit foecunda, animaduertunt fere ex primo partu, quod non multū à reliquis mutat. Sunt è scrofis alix statim proles foecunda: laudabilis: alix incrementis melius generant. Vbi uero quintūdecimum annū nata scrofa est, non præterea generat: aliquibus tamen uita prope ad uicenos annos: plurimis uero ad quindecim. Si pinguet ocyus, & iuuenis, & senescens mouetur ad coitum: si grauida admodum pinguescat, efficitur ut foeta minus habeat lactis. Sues cicures bis pariunt anno: natura enim diuisus est suis annus bifariam: quaternis mēsis fert uentrem: binis nutritat. Parere tot potest scrofa quot mamas habet: si minus pariat, fructuaria non erit idonea. Numerus partus plurimum ad uicenos: si tamen multos pepererint, educare omnes nō queunt. Nutricare octonos porcos paruulos primo possunt, ut Varroni placet: incremento facto, à peritis dimidia pars remoueri solet, quod neq; mater sola potest sufferre lac, neq; cōgenerati alenscendo roborari. Mihi uero utilius probatur experto, inquit Palladius, porcam cui pabula suppetunt, ut plurimum sex nutrire anno: quia licet plures possit educare, tamen frequētiore numero sueta deficiet. Porci qui nati

Vsq; ad quartum annum, Varro: Pleni, non ultra triennium.

B sunt hyeme, fiunt exiles propter frigora, & quod matres aspernantur propter exiguitatem lactis. Cum scrofa peperit, primam mammam porco, qui primus in lucem prodit præbet: & suam nouit quisque in fœtu quo genitus est ordine, eaque alitur, nec alia. Detraeto illa alumno suo, sterilesceit illico ac resilit: uno uero ex omni turba relicto, sola munifex, quæ genito fuerat attributa, descendit. penuriam lactis præpingues sentiunt. qui in utero lesus minutusque fuerit fœtus, metachæros dicitur. Omnem porro situm rursus pecus hoc usurpat: nam & montibus & campis cōmode pascitur: melius tamen palustribus agris quā sitientibus. Nemora sunt conuenientissima, quæ glandium pomorumque syluestrium feracia sunt. at ubi penuria est arborum, terrenum pabulum consectabimur: & sicco limosum præferemus, ut paludem rimentur, effodiāntque lumbricos, atque in luto uoluntentur, quod est huic pecori gratissimum. Herbæ frugūque minime appetens est (imo uiridia pabula suisbus plerunque nocēt:) sed radicū maxime ex omnibus animalibus: ricūque aptissimo ad id negotij est. Facillime etiā omnium ad quoduis pabulum assuescit: & celerrime quoque in pinguedinem proficit, pro sui corporis magnitudine: sexaginta enim diebus pingue

Varro, Sum Aenea Lani ni triginta porcos peperit: sed portenti erat. Porca.

C scit: quantum autem profecerit, ij cognoscūt quibus ea res curæ est. Alitur hoc pecus pinguescitque maxime glāde: deinde faba, & hordeo, & cætero frumento. quæ res non modo pinguitudinem efficit, sed etiā carnis iucundum saporem: sed maxime pecus hoc, ut etiam cætera quibus uentriculis optime concoquit, quiete immotionēque pinguescit: magis autem inedia

Metachæros, iuxta Porcos.

Alas, sex diebus.

DE DIFFERENTIIS

saginatione orsa. Cæterum sues pinguiore redduntur etiam cum in luto esse uolunt. Sues ex omnibus pecudibus impatientissimæ famis sunt, ita ut aliquando si indigeant pabuli, non tantum alienam (si liceat) sobolem, sed etiam suam consumant. Sues tantum coitu spumam ore fundere inuenimus. uerrem subantis audita uoce, nisi admittatur, cibum non capere ut que ad maciem. In Africa suillum genus non uiuit. Apud Indos quoque nullum suem neque ferum neque cicurem nasci Ctesias Cnidius ait. In Macedonia sues muti esse dicuntur. Agatharhides ait sues in Æthiopia cornua habere. Cum cætera animalia, nisi nouella castrentur, intereant, aper unus qua ætate castretur non refert. Postquam enim salire desierit, ita ut id recte facere possit, castratur saginatürque, quoad perueniat ad lanium: uerum castrantur uerres commodissime anniculi, utique ac minores quàm semestres: quo factò nomen mutant, atque è uerribus dicuntur maiales. Castratur & femina post bidui in ediam suspensæ pernis posterioribus, uulua rescissa, celerius ita pinguescunt. Variis morborum generibus laborant sues, ut raucedine, anginae, struma, febribus: & unum ex omnibus quæ nouimus animalibus, sus grandinè concipit. Grandinosi autem fiunt sues, quorum crura, & collum, & armi carne constant humidiores: quibus partibus uel grandines plurimæ innascuntur. Caro dulcior est si grâdines habet paucas: sed si multas, humida ualde & insipida est. Facile qui grandem concipere cognoscuntur: parte enim linguæ inferiore grandines habentur: & si setas dorso euellas, sanguinolentæ in radice uidentur. pedibus etiam posterioribus constare non possunt qui grandent: & caput obliquum in incessu est: grandinem uero non habent cum adhuc solum lactent. Suem oculo amissio putant cito extingui. Porci alienos sibi manipulos scæni lacerantes, pluuiam præfagiunt. Qui suum gregem uult habere idoneum, eligere oportet tum bona ætate, tum bona etiam forma. Verres itaque legedi sunt, totius quidem corporis amplitudine eximi: sed quadrati potius quàm qui longi aut rotundi sunt, uetere promisso, clunibus uastis: cruribus uero & ungulis haud perinde proceris, rostris breuibus & resupinis, amplæ & glandulosæ: ceruicis: maximèque quod ad rem pertinet, quàm salacissimos oportet esse uerres: qui & ab annicula ætate commode progenerant dum quadratum agant. Scrofæ probantur longissimi status, & quibus ad sustinendum seturæ onus, magnus se uenter effundat: cætera uerribus similes. Fœmina sus habetur ad partus edendos idonea fere usque in annos septem, ut dictum est. Annicula non improbe concipit. Si regio frigida & pruinosa est, quàm durissimæ densæque & nigre setæ dux eligendus est. Si temperata atque aprica, glabrum pecus, aut qualecūque prouenerit, potest pasci. Sues setæ semel anno gignunt: principio hyemis coeunt, uere pariunt, petentes maxime inuia, prærupta, angusta & opaca loca. Mas cum fœminis dies triginta magna ex parte conuersari solet. maribus non nisi anniculis generatio est. In coitu plurima asperitas: tunc inter se dimicant indurantes attritu arborum costas, lutoque se tergorantes. Pugnant adeo acri certamine, grege relicto, ut sæpe numero mortem uterque aduersarius obeat. Fœminæ in partu

Verres.
Maiales.

Insipida, ἀψυ-
λας.

Sus fera.
ῥεῖα χρία.
αἰνυρος.
καπρὸς οἰνυ-
λας.

- A partu asperiores, quæ & nonnunquam cum libidine excitantur, uel homines aggrediuntur: idque candida maxime ueste indutos. Numerus partus & tempus ferendi, idem atque in urbanis suis est. uox etiã similis: sed scæmina uocalior est, mas raro uocem emittit. Mares castrati, maiores ferociorẽsque euadunt: castrantur autem, quod iunioribus adhuc morbus pruriens iucumbit in testes: quo fit ut atterentes eam partem ad arbores, testes exstringant. Inter omnia edulia, suilla caro ualentissime nutrit, & ex quadrupedibus facillime concoquitur: & si in uentriculo & in iecinore probe concoquatur, optimum procreat succum, sed qui glutinosi nonnihil in se habeat: quo fit ut iecur obstruat, & renes iis quibus hæc à natura meatus habent angustiores: atque uberior frequentiorque eius usus in his membris uel grauitatem uel dolorem nonnunquã creat: eoque senibus inutilis est.
- B Optimum autem succum gignit eorum caro qui ætate sunt mediocri: nã porcellorum recens natorum caro mucosa est, & excrementis abundat. Viscera suilla omnia, cæterorum quadrupedum uisceribus sua natura multo sunt suauiora: quæ tamen etiam seipsis meliora euadunt, cum animal ipsum caricas abunde comederit. Adhibetur & ars iecori scæminarum sicut anserum. Neq; alio ex animali numerosior materia ganæ: quinquaginta prope sapes, inquit Plinius, cum cæteris singuli. Vulua, ut diximus, cieto partu melior quàm edito: ciectitia uocatur illa, hæc porcaria primiparæ suis optima: contra effœtis. A partu, præterquam eodem die suis occisæ, liuida ac macra. Nec nouellarum suum præterquam primipararum probantur: potiusque ueterum necdum effœtarum, & biduo ante partum, aut post partum, aut quo eiecerint die. proxima ciectitiæ est occisæ uno die post partum. Huius & sumen optimum, si modo sætus non hauserit: ciectitiæ deterrimum, antiqui abdomen uocabant. Præpinguium suũ cutis, ubi probe elixa sit, glutinosum quidem pinguẽmque succum gignit, sed non admodum crassum: nec tam facile concoctione admittit quàm extremæ partes, (crura inquam ac labra): neque succum præstat tam bonum, sed qui excrementis magis abundet. Pulmo suillus intertrigines, quæ à calciamentis fiunt, ab inflammatione tueri sanarq; creditur. Aprinum iecur recens si arefactum teratur, ex uino potũ contra serpentiũ morsus auxilio est. Suillũ lac sunt qui arbitrentur utilissimũ tenasmo, dysenterix, necnon phthisicis.
- D Adipem suillum (axungia Græci appellauere) antiqui maxime axibus uehiculorum perungendis ad faciliorem circũactum rotarũ utebantur: unde & nomen: sic quoq; utili medicina cũ illa ferrugine rotarũ ad sedis uitia uirilatisque. Adeps suillus omniũ liquidissimus est, instarq; olei diffiluit: emoluit atq; concoquit magis q̃ oleũ: id eoq; cataplasmatibus quæ ad phlegmonas imponũtur, apte cõmisceri solet. Humorũ acrimoniã impolitus maxime obtũdit, ac proinde medicamentis ulcera curãtibus miscetur: quæ est quod parygton uocant. Et per se axungia medici antiqui maxime probabãt renibus detractã: & exẽptis uenis aqua cælesti fricabãt crebro, decoquebãntq; fœtili nouo sapius, tum demum asseruãtes. syncera axungia medetur igne ambustis uel niue: pernionibus autem cum hordei cinere: & galla pari mo

Vulu: ciectitia
Vulua porcaria.

Sumen.
Abdomen.

Axungia.
ἀξὺν γῆτος.

DE DIFFERENTIIS

do. Ad tussim ueterē recens decoquitur quadrātis pondere in uini cyathis E
tribus, addito melle: uetus etiā phthisin in pillulis sumpta sanat, quę sine sa
le inueterata est: omnino enim nō nisi ad ea quę purgata sint, aut quę non
sint exulcerata, salsa recipitur. Quidam quadrātes axungię & mulsi in ui
ni cyathis tribus decoquant contra tussim, quinto die picem liquidam in
ouo sumi iubent, circunligatis lateribus & pectoribus, & scapulis eorū qui
phthisin sentiunt: tantāque est uis, ut genibus etiam adalligata, redeat in
os sapor, eāque expuere uideantur. E luc quę nō peperit, aptissime utun
tur ad cutem mulieres: contra scabiem uero qui uis, admixto iumentorum
seuo, pro parte tertia & pice, paritēque subseruesactis. Medicorum aliqui
admixto anseris adipe taurotūq; seuo & cęsyro, ad podagras uti iubent: si
uero permanet dolor, cum cera, myrto, resina, pice. Vfus igitur axungię ad F
mollienda, excalfacienda, discutiēda, purgandāque. Inueteratur autē duo
bus modis: aut cum sale aut syncera: tanto utilior, quanto sit uetustior: con
uenitque salsam magis emollire, excalfacere, discutere: utiliorēque ef
fic uino lotam. Elota uino pleuriticis prodest: cinere aut calce excepta, in
flammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Talem suillū ustum atq;
epotum, quidam colli inflammationes atque tormina diuturna sanare pro
dunt. Atque hæc de bisulcorum genere satis præcepimus.

*Alias, contra
phthisin.*

*Quomodo cu
rari seruariq;
debeat, mon
strat Dioscori
des lib. 2.*

*Sus, ὄσ. Porcus, χοῖρος.
Delici.
Sacres.
Nefrendes.
Scrofa.
Verres.
Aper, ἀγρὸς.
Ivayp.*

1 Sus, ὄσ. olim ὄσος. Porcus, ut Varro tradit, Græcum nomen est antiquum,
sed obscuratum, quod nunc eum uocant χοῖρος. Cum porci depulsi sunt à māmā, à qui
busdam delicii appellantur: neque iam lactentes dicuntur: qui à partu decimo die, uel
(ut alij) die quinto habētur puri, ab eo appellantur sacres: quod tū ad sacrificia idonei G
dicuntur primum. Amisso nomine lactentis dicuntur nefrendes, ab eo quod nondum
fabam frondere possint, id est frangere. Sus fœmina, scrofa: mas, uerres dicitur, & nō
nunquam aper, græce ἀγρὸς: quanquam aper fere pro syluestri accipitur, qui Græcis
ἀγρὸς appellatur. 2 Quomodo saginātur sues, docet Aristot. lib. 8. hist. anim. 3
Aristoteles. Pernis posterioribus, rectisā cute inter fœmina, quā maribus testes maxime
continentur, &c. ubi Plinius, pernis prioribus habet: quem & Theodorus secutus est.
4 Desuū morbis, & eorum curatione Aristoteles lib. 8. hist. & Columel. lib. 7.
5 Sumen interpretantur suillas eum lacte suo densato mammas, ut Martial. lib. 13.
Esse putes nondum sumen: sic ubere largo Effluit, & uiuo lacte papilla tumet.

De quadrupedibus solipedibus.

Cap. C.

*Solipedes,
Solidipedes.
Μόνωγα.*

Reliquum iam est solipedum genus: earum scilicet quadrupedum, quę
ungulas in pedibus gerunt solidas. Porro solidas habent ungulas fere, H
quę non sunt cornigera, igitur pro iis, telum ungula est illis: nec talos habent
eadem. Solipedū crura statim iusta nascuntur mensura: postea expor
rigentia se uerius quā crescendo: itaque in infantia scabunt aures poste
rioribus, quod addita ætate non queunt: quia longitudo superficiem corpo
rum solum ampliat. Hac de causā inter initia palci, nisi submissis genibus
non possunt, nec usque dum ceruix ad iusta incrementa perueniat.

De equo.

Cap. CI.

Equus, ἵππος.

In hoc genere primas partes iure uendicabit equus: homini enim fidelis
simi ante omnia, quę uel in consortiū operum nobis paramus, sunt equi:
&

A & omnium quoque generosissinii. Iudicium quoque ac uoluptatem, affectusque alios nonnullos humanis similes iis inesse, præstantissimo saltem eorum generi, in exemplis habetur. Cum cæteris fere animalibus in suo singulis genere oculorum color sit idem, equus, secundum hominem, omnium cæterorum animalium maxime uersicolor est: & aliqui cæsi altero oculo nascuntur, quod nulli fere ex cæteris bestiis euenit manifeste. Ceruix iuba ornatur: & pili in iuba largi. Dentes habet equus cōtinuos numero quadraginta: quorum primores quatuor mēse tricesimo amittit, binos utrinque, supra dico & subter. Tum ubi præterea annum compleuerit, incipiātque quartum agere annum: quatuor item eodem modo mittuntur, duo superius, totidemque inferius: & incipiunt nasci quos uocant columellares.

B Rursus anno altero peracto, quinto scilicet anno incipiente, & omnino intra sextum annum, simili modo quatuor alij cadunt. Quibus iam peractis annis quatuor & mensibus sex, nullus præterea mittitur: quanquam euenisse in aliquo certum est, ut cum primis omnes amitterentur: atque etiam in alio, ut cum ultimis omnes: sed raro. Sexto deinde anno quos primos mutauit, exæquat. Septimo omnes explentur æqualiter, & ex eo cauatos gerit. Nec postea quot annorum sit ex dentium mutatione comprehendi potest: sed prouectionibus, decimo anno (ut nonnullis placet: ut uero aliis sexto decimo) tempora cauari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominere. Agitur certe in equis contra atque cæteris animalibus: cum enim cæteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redcuntur. Equus in pedibus solidas gerit ungulas, felle omnino cæci. Salacissimus omnium tum scæminarum tum marium equus est, excepto homine. Coire incipit bimus tam mas quàm scæminā: sed hoc in paucis fit, pullique eorum minores imbecillioresque sunt. Quod autem plurimum, trimatu tam mares quàm scæminæ coeunt, & proficiunt subinde in generando, ut proles præstantior ad annos usque uiginti procreetur. Iuniorum coitus præter ætatem contingit, pabuli bonitate & copia. Seniores equi foecundiores sunt tam mares quàm scæminæ: quò fit ut à circo post uicesimū annum mittantur equi ad sobolem reparandam. Matrem autem post decennium non esse utilem iudicant Columella & Palladius: quòd ex anno sã matre tarda sit atque iners proles. Coeunt mares ad annos tricenos ternos: scæminæ ad quadragenos: ita ut per totam fere uitam coitum equis seruari eueniat: uiuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta, scæmina plus quàm quadraginta. iam & quinque & sexaginta annos uixisse equum proditum est. Scæmina quinquennio finem crescendi capit, mas anno addito. Ad generandum paucis animalium minor fertilitas: qua de causa per interualla admissuræ datur. Equæ tricenæ, inquit Aristoteles, aut paulo plures singulis dantur admissariis. Neque tamẽ æqualem numerum omnibus debemus adhibere, sed æstimatis uiribus uniuscuiusque admissarij, submittenda sunt pauca uel numerosa coniugia. Iuueni equo & uiribus formæque constanti (ut Palladius præcipit) non amplius quam duodecim uel quindecim debemus admittere: cæteris pro qualitate uirium suarum.

Caninos hos uocant Columella & Palladius: Columellares dentes.

Equæ.

Nec unus admissarius, ut Plinius author est, quindecim initus eiusdem anni E
 ualet tolerare: quanquam (ut Columellæ placet) nec minus quàm quindecim, nec rursus plures quàm uiginti unus debet implere. Equus non certo dierum numero implet, sed aliquando uno aut duobus tribusue, aliquando pluribus: ferius cettè quàm alinus equam supetueniens implet. Coitus uerno sit æquinoctio: atque hoc tēpore horum sceturæ initium admissio-
 nis facere oportet ad solstitium, ut partus idoneo tempore fiat: duodecimo enim mense, die decimo aiunt nasci. Qui uero post solstitium partus eduntur, uitiosi & inutiles existunt, ut Apfyrtus docuit. Equos autem pretiosos, reliquo tempore anni remouere oportet à sceminis, ne aut cum uolent incant, aut si id facere prohibeantur, cupidine sollicitati noxam contrahant. Equas autem domitas L X diebus equire ante quàm gregales inuenimus. F
 Coitus tempore equi equos mordent, & prosternunt equitem quoque. Incenduntur libidine sceminarum equæ potissimum, uti diximus: quæ tempore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent. Caudā mouent crebrius, uocemque immutant. mingunt etiam pluries, atque inter se ludunt. Nec dubium, quin aliquot regionibus tanto flagrent ardore coeundi sceminæ, ut etiam si marem non habeant, assidua & nimia cupiditate figurantes sibi ipsæ uenerem (cohortalium more auium) uento concipiant. Fert iterum equa menses undecim: parit duodecimo mense, ut dictum est. Pariunt equæ magna ex parte singulos: sed gemellos quoque aliquando, cum plurimum, procreant. Abortum etiam facit equa odorē sentiens ellychnij lucernæ extinctæ, quod & mulierum nonnullis accidit. In hoc G
 genere grauida stans parit: præterque cæteras scetum diligit. Quod hippo- 3
 manes uocant, ueluti caruncula est, & hæret quidem fronti nascentis pulli, ut narratur, caricæ magnitudine, colore nigro: sed equæ perlambentes abstergentēque id abrodunt: alioqui partum ad ubera non admittunt. Non statim à partu equa impleri debet, sed intermisso tempore: & melius quarto aut quinto anno interposito procreat, ut Aristoteli uisum est. Omnino si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale facere necesse est. Alternis, inquit Varro, qui admittunt, diuturniores equos & meliores pullos fieri dicunt: itaque ut restibiles segetes essent exuētiores, sic quotannis quæ prægnans fiat. Et Columella, uulgari inquit, sceminæ solenne est omnibus annis parere: generosam conuenit alternis continere, quo H
 firmior pullus lacte materno laboribus certaminum preparetur: mammas nanque pullis equæ anno prope toto præbent. Fruge herbæque uescuntur equi, sed maxime potu pinguescunt: ut alia enim iumenta, ita & equi pro aquæ quam bibunt usu, suo fruuntur pabulo: & qui minus potum aspernatur, is appetentior pabuli est. Gaudent pratis & paludibus. Aquam quoque turbulentam & crassam suauius bibunt: quod si clara est, pede eam inturbant. Bibunt autem equi sorbendo: & quo quis acrior, in bibendo profundius nares mergit. Equos castrare quibusdam in more est, ut Scythicis Sarmaticisque gentibus: quibus equi parui sunt, acresq; ualde, neque adeo tractabiles: demptis enim testiculis, hunc quietiores: & canterij appellantur, ut in

Hippomanes.

Canterij.

Aut in suibus, maiales, & in gallis gallinaceis, capi. Equorum gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: hoc enim uno laborant, & plerunque ob id ungues amittunt: sed amissis alij statim renascuntur: fit enim ut altero subnascente ungue, alter amittatur. At uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt: adeo ut homines usu periti totidem fere morbis equum infestari, quot hominem referant. Equinum pecus tripartito diuiditur, uti Columella prodidit: est enim generosa materies, quæ circo sacrisque taminibus equos præbet: est mularis, quæ pretio scetus sui comparatur generoso: est & uulgaris, quæ mediocres sceminas marisque progenerat. At Varro ita distinguit: equi, quod alij sunt idonei ad rem militarem, alij ad uenturam, alij ad admissuram, alij ad cursuram, alij ad prædam: itaque peritus belli alios eligit, atque alit ac docet: aliter quadrigarius ac defultor: neque idem qui uectarios facere uult, neque eodem modo paratur ad ephippium ut ad prædam: quo ut ad rem militarem, quod ibi ad castra habere uolunt acres: sic contra in uitis habere malunt placidos: propter quod discriminē, maxime institutum, ut castrentur equi. Quales autem equos maxime legi oporteat, his præcipue signis intelligitur. Cum natus est pullus, confestim licet indolem æstimare, si hilaris, si intrepidus, si neque conspectu, nouæque rei auditu terretur, si ante gregem procurrit, si lasciuia & alacritate, interdum & cursu certans, æquales exuperat, si fossam sine cunctatione trāsilit, pontemque flumēque transcendit. Hæc erunt honesti animi documenta. Corporis uero forma constabit exiguo capite, nigris oculis, naribus patulis, breuibus auriculis & arrectis, ceruice molli latæque nec longa: præterea quæ non porrecta sit, ut suis, sed intro flectatur gallinaceorum more, densa iuba & per dextram partem profusa, lato & musculorum toris numeroso pectore, grandibus armis & rectis, lateribus proceris & ad uentrē inflexis: spina duplici, uentre substricto, testibus paribus & exiguis, latis lumbis & deorsum uersum pressis, cauda longa & letosa crispæque, mollibus atque altis rectisque cruribus, tereti genu paruoque, neque introrsus spectanti, rotundis clunibus, sceminibus torosis, tibiis excarnibus, duris ungulis, & altis, & concauis rotundisque, quibus coronæ mediocres superpositæ sunt. Sic uniuersum corpus compositum, ut sit græde, sublime, erectum, ab aspectu quoque agile, & ex longo, quantum figura permittit, rotundum, & toto corpore uenas habeat, quæ animaduerti possint: quod qui huiusmodi sit, & cum est æger, ad medendum est appositus. Quod ad colores attinet, hæc tradit Vergilius,

-Honesti

Spadices glaucique: color deterimus albis

Et giluo.

De colorū uarietate in equis plura legas apud Palladium.

Hæc eadem in equabus considerata sunt: & maxime, ut sint longi & magni uentris & corporis. De stirpe magni interest, qua sint: quod genera sunt multa. Itaque ad hoc nobiles à regionibus dicuntur, ut in Græcia Thesalici equi, in Italia, Apuli. Sed Cappadocia ante alias alitrix equorum, & prouentui equino accommodatissima est. In Hispania Galetica gens est, & Asturica. Equini generis hic sunt, quos thieldones uocamus. minori for-

Thieldones.

DE DIFFERENTIIS

Aliis, minori fama. ma appellatos asturcones gignunt, quibus non uulgaris in cursu gradus, sed mollis alterno crurū explicatu glomeratio: unde equis solum capere incursus traditur arte. Celtiberorum equi corporis agilitate perniciarēque reliquos facile superāt, Parthicorum maxime similes. Hi in Celtiberia quidem colore spectantur uario cinereō: in alieno uero solo colorē mutare solent, ut Possidonius author est. Circa Maotim paludem pusilli gignuntur equi: sunt enim loca hæc impense frigida. Apud Indos Pyllos arietibus non maiores equi gignuntur. Terram quoque Indiā equos uno cornu præditos procreare ferunt: quorum è cornibus pocula conficiuntur, in quæ mortiferum uenenum coniectū si quis biberit, nihil graue, quod cornu repellat malum, perpetietur. De Lybicis equis hæc feruntur: eorum uelocissimos esse, nullo laboris sensu affici, ex habitus gracilitate macilentos esse, totosque ex sese aptos ad fortissime sustinendam dominorum negligentiam: pabulum enim dominos eis nec largiri, nec eos cum laborauerint strigile perfricare, nec eis cubilia substernere, nec ungulas expurgare: sed simul atque iter institutum confecerunt, ex equis dissilientes, hos ad pastiones dimittere. Lac equinum, cum à camelino discesseris, liquidissimū omnium est, minimūque in se pingue habet. Caseum equinū, hippacem uocant alij: Sextius eisdē effectus equino, quos bubulo tradit. Hippacē alij coagulum equinum dixere: hæc dysentericis cæliacisque prodesse scripsere nonnulli. Lichenes uocantur in equorum genibus & prope ungulas indurati calli, in earum partium flexu nati: hi trixi & ex aceto epori comitialibus morbis mederi traduntur. Sunt qui eos & ad cuiusuis feræ morsum exhiberi cōsulant. Damnatur equinum fel inter uenena, ut Plinius refert. Quin & sanguis eorum septicam uim habere traditur: item equarum præterquam uirginū, erodere, emarginare ulcera. De equis feris pauca scripserunt Græci, quoniā terræ illæ non gignebāt: Hispania multos. Ad Hispaniam fluuium sunt equi feri candidi. In Æthiopū terris ultimis & deuus, ferorum equorum non parua natio duobus dentibus acutis & uenenatis prædita uersatur: quibus non perpetua pedum ungula, sed similiter ut ceruorum bifida est. iuba per mediam spinam ad extremam usque caudā pertinet. Ac si quando eos positis laqueorum insidiis Indi cōprehensos in seruitutem redigere uelint, abstinent se cibo & potione, quod seruiendi indignitatem acerbissime ferant. Dimidio quā equus maior perphagus est, animal Indicū, spississima cauda & nigerrima: humani pili subtilitatē eius setæ uincunt. Ad bina cubita singulæ ipsius setæ longitudine procedunt: ex una radice triginta simul exoriuntur. Omnium animalium timidissimus est perphagus. Septentrio fert & equorum greges ferorum: præterea alcem iumēto similem, ni proceritas auriū & ceruicis distinguat: quibus in rebus multo comparanda est: adeo propenso labro superiore, ut nisi recedens in postiora uestigia pasci non queat, ne in priora tendens labrū inuoluatur. Scandania insula è regione Germaniæ mittit animal quale alces, in hoc orbe nunquam uisum, multis tamen narratum, machlin nomine. Huic suffragines ut elephantis flecti nequeunt: propterea non cubat cum dormiendum est:

A est: tamē somnolentū arbor sustinet, quæ prope casura secatur, ut fera, dum affuetis fulcimentis innititur, faciat ruinam: ita capitur, alioqui difficile est eam manu capi: nam in illo rigore poplitum, incomprehensibili fuga pollet. Sunt in Hercynia sylva, ut Cæsar author est, quæ appellantur alces. Harum est consimilis capris figura, & uarietas pellium: sed magnitudine paulo antecedunt: mutilæque sunt cornibus: & crura sine nodis articulisque habent. Neque quietis causa procumbunt: neque si quo afflicta casu cōciderint, erigere se se aut subleuare possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant: atque ita paulum modo reclinatæ quietem capiunt: quarū ex uestigiis cum est animaduersum à uenatoribus, quò se recipere consueuerint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt, aut incidunt arbores, tantum ut summa species earum stantium relinquatur. huc cum se consuetudine reclinauerint, infirmas arbores pondere affligunt, atque unà ipsæ cōcidunt. Equos pennatos & cornibus armatos, quos pegafos uocant, Æthiopia generat. ut uero alij referūt, ales est pegafus: & hæc ales equinum nihil præter aures habet.

Alces.
An eadem sit
cū machi, an
diuersa.

Pegafus.

1 Intra sextum annum molares superiores cadunt, inquit Columella: Aristoteles uero, Maxillares nullum animal mutat. 2 Viuunt equi, inquit Plinius, annis quidem quinquagenis: forminx minore spatio. 3 Ve Theocritus scribit, *ἰππομανὴς φωνὴ ἐστὶ πρὸς ἀρχῇ, πῶ δ' ὡς πῶται, καὶ πᾶσι μάλιστα ἐν Ἰερῇ καὶ δευτέρῃ πῶται*: ut uero Cratenas, fructum fert planta ficui similis, sed nigriorem, folium papaueris, sed spinosum. Sed φωνὴ forsan dixit Theocritus quasi φῶμα, id est tuberculū quod in pulli fronte nascatur, ut insentiretiam Aristoteles. 4 Morborum signa & curationum genera C ad medicinæ ueterinarie scriptoribus perquirenda sunt: nonnulla quidē ab Aristotele: plura uero à Columella, Vegetio & aliis qui medicinam tradidere ueterinariam. 5 Quæ sint in equo maxime uicuperanda docet Pollux lib. 1. ubi & notæ etiam habentur generosi equi. 6 Regiones in quibus nobilissimi procreantur equi, ostenduntur præcipue ab Oppiano De uenatione lib. 1, & Gratio atque Strabone. 7 Equos pennatos. Monstro simile, uel monstrum potius hoc uocauit Plinius: & fabulosum arbitrat. Apuleius lib. 8 De asino. Meū ipse reputabam pegafum inclytum, illū motu magis uolaticum fuisse, ac per hoc merito pennatum proditum, dum in altum & adusque cælum subsilire ac resultat, formidans scilicet igniferæ morsum chimæ.

De asino.

Cap. CII.

Vilem uulgarēque asellum rus omne tanquam maxime necessarium desiderat: nec sane iniuria: nam etiam eo rure quod pascuo caret, contineri potest, exiguo & qualicunque pabulo contentus: quippe cum non fruge solum & herba uelcatur, sed uel foliis spinis que, uel perticis salignis alitur, uel obiecto fasce sarmentorum: paleis uero, quibus pene omnes regiones abundant, etiam gliscit, sed potu maxime: tum imprudentis custodis negligentiam fortissime sustinet, plagarum & penurie tolerantissimus: laboris etiam & famis maxime patiens, raro morbis afficitur. Huius animalis tam exigua tutelæ, plurima & necessaria opera supra portionē respondent: cum & facilem terram leuibus aratris poscindat, & nō nimio podere uehicula trahat: & pleraque utensilia & uehere in urbem, & reportare collo uel dorso commode possit. Iam uero molatum & conficiendi frumenti pe-

Asinum,
asellum, uos.

DE DIFFERENTIIS

ne solennis est huius pecoris labor. Frigidum animal asinus est, inquit Aristoteles: quamobrem locis frigidis gigni non potest, utpote sua natura maxime impatiens frigoris: quapropter Pontica & Scythica terra asinis caret. Dentes priores, ut equus, tricesimo mense amittit asinus: proximos autem sexto postea mense, atque etiam tertios quartosque eodem modo. In asini cauda, caulis longior est quam in equis. Cor habet pro corporis ratione magnum: & felle caret: sanguinem habet nigerrimum & crassissimum. Asinus tam mas quam femina tricesimo mense coire incipit: sed magna ex parte nequeunt generare. Partus tamen à trimatu legitimus est: quanquam iam uel anniculam uetrem gessisse asellam aiunt, ita ut quod pepererat educari ac perfici potuerit. Mulis tamē procreandis minor trimo, aut maior decēni non debet admitti. Reiciit semen à coitu, nisi si interpellatur asina: quāobrem ne id faciat, statim post coitum uerberant insectanturq;. Totidem pariunt quot equæ, & eisdem mensibus, & simili modo. Parit nanque asina duodecimo mense: & singulare magna ex parte gignit prolem: nonnunquā etiā, sed raro, gemellos edit. Paritura lucē fugit, & tenebras querit, ne cōspiciatur ab homine. Cum uel equus cū asina uel asinus cū equa coierit, multo magis abortus cōsequitur, q̄ cū unigenæ inter se iūgūtur: uerbi gratia, equa cum equo, aut asina cum asino. Euenit etiam tempus gerendi uteri maris norma: id est ut quanto spatio temporis mas perficitur suo in genere, tanto etiam fœtus, quē ipse procreat absoluitur. At magnitudine, corporis specie & uiribus magis fœminæ quam mari simile euadit quod nascitur. Si frequenter coeant, neque ullo interposito tempore cessent, quæ ita iunguntur, breui fœmina sterile scit: alioqui uero parere tota uita potest asina. uita autem asinis amplior annis triginta: & fœmina uiuacior mare est. Asinæ prægnantes, continuo lactescunt. Pullis earum, ubi pingue pabulū, biduo à partu maternum lac gustasse, lethale est: genus mali uocatur colostratio. Mammæ asinis à fœtu dolent: ideo sexto mense arcēnt partus, cum equæ anno prope toto præbeant. Partus charitas summa, sed aquarum tedium magis. Per ignes ad fœtus tendunt: eadē si riuus minimus interfit, horrent, ita ut pedes omnino caueant tingere: nec nisi assuetos petant fontes, qui sunt in pecuariis: atque ita ut sicco tramite ad potum eant: nec pontes transeant, per raritatem earum translucentibus fluuiis. Mirūmq; dictū, si-tiunt: & si immutentur aquæ, ut bibant cogendæ exorandæ ue sunt. Minor asellus maxime agro necessarius est, qui & laborem tolerat, (ut modo diximus) & custodis negligentiam propemodum non recusat. In hoc fere murinus color uulgaris est. Admissarius uero asinus & qui mularum generi seminando destinatur, speciosior esse debet: ut scilicet amplioris sit corporis, ceruice ualida, robustis ac latis costis, pectore musculofo & uasto, fœminibus lacertosis, cruribus cōpactis, coloris nigri uel maculosi: nā murinus non optime respōdet in mula, ut Columellæ uidetur: uerū Palladius admissarium nigri uel murini maxime coloris aut rubei uult: qui tamen si discolorēs pilos in palpebris aut auribus geret, colorem sobolis plerunque uariabit. Sunt qui asinorum, ubi iam senuerint, carnibus uescantur: quæ succum

*Etiā à bimatu
Cōfessisse tra-
dit Aristote-
les.*

*Alias, exone-
randæ sunt.
Minor asellus*

*Admissarius
asellus.*

H

2

A succum procreant deterrimum. concoctu sunt difficillimæ, stomachoque
 3 noxiæ, & gustui quoque insuaues. Lac asininum serosi humoris plus habet
 quàm caseosi: estque consistentia tenui: & secundum camelinum equi-
 numque liquidissimum ac minime pingue. In uentre minime omnium
 coagulatur, & quoquo uersus ocyslime in corpus digeritur: ac proinde sic-
 ca uentriculi toriúsque corporis intemperie laborantibus utile est. & bibi-
 tur ab imbecillitate uires colligētibus, quos atrophos uocāt: & ut nōnullis
 placet, in febris etiam, quæ careat dolore capitis. Pueris ante cibum lactis a-
 sinini heminam dari, aut si in exitu cibi rosiones sentirent, antiqui in arca-
 nis habuerunt: si hoc non esset, habuerunt è caprino. Asinino lacte potio ue-
 nena restinguuntur, peculiariter si hyoscyanum potum sit, aut lepus mari-
 nus, aut opocarpalum, aut pharicon, aut dorycnium: & si coagulum ali-
 cui nocuerit: nam id quoque uenenum est in prima lactis coagulatione.
 Sunt inter exempla qui lac asininum bibendo liberati sunt podagra chira-
 græue. Sed meminisse oportebit recenti utendum, aut nō multo postea te-
 pefacto: nullum enim celerius euanescit. gargarizatur quoq; faucibus ex-
 ulceratis utilissime. dentes collutos & gingiuas firmat. Cutem in facie eru-
 gari & tenerescere lacte asinino putant. Conferre aliquid & candori in mu-
 lierum cute existimatur. Poppea certe Domitij Neronis cōiunx quingētas
 per omnia secum fœtas trahens, balnearum etiam folio totum corpus illo
 lacte macerabat, extendi quoque cutem credens. Asini iecur assum comi-
 tialibus prodest: ieiunis autem edendum est. Ossa asini contrafacta & deco-
 C cta cōtra leporis marini uenenum dantur. Asinorum ungulas combustas,
 sunt qui comitalem curare morbum dicant, si assidue binis cochleariis bi-
 bantur: si oleo misceantur, strumas discutere: & ipsum cinerem aridum in-
 spersum perniones sanare. Quæ ex asinis utilia esse diximus, eadē omnia
 onagris efficaciora: asinorum enim genera duo: unum mansuetum, ut sunt
 optimi ex Arcadia, & in Italia ex agro Reatino: alterum ferum quos uocāt
 onagros. In Phrygia & Lycaonia, in Asia quoq; & Africa sunt greges mul-
 ti: nam similitudine quadam nomen urbanorum accepere. Est uero ona-
 ger corpore ampliore, pulchriore specie, colore albicante, auribus proce-
 ris, nigra linea ueluti uitta per mediam spinam protensa. animal cursus ue-
 locissimi: quod tamen ferocioribus beluis prædæ esse solet. Mares in hoc ge-
 D nere singuli fœminarum gregibus imperitant: quos & sua sponte sequun-
 tur ad pascua, ad fontes, denique quocunque duxerint. Timent mares libi-
 dinis æmulos: & ideo grauidas custodiunt, & fœtum si fœmina sit fouent,
 morsuque natos mares castrant. Contrà grauidæ laticbras petunt, & parere
 furto cupiunt, gaudētque copia libidinis. Onagri nō transeunt montem,
 qui Cappadociam à Cilicia diuidit. Onagri in Phrygia & Lycaonia præci-
 pui: pullis eorum, ceu prælatis sapore, Africa gloriatur, quos lalisiones
 appellat. Asinorum syluestrium caro (quod ad alimenti bonitatem atti-
 net) bouillæ, caprinæ & ouillæ comparatur, si ætate sint adhuc mediocres,
 ac bono corporis habitu. In solidipedum genere, unicomne asinus tantum
 4 Indicus est. gerit sane medio sui capitis cornu fixum, quo taurorum more

*Alias, furunculos, & x-
thia.*

*Onagrus.
Onager.
ὄναγρος.
ὄναγρος ἄ-
χιος.
Asinus syl-
uestris.*

Lalisiones.

*Asinus Indi-
cus, & taurus in-*

DE DIFFERENTIIS

generosissime pugnat: & talos quoque unus solipedū habet. Ex huius cornu pocula conficere Indos aiunt: nec ullis morbis eo die affici, quo ex huius generis poculo hauserint, neque ullis uenenis lædi, quæcunque nocendi gratia in potu dantur. Syluestrem asinum hunc uocat Philostratus, quem in Hyphasidis fluuij paludibus degere refert: alij uero syluestres asinos, equis magnitudine nihilo inferiores apud Indos in locis desertissimis nasci degerēque referunt, eosque reliquo corpore albos, capite uero purpureo, oculisque nigris esse: cornūque in fronte gerere, cuius superius puniceū, inferius album, mediū uero nigrum sit: atque non omnes quidem Indos, sed potentiores, cum tāquam armillis quibusdā brachia, sic cornua auro certis spatii ornarunt, ex his ipsos bibere solere. Ex hoc cornu bibentem ab insaniabilibus morbis tutum fieri: neque cum conuulsionibus corripī, neque saepe morbo tentari, neque uenenis ullis ferunt: quinetiam si quid pestilens prius biberit, tum id euomere, tumque ad sanitatem redire. Asinos Indicos cornigeros Ctesias inquit, talis præditos esse, quos si quis confregerit, interiora quoque nigra deprehensurum esse. Horum fœminæ postquam pepererunt, patres circū pullos à partu recētes summa custodia uersantur. Cum à uenatoribus Indis inuaduntur, pullos suos adhuc ætate infirmos à tergo suo pascentes habent, atque pro iis pugnant: ac contra equites audēt uenire, eosque ferire. Tanto sane hi robore existunt, nihil iis ut obistere queat, quin statim & concidat & perdat: equorumque incursum latera discerpūt ac lacerant, & uiscera dirūpunt: quo fit ut ad eos equi appropinquare ualde metuant. Carnes eorum, quod amarissimæ sint, haudquaquā esculentæ. G

1 Minor asellus, Hunc degenerē & uulgarem asellum uocat Columella: dosuarius asellum Varro. 2 Quæ forma maxime probāda est in asino, qui ad mularum procreationem destinatur, ostendit Apfyrtus in lib. ueterinario. 3 Crassissimum, inquit Plinius, lac asinæ est, ut coaguli uice utatur. 4 An idē sit cum eo, qui Eonius bos dictus est, aut bos Indicus: hunc Aelianus, ni fallor, etiam equum Indicū uocat.

Equus Indicus.

De mulis.

Cap. CIII.

*Mula.
Mulus.
Mularos.
Opeus.*

Muli nō suo pre genere ab radicibus, sed bigeneri & insititijs sunt: creātur enim ex equa & asino, uel onagro & equa. Neque ullū est in hoc pecore aut animo aut forma præstātius, quā quod seminabit asinus: quāquam possit huic aliquatenus cōparari, quod progenerat onager: nisi quod indomitum & seruitio contumax syluestri more, strigosum patris proferret habitum: generantur enim ex equa & onagris mansuetis. mularum ueloces in cursu, duritia eximia pedum, uerum strigoso corpore, indomito animo, sed generoso. Utiles etiam admissarij nascētur ex onagro & asina, & qui reliquos omnes antecellit. nam ubi asina & onagro natus, admittitur equæ per gradus infracta feritate, quicquid ex eo prouenit, paternam formam & modestiam, fortitudinem celeritatēq; auitam refert. Ad mularum generationem equas neque quadrimis minores, neque decēnibus maiores legunt. Mulorum genus totum sterile est, neque omnino fœcundum, sed infœcundum ad perfectam fortificationem. Concipere uero aliquando mula potest (quod iam factū est) sed enutrire atque in finem perducere non potest:

potest:

A potest: mas generare interdum potest: quod autē procreat ginnus est, quòd
 1 scilicet mulus oblæsus est: (nam ex equo & ex asino ginni proueniunt, cum
 conceptus in utero ægrotauit:) est enim ginnus idem quod metachærus in
 porcis, aut in homine pomilio. Mulus superuenire coiréque incipit, missis
 primū dentibus: sed septennis implere potest: & cum equa coniunctus
 ginnum procreauit: post deinde superuenire non solet. Mula quoque iam
 grauida facta est, uti modo diximus: sed non quoad perficeret atque ederet
 prolem. Quidam uero non dissimulādi authores, ut M. Varro, & ante eum
 Dionysius & Mago prodiderunt mularum fœtus regionibus Africæ adeo
 non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis partus earum, quàm
 sint nobis equarum. Theophrastus quoque uulgo parere mulas in Cappa-
 2 docia tradit: sed esse id animal sui generis. Vita mulis ad annos multos. Iā
 quidam Athenis uel octogesium annum egerat. & serius scœmina sene-
 scit quàm mas. Gignitur autem mula & ex equo & asina: sed effrenis & tar-
 3 ditatis indomitæ. Qui ex equo & asina concepti generantur mares, hinni
 uocantur & hinnuli. Est autem Hinnus matri quidem per omnia simi-
 lior, minor quàm mulus corpore, plerunque rubicūdior. Iubam & caudam
 habet similem asini, aures tamen gerit equinas. Item in uentre est (ut equus)
 menses duodecim. Hosce item ut equulos & educant & alunt: & ætatem
 eorum ex dentibus cognoscunt. Vngularum muli uel mulæ cinis ex oleo
 myrteo alopecias replet. Mulæ quas terra Syria fert, similitudine quadam
 nomen accepere: quanquā non eadem qua mulæ specie cōtinentur. Coeūt
 4 enim & mutua generatione progenerant, & celeritate mulis præstant. In
 India equarum & asinorum greges sunt: & asinos equæ facillime admit-
 tunt, & rufos mulos pariunt, ad currendum præstantissimos: quos pedibus
 captos ad Prasiorum regem adducunt. Ex iis, qui bimi capiuntur, domari
 possunt: contra uetuli ab immanissimis & carniuoris feris nihil differunt.
 Hæc de uniuerso quadrupedum uiuiparorum genere satis dicta sunt.

*Ginnus.**Mulus, ὄπρως.**Mula, ὁ Ση-
λογόπρως.**Mula Afri-
cana.**Mula Cappa-
doces.**Hinnus.**Hinnulus.**Mula Syriaca**Mulus Indi-
cus.*

1 Hinnum hunc uocat Plinius, id est paruum mulum, nisi deprauatus sit codex. *Hinnus.*
 2 Bardones etiam à nonnullis uocari hos scribit Hermolaus. *Bardones.*

DE ANIMALIVM DIFF- E FERENTIIS LIBER VI.

Continet ea quæ cortice integuntur, *φασιδνὰ* à Græcis dicta, quadrupedes scilicet ouiparas & serpentes.

De quadrupedibus ouiparis. Cap. CIIII.

*Ouipara, ὄσ-
τις.*



Vadrupedes quæ sanguinem habent, eedém-
que oua pariunt, (unde & ouiparæ dictæ
sunt) omnes caput, collum, dorsum, prona F
atque supina corporis possident: crura etiam
priora posterioraque, & quod pectori pro-
portionetur, modo uiuari generis. Sed cru-
ra iis ex obliquo habentur annexa, & humi
extensa: retróque flectuntur tum priora tum
posteriora, paulo in latus uergentia. Et pedes
hæc omnia in plures digitos habent discre-
tos. Caudam quoque habent longiorem, exceptis paucis. Ad hæc omnibus
iis sensus totidem quot cæteris quadrupedibus sunt. Oculos habent, &
coniuient palpebra inferiore (nam superiorem non mouent) quemadmo- G
dum & aues: quanquam non more auium niçantur: sunt enim oculis du-
rioribus quam aues. auriculis tamen hæc omnia carent, meatúsque tantum
habent audiendi. Foramina item iis ante os sunt, sed non ita explanata, ut
nares appellari possint, nisi spirandi officio. Et lingua quoque omnibus cõ-
spicua data est, (excepto quem Ægyptus fert crocodilo:) sed quæ in parte
maiore adhæret, & dura est atque inutilis ad uocis officium: quanquam ad
saporum gustatum usui illis sit. Lacertis inter hæc lingua bifida est, sicuti
serpentibus. Dētibus etiam serratis sunt omnia more piscium. Lingulam,
quam *ὠδυσσέϊδα* Græci uocant, superimpositam asperæ arteriæ non habēt,
sed dum alimentum in gulam admittunt, meatum ipsum constringunt:
atque ita efficitur, ut in pulmonem nihil delabatur. Māmis carent hæc: nec
genitale aut testes foris obtinēt manifestos, sed intus conditos habent: nec H
pilo, sed cortice, prope dixerim omnia, testæ sunt: sed alia præduro & testa-
cco, alia molliori. Pulmo in iis exiguus quidem & fungosus, & tamen bi-
partitus est: & pars altera multum ab altera discissa est, ita ut binos habere
pulmones uideantur. atque à singulari arteria partes in utrumque pulmo-
nis latus duæ dependent, quemadmodum & in auibz conspicimus. Qua-
drupedum ouiparorum iccinora pallidiuscula sunt: nonnullorū etiam ui-
tiata omnino, ut corpora quoque eorum prauum tēperamentum fortian-
tur, ut rubetæ, & testudinis, & similia. Lien iis exiguus, ut propemodum
sensum effugiat: rigidus quoque est & reni similis. Fellis etiam habent aut
plus aut minus omnia. Renes autem & uesicam eorum nullū possidet, præ-
ter te-

- A**ter testudinem. Testes iis dati sunt, non tamen qui foris pendeant, ut modo diximus, sed qui intus adhæreant lumbis, (quomodo etiam auibus habentur) uenulis admodum tenuibus circumdati. Meatus de singulis singulis pertinent, eodémque coeunt supra ostium excrementi, sicuti & in aliis ouiparis omnibus. isque meatus qui ex coitu amborum consistit, genitale est. Vuluæ ratio in iis eadem quæ in auibus est: enim uero ceruix una in imo & carnulentior est: fissura autem & oua proxima septo tranuerso continentur. Ventris intestinorumque eadem ratio est, quæ in uiuiparis quadrupedibus utrinque dentatis: simplicem enim unumque habent uentrem aut canino aut suillo similem. Os aut saltem spinam pro suæ magnitudinis modo fortiuntur: maiora enim ossis naturam potius obtinet: minora spina potius in ossis uicem fulciuntur. Quadrupedes quæ oua pariunt eodem coeunt modo, quo ea quæ animal generant, mare scilicet superueniente, ut testudo tam aquatilis quàm terrestris. habent uero in quod meatus illi genitales contingant, & quo per coitum adhæreant: quibus autem uesica deest, (carent autem uesica præter testudinem omnes, ut dictum est) iis idem meatus sicco excremento, qui & semini pertinet foris: intusque iuxta alter habetur. Atque hæc quidem similiter tam in feminis eorum quàm in maribus sunt. Feminae in iis (sicuti in cæteris ouiparis) maribus sunt maiores. Ortus iis uerno quidem tempore agitur, sed coitus non tempore eodem: alia enim uere, alia æstate, alia circa autumnum coeunt, utcunque singulis tempus sequens ad prolem commodius est. Oua edunt, maxima ex parte perfecta: quæ ut seruari possint, duro iam consent putamine oportet: sunt enim oua quandiu incretunt molliora. Eodem igitur modo sunt quadrupedum oua fere, quo auium, crusta dura intacta, & bicolora: & supra iuxta cinctum consistunt ut auium: & reliqua eadem tum intus tum extra eueniunt. Sed quadrupedum oua, ut ualidiora, tempore cõcoquantur: auium imbecilliora sunt, atque ob eam rem parentem incubantem desiderant, cū quadrupedum oua uel sine parentis incubitu tepore terræ cõcoquantur ac perficiantur: (hæc nanque fere omnia in terra pariunt.) nam si quæ quadrupedes ouiparæ frequentantes fouent, quæ ediderint oua, custodiæ gratia potius id faciunt. Huius generis omnia & pariunt in terra, & dormiunt uel in terra, uel si in aqua, rostrum ex humore extollentia spirandi causa.
- D**Vocem quidem emittunt, sed alia exilem & imbecilem, alia perexiguum sibilum. Ranis sua uox quædam est. Omnium horum hoc genus est: nam & carnem edit & herbam. Conduntur hæc hyeme fere, & mensibus quatuor frigidissimis latent, nec per id tempus quicquam comedunt. Ex iis uero quæ cortice molliori (non præduro & testaceo, qualis est testudinum) intacta sunt, senectutem exuunt secessus sui tempore. Varia horum genera: in his maximum est crocodilus.

De crocodilis & scinco.

Cap. CV.

Crocodilus fluuiatilis (duo enim genera eorum) maximum animal ex parua origine euadit: ouum enim non maius quàm anseris, & fœ-

*Crocodil^{us}, ὀφιδόλιθος.
aniseris.
ῥαῖνός.*

tus inde exclusus proportione est. Accrescit deinde, & magnitudine excedit duodeviginti cubita. Sunt quicquid tandiu augeri quandiu uiuat confirmant: uiuit autem diu. uitam habet terræ æque communem. Oculi sunt illi suis, & uisus in aqua hebes, extra acerrimus. Vnum hoc animal superiori mobili maxilla imprimit morsum, (inferiorem enim habet immobilem:) aliàs terribile, peccinatum stipente se dentium serie. Sunt præterea dentes exerti magnique pro corporis ratione. Lingua tota inferiori annectitur maxillæ, quæ uix sentiri potest, parua adeo, ut non linguam, sed locum tantummodo linguæ habere putaueris. Crura habet à latere adiuncta, & in summa humo expansa: pedes admodum paruos, atque ad capiendum retinendumque inutiles. unguibus armatur robustis. cutis in tergo corticea contra omnes ictus inuicta, in uentre mollis tenuisque est. Parit F oua, quanta anseres, candida, circiter sexaginta, quæ terræ gremio committit, & sexaginta diebus incubat. Dies in terra agit, noctes aqua, teporis utrinque ratione: quatuorque menses hyemis, inedia semper transmittit in specu: uti uero alij narrant, sexaginta dies uentrem gerunt crocodili, sexaginta oua totidem diebus pariunt: totidemque dies hæc fouent. Sexaginta uertebrae in spina habent, quam totidem heruīs alligatam esse ferunt. Curatio partus ab eisdem sexaginta diebus peragitur. Annos uiuit sexaginta: totidem dentes possident, totidem quotannis dies sine ullo cibo in latibulis quiescunt. Alij uero crocodilos dicunt cum in terra partum ediderint, obruere oua, deinde discedere: ita per se nascuntur & educantur. Crocodilum habent Nilus & Indus, quadrupes malum & humani corporis auidissimū. G Terribilis hæc contra fugaces belua est, fugax contra insequentes. Crocodilis in litore somno datis atque hiantibus, trochili aues inuolantes repurgant dentes, & intus fauces quoque: quo munere & ipsi aluntur, & crocodilus sentiens secum commode agi, nihil nocet: sed cum egredi auem uult, ceruices mouet ne comprimat. In hac quoque uoluptate nonnunquam crocodilum somno pressum conspicatus ichneumō, per easdem fauces ut telū aliquod immissum, erodit aluum. Fluuatiliū crocodilorum duo genera Ganges fluuius generat: horum alteri nihil nocent, alteri inexorabili atque immisericordi in quidlibet uoragine carniuori sunt: in eorum summo rostro quiddam tanquam cornu eminet. Crocodilus alter priori illi similis est, multum infra magnitudinem (qua chameleonti æquatur) in terra tantum, odoratissimisque floribus uiuit: ob id intestina eius diligenter exquiruntur iucundo nidore facta, crocodileam uocant: alij terrestres crocodili H finium crocodileam appellant. Crocodilum terrestrem sola fert Africa, ut auctor est Pausanias, qui & bicubitalem habet magnitudinem. Herodotus uero apud Ionas nasci crocodilos in sepibus murisue, à quorum similitudine Niloticos illos crocodilos nominari: quos & halitus odorésue multos uariósque edere prodidit. Crocodilea oculorū uitiis utilissima fertur cū porri succo inuncta, & cōtra suffusiones & caligines. illita quoque ex oleo cyprino molestias in facie enascentes tollit: ex aqua uerò morbos omnes quorum natura serpit in facie, nitorēque reddit. Lentigines tollit ac uaros,

Crocodilus terrestris.

Crocodilea.

A ros, omnesque maculas. & contra comitiales morbos bibitur ex aceto multo binis obolis. apposita menses ciet. Optima est, quæ candidissima, & friabilis, & amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquescent: cum teratur inter digitos, odore fermentescens. Felle inunctis oculis ex melle, contra suffusiones nihil utilius prædicat. Intestinis & reliquo corpore eius suffiri uulua laborantes, salutare tradit. Corij utriusque crocodili cinis ex aceto illitus iis partibus quas secari opus sit, aut nidor cremati, sensum omnem scalpelli aufert. Sanguis utriusque claritatem uisus inunctis donat, & cicatrices oculorum emendat. Corpus ipsum excepto capite pedibusque elixum manditur ischiadicis. tussim ueterem emendat, præcipue in pueris: item lumborum dolores. Et adipem habent, quo tactus pilus defluit: hic perunctos

Quibus modis adulteratur, explicat Dioscorides, & Plinius;

B à crocodilis tuetur, instillarumque moribus. Ex eadem similitudine est scincus, quem quidam terrestrem crocodilum sui generis esse dixerunt, candidiore autem & tenuiore cute: præcipua tamen differentia dinoscitur à crocodilo a quatico, squamarum seta à cauda ad caput uersa. Apud Nilum gignitur in Indiâque, & ad mare rubrum, atque in Lybiæ quoque Mauritania. Maximus Indicus, deinde Arabicus: afferuntur salii. Minor ichneumone est in Nilo natus scincus contra uenena præcipuum antidotum: item ad inflandam uirorum uenerem: nam quæ circa renes sunt partes, ad pudendi erectionem bibuntur: ueneremque accendere ferunt, si drachmæ pondere ex uino bibantur. Et rostrum quoque eius & pedes in uino albo poti, cupiditates ueneris accendunt, utique cum satyrio & eruca femine singulis

Scincus, enchy-
ret.

Salæ ad seruandam naturam nascuntur. Dioscorid.

C drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis: ita ut pastilli singularum drachmarum bibantur. per se laterum carnes obolis binis, cum myrrha & pipere pari modo potæ, efficaciores ad idem creduntur. Prodest & contra sagittas uenenatas, ut Apelles tradit, postea sumptus. in antidota quoque: nobilia additur. Sestius plusquam drachmæ pondere in uini hemina potum, perniciem afferre tradit: præterea eiusdem decoctum cum melle sumptum uenerem inhibere. Apelles author est, si ex melle uenenato syncero saltidius cruditasue, quæ sit grauissima, incidat, scincum circuncisis pedibus, capite, cauda, decoctum, antidotum esse. Apud Indos nascitur bestia crocodili terrestri specie, magnitudine Melitensis canis: cuius pellis squamis adeo aspersis scatet, ut more ferræ æs dissecet, & ferrum exedat atque conficiati

Alii, prodest & contra sagittarum uenenam ante præsumptum;

D Indi phartagen uocant.

Phartagæ:

1 Aristoteles & Herodotus, Acereferit ad decem & septem cubita: uel ut alij legunt apud Aristotelem, ad quindecim cubita. 2 Crocodilum. Herodot. Apud Nomadas Africæ trium cubitorum magnitudine lacertis simillimum.

De testudinum generibus.

Cap. CVI.

1 Geminus similiter uictus in aquis terræque & testudinum. Sunt autem testudinum genera, terrestres, marina, lutaria, & quæ in dulci aqua uiuunt. Aristoteles tria prodidit genera: marinam terrestrem & hæmyda, quam Plinius (opinor) lutariam uocat & murem marinum. Testudinum genera omnia à latere adiuncta habent, eademque in obliquum flectunt, quemad-

Testudo, hæ-
lona.

Q

DE DIFFERENTIIIS

Testudo marina.
*Χαλάρη θη-
 λασίς,*

Testudines Indicae.

Testudines cornigerae.
*Αλιὰ, celtiū,
 uel celerinum,
 uel, ut Hieron-
 imo placet ce-
 letum.*

Testudo terrestris.
*Χαλάρη χερ-
 σίνη.*

Chersina.

modum crocodili & lacertæ, & cortice integuntur duro rigidoque, & qui esse firmior sit. Testudinis iecur omnino uiciatum est, & totū corpus prauum temperamentum sortitur, quemadmodum & ranæ rubetæ. Testudini marinæ lingua nulla manifesta nec dentes, sed rostri acie comminuit omnia. Sunt enim rostri margines acuti, superna parte inferiorem claudēte pyxidum modo: & os habent robustissimum: quicquid nanque in os ceperint, siue lapidem siue quoduis aliud, perfringunt ac deuorant. Pulmonē habet testudo marina carnosum & sanguineum, similem bubulo, sed minorem quàm sit testudinis terrestris pro corporis ratione: at contrā, uesciā ampliorem. Renes etiam habet similes bubulis. Corde eius exempto, mouetur tamen. In mari uiuunt conchiliis: habet enim os robustissimum, ut dictum est. Exeunt in terram, & pascunt herbam, & in herba pariunt oua auium corticalium ouis similia, ad centena numero: eaque defossa extra aquas & cooperta terra, ac pauca pectore & complanata incubāt noctibus: & educant fœtus annuo spatio: quidam oculis spectando quoque oua foueri ab ijs putant. Fœminę coitum fugiunt, ob rigore asperitatemque genitalis masculi: quocirca non aliter coire creduntur, quàm coactæ, & pugna à maribus superatæ. Testudines tantæ magnitudinis Indicū mare emittere fertur, ut singularum superficies habitabiles casae integant, & numerosam familiam non arcte receperint, ut Solinus testatur, atque inter insulas rubri maris his nauigēt cymbis. Troglodytæ cornigeras habēt, ut in lyra annexis cornibus latis, sed immobilibus: quorū in natando remigio se adiuuāt: celtinū genus id uocatur, eximie testudinis, sed raræ. Testudinis marinæ sanguis cum uino & leporino coagulo cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena utiliter bibitur. Sanguine, alopeciarum inanitas, & porrigio, omniāque capitis ulcera curantur: inarescere autem eum oportet, lentēque ablui. Instillatur & dolori aurium cum lacte mulierum: comitialibus instillatur ori, diductis labris, iis qui modice corripiantur: spasmo cum castoreo clystere infunditur. Quod si dētes per annum colluuntur testudinum sanguine, immunes à dolore fiunt. Marinæ testudinis fel oculorum suffusionibus, albuginibus, & hebetudini medetur, claritatēque oculorum facit, & cicatrices extenuat. Oculorum quoque uicia omnia fel inunctum cum melle emendat: rōfillas sedat, & anginas, & omnia oris uicia: priuatim nomas ibi: item ardentium testium. naribus illitum comitiales erigit attollitque. Marinarum testudinum carnes admixtæ ranarum carnibus, contra salamandras præclare auxiliantur: neque est testudine aliud salamandræ aduersus. Terrestris testudo pulmonē habet pro corporis ratione maiorem quàm marina: uescicam autem admodum exiguam: adeo ut urinam earum (quæ ad remedia nonnunquā perquiritur) aliter quàm in uescica dissectarum inuenire difficile sit. Oua durioris testē & bicolora edit, quale ouum auium est: eaque defossa & cooperta terra & cōplanata supra incubat, crebrius repetens: fœtūque sequente anno excludit. Sunt testudines terrestres, quæ ob id in operibus chersinæ uocantur, in Africæ desertis plurimæ, qua parte maxime sitientibus arenis squalent, roscido, ut creditur,

A datur, humore uiuentes: neque ibi aliud animal prouenit. Testudinum putamina secare in laminas, lectōsq; & repositoria his uestire Carbilius Pollio instituit. Terrestrium testudinum carnes suffusionibus proprie, & contra uenena salutare produntur. Testudinis terrestris sanguinem epotum comitialibus prodesse tradunt. plurimā in Africa uti modo diximus: 6 Hę ibi amputato capite pedibūsq; pro antidoto dari dicuntur: & ex iure in cibo sumptæ strumas discutere, ac lienes tollere: item comitiales morbos. Sanguis earum claritatem uisus facit, suffusionēque oculorum tollit: et contra serpentium omnium & araneorum, & similiarum, & ranarum uenena auxiliatur. sanguine seruato, & in farina pilulis factis, & cum opus sit in uino datis. Felle testudinum cum Attico melle glaucomata inungi prodest: & scorpionum plage instillari. Tegumenti cinis uino & oleo subactis pedum rimas ulceraque sanat. Squamæ à summa parte derasæ, & in potu datæ, uenerem cohibent: eo magis hoc mirum, quoniam totius tegumenti farina accēdere traditur libidinem. Oua durata illinuntur strumis & ulceribus frigore aut adustione factis: sorbentur in stomachi doloribus. Aliqui *Lethargicis illinunt. Ad hæc de altero testudinū genere dicantur. Testudo lutaria.* sanguinem testudinum lethargicis illinunt. hydropicis medetur testudo, decisis pedibus, capite, cauda, & intestinis exemptis: reliqua carne ita cōdita, ut citra fastidium sumi possit. Testudinum est tertium genus in cœno & paludibus uiuentium, lutarium uocant: latitudo his in dorso pectori similis, nec conuexo incurua calice, ingrata uisu. Ex hac quoque aliqua contingunt auxilia: tres nanque in succensa sarmenta coniectæ diuidetibus se- *Mus marinū huius. Mus aquaticus.* C tegumentis, rapiuntur: tum euulsæ carnes earum coquuntur in aquæ congio, sale modice addito: ita decoctarū ad tertias partes succus paralyfin, & articulares morbos sentiētibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sanguinemque uitiatum: sistitur ab eo remedio aluus aquæ frigidæ potu. Aristoteles *αἰνίδα* uocat, Plinius murem marinum. Hæc corticē (licet duriusculū) molliorem tamen habet quā marina aut terrestris testudo: uesica & renibus uacat. Egressa hæc in terram, scrobe effossa dolij forma, parit oua, quę deserit obruta terra, die tricesimo repetit: resossa breui excludit, fortumq; continuo ducit in aquam. Cutē replet in alopeciiis muris marini cinis cum oleo. Quartum testudinum genus est earum, quę sunt in amnibus: has quidam è Græcis hæmydas appellant, longitudinis in India trium cubitorum. 4 Harum diuulsarum pingua cum aizoo herba tusa, admixto unguento & semine lilij ante accessiones perunguntur ægri præter caput: mox cōuoluti, calidam aquam bibunt, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quintadecima luna capi oportere, ut plus pinguium repetiatur, uerum ægrum sextadecima luna perungi tradūt. Ex eodem genere testudinum sanguis instillatus crebro capitis dolores sedat, item strumas. Sunt qui testudinum sanguinem cultro æreo supinarum capitibus præcis excipi nouo fœtuli iubeant: ignem sacrum cuiuscunque generis testudinum sanguine illini: item capitis ulcera manantia, & uerrucas. Iidem promittunt testudinum omnium fimo pauos discuti.

1 Atrianus in rubri maris nauigatione aliter enumerat quatuor testudinū ge-

DE DIFFERENTIIS

*Ἰμβρ.
Testudo.
Χιλόνη.*

nera, ἁλῆθινῶν: (hæc opinor marinā intelligit,) terrestrē albā & montanā, quæ maxima est, & cortice crassissimo. 2 Hæmyda, ἡμύδα: Aristoteles nūquā, quod meminerim, nomine testudinis appellat, imò potius distiuguit, ἡμύδα γὰρ καὶ χιλόνη: sed fere cum ipsis cōnumerat. 3 Hoc forsitan uerū est de testudine marina: nā terrestrīū carnes ad remedia mādūtur. Testudinis ereoim nomē apud Latinos, sicuti & χιλόνη apud Græcos, absq; ullo addito, quādoq; marinā, quādoq; terrestrē significat: ut apud Plin. lib. 11. cap. 17: & Aristotelē lib. 5 hist. animal. ca. 33. 4 Plinius (modo absit mēda) inquit: Testudo pulmonem quāuis prægrandē, & sub toto tegumento habeat, sine sanguine rameo habet: ut uero de terrestrī testudine intelligatur (ut mihi quidē uidetur) nō patitur contextus. 5 Vtriusque generis testudinū putamina in lamias secari ad opéra, ut ad pocula aliāque uasa, perspicuum est: ex Martiale in Apophoretis, de Gustatorio.

*Testudines
albæ.
Auræ.
ὄφιαί.
Montana.*

Fœmincū nobis Cherfoo si credis inesse. Deciperis: pelagi mæscula præda sumus. Sunt apud Attriaō in rubri maris navigatione (quæ ut opinor ad huiuscemodi opéra exquiruntur) testudines quædam quæ albæ dicuntur, maioribus corticibus: & auræ, quæ reliquas facile superant. Sunt & ὄφιαί, id est montanæ testudines prægrandes & cortice crassissimo, cuius pars inferna, quæ & subrufa est, sedtio oem uix paritur. 6 Hæc ibi, Plinius: Si ex melle syneero fastidium cruditasque sit grauissima, incidat, testudinem circūcis pedibus, capite, cauda, decoctā, antidotū esse, auctor est Pelops.

De ranarum generibus.

Cap. CVII.

*Rana.
βάτρακες.*

*Oligo, ὀλιγό-
λιπῶν.*

Gynni.

*Rana fluuiati.
Rana aquatic.
Rana lutaria.
βάτρακες πε-
λοποννησίου.
βάτρακες λι-
μνῶν.*

Ranarum genus ne uiuere quidem diu potest discussum ab aquæ natura. Quadrupes est ex ouiparorum genere. Lingua ranis sui generis est: pars enim prior, quæ cæteris absoluta est, iis coheret eo modo quo piscium: intima uero absoluta ad guttur applicatur, qua suam uocem solent emitte-
tere. Et quidem genus illud ululatus, quam oliginē nominant, mares intra aquam reddunt, ut ciant ad coitum fœminas: & flagrant tantisper oculi modo luccræ, dum uociferantur. Coitum uero noctu magna ex parte agere uisuntur. Coitu superueniunt ranæ, prioribus pedibus alas fœminæ mare apprehendente, posterioribus clunes. fœtum emittunt suum continuo filo sibi coherentem. Pariunt minimas ueluti carnes nigras, quas gyninos uocant: oculis tamen & cauda insignes: mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirūmiq; semestri uita resoluuntur in limum nullo cernente: & rursus uernis aquis renascuntur. Cyrcnis mutæ fuere ranæ, illatis è continente uocalibus. durat genus earum. Mutæ sunt etiā nunc in Scripho insula: cædem aliò translata canunt: quod & accidere in lacu Thessaliæ Siccædo tradunt. Ranarum uaria sunt genera. Rana fluuiatilis circa stagna riuosque uersatur. hæ sunt quæ apibus, ubi aquatum accesserint, insidiantur, & eas rapiunt. Iubent aliqui nascētium in aqua ranarum, quibus adhuc cauda est, in calice nouo combustarum cinerem, si per nares fluat sanguis, iniiciendum. Contra omnium reptilium uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ carnes earum edantur, iusue decoctarum sorbeatur: profunt & contra inueteratos tendinū rigores. Hydro-
pici quoque medentur ranæ aquaticæ in uino uetere & farre decoctæ, ac pro cibo sumptæ. Ignes sacros restinguunt ranarum uiuentium uentres impositi: pedibusque posterioribus adalligari iubent, ut crebriore anhelitu profint. Ranæ uero in triuio decoctæ oleo, abiectis carnibus perunctos liberant quartanis. Decoquantur ranæ singulæ in acci heminis, ut dētcs colloātur,

Acolluantur, contineaturque in ore succus, dentium dolores sedat. Si fastidium obstaret, suspendebat pedibus posterioribus eas Salustius Dionysius, ut ex ore uirus deflueret in acetum feruens, idque è pluribus ranis. Fortioribus stomachis ex iure edendas dabat: maxillarésq; ita sanari dentes præcipue putant: mobiles uero supradicto aceto stabiliri. Ad hæc quidam ranarum corpora binarum præcis pedibus, in uini hemina macerant: & ita colui dentes labentes iubent: aliqui totas adalligari maxillis: alij denas in acetæ sextariis tribus decoxere ad tertias partes, ut mobiles dentium stabiliarent: alij iecur ranæ decoctum & tritum cum melle imposuere dentibus. Si cariosi & foetidi sunt, centum in furno arefieri per noctem præcipiunt: postea tantundem salis addi atque fricari. Pforas tollit rana decocta in heminis quinque aquæ marinæ: excoqui debet donec sit crassitudo mellis. Ranarum decoctarum ex aceto succus anginas illitus abolet: hic & contra tonsillas prodest. Insuper earum cinis profluentis sanguinis impetum sistere fertur: cum liquida pice illitus sanare alopecias. Tuslim sanare dicuntur piscium modo in iure decoctæ in patinis ranæ. Suspensæ autem pedibus, cū distillauerit in patinam salua earum, exenterari iubentur, abiectisque inter canes cōdin. Vermes ulceribus innati, ranarum felle tolluntur. Iecur ranæ geminum esse dicunt, obiciique formicis oportere: eam partem quam appetant contra omnia uenena esse pro antidoto. Ranarum adeps instillatus, statim dolores aurium tollit. Quæ *Βάτραχος* *ἰαλός* à Græcis uocatur, & *ἰαλὸς βάτραχος* (quasi ranam palustrem dixeris) quibusdam aut idē cum phryno aut certe non dissimilis uidetur: atque ex utriusque ueneno eadem procreari symptomata feruntur: nempe corporis tumor cum colore admodū pallido, ut buxo similis appareat: spiritus angustia, oris fœtor, singultus: nō nunquam & sua sponte inuitōque effluit semen. facile autem sanatur qui post uomitionem meraci uini plurimum ingererit. Nicander uero & Aëtius hæc omnia fere ranæ mutæ tribuunt. At *Βάτραχος* *ἰαλός* sumentibus, appetitus deiectionem, oris nimiam humectationem, nauſeamque & frequentem uomitum, ac præterea affectionem quam *αερίδιαισι* uocant: curari uero, ingesta uini copia unā cum aliis quæ uehemētius calfaciant. Phrynos, ut Aëtius prodidit, ranarum genus est, quod cum palustris uitæ conditionem in terrestrem mutauerit, *φρυνός* appellatur. Magnitudine testudinem paruum æquat. Dorsum exasperat inflatq; se irata & intumescit: adeo proterue audax ut in quocunque aduersum icrit, insultet & quasi uindictet. Raro quidem mordet: uerum adeo uenenosum exsufflat, ut uel solo anhelitu officiat: hoc malum sequitur totius corporis tumor, ut quandoque rūpatur, ac breui intreat lēsus. Phrynon Latini ranam rubetam uocant. Ranæ rubetæ, inquit Plinius, quarum & in terra & in humore est uita, plurimis refertæ medicaminibus, deponere ea quotidie ac resumere a palſtu dicuntur, uenena tantum sibi referuantes. Sunt quæ in uepribus tantum uiuunt, ob id rubetarum nomine, quas Græci phrynos uocant, grandissimæ cunctarum, geminis ueluti cornibus, plenè ueneficiorum. Ranæ rubetæ hostis est buteo triorchisue: rapit nanque eum & exedit. Apes hoc modo in-

Βάτραχος ἰαλός
ἰαλός
ἰαλὸς βάτραχος
Rana palustris
φρυνός

φρυνός

φρυνός
Rana rubetæ

Rubetæ
φρυνός

DE DIFFERENTIIS

terimit rana rubeta: adrepens nāque foribus aluei insufflat, & deinde auo- E
lantes obseruat ac deuorat. Nec sentire ictus apum ranæ traduntur. Ranæ
rubetæ iecur omnino uitiatum est, & corpus denique totum prauum for-
situr temperamentum, uenenosumque est. Ranarum rubetarum iecoris al-
tera fibra à formicis non attingitur, propter uenenum, ut arbitrantur. Ti-
mazus & Neocles medici rubetas dicūt bina iecora habere: & alterum qui-
dem occidere, alterum alteri aduersantem salutem asserre. Ex iis ranis quæ
in uepribus tantum uiuunt, lien contra uenena quæ sūt ex ipsis, auxiliatur.
cor uero etiam efficacius est. Mira de his alia certatim tradūt authores. Est
phryni genus alterum φρυγῆς καφῆς, id est rubeta muta, sine uoce est. Exitiosa 8
hæc, in arundinetis roris linctu uicitur: ex qua uenenum quoque appa- 9
tur. Huic eadem fere tribuunt Nicander & Aëtius, quæ alij ranæ palustri. F
Rana uiridis. Est parua rana, inquit Plinius, in arundinetis & herbis maxime uiuēs, mu-
ta ac sine uoce uiridis, si forte hauriatur, uentres boum distendens. Huius
corporis humorem penicillis derafum claritate oculis inunctis narrat
afferre: ipsasque carnes doloribus oculorum superponunt. Huius ranæ par-
uæ sanies efficacissime psilothrum est, si recens illinatur: & ipsa arefacta ac
tusa, mox decocta tribus heminis ad tertias, uel in oleo decocta æreis ua-
sis. Ranarum uiridium sanguine, inquit Dioscorides, palpebræ pili auulsi
renasci prohibentur. Est rana parua arborem scandens, & ex ea uociferans,
Dryphytes. in huius os si quis expuat, ipsamque dimittat, tussi liberari dicitur. Pilos in-
utiles in palpebris euulsos cohibent, quas dryphytas & calamitas uocant: 10
sanguis earum cum lachryma uitis si euulso pilo palpebris illinatur. uene- G
rem concitat iecur ranæ dryophytes & calamitæ adalligatum. 3

φρυγῆς καφῆς.
Rubeta muta.

Rana uiridis.

Penicillis, a-
lias specillis.

Rana ex ar-
bore uociferas.
Dryphytes.
Dryophytes.
Calamitas.

Gyrini.
φρύνη λι-
μυταιν.
Rana leuis.

1 Gyrinos, Gerynos uocat Nicander in Alexiphar. nisi menda subit. 2 Ra-
na fluuiatilis, φρύνη λιμυταιν uocat Nicander, quæ mukum uociferatur, uerque ipsum
iam aduentare primum denuntiat. 3 Βάτραχος λεῖπτος ex mendoso codice forsitan le-
gerat Hermolaus, cum miratus ranam leuem inuenisse diceret apud Dioscoridem.

4 Si ingesto uino copioso euomat, inquit Nicander. 5 Quod os bilioso hu-
more humectum sit refert Nicander de muta rubeta. 6 κερεθαιμός, & morsum or-
is utriculi significat, & crebrum uelocemque cordis motum ac ueluti palpitationē:
sed ex Nicandro uidetur hoc in loco stomachi affectionem significari. 7 Rubeta-
rum, Bufo (ut opinor) huius est generis: de quo Vergil. Inuentusque cauis bufo: hoc
est rubeta terrestris maxima, ut interpretatur Seruius. 8 Nicander, φρύνη καφῆς 8
καφῆς ἢ φρυγῆς ἢ φρυγῆς ἢ φρυγῆς.

Bufo.

φρύνη ξηρῆς
μυλαινῆς.

9 Roris linctu inter strueta uiuere attribuit Nican-
der alteri rubetarum generi, quod ξηρῆς μύλαιν & ξηρῆς μύλαιν cognominat, quasi æstiuam
dixeris: & quod colorem corpori uiridiores inducit, qualis est thapsia: corpusque ip-
sum calore incendit, cum anhelitus angustia orisque fectore: quæ fere Dioscorides &
Paulus, illi quam ranam palustrem uocauimus, tribuunt. 10 Si quis, hæc Diosco-
rid. de ranis uiridibus. 11 Diophytes, Alias dyophytas diopetes.

Diopetes.

De lacertis.

Cap. CVIII.

Lacerta.
Lacertus.
λαρτῆς.
λαρτῆς.

Q Vadrupes ouipara lacerta est, & crura gerit à latere adiuncta. Cortice
quoque integitur, sed molliori, serpentum more. Linguam præterea
ut serpentes longam habet & bifidam, & parte extrema, capil-
lamenti tenuitate. Omnia denique habet membra serpētibus similia, si pe-
des

Ades iis demas, longitudinem addas. Complexu etiam simili serpētibz coit lacertarum genus: in iis marem intelligi dicunt, quod sub cauda unam cauernam habeat. Lacertā ore parere creditur uulgo: Aristoteles negat. Neque incubant, oblitā quo sint in loco enixā: quoniam huic animali nulla memoria. Itaque lacertarum oua sua sponte in terra aperiuntur: & catuli per se erumpunt. uitam eorum annum non complere, sed semestrem finire aiunt. Mensibus certe quatuor frigidissimis latent. Renasci lacertis caudas haud falsum est. Lacerti Arabiā cubitales: in Lybiē desertis binū cubitorum: in India uero in Nisā monte x x i i i i in longitudine pedum, colore fului aut punicei aut cœrulei. Lacertæ combustæ cum radice recentis arundinis (quæ, ut una cremari possit, findenda est) itēque myrteo oleo permixto cineres, capillorum profluua continent. Efficacius uirides lacertæ omnia eadem præstant. Quidam denas uirides in x sextariis olei ueteris discoquunt, contenti semel in mēse ungere. Lacerti inueterati in os pēdentiū, addito sale confusi, & ab ictu læsas aures sanant: efficacissimæ autē ferrugineas maculas habentes, lineis etiam per caudā distinctę. Lacertæ caput tritum & appositum prodidere nonnulli spicula extrahere: uerrucas quoque, quas myrmecyas & acrochordonas dicūt, clauosque tollere. Iecur uero eros dentibus impositum, eos à dolore liberare. Si dissecta apponatur, ictis à serpente prodest.

Lacerte uirides.

Ferrugineas maculas habentes lacertæ.

1 *Χλαροσκούροι* uocat Theocriti interpres.

Χλαροσκούροι

De salamandra & sepe quadrupede.

Cap CIX.

C Lacerti species (ut Dioscoridi placet) salamādra est: lacerti quidem figura, sed alpera magis atque scabra: animal ignauū, & punctis ueluti stellis uarięatum: nunquam nisi magnis imbribz proueniens, & serenitate deficiens. Nihil gignit: neque est in iis genus masculinū femineūque, sicut neque in anguillis. Huic tantus rigor, ut ignem illæsus pertransire possit: ignēque tactum, ut aiunt, extinguere, nō alio modo quā glacies. Et omnino ad certum usque terminum ab igni nihil patitur: uritur autem, si longiore spatio igni sit admota: si nanque diutius in igne immoretur, effluētē absumptōque ex ea mucoso quodam frigido humore, exurit. Eius sanie saluāue, quā lactea ore uomitur, quacunque parte corporis humani, uel in pede imo cōtacta, omnis in toto corpore defluit pilus: id quod cōtactum est colorem in uiciliginem mutat. At si quem salamandra momorderit, dolor uehēmēs sequitur, & in uulnere ipso crusta. Inter omnia uenēnata salamandræ scelus maximum est: cætera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt: salamandra populos pariter necare improvidos potest. Nam si arbori irrepserit, omnia poma inicit ueneno: & eos qui ede rint, necat frigida ui, nihil aconito distans, inquit Plinius: quinimo si cōtacto ab ea ligno uel pede, crusta panis incoquatur, idem ueneficiū est: uel si in puteum cadat: tamen talis ac tanta uis ueneni, à quibusdam animalium, ut suibus, manditur. Venenum eius extingui primum omnium ab iis quæ uescantur illa uerisimile est. Sestius uenērē accendi cibo earum, si de-

Salamandra.

DE DIFFERENTIIS

tractis interancis & pedibus & capite in melle seruentur, tradit: negatque E
 restingui ignem ab iis. Vim habet (ut Dioscorides auctor est) calfaciendi,
 exulcerandi & exedendi: additurque non aliter atque cātharis, in medica-
 menta quorum uis est erodere, & lepras abolere. Pilos euellit oleo lique-
 facta: exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruat ad eundem
 usum. Et combusta quoq; salamandræ cinerem nonnulli septicis & lepri-
 cis pforicisque medicamentis admiscunt. Lacertæ quoque parvæ similis est
 seps, quem alij chalcidem uocant, alij zignida, alij *σαύρος χαλκιδεύς*, id est la-
 certam chalcidicam.

Seps.

Σαύρ.

Chalcis.

Zignis.

Σαύρος χαλ-

κιδεύς.

Lacerta chal-
cidica.

Parua quidem serpens, sed qua non ulla cruentæ

Tantum mortis habet. Color illi serpentis quàm *πυφίνης* ceci-

liamue dicunt. Si equum momorderit, tumor primum pellucidus ac ueluti splende-
 scens, & cū nigritia circa uulnus undique: sequitur postea membri pri-
 mum affecti, & totius deinde corporis putrefactio. Lacerta chalcidica in ui
 no epota morsus suos sanare traditur.

1 Chalcis dicta est à uirgulis, quas in dorso habet ærei coloris: longitudinem habet
 octo palmorum: gignitur in Syria, Lybia & Cypro. Hæ Nicædri interpres: uerū quod
 de eius longitudine affertur, uerius fortasse est de sepe serpente, de quo infra.

De stellione.

Cap. CX.

Stellio.

Ascalabur.

Ascalabotes.

κωλότες.

Galeotes.

Lacertæ figura & stellio est, quem Græci ascalabum & ascalaboten uo-
 cant: alij coloten, alij galeoten:

Combibit os illi maculas: aptumque colori

Nomen habet, uariis stellatus corpore guttis:

Inque breuem formam, ne sit uis magna nocendi,

Contrahitur: paruaque minor mensura lacerta est.

Chameleonū stelliones quodammodo naturam habent, rore tantum ui-
 uentes, præterquam arancis: cum quibus pugnat, eosque deuorant. Cubile
 habet stellio in locis ostiorum fenestrarumque, aut cameris sepulchrisue.
 Temporibus statis se condunt stelliones: mensibus enim quatuor frigidis-
 simis latet in cauernis. Senectutem quoq; exuunt, ut angues: eamq; pro-
 tinus deuorant, ut Theophrastus auctor est, præripientes comitali morbo
 remedia. Operæpretium est scire, quomodo præripiatur, cum exiit me-
 brana hyberna, aliàs deuoranti eam: quoniam nullum animal fraudulētius
 inuidere homini tradunt. Obseruant cubile eius æstatibus: est autem in lo-
 cis ostiorum fenestrarumque, aut cameris sepulchrisue, ut dictum est. Ibi
 uere incipiente fissis arundinibus textas opponunt casas, quarum angu-
 stiis etiam gaudet, eo facilius exuens circumdatum torporem: sed eo dereli-
 cto non potest remeare. nihil ei remedio in commitialibus morbis præ-
 fertur epoto. Arbores scandit stellio, uel resupinus ingrediens. Coloris li-
 cuti & lacertis caudas renasci haud falsum. Colorem hostis asinus est: dormit
 enim colota in eius præsepi: & narē subiens asini, ne comedat impedit. In
 insulis Thraciæ uicinis frequens est. Pestiferos ferunt stelliones in Græcia:
 at in-

G

H

2

At innoeuos in Sicilia: Italiae tamen quibusdam locis morsus eorum ex-
tiales sunt. Duo eorum genera: alterum stellionem transmarinum nomi-
nant: hunc Graeci coloten uocant, & ascaloboten, & galeoten. In Italia non
nascitur: est enim hic plenus lentigine, & stridoris acerbi, & uestitur: quae
omnia à nostris stellionibus aliena sunt. Si quem stellio momorderit, lo-
cus affectus cum dolore assiduo liuescit. Stellionē dissectum scorpionum
plagis nonnulli imposuere: & scorpio tritus stellionum ueneno aduersatur:
fit enim & è stellionibus malum medicamentum: nam cum immortuus
est in uino, faciem eorum qui biberint lentigine obducit: ob hoc in unguē-
to necant eum insidiātes pellicum formae: remedium est oui luteū, & mel
ac nitrum. & scorpionibus contrarius maxime inuicem stellio trahitur, ut
B uisu quoque pauorem iis afferat, & torporem frigidi sudoris. Itaque in
oleo putrefaciunt eum, & ita uulnera eo perungunt: quidam oleo eo spumā
argenti decoquunt ad emplastri genus, atque illinunt. Hydrocœlicis stel-
liones mire prodesse traduntur, capite, pedibus interaneisque demptis: reli-
quum corpus inassatum, in cibo id sæpius datur. Comitialibus morbis stel-
lionis trāsmarini cinis potus in aceto prodest: & tunica stellionis, quam,
ut dictum est, eodem modo ut anguis exuit, pota: quidam & ipsum arun-
dine exenteratum inueteratūque bibēdum dedere: alij in cibo in ligneis
ucrubus inassatum. Mirum de stellionis cinere (si uerum est) in linamento
inuolutum, in sinistra manu uenerem stimulare: si transferatur in dextrā,
inhibere. Fel stellionum tritum in aqua mustelas congregare dicitur.

C De chameleone.

Cap. CXI.

Chamæleo quoque & magnitudine & figura totius corporis lacertam *Chameleo.*
plane representat: uel ut alij referunt, similis est magnitudine croco- *χρμαιλας.*
dilo terrestri, spinæ tantum acutiore curuatura, & caudæ amplitudine di-
stans. Latera deorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus: & spina modo
piscium eminet. Rostrum, ut in paruo sit, haud absumile suillo: uel ut depin-
xit Aristoteles, rostrum simiæ porcariæ simillimum. Cauda prælonga in te-
nuitatem definens, & permultis implicata in se orbibus, lori modo. Elatior
à terra est quam lacerta: inflexus crurum perinde ut lacerta, sed crura ha-
bet recta. Pedes singuli bipartito secantur: partēsque talem inter se habent
D situm, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectam: sed ipsæ etiam
reliquæ partes paulotenus in digitos quosdam finduntur: uidelicet primo- *Paulotenus,*
res triplici fissura interius, duplici exterius: posteriores interius duplici, ex- *ὡς ἐν Ἑgyptῷ.*
terius triplici. Unguiculi iis adunci. Corpus asperum totum, ut cocodilo, o- *Solimus.*
culi in recessu cauo intus recepti, prægrandes, rotundi, cute simili atque re- *Hamati un-*
liquum corpus obducti, media sui parte per quā exigua detecti qua uideāt. *gnes subtili*
quæ uidendi sedes nunquam cute operitur, nec pupillæ motu: sed totius o- *aduncitate.*
culi uersatione in orbem, mutationēque quoquod uersus aspicit quæ uelit.
Color uarius, & in momento mutabilis: mutat nanque suūm colorem in-
flatus. Habet autem & nigrum colorem non longe dissimilem cocodilo,
& pallidum, ut lacerte, & maculis distinctum nigris, ut panthera. Et muta- *Pallidum,*
 ἄγριον.

DE DIFFERENTIIS

tur color subinde toto in corpore: redditque semper quencunque attingit, Et præter rubrum candidumque. Et oculi quoque concolores reliquo corpori redduntur: & cauda eundem colorem accipit. pallefcit cum moritur: defunctusque eundem colorem feruat. Motus illi piger admodum ut testudini est. Gulam atque arteriam situ eodem continet, quo lacerte. pulmonem habet portione maximū. Carnem nusquam nisi in capite & maxillis, & ad commissuram caudæ admodum exiguum possidet. Nec alibi sanguinem quàm in corde & oculis, & loco à corde superiore, & uenulis hinc tendentibus: uerū nec in iis quidem ulla copia, sed pauxillum habetur sanguinis: & omnium ouiparorum pedestrium maxime inopia sanguinis riget chamæleo. Cerebrum paulo superius oculis positum est, & prope iis contiguū. Cute autem exteriore detracta oculis, quiddam lucens, ueluti annulus æ-neus tenuis, nullo palo interceptus cingit. Membrana in omnis fere corporis partes multæ ac ualidæ, longæq; firmiores, quàm in cæteris tēdunt. Dissectus hic totus spirare præterea diu potest, motu admodum exiguo adhuc circa cordis sedem extante. Et cum omnes corporis partes contrahit, tum uel maxime costas cogere atque adducere potest: lienem conspicuum nusquam continet. Subit cauernas & latitat hyeme more lacertorum. Nullum animal pauidius esse existimatur, & ideo uersicoloris esse demutationis. Ipse cellus hianti semper ore, solus animalium nec cibo nec potu alitur: nec alio quàm aëris alimento. Circa caprificos ferus, innoxius alioquin. Chamæleontem gignit Africa, quanquam frequentiore India: per omnem quoque Asiam plurimus est. Impetibilis est coraci: à quo cum interfectus est, uictorem suum perimit interemptus. Nam si uel modicum ales ex eo ederit, ilico moritur. Sed corax habet præsidium ad medelam, natura manu porrigente. Nam cum afflictum se intelligit, sumpta frōde laurea, recuperat sanitatem. Vis eius maxima contra accipitrum genus: detrudere enim supra uolantem ad se traditur: & uoluntarium præbere lacerandū cæteris animalibus. Sanguine chamæleontis palpebras nudari pilis creditum est. Hæc de quadrupedibus quarum generatio ex ouo est.

De serpentibus.

Cap. CXII.

*Serpens.
Anguis,
ō quæ.*

Serpentum quoque genus, omnia fere corporis membra habet lacertis proxima, si pedes iis demas, longitudinem addas: quippe quod intestū cortice sit, & prona supinæque perinde ut lacerti habeat. Serpentum itaque genus animal est terrestre, sanguine præditum, quod pedibus ex natura caret, idemque intestum cortice est. Terrestres inquam: nam exigua serpentum pars aquatilis est, scilicet fluminum incolæ, & quæ maris indigena: serpentes sunt terrestribus similes. Sensoria omnia simili modo hæc atque cætera etiam animalia habent: uerbi gratia, nares olfaciendi, oculos uidendi, aures, audiendi sensorium: non tamen hæc eminent, quo modo ne auibus quidem, sed foramina tantum habentur. Nec palpebram superiorem mouent hæc animalia, ut ne aues quidem, sed inferiore conniunt: quanquam non auium more nictantur: sunt enim oculis durioribus quàm aues. De anguibz

- Anguibus Thebanis perhibent Ægyptii, quod cornua habent: extuberat enim ueluti uestigium cornus. Lingua serpentum tenuis, longa & atricoloris est: atque si extrahas, porrigi longius potest. Peculiare hoc præter cætorum linguas, serpentibus & lacertis est, ut eorū lingua bifida sit, sed præcipue serpentium: quippe quæ tenuissimis quibusdam quasi capillamentis discreta uibretur. Dentes omnibus serrati sunt: sed duo in superna parte dextera leuāque longissimi, tenui fistula perforati, ut scorpionū aculei, uenenum infundentes. Quidam unum esse eum tradunt: & quia sit aduncus, resupinari cum momorderit: aliqui tunc decidere eum, rursusque recrescere, facilem decussu, & sine eo esse quos tractari cernamus. Lingulā, quā *ῥινοτρίξ* uocant, arteriæ superpositam nō habent: sed meatum ipsum modo contrahunt, modo laxant pro sui commodi desiderio: atque ita efficitur ne quid ponderis in pulmonem delabatur. Serpentis collum proportionale potius colli uideri potest: siquidem capite & armis humerisue pars hæc describenda est. Proprium serpentibus præ cæteris cortice intestis est, ut caput uertere in auersum reliquo quiescente corpore ualeant. Angues circa Æthiopiam uolare narrantur, pennas habentes cutaneas & sine pedibus. Omnia etiam interna fere eadem serpentibus sunt, quæ lacertis: uerum omnia earum uiscera propter longitudinem & angustiam corporis longa arcuāque habentur: ita ut inter se dignosci præ suæ figuræ dissimilitudine uix queant: arteria nanque longa admodum est, atque etiam gula longior. Arteriæ origo ori proxima est: adeo ut sub ea lingua esse uideatur: & quidē uidetur linguæ præminere, quoniam lingua contrahitur, neque eodem loco ut cæteris animalibus permanet. Speciem quoque uiscerū habent prolixam, & cæteris animalibus dissimilem: cor enim arteriæ postremæ adhæret exiguum, sed longum & renum speciem referens. Pulmo deinde adnecitur simplex, fibrosis fistulis diuisus, prælongus, exiguus, fungosus, multumque à corde sepositus. Iecur item longum & simplex: sed lien exiguus rotundusque ut lacertis. Fel similiter atque in piscibus habetur: nam præter natricem, in omnibus fere intestino adnexum hæret. Neque uescicam habent neque renes, sicuti neque alia, quæ ouum pariunt. Ventriculum habent serpentes uelut intestinum amplius, canino similem: tum intestinum longum, tenue, & ad exitum usque uniforme. Serpētibus ueluti piscibus testes desunt & penis: sed meatus continent binos, qui de septo exorti, latus spinæ utrinque perrepent, coeantque superne iuxta spinam in unum: atque ita ad ostium excrementi finiant. Pleni meatus ij humoris fecifici (*ἄγορ* uocant Græci) redduntur tempore coitus: attritusque mutuo semen effluit genitale: candidum eodem modo quo de piscibus dicitur. Vulua bifida serpentibus omnibus fere tendit prolixior, modo corporis, exorsa inferius ab uno continua meatu, diductaque utrinque in latus spinæ, quasi duplex meatus usque ad septum: in qua oua ordinatim gignuntur, & edi inde solēt. At uiperæ uni (quandoquidē animal edit, postquam intra se oua pepererit) uulua similis ut cartilagineis est. Serpentibus dorso spinam piscium more compleri apertum est: spinam enim in ossium loco continent. Costæ singulis tri

Angues Theban.

Arteria postrema, ueluti triplex & uiscerum.

DE DIFFERENTIIS

centæ. Caudæ serpentibus similiter atque lacertis amputatæ renascuntur. E Vocem quidem emittunt serpentes, sed exilè, & ueluti longum sibilum. Megasthenes scribit in India serpentes ita tantam magnitudinem adollescere, ut solidos hauriant ceruos taurósque. Nota est in Punicis bellis ad flumè Bagradam à Regulo imperatore, battistis tormētisq; ut oppidū aliquod, expugnata serpens, ceterum pedum longitudinis: pellis eius maxillæque usq; ad bellum Numārinum durauerit Romæ in templo. Mas serpens scemina minor est, uti in cæteris etiam ourparis. Serpētum coitus complexu mutuo supinarum partium agitur: & quidē serpentes ita conuoluti sibi cohererent, ut unius serpētis bicipitis caput totum esse uideatur. Pariunt oua foris, excepta uipera omnes: non singulatim, sed ad monilis muliebris quod collū ambit similitudinem: incubant, quæ pepererint in terra, & scetum sequente excludunt anno. Anguem ex medulla hominis spinæ gigni accepimus à multis, inquit Plinius. Serpentes cum natant, eodem modo natant quo repunt, hoc est flexuosis impulsibus. Serpentum genus omnium est: nam & carnem edunt & herbam. Serpentes omnium maxime animalium cupiditæ deditæ sunt: sed desiderium iis bibendi exiguum, sicuti & reliquis, quibus pulmo fungosus est. Vini incontinētes sunt serpentes: proinde uiperas aliqui uino in fictilibus uasis ad sepes disposito uenātur: ebriz enim capiuntur, cum aliqui exiguo indigeāt potu, ut diximus. eodem minimo & pene nullo cibo cū adseruantur inclusa: sed cum serpentes carniores sint, quicquid ceperint, succo exucto intus in uentre (non foris quemadmodum aranei) reliquum totum per meatum sui secessus emittunt. Accipit serpens undeliber quod datur, siue auis siue belua est: oua etiam deuorat: sed cū accepit, reducit, & usque eo retractat, quoad partem nactus extremam è dextro constituat: tum colligit se, in breuēque contrahit, ut quod ori inditum supra est, in imum extento corpore facilius deducatur: quod propterea ita facit, quia gulam angustam habet & longā. Diu etiam serpentes uiuere possunt sine cibo. Conduntur serpentes hyeme sub terra aut saxis aut in arborū saxorumue cavis: & omnes secessus tempore, ueneno orbē dormiunt. Senectutem exuunt serpentes, tum uere post latibula cum egrediuntur, tum etiā autumno. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi aiunt, ita ut obcæcari uideatur iis, qui rem non intelligunt. tū caput exiit: glabrum enim hoc omnium, antequā reliquum corpus apparet: atq; una fere nocte & die senectus tota exiit, à capite orsa ad caudam: eiūque quod exiit, quod internum erat fit externum. Serpentium frigori hedera gratissima est, ut mirū sit illā in honore habitā: contrā, fraxinus adeo serpente fugat, ut ne matutinas quidē occidentesue umbras, quanuis sint longissimæ, serpens arboris eius attingat. Experta prodimus, inquit Plinius, si frōde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignes potius quā in fraxinum fugere serpentem. Serpentes omnes natura frigida sunt: ac proinde in aestuosis locis sunt grandiores: ubi & aliquanto magis pestifera gignuntur. at Italia frigidiorēque regiones, hac quoque parte salubritatem habet, quod minus terribiles angues edunt. uenenorum similiter maxima pars frigore interimit,

Aterimit, tam ictu quàm potu. Sunt tamen & uenenata nonnulla, quæ mor-
 fu ardorem inferant. nec aliud uenenum esse quàm fel serpentium diligen-
 tissimi quidam authores scribunt. Venenum autem anguium magis mi-
 nusue perniciosum ex eorum pastu euadit: id quod maxime manifestum est
 ex uiperis, quæ in Arabia inter balsami frutices, & ex earundem lachryma
 uiuunt: morsum nanque eorum minime timent ij qui balsamum colligunt:
 nullum etenim ueneni periculum affert. Quibusdam in locis serpentes in-
 digenis innoxij sunt, aduenas interimunt. In Syria nanque angues circa Eu-
 phratis maxime ripas dormientes, Syros non attingunt: aut etiamsi calca-
 ti momordere, non sentiunt maleficia: alios cuiusque gætis infesti auide &
 cum cruciatu exanimantes. In serpentum genere omnia magis exitiàlia, si
 suum genus edere, antequàm noceant. Illud præterea ignorare non opor-
 tet, omnis serpentis ictum, & iciuni & ieiuno magis nocere: idèoque perni-
 ciosissimæ sunt cum incubant: utilissimùmque est, ubi ex anguibz metus
 est, non ante progredi, quàm quis aliquid assumpsit. Venenum serpētis (ut
 quædam item uenatoria uenenata quibus Galli præcipue utuntur) nō gu-
 stu sed uulnere nocet. nam seps, quæ & lacerta Chalcidica dicitur, in uino
 pota, morsus suos sanat. Quidam & uiperis utuntur in cibis. Et homini-
 bus contra serpentes inest uenenum: feruntque ictas salua ut feruentis a-
 quæ contactum fugere: quòd si in fauces penetrauerit, etià mori: idq; ma-
 xime humani ieiuni oris. Nihil autem æque aduersari serpentibus ferunt,
 quàm cancos: suèque percussas, hoc pabulo sibi mederi: cum sol sit in can-
 cro, torqueri serpentes. Anguibz in cibo sumpis anguillarum modo len-
 des tolluntur: aut uernatione earum quam exuunt pota. Anguis inueterati
 suffitus mēstrua adiuvant. Membrana siue senectus anguium uernatiō-
 ne exuta in uino decocta, dolores aurium sanat infusa: & dentium dolores,
 si colluantur. Additur & in ocularia medicamēta, præsertim uiperina. Se-
 nectus serpentium sequente testa usta instillatur, rosacco admixto contra
 omnia quidem aurium uitia efficax, sed contra graueolentiam præcipue:
 aut si purulentæ sunt, ex aceto: melius cum felle caprino uel bubulo aut re-
 studinis marinæ. uetustior anno eadem membrana non prodest, nec imbre
 perfusa, ut aliqui putant. Dentium dolores sedat anguinæ uernationis mē-
 brana cum olco tædæque resina calefacta, & auri alterutri infusa. adiiciunt
 aliqui thus & rosaceum: eadēque cauis indita, ut sine molestia cadant,
 præstat. Phthiriasin à toto corpore pota membrana senectutis anguium tri-
 duo inhibet. Anguium senectus adalligata lumbis faciliores partus facit:
 protinus à puerperio remouenda. Dant & in uino bibendam cum thure:
 aliter sumpta abortum facit. ad canis rabidi morsum cum cancro mascu-
 lo trita illinitur: nam etiam per se reposita in arcis armariisque tineas nec-
 car. claritatem oculorum facit, si affricetur. Anguium adeps erugini mix-
 tus, ruptas oculorum partes sanat. Quoddam est ouorum genus in ma-
 gna Galliarum fama omissum à Græcis: angues innumeri ætate conuolu-
 ti saluis faucium, corporumque spumis artificij complexu glomerantur,
 anguium appellatur. Vidi equidem ouum, inquit Plinius, mali orbiculati

*Venenum an-
guinum.*

*Anguium, aliis
anguinum.*

DE DIFFERENTIIS

modici magnitudine. ad uictorias litum, ac regum aditus mire laudatur E
à magis.

*Visa iam etiā ser
pentes, inquit Pla
nius, auferuntur pe
dibus.*

*Non cortici, sed
cuti purā habere
serpentes tra
dit Plin.*

ἔρπονται.

ἔρπονται.

ἔρπονται.

ἔρπονται.

Serpens.

ὄφεις, anguis.

r Serpentis nomen Latinis (ni fallor) nonnunquam significat terrestre animalcu
lum omne, quod se non attollit ingressu, sed humi tepit, etiam si quadrupes est, ut seps,
salamandra: uel etiā multipes, ut scorpio, scolopendra: præsertim si aut morsu aut idu
uenenum inferat. Plinius enim salamandram serpentem uocat: & sepa quoque, id est
lacertam Chalcidicam. Cornelius Celsus scorpionem, araneum & phalangium inter
serpentes numerat: (quanquam, ut Solino placet, scorpiones, scinci, lacerti que, uer
mibus, non serpentibus adscribuntur.) Lincanus de sepe, patna modo serpens, dixit.

ἔρπονται & *ἔρπονται* quoque, non ea solum quæ serpētum more repunt, significant, sed
& alia quoque: ut quadrupedes paruas, quæ apud Aristotelem unguibus numerosio
ribus apprehendendo (quod sit quinis digitis, quos in posteriotibus pedibus obtinēt)
facilius obrepunt ad superiora. *ἔρπονται* uero *ἔρπονται* distinxit Galenus: nam *ἔρπονται* pro
prie de serpentibus dicitur & uermibus, quibus pedes desunt: improprie etiam de pede
stribus omnibus quæ tardius repunt. Hæc Theocriti interpret: Et diuus Basilus *ἔρπον
ται* na tatilia omnia nocaui, ut pisces, & alia quæ in aquis uiuant. Serpens nonnu
quam unam speciem significat. Plin. lib. 29 serpentis oculorum dextrum adalligatum
contra epiphoras prodesse, si serpens uiua dimittatur. Nec aliter apud Græcos *ὄφεις* pro
una specie, scilicet uisera accipitur: ut apud Oppianum de murena & serpentis coitu,
id est niperæ. Anguis generale non minus est, quàm serpens, ut apud Celsum lib. 5. Ser
pentium quoque morsus nō nimium distantem curationem desiderant. quannis in ea
multum antiqui uariarunt, ut in singula genera anguim singula medēdi genera præ
ciperent: atque aliis alia. Item illud ignorari non oportet, omnis serpentis idum & ie
iuni & ieiuno magis nocere: utilissimūque est, ubi ex anguibz metus est, non ante
progredi, quàm quis aliquid assumpsit. Et aliàs frequenter anguis nō etiam speciem
significat, ut apud Plin. lib. 29 cap. 4. 2 Tenuissima serpentibus lingua, inquit
Plinius, & trifidula, uibrans, attri coloris, & si extrahas, prælonga. 3 Serrati *ὄφεις*. G
ὄφεις, uetus interpret acuti, diuisi, coniuncti secundum serram. 4 Anguem, Plu
tarchus in Cleomene: & Ouid. lib. 15 metamorph. eadem tradunt. Ouid.

Sunt qui cum clauso putrefacta est spina sepulchro,
Mutari credant humanas angue medullas.

De hydro, & aliis quibusdam serpētibus aquatilibus. Cap. CXIII.

Hydru.

Natrix.

Cherfydra.

I N orbe terrarum pulcherrimū anguim genus est, quod in aqua uiuit:
Hydri uocantur, nullis serpentium inferiore ueneno. Genus hoc nomen
etiam cherfydri compositum inde sortitum est, quod primū in aquosis lo
cis degit, postea aridiora petit: quo etiam tempore uenenum illi nocentius
inest: ut quod syncerius iam uenenum sit, minúsque alienis admixtum suc
cis, ac proinde atrocius redditur magisq; noxium: uerum in humore dum
uiuit, non adeo purum habet uenenum: ex humidiori nanque uictu alic
nis temperatur iuccis. Calabria cherfydris frequentissima est: uti & Vergi
lius explicat:

Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis
Squamea conuolens sublato pectore terga,
Atque notis longam maculosus grandibus aluum:
Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus, & dum
Vere madunt udo terræ ac pluuiialibus austris,
Stagna colit: ripisque habitans hic piscibus atram

Impro-

A Improbis ingluuiem, rarisque loquacibus explet.
Postquam exhausta palus, terræque ardore dehiscunt,
Exilit in siccum & flammantia lumina torquens,
Sequit agris, aspérque siti, atque exterritus æstu.

*In paludibus,
Nicanter in
Ther.
Ex Nicanr.*

Hydra.

1 Forma similis est alpidi cherfæ: parua, nisi quod ceruicem non ita latâ habet: qua in re maxime ab iis differre uidentur aspides. Huius iecori fel adnexus est, cum in cæteris serpentibus intestino magna ex parte adhæreat. Ex hydri morfu factum ulcus dilatur, liuescensque subinde augetur: nigraque ex eo sanies copiosa malæque olens, ceu ex ulcere depascete manat.

Hydri iecur seruatum, aduersus percussos ab iis auxilium est: quod & bibi iubent ad calculos pellendos. Enhydri uocatur à Græcis coluber in aquis uiuens: est autè serpens masculus albus. De colubro uero ita cecinit Vergil.

*Enhydri.
Coluber.*

Est tecto assuetus coluber succedere & umbræ.

Pestis acerba boum, pecorique aspergere uirus.

Fouet humum: cape laxa manu, cape robora pastor:

Tollentemque minas, & sibila colla tumentem

Delice. iamque fuga timidum caput addidit alte:

Cum medij nexus, extremæque agmina caudæ

Soluuntur, tardosque trahit sinus ultimus orbes.

*Aliis, fodiit
humum.*

Coluber, inquit Plinius, est in aqua uiuens. huius adipem & fel habentes qui crocodilos uenentur, mire adiuuari produntur, nihil contra belua audete.

Enterocelæ iecur aquatici colubri illinitur enhydri (qui ut dictû iam est, uocatur Græcis coluber in aquis uiuens.) Huius inquam quatuor dentium

superioribus in dolore superiorum gingiuas scarificat, inferiorum inferioribus: aliqui canino tantum contenti sunt. Sunt & hydri marini, qui circa

insulas quasdam Indiæ egrediuntur in terram, uicenum cubitorum longitudine. Sed serpentum marinorum genera cõplura sunt, colore numerosæ

uarietatis. nasci eos non in altissimis gurgitibus certum est. Est serpens marina colore & corpore congro proxima, sed obscurior & acrior. Hec si

meat atque piscatores euadat, in arenam rostro quamprimum adacto terreat subitque tota. Est ore acutior hæc quàm terrestres. Myroné piscem cundè esse cum marino serpente uolunt nonnulli: cuius alteruter oculus erutus pro amuleto gestatur aduersus oculorum uitia, quem oportet uiuûm

dimittere: alioqui frustra geritur amuletum: atque tui deinde pisci alterum renasci oculum loco eruti aiunt. Sunt etiâ maris indigenæ serpentes terrestribus similes, nisi quod caput habeant congrui. Inter aquatiles numeratur

& serpens quidam paruus, colore atro, oculis sanguineis, cuius caput draconis formam imitatur. circa mare rubrum nascitur, ut refert Arrianus. Hydri quoque nomine à nonnullis appellatur dryinus: ab aliis chelydrus. In humidis paludosisque locis, in quercuum ac fagorû radicibus fere latibula habet: & in pratis ranas uenatur & molaridas, in Helleponto frequens. Est autem dryinus serpens duorum circiter cubitorum longitudine, corpore

obeso, asperis squamis undique munito: in quibus latitant muscæ quædam paruulæ quæ serpentem conficiunt. colore in tergo subatro est: cap-

Hydri marini.

Serpens marina.

ὄφις θαλάσσιος.

Μύρων.

Petrus Aristoteles interpretis ita habet, Nisi quod caput eius asperum atque durissimum.

Dryinus.

Chelydrus.

Hydrus.

DE DIFFERENTIIS

*Lucan^o lib. 9.
Tractique nix
fumante che-
lydra. Virgil.
3. Georg. Agi-
tare graves ni-
dore chely-
dros.*

*Serpentes bi-
cipites.*

Hydra.

*quæ.
phydion.*

te minime acuto: sed æqualiter latiusculo, hydro similiter: odore tetro, adeo ut fœtor latentem prodatur. Est autem odor, qualem reddere solent præsegmina tergorum equinorum humentia, cum à coriariis abraduntur. Est uero dryinus serpens perniciosus adeo, ut refert Galenus, ut si quis eam calcauerit (ut aiunt) cutis illi à pedibus excoriatur, tota crura maiorem in modum intumescant: & quod magis mirum est, manus quoque curantium medicorum excoriuntur. Si quis autem aggrediatur dryinum interficere, olfactum adeo illi corrumpi aiunt, ut quemlibet odorem quanuis etiam gratissimū, prauum esse existimet: nec aliud præterea olfactu sentire queat. Sequuntur dryini morsum graues dolores: & in ipso morsu loco insurgunt pustula: nonnunquam & aquosus effluit humor: cordis dolor, qui *ασπιδιόγυνος* uocatur, atque tormina. In flumine nomine Arcade, quod ad Persicam Phitacen est, bicipites serpentes Ctesias narrat binis pedibus ad caudam præditas esse: easdémque capite albas, reliquo corpore nigras: quatuor cubitorum longitudinem habere: & quos percusserint interimere: interdiu eas haud quaquam natare solere, sed noctu uel aquantibus, uel linthea lauantibus perniciem inferre.

1 Forma, Huius generis, sed ingenti magnitudine erat hydra ab Hercule in Lerna confecta: quam primus omnium Periæder, & hunc secuti poetarum turba monstrum multorum capitum effinxerūt. Ex Pausania. 2 Colubri nomine etiam pro genere aburuntur: femina colubra dicitur. 3 Hydri aquatiles sunt & quæ *χελιδόνες* dicuntur apud Arrianum in rubri maris nauigatione. 4 Ophidion Plinio pisciculus est congro similis, uel, ut alia habet litera, scombro similis: urinæ incontinenti cum lili radicemendat. 5 Hæc si, Theodorus: Hæc si capta dimitratur foris, &c. Hæc fere de dracone marino pisce à Plinio narrantur.

De serpentibus terrestribus, & primo de aspidum generibus.

Cap. CXIIII.

Aspis.

*Subatri fuliginose, ni-
dras.*

*Abas con-
iuge.*

Aspis in Africa gignitur: chersydra non dissimilis est: hoc enim insigne solum præ illis possident aspides, quod ceruicem latam humidamue habent: similis alioqui chersydrus est aspidi chersæ parus, ut modo diximus. Est uero aspidum color uarius: sunt aliæ flauæ aut subuirides, aliæ coloris cinerei, aliæ subatri fuliginosæ. In fronte circa supercilia extant duo ueluti callosa tubercula cornuum instar, quibus efficitur ut oculi caui appareant: quos & hebetes huic malo dedit natura: eosque non in fronte, aut ex aduerso cernere, sed in temporibus: eosdémque semper fere quasi somno conniuentes: & excitari sæpius auditu quam uisu. Dentés fœminis prominent quaterni incurui: maribus bini. Sub lingua cuticula inuenitur, quæ dentes etiam operit. Non obliquo ut cæastes, sed recto incessu serpit. Coniuga ferme uagantur, nec nisi cum compare uita est. Itaque alterutra interit, præterea, incredibilis alteri ultionis cura: persequitur interfectorem, unumque cum in quantolibet populi agmine notitia quadam infestat. Perrumpit omnes difficultates, permeat spatia: nec nisi amnibus arcetur, aut præceleri fuga. Longitudo quibusdam orgiæ est, id est pedum senium: magnitudo uero, quanta est uenabuli, quo ad tauros leonésque conficiendis uti solent.

A solent. Alterum genus (quidam enim duo statuunt aspidum genera) *aspis chelidonia*, id est dodrantale est. hoc celerius interficit. Verum, ut aliis placet, aspidum tres sunt species: quædam chelidoniæ uocatur, aliæ chersæ, id est terrestres, aliæ ptyades. Chelidoniæ circa fluuiorum ripas, præcipue Nili, latent: unius cubiti longitudinem paulo superant, & colorem habent hircini similem. Chersæ maiores sunt: inueniuntur enim nonnunquam quæ quinque cubitorum longitudinem æquant, colore fere cinereo: quæquam & subuirdes aliquando reperiuntur. Ptyades omnium maximæ sunt, colore & ipsæ cinereo subuirdante, & qui aurum imitetur. omnium perniciosissima ptyas est: quæ collo exporrecto, ueluti ratione quadam loci interuallum coniectans, uenenum expuit uel in hominum oculos, & aliorum quorumlibet animalium corpora. Aspidis morsus (signa enim fere communia sunt iis quos aspis momorderit) nullum affert dolorem, neque phlegmonem excitat: sed animal quodcumque momorderit (uno ichneumone excepto) torpore & somno interficit, omnium serpentium ictu minime sanabili. Mors autem intra tertiam dici partem accidit: ex chersæ quidē morsu, tribus ad summum horis: ex chelidoniæ uero ictu, præsentissima mors & ad manum est. At iis qui à ptyade conspuuntur, tardius paulo: præcedit nanque uisus hebetudo, faciei tumor, surditas, & deinde sequitur mors.

3 Quin & aliæ sunt aspidum species, uerum disparis effectus ad nocendum: aliarum uirus quoniam medelas facilius admittit, minus famæ meretur: Cunctar in profertendo ex his remedia, inquit Plinius, nisi M. Varronem scirem LXX XVI uita anno prodidisse, aspidum ictus efficacissime curari hausta à percussis ipsorum urina. Venenum earum, si sanguinem attingit, aut recens uulnus, statim interimit: inueteratum ulcus tardius. De cætero potum, quantalibet copia non nocet: non enim est tabifica uis. Itaque occisa morsu eorum animalia cibus innoxia sunt. Membrana aspidis quam exuerit cum adipe eiusdem, iumentorum oculis claritatem inunctis facit.

1 Ægyptij aspidēs quatuor cubitorum longitudine nonnunquam apparuisse ferunt. *Ælianus*. 2 Aspidā somniferā, dixit *Lucanus*. *Solinus* uni aspidis speciei hoc tribuit, hypnale scilicet, quodd somno necat, teste etiam *Cleopatra*. emitur ad mortem: quanquam *Cleopatæ* mors, si aliis credimus, ptyadi potius debetur: nisi fortasse eadem sit ptyas, quæ hypnale: aut hypnale genus sit ad hæc tria: quod lectoris iudicio relinquo. 3 Aspis anguis, inquit *Aristoteles*, ex quo medicamentum putrissem illud componunt, in Africa gignitur, cuius ictui nullum remedium est.

De uipera, dipside, cerasse, & hammodyte. Cap. CXV.

1 **V**ipera mas echis, femina echidna uocatur: colore est sublauro, pluribus ornata maculis rotundis, longitudine cubitali: nonnunquam uero trium dodrantium. In Asia certe organi longitudinem æquant, id est senum pedum. Sunt in India, authore *Strabone*, quæ nouem cubitos superent. Caudam habet fermina ex carnem, & squamis duriusculis asperam, non paulatim gracilescenstem ut mas, sed simul uniuersim acruatimue. Caput gerit latiusculum, oculos subrufo, collum quàm sit mari angustius, aluum

prominulam, meatum ad caudæ extrema propius accedentem. Incessus illi quietus & tardior. Dentes uiperæ gingiuis conduntur: sed qui canini uocantur dentes, scæminis quaterni, & uulnera ex illius morſu infliguntur quaterna. At contra mari caput angustius, collū crassius, dentes canini tantum bini, & uulnera ex plaga, bina. Oculi, cum irritatur, rubicundi. paulatim huic gracileſcit cauda, aliorum more serpentium, non aceruatim, ut in uiperæ scæmina. Meatus ille, superne magis, & uentri propinquior est. Corpus illi uniuersum tenuius, & modo quodā procerius, & incessus alacrior. Color idem qui scæminæ. uiperæ uulua similis, ut in piscibus cartilagineis est. Cum cætera serpentum omnia genera oua edant in lucem, uiperæ serpen-
 tibus una foras animal uiuum in lucem edit, cum intra se ouum prius peperit piscium ouis simile, hoc est unius coloris, nec cortice ullo, sed molli cuticula opertum: parit inquam catulos, in utero antea exclusos, & parit eos obuolutos membranæ, quæ tertia die rumpantur. Euenit interdum, ut qui in utero adhuc sunt, abrosis membranæ erumpant. Parit autem sigillatim uno die plures quàm uiginti. Nec nos lateat quosdam de uiperarum coitu ac partu aliter sentire. Viperæ, inquiunt, mas in coitu caput inserit in os scæminæ, quod illa abrodit uoluptatis dulcedine: appetente deinde partus tempore, scetus tarditatis impatientes, erodunt latera, occisa parente. Cum cæteræ serpentes cauernas subeant terræ, uiperæ tamen sub saxis conduntur hyeme. Ita Aristoteles: contra Plinius. Serpentium uiperæ sola terra dicitur condi, cæteræ arborum aut saxorum cauis. Viperæ senectutem exuit (ut alij serpentes) tam uere quàm autumno. Ex uiperæ morſu à uulnere sanies primum effluit subpinguis oleosaue, deinde cruenta: insurgit & pustulæ, ambustis similes: sequitur postea ulcus quod uicinas omnes partes depascitur, non in summa cute solum, sed altius in carnem descendit. Sanguinolentæ sunt & gingiuar: & iecur phlegmone tentatur. Tormina præterea accedunt, & uomitiones biliosæ. Ad hæc tremor, & sopor, & urinæ difficultates, sudorque frigidus: mors postremo intra horas septem imminet, aut cum diutissime (in iis qui non euadunt) die tertia. Quidam tamen uiperis utuntur in cibis, ut modo diximus. Primum omnium occisæ statim salem in os addi iubent, donec liqueſcat humor: quatuor digitorum mensura (si prægrandis fuerit) utrinque præcisæ, exemptisque interaneis discoquunt in aqua, condientes sicuti anguillas, oleo, sale, anetho, & porro: & omnibus aut statim uescuntur, aut pane colligunt, ut sæpius utantur. Viperarum carnes, inquit Galenus, cum in anguillarum morem cōdiuntur, & exalfaciunt palam, desiccantque, & corpus totum per cutim euacuant. Viperinæ carnes, ait Dioscorides, si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt: neruorum uitiis auxiliantur: crescentes reprimunt strumas. Adiciunt nonnulli longam fore senectutem iis qui earum carne in cibo utuntur. Carnibus hisce uescentibus, pediculos procreari tradunt quidā, quod plane à ueritate abhorret, inquit Dioscorides. Sal ex iis ad eadem conficitur, sed inefficacior. Antonius Musa medicus cum incidisset in insanabilia ulcera, uiperas edendas dabat, miræque celeritate perſanabat. Viperam uiuam in fœtuli

*Ac & à Ga
 no referuntur
 ex Nicandro in
 lib. De Theri-
 aca ad Pisonē.
 Vide ne mēdo-
 sa sint exēpla-
 ria Pliniana in
 hoc loco.
 Hæc fere ex
 Dioscoride,
 Alia ex Pan-
 lo colligam licet
 & Aërio.*

- A Etli nouo comburere addito sceniculi succo ad cyathum unum & thuris manna una, atque ita suffusionem oculorum, & caligines inungere utilissimum est: echion uocatur hoc medicamentum. Fiunt & ex uipera pastilli qui *Echion.* rheriaci uocantur, quibus ad multa medicamenta utuntur. Vipere caput ari
 5 dum asseruatum & combustum, igni sacro medetur. pellium uiperinarum cinis alopecias celerrime explet. *Dipsas.* *Solumus affidis specie esse uale.* Dipsas (ut quibusdā placet) species uiperæ est in maritimis locis, aut aliàs saluginosis reperta: ut aliis uero, non eiusdem omnino generis, sed speciei similis est uiperæ paræ. Est enim quàm mas uipera, minor, cauda gracili & nigra: ar reliquo corpore albicante, maculis partim rufescentibus, partim nigris uariiegato. Et in cauda quoque lineas habet duas nigras: magnitudine cubitali, inquit Aëtius, ex crassa in tenuem desinens, capite quàm uipera angustiore. Morsum eius sequitur internarum partium ardor intolerabilis, sitis inextinguibilis & interficiens: adeo ut quantumuis potus exhibeatur, nihilo magis sedetur sitis: cum tamen neque urina aut uomitu, aut sudore quicquam excernatur: prester à nonnullis uocatur: ab aliis caufos aut melanurus, aut ammoatis, aut
 7 centris dicitur uel centrine. Est uero prester serpens (ut uidetur) alius. Hic si quem percusserit, distenditur, enormique corpulentia necatur extuberatus. Ceraustes quoque ex agnita uipera facile cognoscitur: corpore enim non admodum dissimili est: sed cornua habet (unde illi nomen) bina: uel, ut alij tradunt, quadrigemina: id est extantia quædam corniculis similia, quæ uiperis desunt. Longitudo illi cubitalis, nonnunquam & cubitorum binum. Color arenæ similis: cauda squamis hirta: squamæ uero & sub aluo in ordinem quendam conditæ: quo fit ut sonitum libilo non dissimilem serpendo edat. non recta incedit, sed oblique, & in alterum potius latus inclinata, in nauiculæ modum quæ uenti uiolentia in alterum latus inclinatur. in arena aut rotarum orbitis fere delitescit. Corniculorum illorum ostentatione ueluti esca illice, sollicitas aues perimit. Nam reliqua corporis de industria arenis tegit: nec ullum indicium sui præbet, nisi ex ea parte qua inuitatis dolo pastibus, necem præpetu aucupetur. In iis quos ceraustes momordit, tumescit locus una cum duritie & pustulis: uaria è uulnere effluit sanies, quandoque atra, quandoque uero subpallida. Genitale tenditur: accedit ad hæc delirium: caligant oculi, & à conuulsione tandem sequitur
 D mors. Hammodytes uiperæ fere similis est, serpens cubitalis longitudinis. Color illi non sufflauius, ut uiperæ, sed arenæ concolor est, & maculis quibusdā nigris insignitus. Maxillæ item quàm sinu uiperæ latiores. Cauda superiore sui parre hirsuta & prædura, unde & cercrias illi nomen. Serpētis huius ictum maxima ex parte festina sequitur mors. Qui uero non statim pereunt, iis à uulnere sanguis primum effluit: deinde sanies, sequitur postea capitis grauitas & animi deliquium. Qui aurem uehementius ueneno infestantur, triduo moriuntur: quanquam aliqui uel ad diem usque septimum perdurauerint. Citius pereunt, quos scemina momorderit.

1 *ἄχρ* Oppianus in sexminio quoque genere protulit, aspidem significans: & *ἄχρ* pro scemina dixit Aristoteles. 2 Rotundis, *ῥοῦνδαι* potius quàm *ῥοῦνδαι* legit

DE DIFFERENTIIS

hic Hermolaus apud Aëtium. 3 Sigillatim, id est non binos aut ternos, sed unū E post alterum, & si Plinius, & illum secutus Theodorus hunc Aristotelis locum aliter reddant, quod singulis diebus singulis parit. Ex Leoniceo De serpentibus. 4 Viperæ quomodo condiantur ad esum, docent Plin. lib. 29, & Galen. lib. 11 de simp. medic. & Dioscorid. lib. 2. 5 Theriaci, Horum compositionem uideas apud Galenum lib. 1 antidot. & Plinium lib. 29 cap. 4 & 6, & Aëtium & Paulum. 6 Nicandri interpreter caput latum esse dipsadi ait, & collū amplū. Exemplo est Aulus Iuuenis apud Lucanum, quem dipsas momorderat. 7 Centris uel centrine uocatur, quod rostrum eius in acutum tendat, ut centro, id est stimulo non sit dissimile. Huius exemplū præclarum est apud Lucanum, Narfidius à prestere percussus.

De hæmorrhō, sepedone, sepe, cenchri & cenchrite. Cap. CXVI.

*Hæmorrhus.
Hæmorrhoid.*

Hæmorrhī quoque color arenæ similis est, quandoque obscurior: non- F
nunquam uero splendescens magis. Et incessus cerasæ similiter obli-
quus. Longitudo pedalis: crassitudo uero eius à capite ad extremam usque
caudam paulatim in tenuitatem descendit. Caput habet asperum horri-
dūmque: oculos similes locustarum generi, quæ ~~serpenti~~ dicuntur. Supra o-
culos bina ueluti cornua: collum angustum, caudam ab umbilico gracile-
scentem. Meatum excrementi mas habet superne ad uentrem: femina in-
ferne ad caudam. corpus uniuersum maculis ornatum, partim candidis,
partim uero nigris. dum serpit, ob squamarum asperitatem strepitum edie
haud magnum, quasi per arundinum acruum transiret. in petrarum ca-
uernis fere degit. Hæmorrhū mas est, hæmorrhōis femina. Ab effectu no-
men habet: à morfu nanque eius interit homo præ copioso sanguinis pro- G
fluuiō, tum ex ore tum è naribus, tum etiam ex uniuerso corpore. Si qua ue-
ro corporis parte obducta iam olim cicatrix aliqua fuerit, sanguis ex ea de-
nuo erumpit. Alui quoque excrementa sanguinolenta egerūt. Quin &
ex pulmone sanguis tussī expuitur, & mors certa cum uomitu sequitur.
Hæmorrhō simili forma est sepedon, sed gressu celeriori: neque cornua ha-
bet ulla. Color illi coccineus: caput prægrauē: cauda quanuis sit prolixior, 2
breuis tamen apparet, eo quod dum serpit tātopere per anfractus torquea-
tur. A sepedone percussio, undique defluunt pili, & ex capite & superciliis
palpebrisque. Sequitur deinde per totum corpus uutiligo atque leuce. Seps
anguis longitudinem habet cubitorum binū, capite lato, ore exacuto, to-
to corpore ex crasso in tenuius descendente, multis albis maculis uarię- H
to, incessu recto tardoque. Seps colorem in eorum quæ contingit similitu-
dinem immutat. Eius imos quatuor dentes tuniculæ quædam occultant.
Si quem seps momorderit, ex uulnere (quod manifesto apparet) sanguis
primum excernitur, sanies deinde fortens: intumescit autem locus cum
dolore quodam mitiore. Et membrum putrescit iam, & colorem recipit
album: toti denique corpori & color inest qualis uutiligine affectis: &
pili undique defluunt: biduōque aut certe triduo sequitur mors. Seps,
ut Pausanias scribit, anguis est minimæ uiperæ magnitudine æqualis: ma-
culis ex intervallis quibusdam uariis, capite lato, ceruice angusta, uentre
maiori, cauda breui, incessu obliquo, cancri in morem: id quod illi cum ce-
rasæ

*Alia quoque si-
gna legiro a-
pud Aëtium.
Iam dicit.*

*Seps, 264.
An idē sit ser-
pens cū sepe-
done conside-
ra lector.*

Seps.

A raste commune est. At contrà in obliquum non nisi tardissime mouetur, cum aliàs uelocissime:

Sed semper recto lapsurus limite cenchris:

Pluribus ille notis uariatam tingitur aluum

Κένχρις,
Cenchris, nel
Cenchrine.

5 Quàm paruis tinctus maculis Thebanus ophites.

Hunc & leonem uocauere quidam, ferocissimum anguem, & qui sese cauda uerberet, atque ad ferocitatem irriter. Corpus illi longum & crassum: æstate media petit montes, pecorique insidias tendit, sanguinis auidissimus. In insulis Thraciæ uicinis frequens est. morsum eius sequitur aqua in uentre collectio, & corporis tumor, qualis in hydropse euenire solet: necnō carnis tanta cum dolore putredo, ut uel spōte diffluat. Veternum præterea infert & soporem: atque, ut Erasistratus testis est, iecur, uesica, & crassius intestinum in iis corrumpitur, quos cenchris momorderit. Cenchrites, qui & acontias, serpens esse traditur, cubitorum binū longitudine, corpore toto à crassitudine in exilitate desinente: colore, præsertim circa uentrē, uiridi, ut uideatur milio (cum adhuc recēs seges est) persimilis: unde nomē illi cēthrites: quem & fortiozem seipso fieri aiunt, cum milium floret. Cēthrites cum se infestum alicui reddere uoluerit, in iaculi uibrati modum inuolat, atque ita ferit. Ab huius morsu grauiora quàm ab aliis sequuntur pericula, ut simul & putrescant & defluant carnes. Iaculum ex arborum ramis uibrari uulgatū est, inquit Plinius, & missili uolare tormento. Subeunt enim iaculi arbores, è quibus ui maxima turbinati, penetrant animal quodcunq; fortuna obuium fecerit. Adeo ualet saltu iaculus, ut uiginti cubitorum spatium transilire queat: protinūsque ad ea quæ saltu appetit, inhærescat.

Cenchrites,
Acontias.
Λύκτιος α-
πὸδ Νιανδρῶ
ἀλινδ γεν' ser-
pentis est: de
quo infra.

Iaculus.
Iaculique no-
mē, inquit
Zucanus.

1 Longitudo, Ita Nicæder: Aëtius uero hoc modo, Recta & tarde prorepat. Longitudo illi trium palmorum, uel trium dodrantium: nam utrunque significat τριδάκτυλος. Sed uide ne sint exēplaria mendosa. 2 Coccineus, Nicæder: Color illi, qualis est hirsuti tapetis, id est (ut uult interpretes) coccineus.

De basilisco, & aliis quibusdam serpentibus, quorum uenenum remedio caret. Cap. CXVII.

Basiliscum Cyrenaica generat prouincia, malum in terris singulare: qui uel conspectus solum, ut aiunt, & sibilo auditus, interimit: uel ut referunt alij, qui hominem, uel si aspiciat tantum, dicitur interimere. Et quicquid morsu eius occiditur, non depascitur fera, nō attrectat ales: si uero attigerit, statim interit. Alios quoque serpētes olfactu necat: nec hominis tantum, uel aliorum animantium exitiis datur, sed terræ quoque ipsius, quam polluit & exurit: necat enim frutices arboresque non contactas modo, uerum & afflatas. Extinguit herbas, rumpit saxa: ipsas etiam corrūpit auras: ita ut in aëra nulla alitum impune tranfuolet insectum spiritu pestilenti. talis uis malo est. Basiliscus parua serpens est trium palmorum longitudine, colore flauo fuluoue, capite acuminato, & candida in eo macula, ut quodam diademate insigni. uiribus reliquos serpentes longe superat. Nec flexu multiplici, ut cæteræ corpus impellit: sed cum mouetur, media corporis parte serpit, media celsus & erectus incedit. Vulnus ab eius morsu factum

Basiliscus.

Basiliscus;
αιδης.

DE DIFFERENTIIS

(ut inquit Erasistratus) auro colore obducitur: statimque à uulnere sequi-
tur mors. Sibilum eius etiam serpentes alij perhorrescunt: & cum acce-
perint, fugam quæque quoquò possunt, properant. Huic tali monstro mu-
stelarum uis exitio est. adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. interficiunt
eos in cauernis, in quibus delitescunt: uis tamen ne defuncto quidē deest.
Basilisci reliquias amplo tertio pergameni compararunt: & ut eodem A-
pollinis manu insignem, nec araneæ intexerēt, nec alites inuolarent, cada-
uer eius reticulo auro suspensum, ibidem locarunt. Sanguinem magi mi-
ris laudibus celebrant coëntem picis modo, & colore dilutum cinnabari
clariorem fieri: quidam id Saturni sanguinem appellarūt. Est in Indica re-
gione serpens paruus, inquit Aristoteles, cuius unius remedio carent inco-
læ. In regionibus ultra Indum fluuium, ut auctor est Diodorus, serpentum F
uis est, qui haud magni sunt, & corporum uarietate distincti. Aliqui æneis
uirgis sunt similes: alij densam & hirsutam cristam gestāt. atque omnium
ea est morsus uis, ut mortem citissimā inferant. Est & Indicus serpens por-
phyryus nomine, palmi magnitudine, colore ad purpuræ similitudinem ac-
cedente, capite albissimo, locis Indiæ calidissimis reperitur. Dentiū expers
est: idcirco mordendi potestas illi nulla. At eius uomitio, si quod uel homi-
nis, uel alterius animalis attigerit membrum tabescat necesse est.

*Serpentes In-
dici.*

Porphyrus.

1 Basiliscus, Plinius: Duodecim non amplius digitorum magnitudine. Solinus:
Pene ad semipedem longitudinis. 2 Candida, Solinus: Alba quasi mitrula lineatus
caput. (An igitur in Plinio legendum potius mitrula pro macula.) Aëtius: *ὄφις πορφυρῆς*,
id est tubercula tria habet: & Galenus ad Pison.

G

De dracone, amphibiaena, & aliis quibusdam serpentibus, quo-
rum morsus minus affert periculi. Cap. CXVIII.

*Draco,
αἰσχινος.
Draco uerus.*

DRACO nō habet uenena. Porro ueris draconibus ora parua, & ad mor-
sus non dehiscunt: sed arctæ fistulæ, per quas & trahūt spiritus, & lin-
guas exerunt. Proinde neque draconis morsus dolorē ullum uehementem
excitat, etiam si pro uiribus maxime nitatur morsum infligere: sed qualem
mus mordēdo efficit: quippe non in dentibus uim, sed in caudis dracones
habēt: & uerbere potius quam rictu nocent. Speciosa draconis forma est.
dentes quoque habet utrinque duplici ordine: frontem & supercilia cras-
sa. sub mento ueluti palearia dependent subflaua subuiriidiæ, quæ barbæ H
speciem referunt. Id modo mirum, unde cristatos Iuba crediderit: draconū
enim cristas qui uiderit, non reperitur. Non admodum dissimile huic ui-
detur esse genus quoddam draconum, quod sola fert Epidaurus, mansuetū
& colore subflauum, quod Æsculapio sacrum erat: auctor Pausanias. Qui
Æsculapio dicatus est, anguis à Plinio uocatur: neque anguis hic uenena-
tus est, nisi per mensem luna infligatus: sed prodest uiuus comprehēsus, &
in aqua contusus, si foueatur ita morsus. quin & inesse ei remedia multa
creduntur, & ideo Æsculapio dicatur. Atqui anguis Æsculapius Epidau-
ro Romam aduectus est, uulgóque pascitur, & in domibus: ac nisi incēdiis se-
mina exurerentur, non esset fecunditati eorum resistere. Draconum genus
est

*Subflaua sub-
uiriidiæ, & αἰσχί-
νης.*

*Draco Epi-
daurius.*

*Anguis Æ-
sculapius.*

*Anguis Æ-
sculapius.
Draco.*

- A est magnitudine quinque aut decē cubitorum:reperiūtur autem & uiginti
 1 aut triginta cubitorum longitudine:& ut aiunt, nonnunquā maiores. Ge-
 nerat Æthiopia dracones Indici pares,uicēnū cubitorum.Artemidorus
 draconū in Arabiā magnitudine refert tricenū cubitorum, qui tauros
 3 elephantosque perimant:moderatus sane in his:nam Indici ac Lybici dra-
 cones fabulosiores sunt,super quibus herba etiam nasci dicitur.Draconum
 ingens hoc genus squamis tegitur toto corpore asperrimis. oculis est præ-
 grandibus:supràque oculos extantibus quibusdam ceu umbraculis: in mē-
 to uero,quam barbam uocant,ore uasto,lingua longius exporrecta,denti-
 bus magnis,quales sunt suis syluestris,quibus mordero ossa frangunt. Nō
 4 enim nisi in locis æstuosis uenenū habet draco: sed morsu uiolēto perniciē
 B quādoq; affert. Color illis uarius:sunt enim alij nigri,alij rufi flauūe, alij ci-
 nerei coloris. In Phrygia dracones ad magnitudinē quadragenū pedū na-
 sci ferunt:qui quotidie media æstate ex cauernis prodeūt,cauda ad terram
 admittentes,religio erecto corpore, & toto gutture eminentē: & paulatim
 laxato ore hiante,uolucres super uolantes (tamenq; sublimes & perniciter
 ferātur)sua aspiratione ad se pettrahere atque allicere:eas autem ex horum
 spiritus ductibus detractas in illoꝝ uētre m decidere atque illabi:& hæc
 quidem maxime ad occidentem solem agere.Spectanda quidē draconum
 ars in deuorandis ouis:aut enim solida hauriunt,si iam fauces capiunt:quæ
 deinde in semet conuoluti frangunt intus, atque ita putamina excutiunt:
 aut si tenerior est & catuli adhuc ætas,orbe apprehēsa spirā, ita sensim ue-
 hementēque perstringūt,ut amputata parte ceu ferro, reliquam quæ am-
 plexu teneretur, sorbeant. Draconis adipe & melle cum oleo uetere incipiē-
 tes caligines discuti tradunt. draconum quoque adipem uenenata fugiūt.
 Draconum maguitudini fidem faciūt in Italia appellatæ boæ, quas gignit
 Calabria.Hunc anguem ad immensam molem ferunt coalescere. captat
 primo greges bubulos: & si quæ plurimo lacte rigua bos est, eius se uberibus
 innēctit,suctūque continuo saginata,longo seculo ita funebri satiēta-
 te ultimo extuberatur,ut obistere magnitudini eius nulla uis queat.postre-
 mo depopulatis animātibus, regiones quas obsederit, ob uastitatem cogit.
 Deniq; D.Claudio principe, in loco ubi Vaticanus ager est, in aluo occisæ
 boæ spectatus est solidus infans. Amphibæna aut scytale etiam si mor-
 5 deant, non encant: sed horum serpentium morsus & obscuri sunt, & in-
 flāmationes tantū inferunt, quales ferē ex apum uespārū uie iētibz cōtin-
 gunt:scytale tamē chalcidicæ morsum aiunt eadē ferē sequi symptomata,
 ac si quē uipera momorderit. Animalcula hæc inter se similia sunt, nisi q̃
 magnitudine differunt. Neque ut alij serpentes ex crassiore corpulentia in
 caudam tenuem desinunt: sed terete corporis figura utrinque æque crassa
 existunt:ut aspectu discernere nescias, utra in parte caput aut caudam esse
 dixeris. Differunt, quod amphibæna in utranque partem, in caput scilicet
 & in auersum serpit:quo fit ut in nōnullis biceps esse dicatur, & ἀμφικεφαλός,
 parua serpens, lumbrici terrestris magnitudine, colore terreo maculis par-
 uis distincto:ob maxillarum crassitiem modo quodam cæcutiens. Sola ser

Umbraculis,
ὀφθαλμοῖς.

Rufi flauūe,
κίττει.

Bod.

Amphibæna,
Scytale.

Scytale Chala-
cidica.

pentium frigori se committit, prima omnium procedens, & ante cuculi cantum. Amphibianam mulier prægnans si transcenderit, abortum faciet, mortuam duntaxat: nam uiuam habentes in pyxide impune transeunt, etiam si mortua sit atque adseruata: partus faciles præstat uel mortua. Mirum, si non adseruatam transcenderit grauida, innoxiam fieri, si protinus transcedat adseruatam. Scytale grandior est: quippe cuius longitudo ligonis aut securis manubrium æquat. Tanta præfulget scytale tergi uarietate, ut notarum gratia uidentes retardet: & quoniam reptando pigrior est, quos assequi nequit, miraculo sui capiat stupentes: in hoc tamen squamarum nitore, hyemales exuias prima ponit. Phlegionem quoque excitat, neque aliàs mortis periculum affert ullum spathiuri morsus aut paroi. Est uero spathiurus serpens capite lato, & crassitudine in tenuitatem ad caudam usque definens. Nascitur in locis Chalcidi uicinis. muribus uestitur. Parous aut parcas anguis est in locis Syriæ proximis natus. In hoc genere alij colore æris simili, alij uero nigro conspiciuntur. Alianus parian uocat: uel, ut uult Apollodorus, pariani: igneo colore, & acerrimo oculorum sensu: largo ore, morsu nihil nocet. Sed mitis cum sit Æsculapio dicatus est. Elapis uel elopis notæ non sunt à ueteribus authoribus explicatæ: sicuti neque peliadis relictis enim uidentur tanquam serpentes nulli non cogniti. Mordent quidem, sed nullo cum periculo mortis: uerum elapis morsus tormenta excitat, qualia uolulosis accidunt: iisdemque remedijs curantur. iis uero quos pelias momorderit, dolor circa locum uulneratum cum putredine quadam prouenit: sed absque omni mortis periculo: oculorum præterea dolor cum caligine: nimirum ex ueneni ui ad ipsos pertingente. Typhline, qui & typhlopes à Nicandro dicuntur, colore similes sunt Chalcidi siue zignidi. Rimam quandam sub imo uentre habent, qua dehiscente aut disrupta, oua pariunt: à partu autem uiuunt, & uulnus coalescit. Hæc si etiam calcantur non mordere sentiuntur. Circa Thebas Ægypti serpentes quidam sunt hominibus minime noxij, ideoque sacri dicti: corpore pusillo, binis corniculis è summo uertice extantibus. Sacer item appellatur à nonnullis alius serpens quidam minutus, quem serpentes alij permagni fugiunt. Magnitudo huic ad cubitum, species hirsuta: quicquid momorderit, continuo circiter putrescit. Gignitur in Africa agro, in quo laser, serpens quidam pusillus, cuius remedium lapis est, quem ex sepulchro cuiusdam regis antiqui accipiunt: eoque infuso in uino bibunt. Innocui & alij notantur quidam à Nicandro, ut ij qui moluri dicuntur, & qui acontia uocantur. Volat serpentis genus quoddam, ut fertur, uere ineunte ex Arabia in Ægyptum, forma hydris simile. Alas autem habet hoc genus non penneas, sed cuteas uespertilionibus similes. Genus serpentis est spondile, inquit Plinius. Hæc nullam radicem, quanuis acrem intactam reliquit earum, quæ diutius siccæ manserint: cum è bestiolis externis nulla alia radicem aliquam tangit. Hoc ergo naturæ animalis istius deputandum sit. Et de serpentibus aliisque quæcunque cortice intacta sunt, dictum ad hunc modum est. Sequitur natura auium.

- A 1 Draconum, Hæc Plinius: Philostratus autem, palustribus draconibus, inquit, ciusta non est: montanis uero, iuuenibus quidem adnascitur crista medioeriter prominens, prouectis uero ætate, grandior. 2 Hos Epidaurici, ut refert Pausanias, non dracones, sed angues potius uocari dicunt. 3 Draconum cum elephantis pugnam depinxit egregie Plin. lib. 8. 4 Draco. Lucan. Vos quoq; qui cūctis innoxia nu-
mina ternis Serpitis aurato nitidi fulgore dracones. Pestiferos ardens facit Afri-
ca. 5 *Ἐκκεκρίφαλος*, Solin. Quæ causa efficit, ut caput utrinq; secus nitibūdo serpat
traſſibus orbicularis. 6 Lucanus, Et scythale sparsis etiam nunc sola pruinis
Exuias positura suas. 7 Aut idem cum spathiuro, aut certe non dissimilis ser-
pens esse uidetur, qui à Nicandro *μύχρος* uocatur, *πολυπύχρ*, id est pluribus insignitus
coronis lineisue, ut exponit eius interpres. Est & Aristotelicus quidam serpens, de quo
lib. 9 histor. animal. Serpentem quoque impugnat mustela, cum præcipue qui mures
uenatur: uidelicet ea causa, quia ipsa etiā mures prosequitur. 8 Pareas apud Lucanū,
Et contentus iter cauda fulcare pareas. 9 Typhlinx, Nomen hoc sortitæ sunt,
quia cæcæ sunt. Hermol. Cæci serpentes etiam à Plinio uocantur. Cophiæ etiam no-
men ideirco habet, quod hebetes illi aures sint: adeo item dura est pelle, uix ut tandem
secari queat. 10 Lafer, Aristoteles, *ἡ ἀλφειῶ*, id est in lafere, urtus interpres habet,
in loco qui dicitur siphia. 11 Moluri dicti sunt, quæ & coit more eorundem.
Sphondyle apud Aristotelem è genere est insectorum, quæ & coit more eorundem.
Theodorus uerticilla interpretatur. Et alio loco uerticillos dixit pro *σφονδύλης*: uerū
apud Theophrastum nihil aliud reddidit latine quàm sphondylas: ut uideatur sentire
etiam Theodorus diuersa hæc esse animalia.

*Anguis, cæcis.**μύχρος.**Cæci serpentes
Cophiæ.**Verticillus.
Verticillum.*DE ANIMALIVM DIF-
FERENTIIS LIBER VII

DE AVIBVS.

De partibus auium exterioribus.

Cap. CXIX.



N genere animaliu, quod bipes est & alige-
rum, pennisque opertum, auem appellamus.
In auibus partes nonnullæ similiter atque in
iis quæ exposui animalibus, habentur: omni-
bus enim caput inest, & collum, & dorsum:
& supina corporis pars, & quod pectori pro-
portionetur. Crura quoq; bina, hominis mo-
do: sed manibus pedibusque prioribus ca-
rent. Auim nonnullis in capite crista ad-
dita est: quam cum cæteræ pennarum emi-
nencia quadam extructam gerunt, gallinaceus unus peculiarem sibi forti-
tus est: sic enim institutam, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino alie-
na. Oculi omnibus sicut cæteris animalibus bini, sine ciliis. & grauiores pal-
pebra inferiore conniuent: columbæ autem & similia utraq; quæ uero
speciem nocturnæ gerunt (*φασματόδεις* uocant) superiore etiam palpebra conni-
uunt. Niſtantur omnes ab angulo obœute membrana. Volucris usus cer

Avis, æret.

DE DIFFERENTIIS

nendi ex longinquo est unde fit, ut quæ unguibus sunt aduncis, clarissime E
cernant: cibus enim de sublimi conspiciendus iis est: & quidem uolare in
excelsum omnium maxime auium genus id ob eam rem assolet: terrestres
autem parumque uolatiles aues, ut gallinacei & similes, nō acie oculorum
adeo ualent. Auriculis carent omnes & naribus, meatūsque odorandi in ro
stro continent, audiendi in capite. foramina bina ante os habent, sed nō ita
explanata ut nares appellari possent. Os sibi propriū aues possident: non
enim labra, non dentes, sed pro maxillis rostrum habent (ῥίγξ Græci uo
cant & ῥίμκος,) quod in senectute maius redditur. Rostrū hoc uarie pro ui
ctus ratione & auxilio datum auibus est: quæ enim adūcis unguibus sunt,
quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uescuntur, rostrum habent omnia
aduncum: cæterarum rectum. Sed aliis prædurū est, ut coruino generi: mi
nutis auibus lautum subtilēue, ad terræ fruges colligendos, & ad bestiolas
capiendas idoneum. Quæ autem herbis uiuunt, & quæ ad paludes uictitāt,
(ut palmipedes, & quæ collum habēt longum) partim alio quodam modo
rostri commoditatem obtinēt, (nonnullis enim rostrum longum est ut &
collum) partim latitudine rostri sibi sufficiunt: quippe quæ rostro eiusmodi
infodere possint. Quinetiam aues quæ latius habent rostrum, & quæ ra
dices esitant, & reliquæ quarū uictus similis, nonnullæ ferratū rostri extre
mum habent: ita enim herbarū carptus quo uiuunt facilius agitur. Lingua
omnibus est, sed uarie: aliis enim longa, aliis brevis, aliis lata, aliis angusta.
Quæ aduncis sunt unguibus, latiore fere linguā habent. Collū auibus por
rectum est: sed hoc aliis breuius, aliis longius: quibus enim longa sunt cru
ra, iis collum longum: quibus breuia, contrā, collum breue, præterquā pal
mipedibus. Carniuoris uolucris longitudo colli incommoda est: quam
obrem nulli collum longum quibus ungues adunci. Palmipedes uero, &
quæ diuisis quidem, sed parum diductis digitis sunt, (ut quæ eodem genere
cum palmipedibus contineantur) collum longius habēt: tale enim collum
ad cibum ex humore petēdum commodius est: sed crurā iis breuia, ut me
lius natare possint. Omnes aues unæ breui sunt collo (uti modo diximus)
& lingua lata, aptæque ad imitandū. Pectus in auibus integrum est, & sibi
continuum carinatumque, & acutum atque carnosum. Et inter eas aqua
tici maxime carinātū. Pectori uenter subiacet ad ostium usque extremēti
& suffraginem crurum. Umbilicus auibus iam adultis delitescit: incertūsq;
est, intestini enim coalitu consistit non uenarū pars ulla est, ut in uiui pa
ro genere. Carent aues manibus pedibusque prioribus, ut dictū est: sed pec
culiare inter cætera animalia alas possident: alæ enim iis pro brachiis & pe
dibus prioribus dependent: quamobrem pro scopulis extrema alarū dor
so adhærent. Clunem habent fœmori similem, longiorem, uentrēque me
dio tenus porrectū cohaesione perpetua, ita ut ipsum diuulsum fœmū esse
uideatur: sed enim parte alia iunctum tibiæ est. Sūt fœmora sane maxima
iis auibus, quæ ungues habent aduncos, & pectus quàm cæteris robustius.
Crura auibus omnibus ut in homine bina, sed intro flectenda, ut quadrupe
dum suffragines, nō ut hominis poplites foras. Crura quibusdam breuiora,
ut

Rostrum.
ῥίγξ.
ῥίμκος.

Parū diductis,
αὐτῶν αὐτῶν.

Pluribus expli
catur hæc lib.
6 hist. anima.
Ala, ἄλῃς.
Scopulis.

ra, ut

Ara, ut palmipedibus. Sunt uero quæ longis cruribus innitantur: harum uita palustris est: nantes tamen non sunt, ideo neq; palmipedes: sed quòd in solo præmolli degunt, hinc digiti illis productiores, & flexus plures in digitis magna ex parte. Multifidæ etiam omnes quodammodo sunt: quippe cum pars maxima digitata sit: & nantes quauis palmipedes, tamē & ipsæ digitos perfectos distinctosque habeant. Iis autem natura aut pedum interualla penitus cõpleuit, omninoq; palmipedes reddidit: aut discretos quidem fecit digitos, sed singulis digitis annexa est ductu perpetuo latiuscula cutis, ut pedes etiam ad nandum utiles habeant. Omnibus tam multifido quàm palmipedi generi quaterni digiti dati sunt, (nec fere est quod plures habeat digitos) terni in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce:

B hic tamen deest quibusdam longa crura habētibus: paucis quibusdā utrinque bini, ut auiculæ quam iungem uocant: & qui in calce est digitus, minutus est, ut in crece maxime patet. Copia auibus omnibus unguium est: & quibusdam ungues adunci sunt, indeque ungues appellantur: quibusdam uero rectiores. Vncungues omnes difficulter ambulāt: nec in saxis cōsistunt, quoniam saxi durities impedimento curuaturæ unguium est. Sunt nonnulla grauiorū alitū genera, (ex maribus saltem, sed fœminæ omnino iis carent) quibus natura calcar etiam dederit: sed nulli datum hoc est, cui ungues adunci sunt. Cauda tali, qualis data quadrupedibus est, uolucres carent: sed *ὀρνίθιος* uropygiū muc, id est caudam pennis conditam gerunt, breuem quæ longa crura habent, & quæ palmipedes sunt: maiorem autem

Vncungues
ταμὸν γὰρ.

Calcar,
παλῆα ποτ.
Cauda, ὀρνίθ.
ὀρνίθιος
Uropygium.

C quæ è contrario constant, quæ etiam contractis ad uentrē pedibus uolant: cum illæ, quæ scilicet caudam pusillam gerunt, porrectis in caudam cruribus ferūtur, ut porphyrio, ardea, & aquaticæ aues. Uropygium hoc auibus ad dirigendos uolatus affigitur, sicuti & piscibus suæ caudæ, & nauigiis gubernacula: quo fit, ut aues quæcūque caudā talem ad hunc usum incptam habeant, ut pauones & gallinacæ, & quæ minime uolaces sunt, haudquaquam directe uolare possint, sed ueluti gubernaculo carens nauigiū agitur feranturque quocunq; fors tulerit: nisi si quæ caudæ loco protensis cruribus uolent modo quo iam dictum est. Aues item hoc proprium habent ad cetera animalia, quòd non pilis, non squama, non cortice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule constant, fissæq; omnibus sunt: nec simili specie sunt: atque ea quæ *ἀνέπτερος*, id est totipenna à pennæ continuitate appellantur: his enim fissâ, illis infissâ est penna: & altera excaulis est, altera caulem habet. Pennæ præfectæ non similiter ac cæterorum animalium pili aut ab radice aut superne ab incisura possunt reparari, sed cadant necesse est.

Penna, ἀνέπτερος.

D

1 ὀρνίς autē fere significat, ἄ ὄρνις, gallinam: sed cōfunduntur nonnunquā. 2 In auibus proprie *ἰμμοθ*, in sue *ἰμύχες* dicitur. 3 Lautum, *λαφρόν*, uetus interpres, subtile: an potius elegans? nā & ita uertit Theodorus: *λαφρόν* in purpurarū sanguine.

De partibus auium interioribus.

Cap. CXX.

Aves uero & inter seipsas differre, & à cæteris discrepare animalibus etiam interiorum partium ratione apertum est: lingua enim (quam

S ij

DE DIFFERENTIIS

ἀνδροειδὴς uocāt) auibus deest: uerū laringis constrictione idipsum præstāt, E
 quod lingula in aliis: dum enim alimentum capiunt alia, lingula arteriam
 cooperiunt: aues arteriam ipsam contrahunt atque ita claudūt, sicuti qua-
 drupedes ouiparæ & serpentes. Auium pulmo exiguus est, parum habens
 sanguinis, fungosus mēbranæque similis, & aptus ampliari & extumescere
 cum inflatur. Pulmonis partes adeo inter se discretæ sunt, ut binos habe-
 re pulmones credideris. Auium iecur maxime simile est uiui parorū: puro
 enim & sanguineo colore exhilaratur. Magnæ auium parti lien usque adeo
 exiguus, ut propemodum sensum effugiat, ut in columbis, miluis, accipi-
 tribus, noctuis experimur. capriceps auis liene omnino caret. Aues omnes
 fel habent: sed aliis uentri, aliis intestino iungitur, ut colūbæ, coruo, cotur-
 nici, hirundini, passeri: aliis iecori simul & uentri, ut capricipiti: aliis iecori F
 similiter & intestino, ut accipitri, miluo. Renes uero non habent aues, ne-
 que uesciā: quanquam in nonnullis auibus caruncula quædam sit la-
 tiusculæ speciem renum ostendentes. Auibus quibusdam ingluuius præpo-
 sita uentriculo est, ut gallinæ, palumbo, columbo, perdici: (ingluuius eu-
 tis in amplum sinuata est, qua primum eibus ingestus cōtinetur in eoctus:
 hæc parte qua iungitur gulæ angustior est, mox amplior, tum qua definit
 in uentriculum arctior:) aliis ingluuius deest, sed eius uice gula pertinet la-
 tior & patentior uel tota, uel quā propius uētriculo adit, ut monedula, cor-
 uo, cornici, coturnici, capricipiti, noctuæ: at anati, anseri, laro, cataraetæ, gu-
 la tota ampla & lata est. Multis etiā aliis auibus gulā huiusmodi esse perspe-
 ctum est. Nec desunt quibus uētriculus ipse similis sit ingluuiei, ut tinnun- G
 culo. Sunt itē quibus neque gula neq; ingluuius amplior sit, sed uētriculus
 longior, scilicet auiculis omnibus, qualis passer aut hīrudo est. Sunt etiam,
 quanuis pauca, quæ neque ingluuiem neque gulam amplam habeant, lon-
 gitudine autem ingluuiei admodum proluxa utantur: uidelicet quæ longa
 angustaque colla habent, ut porphyrio: quæ fere omnes excrementum hu-
 midius quā cæteræ solent, reiiciunt. Distat ingluuius ab ea gulæ parte
 quæ uentriculo propinqua est multum, magnitudinis proportionē. Ven-
 triculus auium parti plurimæ carnosus callosusque est, cutis intus robusta
 & quæ facile à parte carnosā detrahi potest: sunt tamen, ut modo diximus,
 nonnullæ quibus uentriculus longior sit atque ingluuiei similis. intestinū
 quoque parti plurimæ auium tenue est, solutūque simplex est. Appendi- H
 ces pauca in auibus sunt, non supra & circa uentriculum, ut in piscibus, sed
 infra quā definit intestinum. Habent eas non omnes, sed plurimæ, ut galli-
 naccus, perdix, olor, anser & aliæ multæ. Minoris etiam generis nonnullæ
 habent, sed perexiguas, ut passer. Auibus testes dati sunt omnibus: non ta-
 men qui foris pendeant, sed qui intus adhæreant lumbis: quomodo de san-
 guineis quæ pedes habent ouiparis omnibus dictum est. ij priusquam coire
 incipiant aues, aliis exigui, aliis omnino obscuri sunt. at uero cum uene-
 rem exerceant, insigni tantisper magnitudine augentur, quod apertissime
 palumbis & perdicibus euenit. Vbi uero id tēpus præterierit, adeo exiguos
 habent, ut incertum fere an habeant, sit: cum tamen eo tempore quo coeūt
 gerant,

*Ingluuius,
 ἀνδροειδής.*

Agerant prægrandes: itaque fit ut hybernis mensibus ne ullos quidem testes in iis haberi nonnulli arbitrentur. Salaciorum auium testes conspectiores sunt, ut gallinaceorum & perdicum: temperatiorum minus. Auium uulua iuxta septum annexa est. ceruicem habet carnosam callosamque parte inferiore. at superne qua septo iungitur, membrana constat, & prætenuis adeo est, ut oua extra uuluum esse existimes. Auibus ergo auctioribus membrana conspectior est: & si per ceruicem infletur, extollitur atque sinuatur. at in minoribus obscuriora hæc omnia habentur. Auium ossa paulo inter se differte uidentur: aquilis enim densissima sunt ossa, ut dictum est, & durissima: deinde & accipitrum ferocioribus, circo, palumbario & similibus: gallinaceo uero, anatibus atque anseribus laxa simul ac caua leuisque. **B** ossium est substantia. Semen genitale omnium auium album ut cæterorum animalium est. Partes auium tum exteriores tum interiores ad hunc modum se habere constat.

De coitu auium, & aliis quæ ad earum generationem pertinent.

Cap. CXXI.

Coitus uero differentias in auibus has annotamus, ut aliæ sæmina confidente humi, mare superueniente coeant, ut gallinaceum genus: aliæ non confidente sæmina, sed stante, ut grues: & quæ ita coeunt rem quam celerrime peragunt: mas enim supersiliens, cito ut passeris perficit. Coeundi patiendique tempus non idem omnibus auibus est: sed parte plurima uere ac ineunte æstate coeunt & pariunt, excepta haleyone, quæ circa brumam parere solita est. Sunt etiam quæ sæpius generant, ut columbæ & gallinæ. Auium syluestres semel magna ex parte coeunt atque pariunt: uerum hirundo bis parit & merula. at uero quæ aut urbana sunt, aut traduci possunt ad mores mitiores, hæc sæpius generant, ut columbæ, quæ tota æstate sætant. gallinæ etiam coeunt & pariunt, præterquam duobus mensibus brumalibus. Auium itaque, aliis aliæ sæcundius pariunt: quod bifariam fit: aut enim quia crebrius, ut colubæ, aut quia numerosius, ut gallinæ. Omnes quibus ungues adunci, minus salaces sunt, & parcius generant, excepto tinnuculo, qui plurima in adunco genere parit. Sed quæ graues sunt atque item ueloces, quarum scilicet corpus grandiusculum est, ut colubæ & similes, aut graues non uolaces, quarum corpus grande, ut gallina, coitu superat perfectundæque sunt: quomodo interdum plantæ minores sunt fertiliores. Pariunt cæteræ in nidis: quæ autem grauiores sunt & minus uolant, ut perdices, & coturnices, & reliqua generis eiusdem, non nidis, sed condenso frutice prolem muniunt: facta enim in aprico area (alibi enim nusquam pariunt) atque materia ut uerbis quibusdam cõgestis, quoad accipitrum & aquilarum iniuriam deuigare possint, oua edunt & incubant: mox cum excluserint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolatu iis cibum administrare. Aquaticæ omnes quæ in lacubus aut paludibus uicitant, iuxta paludes & locis herbam habentibus nidos faciunt: quem uero Bæotij meropem uocant, hic unus subiens terræ cauernas facit cunabula. Vpupa una in suo genere non

Numerosius, uetus interpres, multa generat.

DE DIFFERENTIIS

nidificat: sed stipites arborum subiens parit sine ullo collecto stramento in E
cauis. Oua pariunt aues omnes, sed quæ inuicem pariat ouum, excepto cuculo,

Ouum.

Luteum oui.

τὸ ὄρν.

Vitellus.

Χάλκιος.

nulla est. Ouum æque omniū uolucrum duro putamine constat, si modo
non deprauetur: gallinæ enim nonnulla pariunt mollia, uitio. Bicolor quoque
ouum intus est: luteum interius, albū exterius: mēbrana hæc inter se discernuntur. Sunt & quæ *χάλκιος*, id est grandines dicuntur, uitelli initio adhæ-
rentes, quæ nil ad generationem cōferunt: quanquam aliqui ita non existi-
mant: hæc duas esse ceterum est, alteram parti superiori iūctam, alteram in-
feriori. Umbilicus ouis (inquit Plinius) à cacumine inest, ceu gutta emi-
nens in putamine. Fiunt & oua tota lutea quæ uocant schista, cum triduo

Oua schista.

Schista, aliās

sfista.

incubata tolluntur. Differunt oua aquaticarum à terrestribus, quod multo
plus lutei quàm albi ex proportionem contineant. Differunt & colore inter F
se oua auium: sunt enim alia cādida, ut columbarum & perdicum: alia pal-
lida, ut palustris: alia punctis distincta, ut phasianarum & meleagridum:

rubrum tinnūculi est modo minij. Quin & ipsum ouum in se suum habet
discrimen: quippe quod non plane rotundū sit, sed parte sui acutum, parte
latius sit: qua quidem parte latiore exit, cum in lucem editur. Exit autem
pars oui acuta post: ea nāque parte adhæret, in qua & principium pulli est.
Itaque fit ut partus ouorum contra atque animalium cuenit: animal enim
uersum in caput suūque principium nascitur: at ouum quasi in pedes cō-
uersum exit. Concipit fœmina cum coierit ouum superius ad septum trās-
uersum: quod ouum primo minutum & candidum cernitur, mox rubrum
cruentūque. Deinde increfcens luteum & flauum efficitur totum: iam G
amplius autem discernitur, ita ut intus pars lutea sit, foris candida am-
biat. ubi perfectum est, absoluitur à corpore, & exit putamine dum pari-
tur molli, sed protinus durescente, nisi uitio uulæ defecerit. at postea oua
ipsa aceto macerata in tantum emolliuntur, ut per annulos transeant.

Sunt oua quibusdam gemina, quæ binis constant uitellis. Hi ne inuicem
confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis
mediū: aliis uitelli contactu mutuo sine ullo discrimine iunguntur. Gal-
linas aliquas & anserum iuuenas expertes adhuc coitus parere oua quæ
autolūmen, id est subuentanea dicuntur, uisum fæpius est: sunt hæc sterilia
& minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida quàm ea quæ fœ-
cunda gignuntur, sed plura numero. humor eorum crassescere incubatio- H
ne auis non potest: sed tam cādida quàm lutea pars similis sibi perseverat.

Pariunt genus id oui plures aues, & maxime quæ non uolaces sunt aut ad-
uicæ, sed multiparæ ut gallinæ & perdice, colūbe, pauoues, anseres & uul-
panseres. Redditur uero ouum subuentaneum illud fœcūdum, si prius co-
eat auis, quæ subuentaneum ouum fert, quàm ouum ipsum à luteo in can-
didam ambientē partem proficiat. Ita enim fit, ut subuentanea oua fœcūda
reddantur: at si iam candidū receperunt humorē, fieri non potest ut sub-
uentanea in fœcūda mutantur. Sunt qui hypenemia illa oua, zephyria
nominant, eo quod uero tempore aues status illos fœcundos ex fauonio
recipere uideantur. Celeriter magna pars auium, & impletur, & oua sub-
uentanea

Oua autolū-

men, subuen-

tanea.

Oua zephyria

A uentanea illa concipit: quod uel in perdice percipi potest, eo quòd ad libidinem incitatur tēpore. Generatio ex ouo omnibus uolucris euenit modo quidem eodem: fit enim ut incubante & concoquente aue, animal ex parte oui fecernatur, ex albumine scilicet: augeatur uero ex reliqua parte & perficiatur, nempe uitello: origo nanque in albumine est, cibus per umbilicum ex luteo petitur. Itaque auium incubitu fortum excludi naturæ ratio est: non tamen ita solum oua aperiuntur: sed si aut tempus sit bene temperatum, aut locus, in quo oua manent, tepidus, concoquuntur nonnunquam & auium oua, sicut & quadrupedum ouipararum, sine parentis incubitu, tepore terræ: ut in Ægypto oua obruta fimo pullitium procreant. Nonnunquam uero & cum in uasis quibusdā tepidis essent coniecta, spōte

B oua pullos prompsere. Oui generatio ab initu, & pulli rursus ab ouo concocto prouentus, non pari temporis spatio euenit omnibus, sed pro magnitudine generantium interest. Ouum gallinæ consistit à coitu, & perficitur decem diebus in maxima ex parte: columbæ paucioribus. Gallinis tertia die ac nocte postquam cœpete incubate, indicium præstare oua incipiunt. At maiorum auium generi plus prætereat temporis necesse est: minori autem minus sufficit. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumē, à qua principium oui est, & cor quasi punctum sanguineum in candido liquore consistit: uel, ut Plinius tradidit, in medio uitelli. hoc punctum salit iam & mouetur ut animal. Tendūt ex eo meatus uenales sanguigeri duo tottuosi ad tunicam ambientem utranque, dum augetur. Membrana etiam fibris distincta sanguineis, iam album liquorem per id tempus circumdat, à meatibus illis uenarum oriēs: paulo autem post, & corpus iam pulli discernitur, exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis: quo modo diu permanet: sero enim decrescunt oculi, & se ad ratam contrahunt proportionem. pars autem inferior corporis, nullo membro à superiore distingui inter initia cernitur. Iam meatuum quos ex corde tendere diximus, alter ad ambientem album liquorem fertur, (ex quo pulli origo est) alter ad luteum uelut umbilicus. Die iam decimo pullus totus perspicuus est, & mēbra omnia patent: caput grādius toto corpore, oculi capite reliquo gtandiores hērent: quippe qui fabis maiores per id tempus emineāt, nigri nondum cum pupilla: quibus si cutem detrahas, nihil solidi uideris, sed humorem candidum frigidumque admodum refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud: ita oculi & caput. Iam uero & uiscera eo tempore patent: & alui intestinorumque natura perspicua est. uicesimo die iam pullus, si quis putamine secto sollicitet, mouet intus sese, pipitque aliquantulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties ultra uicelimum exclusio protelatur. Iam per id tempus pullum ipsum multum humoris lutei subit, atque in eius aluo aliquid sublidit luteum, quo uidelicet adhuc nutritur. Excrementum etiam album eodem tēpore pullus emittit, & in aluo quiddam album consistit. Demum uitellus paulatim absorbitur totus mēbrorū haustu, ita ut si pullo decimo die post excluso rescindas aluum, nōnihil adhuc uitelli comperias. Initium nanque suæ generationis pullus à candido

DE DIFFERENTIIS

sumit, cibum à luteo capit & incremētum, ut modo diximus: ita enim pul-
lum qui in ovo nascitur, uti luteo existimandum est, ut fœtus in uiuiparis
sua parente utitur quandiu intra parentem continetur. Incubat aquila tri-
cenis diebus: & cæteris quoque magnis alitibus tempus incubandi tantū-
dem à natura statutum est, ut anseri & tardæ: mediocribus uiceni perficiūt
incubationem, ut accipitri, miluo. Et auium quidem ortus ad hunc modū
ex ovo agitur. Sed euidentiora hæc in auctioribus auibus sunt: nam in mi-
noribus obscura præ sua exiguitate habentur. Excludunt celerius incubā-
tes æstate quàm hyeme: ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die fœtum ex-
cludunt, hyeme aliquando uigesimo quinto. Discrimen tamen & auū est,
quòd aliæ magis aliis fungi officio incubandi possunt. Incubat magna auū
pars, fœminæ mare succedente: aliqui mares incubandi munus tantisper
iubeunt, dum fœminæ intermisso incubitu cibum quærunt. anserum &
cornicum fœminæ tantum incubant. Quæ in lacubus paludibusue uictum
sibi quærunt, omnes iuxta paludes ipsas, & locis herbam habentibus nidos
faciunt, ut dictum est: quo fit ut occupatæ negotio incubandi possint su-
mere cibum, nec omnino inedia laborent. Sunt quædam, ut in genere gal-
linarum, quæ pariant gemina omnia: ex iis quædam duodeuiginti peperit,
exclusitque gemina, præterquam si qua essent, ut fit, irrita: sed qui fœtus ge-
mini excluduntur, ita prodeunt, ut alter sit maior, alter minor: & tandem
in monstrum partus degenerat, qui minor nouissime prouenit. Deprauan-
tur quædoque oua, & fiunt quæ urina & canicularia uocantur, uitello cor-
rupto, tēpore potius calido, ut æstate. Multiparis hoc accidit frequētius &
uncunguibz: quanuis parū fœcundis, nihilominus tamen idē euenit: sæpe
enim uel alterum ex duobus urinum fit, uel tertium semper fere. Aues ma-
gna ex parte anniculæ nequeunt generare. Quibus partus numerosior est,
unū saltē ex pullis sæpe nido expellunt. & omnes fere alites quibus unguēs
adunci, pullos cum primū prouolandi facultas fuerit, nido expellunt, per-
cutiētēsq; cogunt discedere: & cæteræ quoq; aues maxima sui parte idē hoc
faciunt: cūmq; enutrierint, nihil præterea adhibent curæ, excepta corni-
ce, quæ aliquandiu prouidet. Aues ad hunc modū coeunt, gestāt & pariunt.

1 Quo pacto perficiatur pullus in ovo, pluribus uerbis atque apertius ostendit A-
ristor. lib. 6 histor. animal. 2 Non cor, ut Aristoteles, sed iecur primum in anima-
lium generatione formari sentit Galenus: id quod in uiuiparis & in homine maxime
explicat aperte: sed in ouiparis minime. 3 Ipsum animal, inquit Plinius, ex albo li-
quore oui corporatur: eibus eius ex luteo. 4 Locus hic Aristotelis aliter fortasse
reddi potuerat, ut infra explicabitur in gallinaceo genere. 5 Οὐρετα ἢ κωδόνες, sunt
urina, ut Plinius uult, oua a incubatione derelicta.

De uictu auium & de loci mutatione earum. Cap. CXXII.

*Καρνιωτά,
σπερμιφύλα.*

*Σκαλκεφύ-
λα.*

Λεπτοφύλα.

IN auium genere, quibus unguēs adūci, omnes carniore sunt: fruges au-
tem ipsæ etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera aquilarū
omnia, milui, accipitres: sunt tamen etiam in genere nō adunco, quæ carne
uescantur, ut hirundines: aliquæ uermiculis partim ex toto, partim magna
ex parte aluntur, ut fringillarum genera: aliæ spinā appetunt, & inter spi-
nas

- A nas uicitant: uermem autem & quoduis animal aspernantur, ut spinus & carduelis. item qui auriuinctis appellatur: atq; hæc omnia uicitant in spinis, & dormiunt pascunturque eodem in loco. Aliæ uermiculis formicisue in lignis degentibus gaudent, nec alio magis quàm eius generis animalculorum uenatu uiuunt: ut pipo tam maior quàm minor. Aliæ frugibus uiuunt: ut palumbes, columbus, turtur. Nōnullæ etiam aues omniuoræ sunt, ut cornix. Omnium fere auium alia uictum à terra petunt, alia à fluuiio & lacu, alia à mari: & harum, quæ palmipedes sunt omnes in ipsa aqua partem maximam temporis uersantur. Multæ etiam fidipedes prope aquas paludescitque degunt: earumque nonnullæ terra contemptis altilibus uescuntur, quæ scilicet carnem non tangunt. Palmipedum grauiore circa lacus & amnes uersantur, ut olor, anas: omnes uero palmipedes apud mare, aut fluuios, aut lacus. Aues aduncæ, tum cætera animalia, tum aues aggrediuntur: sed non sui generis carniuoræ sunt modo piscium, qui plerunque sibi cognatos rapiunt: nulla autem auis, quanuis etiam carniuora, sui generis aliam deuorare solet. Genus auium cum omne potu exiguo contentum sit, tum aduncis nullis omnino usus bibendi est, præterquam paucissimis quibusdam, quæ & ipsæ raro utuntur, qualis potissimum tinnunculus est: miluus etiam uisus est bibere, quamquam raro: cæteræ aues bibunt quidem, sed parum. Auium alia forptu bibunt: sed quibus collum est longum, intermitunt caputque resupinat. porphyrio unus morfu bibit. Loca uero in quibus degant agrestes uolucres, aptissime ad uictum & prolis salutem moliantur. Colunt alia loca fragosa & saxa: alia cauernas, ut qui charadrias appellatur: sunt quæ montes colant & syluas, ut upupa, brentus: trochilus fruteta incolit & foramina. Viuunt apud mare, & flumina, & lacus palmipedes omnes, ut dictum est: sed multæ etiam fidipedes circa aquas paludescitque degunt. Loca mutare quandoque solent aues nonnullæ: imbecilliores nanque hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore poriantur: æstiuo autem repetunt montes, ut æstu careant. Sæper quæ imbecilliores sunt, prius utrauis ratione discedunt: coturnices enim Augusto, grues uero Septembri mense incipiunt. Sunt profecto omnes pinguiore, quæ de locis discedunt frigidis, quàm quæ de calidis: ut coturnices autumno quàm uere sunt pinguiore. fit autem ut simul de locis frigidis & tempore calido discedatur.
- D Auium complures conduntur, non ut aliqui putant, pauca: nec omnes ad loca tepidiora abeunt: sed quibus loca eiusmodi sunt uicina solita sedis, iis eò secedere libet: ut miluos & hirūdines agere animaduersum est. Quæ autem procul locis eiusmodi morantur, non mutant sedem, sed se ibidē condunt: iam enim uisæ sunt multæ hirūdines in angustis conuallium nude atque omnino deplumes: milui etiam de eiusmodi locis euolasse, cum primo apparerent, uisum est. quædam uero auium genera semper apparent, nec loca mutant aut latent: & in iis præcipue quæ in urbibus solent uiuere, ut coruus, cornix. Itaque temporum magna est differentia auibus: perennes, ut columbæ: semestres, ut hirūdines: trimestres, ut turdi & turtures: & quæ cum sætum eduxere abeunt, ut galguli, upupa.

spinus φάσ
carduelis φάσ
auriuinctis φάσ
pipo φάσ
palumbes φάσ
columbus φάσ
turtur φάσ
palmipedes φάσ
fidipedes φάσ

Aues aduncæ
tinnunculus φάσ

Loca fragosa
saxa φάσ
cauernas φάσ
foramina φάσ
fruteta φάσ
montes φάσ

DE DIFFERENTIIS

De uocis discriminibus & coloris in auiibus.

Cap. CXXIII. E

Genus auium uocem mittere potest: & pleraque uocem copiose emittunt: & omnium maxime animalium post hominem conficienda locutionis nonnullis auium generibus datum est, ex iis uidelicet quibus lingua mediocriter lata uel tenuis. Quauis autem latiore habeant linguam quae unguibus sunt aduncis, tamen minores uocaliores sunt, magisque garulæ ac linguaciores: & circa coitum maxime talem fieri unquamque aue moris est. Et aliis in pugna uox, ut coturnicibus: aliis ante pugnam, ut perdicibus, dum suos aduersarios prouocant: aliis cum uicere, ut gallinaceis. Ca nunt item nonnulli mares perinde ut suæ feminae: sicut in lusciniarum genere patet: femina tamen cessat cantu, cum incubat, pullosque educat. Sed in nonnullis generibus cantus maribus tantum datus est, ut gallinaceis & F coturnicibus. Vox illa explanata, quam esse quasi locutionem dixeris, differt: quandoque etiam earum quæ eodem genere continentur: auicularum enim nonnullæ haud uocem eandem mittunt quam sui parentes, si prærepta paterna caruerint educatione, moribusque & cætibz cæterarum auium infuuerint. Lingua utuntur aues etiam ad sui sensus mutuam interpretationem: sed alia aliis amplius, ut in nonnullis uel usus docendi mutuus esse uideatur: iam enim luscinia modulos suos pullos docere, uersusque quos imitarentur, traderet uisa est. Immutantur aues nonnullæ per tempora & colore & uoce, ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & uocem mittit diuersam: turdus colorem mutat: palumbes hyeme non gemit. Denique tunc maxime plurimæque emittunt uoces, cum coeunt. Auium autem penè nullæ G per ætates mutantur, ut aliorum animalium pili, præterquam gruum, quas nigrescere in senectâ perspectum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent acriora, pennæ uolucrum interdum è nigris aut nigriusculis in albas transeunt: ut corui, passeris, hirundinis. Temporum quoque uicissitudine bona pars auium ita colore immutatur, ut quenam sint latere possint, nisi rem penitus noueris.

Ex incessu auium & uolatu differentia, atque ex ualetudine moribusque.

Cap. CXXIIII.

Alias pendentesque.

Omnibus animalibus reliquis certus & unius modi in suo cuique genere incessus est: aues solæ uario meatu feruntur, & in terra & in aere. Ambulant aliquæ, ut cornices: saliant aliquæ, ut passerces, merulæ: currunt, H ut perdices, rutilculæ: ante se pedes iaciunt, ut ciconiæ & grues. Expandunt alas, pandentesque raro intervallo quatunt, alia crebrius, sed & primas duntaxat pennas: alia & tota latera pandunt. Quædam uero maiore ex parte compressis uolant percussioque semel, aliquæ & gemino ictu aere feruntur, uelut inclusum eum prementes. Iaculantur sese in sublime, in rectum, in prouum. Impingi putes aliquas: aut rursus ab alto cadere has, illas salire. Anates solæ, quæque sunt eiusdem generis, in sublime protinus sese tollunt, atque è uestigio cælum petunt, & hoc etiam ex aqua. Vultur & fere grauiores, nisi ex procursu aut altiore tumulo immissa non euolant. Sine uoce

A uoce non uolant multæ, aut è contrario semper in uolatu silent, subrectæ, pronæ, obliquæ, in latera, in ora: quædam & resupinæ feruntur, ut si pariter cernantur, plura non in eadem natura mearè uideantur. Iterum auium alix uolaces, quæ scilicet alis grandibus atque ualidis sunt, ut quæ ungues habent aduncos & quæ carne uescuntur: sed non modo quæ aduncis sunt unguibus, uerum alia quoque uolucrum genera uolatu superant, uidelicet ea quæ pernicitate uolandi sese tuentur, uel loca mutare solent. Sunt quæ non uolaces sed graues sint, quibus uita terrena est, & aut fruge uiuunt aut natant, & apud aquas immorantur. Quæ longis cruribus innituntur non admodum uolaces fere sunt, & in uolatu porrectis cruribus in aërem uolant: sicuti & alix omnes quæ caudam pusillam gerunt, ut palmipedes. At alix, quibus scilicet (ex iis quæ pedes habent fissos) crura breuia sunt, hæc ad uentrem contractis cruribus uolant. Quæ longo sunt collo, si id crassius habent, uolant collo porrecto, ut olor, anser: si tenue; collo curuato feruntur, ut ardeola. Calcarigeræ præ sua grauitate sunt ad uolandum ineptiores. Corpora unguium exigua sunt exceptis alis: contra quæ uolaces non sunt, iis corpora euadunt in molem grandiore: atque ita efficitur, ut sint grandiores. Magnitudinem tamen auium minimam esse prope dixerim, si ad alia respicias animalia, necesse est. Quod uero ad ualitudinem attinet, auius profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum etiam ad partum, & præcipue palumbis: incommodi autem his anni pluuij sunt: quippe cum auium natura sit, ut ne bibere quidem largius possint sine detrimēto. Cum aues ægrotat, plumæ indicium præ se ferunt: turbantur enim, nec posituram eandem seruant quam habent cum recte ualent. Aduersus improbitatem alitum depascentium semina alium, inquit Plinius, quod in aruis sponte nascitur, (alum hoc uocant) coctum ne renasci possit, abiicitur: statimque quæ deuorauere aues, stupentes manu capiuntur. Mores auium ita habent, ut alix sese in puluere uoluent, alix sese lauent, alix nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quæ non altiuolæ sunt, sed in terra uersantur, ut gallina, perdix, phasiana, lotrices nonnullæ rectungues, & quæ circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. Alix utrunque tum lauare tum puluerare solent, ut columbus, ut passer.

D Eorum quæ in auius alimentum medicamentum rationem ob-
tinent, discrimina. Cap. CXXV.

Auium genus omne carnem habet, quæ si cum quadrupedibus conferas, & minus præstat alimentum, & facilius concoquitur: maxime uero perdicis, attagenis, columbæ & gallinæ. Turdorum autem caro merulorumque & auium ipinutarum (in quibus sunt qui uocantur) durior est: quibus etiam durior, turturis, palumbi & anatis caro est. Phasianorum autem, quod ad alimentum rationem attinet, gallinacæ carni similis est: sed suauitate præstat. pauis durior, fibrosior, concoctumque difficilior est. Perdix tamen & turtur, atque aliq id genus (si qua illis inest durities) cum uel uno die mortuæ asseruentur suspensæ, duriciem illam reiciunt, fiuntque

friabiles omnino: & sanguinem procreant crassitie tenuitatēq; mediocrē. E
 Probum gignit succum auium fere omnium caro: earum tamen non par-
 ua existit differentia, quod in montibus locisque siccis degant: aut in flumi-
 nibus, stagnis, paludibus, lacustribusue locis uicē tē: pro locorum nanque
 ratione sicciores sunt carnes, excrementisq; magis uacuae, & ad conco-
 ctionem faciliores: aut contra, humidæ excrementosæq; & concoctu dif-
 ficiliores. Itaque probum succum faciunt, ut gallinaceum genus, ita & pha-
 siani, perdices, attagenes, columbæ, merulæ, turdi, turtures, atque auicularū
 genera. Excrementosa autem & deterrima earum caro quæ lacustribus pa-
 lustribusque locis ac fluminibus immundis & turbidis degunt. Alarum
 substantia in iis auibus quæ paruæ sunt & duræ fibrosa duraque est: at pin-
 guium iuniorūque auium facile concoquuntur, & optimæ sunt: sicuti F
 annosarum graciliorūque pessimæ. Viscera auium eandem habent ad
 carnes proportionem, quā quadrupedibus diximus. Intestina omnium fe-
 re ad cibum sunt incepta: at uentriculi & manduntur & corpus nostrum
 alunt: sunt autem crassi durique & concoctu difficiles: qui tamen abunde
 nutriunt, si probe fuerint concocti: nonnulli uero ex iis sapore sunt suauis,
 ut anserum & altium gallinarum. Cerebrum ex auibus longe præstantius
 est quàm ex quadrupedibus, ut quod siccius est, præsertim si montanæ a-
 ues fuerint, quæ palustribus longe melius habent cerebrum. Oua cibos
 quot modis iauent notū est. Nullus est alius cibus, inquit Plinius, qui in æ-
 gritudine alarum neque oneret: simulq; uini usum & cibi habeat. Oua optima
 sunt gallinarum & phasianarum: anserum uero & struthocamelorum de-
 G
 teriora. Oua quo recentiora eo præstantiora, sicuti quæ uetustissima eadem
 & pessima sunt: quæ uero ætate media sunt, proportionē recessus ab extre-
 mis bonitate aut succi prauitate inter se differunt. & quæ oblonga sunt ova
 gratioris saporis putat Horatius Flaccus. Ad concoctionem, digestionē,
 nutritionem, bonique succi generationem præstant, quæ *σφατὰ*, id est tre-
 3
 mula uocantur, quæ scilicet cocta quidē sunt, sed modice: quæ uero *φοφάτὰ*,
 id est sorbilia dicuntur, in aqua duntaxat excocta, liquida adhuc & mini-
 me coacta densataque, minus quidem nutriunt, sed alium magis mouent,
 ac gutturis asperitates, gulæque, nec minus uentriculi intestinorum atque
 uellicæ leniunt: stomachum tamen languidum subuertere solent. Quæ au-
 4
 tem diutius cocta duriora quadunt, crassiorem ea procreant succum: diffi-
 ciliusque concoquuntur, & tardius permeant: longe his duriora sunt ac tar-
 dius permeant, quæ in feruenti cinere uehementē assantur. Omnium deterri-
 ma sunt, quæ in sartagine spissantur: unde & *τρυγαννὰ*, id est frixa appellatur,
 malum nanque procreant succū, crassum atque excrementosum nidorosumque,
 & qui reliquū quoque cibū in uentriculo corrūpat. Quæ *μυαλὰ* uocantur,
 hoc modo parari solent: oua ubi oleo, garo ac uino modico fuerint imbu-
 ta, in duplici uase supra ignem modice crassescunt. Hæc & elixis & assis
 meliora sunt, si ad modicrem crassitiem peruenerint: nam & probum
 generant succum, & facile concoquuntur. Hic consistētia modus in iis etiā
 ouis seruandus est, quæ superne aldariis infunduntur: ne scilicet nimium
 crassescant,

Oua.

*τρεμουτὰ,**Tremula.**Oua sorbilia,**φοφάτὰ.**Tardius per-**meant, & quid-**am.**Oua frixa,**τρυγαννὰ.**Oua μυαλὰ.*

A crassescant, sed dum adhuc liquida sunt, uas ab igne sum mouendū. Ouum si edatur in aceto coctū alui fluxiones desiccant: quod si austeri quippiam ouis addideris (quale rhus est, aut galla, aut balaustium, aut id genus aliud) & super prunas frixeris, efficacius sit medicamentū: & ad dysentericos hoc modo cœliacosq; affectus efficacissime datur. Maceratorum in aceto moliri diximus putamen: talibus cum farina in pane subactis, cœliaci recreantur. Quidam ita resoluta in patinis torrerī utiliū putant: quo genere non aluos tantum, sed & menses fœminarum sistunt: aut si maior sit impetus, cruda cum farina ex aqua hauriuntur. Et per se lutea ex his decocta rursū in aceto, donec indurescant, iterūque cum trito pipere torrentur ad cohibendas aluos. Fit & dysentericis remediū singulare ouo effuso in fictili nouo, eiusdēque oui mensura, ut paria sint omnia, melle, mox aceto, item oleo, confusis crebrōque permixtis: quo fuerint excellentiora, hoc præsentius remedium erit. Alij eadem mensura pro oleo & aceto resinā adiciunt rubentem, uinūq; & alio modo tēperant, olei tantum mensura pari, pineisq; corticis duabus sexagesimis denariorum, unā eius quod rhus dicimus, mellis obolis quinq; simul decoctis, ita ut cibus alius post quatuor horas sumatur: ad puris & sanguinis excreationes ouum crudum cum porri sectiui succo parīque mensura mellis Græci calefactū hauritur. Ouo quoque toto crudo utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium māmārumque phlegmonas, & quæ in partibus neuolis contingunt, ut cubito & digitorum tendinibus, siue in manibus siue pedibus existant. Et ambustionibus, si statim imponatur, prodest, siue cādīdum oui solum molli lana exceptum, siue etiam cum uitello quis imponat: mediocriter namque refrigerat ouum, & citra erosionem desiccant. Cādīdum oui ægre concoquitur: tēperatura modice frigidum est, & mordacitatis experts atque emplasticum: ophthalmiis, sedisq; ac pudendorum ulceribus medicamentum est idoneum: ambustionibus innasce pustulas non sinit, si quamprimū eo perungantur: faciem à solis uestione tueretur: frōti impositum, cum thure fluxiones arceat: inflammationes oculorum lana exceptū, addito rosaceo, melle & uino mitigat. Crudum contra hæmorrhoidis serpentis morsum: tepidū uero ad uesicæ rosiones renūmq; ulcerationes datur: ad asperæ quoque arteriæ scabritiem, sanguinis reiectionem, distillationes, thoracisq; fluxiones. Mi-

D ssectur quoque medicamentis sanguinis profluuium ex cerebri membranis quas meningas uocant, supprimentibus: & ad ulcera malefica, cum iis quæ absque erosione exsiccant: qualia sunt pompholix et metallica quædā elota. Vitellus quoque natura simili est: misceturque ceratis immordacibus, & cataplasmatibus quæ phlegmonas mitigēt, ouis uidelicet aut elixis aut assis: sed paulo exsiccantior sit assatus: quantumque siccitatis hoc modo habeat, tantum mitigatoriæ facultatis amittit. Luteum oui, inquit Dioscorides, oculorum doloribus utile est. assūm sedis inflammationibus prodest cum croco & rosaceo: & condylomatis cum meliloto: cum rheo culinaria aut galla in sartagine frigitur: & in cibo aluum sistit: ad idem quoque per se offertur. Prodest tussientibus, inquit Plinius, per se luteum deuorātū li-

DE DIFFERENTIIS

quidum, ita ut dentibus nō attingatur: thoracis distillationibus & faucium E
scabritie. Stomachum dissolutum cōfirmat pulli ouorum, gallæ dimidio:
ita ut ne ante duas horas alius cibus sumatur. Dāt & dysentericis pullos in
ipso ouo decoctos, admixta uini austeri hemina, & pari modo olei polen-
tæq; . Membrana putaminis detracta siue crudo siue cocto, labiorum fissu-
ris medetur: putaminis cinis in uino potus, sanguinis eruptionibus. combu-
ri sine membrana oportet: sic fit & detifricium . Firmitas putaminum tan-
ta esse traditur, ut nec ui nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum in-
flexa rotunditate. Et ne quid desit ouorū gratiæ, cādūm ex his admixtum
calci uiuæ glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum
ouo non ardeat: ac ne uestis quidē contacta aduratur. De gallinarum autē
ouis fere tantum locuti sumus, cum & reliquarum alitum restant magnæ F
utilitates, sicut suis dicemus locis. Adeps auium nonnullarū, ut anserinus
& gallinaccus, recēs & sine sale cōditus, uulua uitiiis prodest: sale inuetera- 6
tus, & qui temporis diuturnitate acrimoniā contraxit, uulua inimicus est.
Fel auium siccus atque acrius est, quā sit quadrupedum.

*Ἀπυλά & α.
Mollia.
Ἀνζυκαλιος.
ἐκ ἑφ & θη.*

1 Hoc in loco πρῶτον, ni fallor, passeres uocant Galenus & Oribasius: nec secus
Aëtius in Galerita. 2 Horatius, Longa quibus facies ouis erit, illa memēto Vr succi
melioris, &c. 3 Hæc Dioscorides ἐκ ἀπυλά, id est oua mollia uocat. 4 Ἀνζυκαλι-
ος hæc uocat Sethus, nisi mendosus sit codex. 5 Caldariis infunduntur, Hæc ἑφ & θη
uocat Sethus. 6 Auiū adeps quo pacto curari reponiq; debeat, docēt Diosc. & Plin.

De auium generibus quæ fillos pedes habent: & primo,
de gallinaceo genere. Cap. CXXVI.

*Fidipedes.
Digitata.
Ἰχθυόπιδες.
Gallinarum
genera.
Gallina,
Ἀλακτρίς.
Gallus galli-
naceus.
Gallinaceus.
Capui.*

VOlucrum prima distinctio pedibus maxime constat: aut enim digitos
habent fillos, dicūtūq; fidipedes, aut in palmipedum genere sunt, uti
modo diximus. Inter fidipedes uero, gallinarū plerunque agricolæ cura so-
lennis est. earum genera sunt, uel cohortalium, uel rusticarum, uel Africa- 2
narum: cohortalis est auis quæ uulgo per omnes fere uillas conspicitur: &
ex tribus hisce generibus, hæc propriæ appellantur gallinæ: mares autē gal- 3
li, semimares capi, qui hoc nomine uocantur cum sint castrati libidinis ab-
olendæ causa. Cum cæteræ aues cristam gerant pennarū eminētia quadam
extructam, gallinaceus unus peculiarem sibi sortitus est cristam: sic enim
instituta, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino aliena. Ingluuiē ha-
bet gallinaceum genus præpositam uentriculo, & appendices quasdā pau-
cas infra, quā definit intestinum. Coeūt & pariunt gallinæ omni fere tem-
pore: toto enim anno præterquam duobus mensibus brumalibus pariunt.
Inhorrescunt à coitu, & se excutiant: sæpe etiam festuca aliqua sese lustrāt,
quod edito ouo interdum faciunt. Magna est generosarum nonnullis fœ-
cunditas: quando oua uel sexaginta edunt ante incubitum: quanquam ge-
nerosæ minus fœcundæ quā ignobiles uulgarēs uel sunt. Nonnullæ enim
è cortalibus bis die pariunt. Iam aliquæ in tantum copiarū peruenerunt, ut
effictæ breui morentur. Hadrianis laus maxima. Hæc paruo quidem sunt
corpore, sed quotidie pariunt: ferociunt tamen, & pullos sæpe interimunt:
color his uarius. Ouum gallinæ cōsistit à coitu, & perficitur decem diebus
magna

*Gallina ha-
driana.*

Amagna ex parte. Gallinarum iuvenæ pariunt primæ, statim uere ineuntei & plura quàm ueteres, sed minora. Sunt in genere gallinarum quę pariunt gemina omnia (gemina uoco, quę binis cōstant uicellis:) quędā enim duodeuiginti peperit, exclusitq; gemina: præterquam si qua essent (ut sic) irrita.

4 Cæteris itaque geminis sætus prodijt: sed ita gemini excluduntur, ut alter sit maior, alter minor: & tandem in monstrum degeneret, qui minor nouissime prodijt: aliqui negant omnino geminos excludi. Pariunt autē gallinæ oua nonnulla infæcunda, uel eorū quę conceperint coitu: nullus enim prouenit ex eis sætus, quanuis incubitu foueantur. Oua plena sint atq; utilia nec ne, animaduerti aiunt posse, si demiseris in aquam: quòd inane, natat: plenum, desidit. Qui (ut hoc intelligant) concutiunt, errare: quòd in eis

B uitales uenas confundunt: quo fit ut non gignant, cōfusus scilicet uitalibus uenis. In iis idē aiunt, cum ad lumen sustuleris: quòd perlucet, id esse inane. Oua quę incubantur, si habeant in se semen pulli, curator quatrduo postquam incubari cœperint, intelligere potest: si enim contra lumen cacumine ouorum apprehenso, purus & unius modi perluceat color, stérilia existimantur esse, pròque eis alia substituēda. Gallinas quę incubare uolūt (glo-

Gloccientes.

5 Numerus autem ouorum quę subiiciuntur (ut præcipit Columella) impar obseruatur, nec semper idem: nam primo tempore, id est mense Ianuario (sere enim cum primū partum consummauerint, gallinæ incubare cupiūt ab idibus Ianuariis) quindecim, nec unquā plura subiici debēt: Martio decem & nouem, nec his pauciora, unū & uiginti Aprili. Tota deinde æstate usque in cal. Octobris, totidem: postea superuacua est huius rei cura, quòd frigidibus exclusi pulli plerunque intereant. Plerique tamen etiam ab æstiuo solstitio non putant bonam pullationem, quòd ab eo tempore etiam si facilem educationem habent, iustum tamen nō capiunt incrementū: tantòque minus, quanto serius prouenere: uerum suburbanis locis, ubi à matre pulli non exiguis pretiis ueneunt, nec plerūque intereunt, probanda est æstiuæ educatio. Diebus quibus animantur oua, & in speciem uolucrū cōformātur, ter septenis opus est gallinaceo generi. Verū celerius excluduntur calidis diebus: ideo æstate undeuicesimo die aut duodeuicesimo educūt sætum: hyeme uero aliquando uicesimo quinto. In gallinaceo genere

D tribus tantū datur cātus. Hi, ut inquit Plinius, nostri uigiles sunt nocturni, quos excitandis in opera mortalibus rumpendòque somno natura genuit. norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdiu cantu. Cum sole eunt cubitum, quartaque castrensi uigilia, ad curas laborēque reuocāt: neque solis ortum incautus patiuntur obrepere: diēmque uenientem nuntiant cantu: ipsum uero cantum plausu laterum. Imperit suo generi, & regnum in quacunq; sunt domo, exercent: dimicatione paritur hoc quoq; inter ipsos, nec finis sæpe commorientibus. Quòd si palma cōtingit, statim in uictoria canunt, seque ipsi principes testantur: uictus occultatur silens, ægrēque seruitium patitur: nec in pugna aut ante pugnam canūt, sed cum uicere. Gallinæ quoque cum mares uicere, cucuriunt: & præterea ex p̃lo marium ten-

Id est hora tertia post mediā noctem: ex Vegetio lib. 3.

Cucuriunt, xerxi 201.

DE DIFFERENTIIS

tant superuentu coire: crista etiam caudaque erigitur: ita ne facile præter-
 ea sit an fœminæ sint cognoscere: nonnunquam etiam calcaria parua iis e-
 nascuntur. Iam uero & mares uisi nonnulli sunt, qui cum forte fœmina in-
 teriisset, ipsi matricis officio fungerentur in pullos ductando, fouendo, edu-
 cando, ita ne de cætero uel cucurire uel coire appeterent. Quin & iam inde
 à primo ortu naturæ ita nonnulli mares effœminati proueniunt, ut neque
 cucuriant, neque per coitum agere uelint, ac uenerem eorum qui tentant
 superuenire patiantur. Desinunt etiam canere castrati: gallos enim castrât,
 ut sint capi libidinis abolendæ causâ: quod duobus fit modis, lumbis adustis
 candente ferro, aut imis cruribus, calcaribusue, mox ulcere, dum consane-
 scant, oblito figlina creta: facilius ita pinguescunt. In hoc uillatico genere,
 qui procera corpora & animos ad prælia pertinaces requirunt, iis præcipue
 Tanagricum genus & Rhodium probant: nec minus Chalcidicum & Me-
 dicum (quod ab imperito uulgo litera mutata melicum appellatur) qui si-
 ne dubio sunt pulchri, & ad præliandum inter se maxime idonei, sed ad
 partus sunt steriliores: nam Rhodij generis aut Medici propter gravita-
 tem neque patres nimis salaces, nec fœcundæ matres. & Rhodiæ aues ne
 suos quidem fœtus commode nutriunt, tantum abest ut alienos, ceu pa-
 uoninos excludant. Tanagrici plerunque Rhodiis & Medicis amplitudi-
 ne pares, non multum moribus à uernaculis distant, sicut & Chalcidici.
 At quibus cordi est industrij patrisfamilias uestigal instituire, mercari cer-
 te nisi fœcundissimas aues non expedit. Eæ sint rubicundæ uel fuscæ plumæ,
 nigrisq;ue pennis, ac si fieri poterit, omnes huius & ab hoc proximi coloris
 eligantur: sin aliter, cuitentur albæ, quæ fere cum sint molles ac minus ui-
 uaces, tum ne fœcundæ quidem reperiuntur: atque etiam conspicuæ sunt,
 propter quod insigne candoris ab accipitribus & aquilis sæpius abripiun-
 tur. Sint ergo matricæ probi coloris, robusti corporis, quadratæ, pectorosæ,
 magnis capitibus, rectis rutilisque cristulis, interdum geminis, albis cruri-
 bus, ore rubicundo, & sub hac specie quàm amplissimæ, nec paribus ungu-
 lis: generosissimæque creduntur quæ quinos habent digitos, sed ita ne cru-
 ribus emineant transuersa calcaria: nam quæ hoc uirile gerit insigne, con-
 tumax ad concubitum dedignatur admittere marem, raroque fœcunda, e-
 tiam cum incubat calcis aculeis oua perfringit. Gallinaceos mares nisi fa-
 cilissimos habere non expedit: atque in his quoque sicut in fœminis, idem
 color, idem numerus unguiû, status altior queritur: sublimes sanguineæq;
 nec obliquæ cristæ, raudi uel nigricantes oculi, breuia & adûca rostra, ma-
 ximæ candidissimæque aures, palæ ex rutilo albicantes, quæ uelut incanæ
 barbæ dependent: iubæ deinde uariæ, uel ex auro flauæ per colla ceruicisq;
 in humeros diffusæ: tum lata & musculosa pectora, lacertos æque similes
 brachiis, alæ tum procerissimæ, caudæ duplici ordine, singulis utrinque
 prominentibus pinnis inflexæ: quin etiam uasta fœmina & frequenter hor-
 rentibus plumis hirta, robusta crura nec longa, sed infestis uelut sudibus no-
 center armata. Mores autem quauis non ad pugnam neque ad uictoriæ
 laudem præparentur, maxime tamen generosi probantur, ut sint elati, ala-
 cres,

Capi.

*Tanagrici galli.
 Rhodij gallina-
 cæ.
 Chalcidici galli.
 Medici galli.
 Melici galli.*

*Gallinæ fœ-
 cundæ.*

*Plinius, Super
 quatuor digi-
 tos transuer-
 so uno.*

*Gallinaceus,
 Vnguibus lō-
 gis, inquit Var-
 ro.*

*Varro. Caudis
 magnis & fre-
 quentibus pin-
 nis.*

Acres, uigilaces, & ad sapius canendum prompti, nec qui facile terrecantur: nam interdum resistere debent, & protegere coniugalem gregem: quin attollentem minas serpētem, uel aliud noxium animal interficere. Talibus autem maribus quina singulis fœminę comparantur: cum Rhodij generis aut Medici ternę singulis maritentur. Tanagrici plerunq; Rhodiis & Medicis amplitudine pares non multum moribus à uernaculis distant, ut dictum est, sicut & Chalcidici: omnium tamen horum generum nothi sunt optimi pulli: nam & paternam speciem gerunt, & salacitatem fœcunditatēque uernaculam retinent. Pumiles aues, nisi quæ humilitas earum delectat, nec propter fœcunditatē, nec propter alium redditum nimium probo, inquit Columella, tam herculē quā nec pugnacem nec B rixosę libidinis marem; nam plerunq; ceteros infestat, & non patitur iniri fœminas, cum ipse pluribus sufficere non queat. Quod ad gallinacci generis morbos attinet, pituita iis nasci solet, quę alba pellicula *Pituita.* linguam uestit extremam. Id porro uitium maxime nascitur, cum frigore & penuria cibi laborant aues: item cum per æstatem consistens in cohortibus aqua potatur; item cum ficus & uua immatura, nec ad satietatem permilla est. Sub oculis etiam illis grana ipsa præcedunt, quę nisi aculeuiter apertis pelliculis auferantur, extinguunt. Pediculis quoque infestantur & cruditate, & à suo leduntur stercore, quod cum pedibus uncis adhæsit, podagram creat. Caro gallinacea facile concoquitur, & probū gignit succum, neque crassum, neque tenue, sed mediocrem: idq; tam ex mare C quā ex fœmina. Gallinacę carnis usum iis quibus ratione uictus tenui opus est, exercitatis quidem non prohibeo, inquit Galenus, præsertim earū quę in montibus fuerint educate: at qui se non exercent, iis gallinacę carne minus utendum est: aliis tamē gallinarum uel in tenui uictus ratione uesci licebit: quanquam neque uiscera neque gallinaceorum testes huic diætę sunt idonea. Dissectę gallinę & adhuc calentes appositę serpentū moribus auxiliantur, quas tamē subinde mutare oportet: ius quoque ex iis potum præclare medetur, & in multis aliis usibus mirabile. datur in stomachi ardoribus. Aluum soluit, inquit Plinius, ualidius è uetere gallinacço. 9 Gallinarum iuniorum ius simplex (uti docet Galenus) ad temperanda humorum uitia datur, sicuti ueterum gallinaceorum alui subducendę gratia. 10 D Coquere autem eos oportet cum sale diutissime: aliqui incoquunt brassicam marinam, mercurialem, enicum aut polypodium: crudos humores, crassos, lentos, melancholicos educit. Prodest longis febribus, asthmati, articulariis morbis, & stomachi inflationibus, (addit Plinius) torpētibus mēbris tremulisq;, & capitis doloribus, epiphoris, fastidiis, incipienti tetanismo, iocineri, renibus, uetice. ueneficiis ex mustela syluestri factis cōtrarium est ius gallinacę ueteris large haustum: peculiariter contra aconitum. Gallinarum gallinaceorumue cerebrum in uino bibendum datur ad serpentū morsus. (Parthi gallinę malunt cerebrum plagis imponere): sanguinē quoque à cerebri membrana profluentem sistit. Contra phalangiorum omnium morsus remedium est gallinacum cerebrum cum piperis exiguo potum

DE DIFFERENTIIS

in posca. Gallinarum, saltem altitium, uentriculi alimenti bonitate sua-
uitatēque reliquarum auium omnium uentriculos superant, præterquam
anserum. Quæ in gallinacei maris uentriculi parte interiore cornus duri-
riem habet membrana, eadem inter elixandum separatur. Hæc, inquit Dio-
scorides, membrana siccat, tritaque in uino stomachicis bibenda datur.
Ventrem gallinæ arefactum, inquit Galenus, si bibatur, stomachicos iuuare
nonnulli prodidere: id quod nos uanum esse comperimus. Gallinaceo-
rum uentris membrana, ut Plinius docet, inueterata & inspersa potioni, di-
stillationes pectoris, & humidam tussim uel recens tosta lenit, & membra-
nam è uentriculo gallinacei aridam, uel, si recens sit, tostam conteri & po-
tioni inspergi iubent ad calculos pellendos. Gallinaceorum testes & sa-
pore sunt suauis, & optimum gignunt alimentum, eorum saltem, qui sagi-
nati fuerint: mulroque maxime si ex lacte seroso alimenta illis præbeantur:
quippe qui & plurimum nutriunt, probumque generant succum, & conco-
ctu faciles sunt. Gallinaceorum testes subinde, si à cœceptu edar mulier, ma-
res in utero fieri dicuntur. Gallinacei dextrum testem arietina pelle adalli-
gatum, uentrem concitare: contra inhiberi uentrem pugnatoris galli testi-
culis anserino adipe illitis adalligatisq; pelle arietina tradunt. Adeps gal-
linaceus inter fuillum & anserinum mediam obtinet naturam. recens &
sine sale conditus uteri uitis prodest: sale inueteratus, & qui temporis spa-
tio acrimoniam contraxit uulæ inimicus est: conuenit & ad laborum ri-
mas, & contra aurium dolores. laudant & gallinarum adipem contra pu-
stulas in papillis: has scilicet eius rei gratia saginant. Adiuuat mirifice & ru-
ptas oculorū tunicas admixtis schisto & æmatite lapidibus. Fel ad me-
dicinæ usum præcipuum est gallinarum & perdicum. Gallinacei fel alliga-
tur ad argema & ad albugines ex aqua dilutum: item ad suffusiones oculo-
rum, maxime candidi gallinacei. Laudant & gallinæ fel contra pustulas in
papillis. Gallinaceum fimum ex aceto strumas discutit: carbunculos perrū-
pit cum melle, lini semine & oleo subactum: igni quoque ambustis medet-
ur. Gallinaceum fimum duntaxat candidum in hyssopo decoctū aut mul-
so, uenena fungorum boletorumque adstringit: item inflammationes ac-
strangulatus, quod miremur, cum si aliud animal gustauerit id fimum, tor-
minibus & inflationibus afficiatur. Alopecias celerime explet gallinarum
fimum recens illitum. Fimum quoque gallinaceorum duntaxat rubrum
lusciosis illinendum monstrant. & fimum gallinarum duntaxat candidum
in oleo uetere corneisq; pyxidibus adseruant ad pupillarum albugines.
Non præteribo miraculum, inquit Plinius, quanquam ad medicinam non
pertinens: si auro liquefcenti gallinarum membra misceantur, consumunt
illud in se, ita hoc uenenum auri est: at gallinaceis ipsis circulo è farmentis
addito collo, nō canunt. De uillaticis gallinis, quoniam uel nimium dictū,
breuitate reliqua compenso.

*OEsophoro
leridum apud
Plinium.*

*Ἀλακτῶν,
Ἀλακτῶν, ἢ
ἔρις.
Ἀλακτῶν,*

1 Fidipedes, χελιδόνες: digitatas uocat Plinius. 2 Cohortales uillaticæ etiā di-
cuntur à M. Varrone. 3 Gallos gallinaceos ἡλακτῶνους & ἡλακτῶνες Græci uocant:
gallinas uero ἡλακτῶνίδες ἢ τῆς ὀρνίθου: & ἡλακτῶνιδες Aristophanes ludēs in comæ-
dia

A dia dixit & ἀλλοφύωνε utrunque continere: inuenias, & pro maribus ἀλλοφύωνας accēptas. Hæc fere Hermolaus. 4 Cæteris itaque. Ita locū hunc reddidit nobis Theodorus, uulgatam Plinij literā, ut uidetur, secutus, quæ ita habet. Et geminos sæpe excludunt, ut Cornelius Celsus author est, alterum maiore: alioqui negant omnino geminos excludi. Verus quoque Aristotelis interpret ex Arabico ita uertit ad eundē sensum. Er in quo libet inueniuntur gemelli: & unus gemellorum parus est, & alter magnus: & multoties est paruus monstruosus. Hæc ille: Græca uero Aristotelis exemplaria (nisi mendam subesse iudicemus) ita habent: τὸ μὲν οὖν ἄλλα γένημα, πάλιν δὲ τὸ μὲν μᾶλλον, & ἂν ἴσῃος γένεται ἢ τὸ διδύμου, & ἂν πλεονέσῃ τὸν ἄλλο: hoc est (ut ego arbitror.) Ex parteris itaque gemina fecunda sunt, nisi quibus hoc cōtingit, ut alter maior fuerit, alter minor: in iis enim tandē in monstrum degenerat qui minor nouissime prouenit. Vtra autem sententia fuerit uerior, indicabit experientia. Videtur certe Plinius uel ex professo cum Aristotele hæc in re minime conuenire: quando Celsus auctorem non Aristotelem eitet. Obiter & illud admonuerim, in quibusdam exemplaribus Plinianis haberi (uti recte annotauit Claymundus) non alioqui, sed aliqui negant omnino geminos excludi. 5 Oua quo pacto gallinis subiicienda sunt & pulli educandi, docent Columella & Varro. 6 Varro aduertes ealeatia ad infima crura usque dum rumpantur. Nec id patiuntur, inquit Columella, amissis genitalibus, sed ferro eandē te ealeatibus uisus. 7 Gallinæ Mediceæ, inquit Varro, primo dicebātur, quia ex Media propter magnitudinem erant allata, quæque ex his generatæ postea propter similitudinem. 8 Harum affectionum curationes ab iis perquirendæ, qui de uillaticis passionibus scripserunt, ut à Columella & Palladio. 9 Quod Galenus dixit, ὡδὴ ἀρεστὴν τῆς ἰσθμίας, Dioscorides, ἀπὸ τῶν ὡδὴ ἀρεστῶν χεῖρε φαρμακίῳ. alij aliter reddiderunt: iudicent lectores. 10 Gallinæ quomodo eoquendus est, ut iusculum efficiat ciendæ aluo idoneum, docent Dioscorides & Plinius.

De gallinis rusticis, Africanis, mecliagridæque & pauone.

Cap. CXXVII.

Rustica gallina uocatur, quæ non dissimilis uillaticæ per aucupem decipitur: eaque plurima est in insula quam nauet in Ligustico mari sitam *Gallina rustica*. producto nomine alitis, gallinariam uocitauerunt. Gallinæ rusticæ, inquit Varro, sunt in urbe raræ, nec fere mansuetæ sine cauea uidentur Romæ, similes facie non his uillaticis gallinis nostris, sed Africanis aspectu, ac facie incontaminata. In ornatibus publicis solent poni cum psitacis ac merulis albis: item aliis id genus rebus inusitatis. Neque fere in uillis oua ac pullos faciunt, (in seruitute enim non fœtant) sed in syluis. Africana est quam plerique Numidicam dicunt, meleagridi similis, ut sentit Columella, nisi *Gallina Africana Numidica*. quodd rutilam galeam & cristam capite gerit: quæ utraque sunt in meleagridæ cœrulea. Et gallinarum Numidicarum eadem est fere quæ pauonum educatio. M. autem Varro, Gallinæ, inquit, Africanæ sunt grandes, uariæ, gibberæ, quas meleagridas appellant Græci. Meleagrides in Bœotia pugnant, inquit Plinius, Africæ, hoc est gallinarum genus gibberū uariis sparsum plumis. Hæ nouissimæ sunt peregrinarum auium in mensas receptæ, propter ingratum uirus: uerum Meleagri tumulus nobiles eas fecit. Et ueneunt propter pennariam magno. Porro meleagrides ita describit Clytus Aristotelis discipulus: magnitudine ut sint gallinæ generosæ, capite ad portionem corporis paruo ac glabro, in quo crista carnea rotunda & prædura, quæ paxilli in morem promineat, rostro ligneo. Ad malas ab ore ortam ca

DE DIFFERENTIIS

runculam habent longam dependentem, rubicundiorē quā in genere E gallinaceo. Quod autem in gallinis rostro adhæret (πελὺς uocat Græci, Latini paleam mentumue) meleagrides non habent. rostrum acutius & maius quā gallinæ, ceruix crassior breuiorq̃ & nigra, corpus frequentibus uarium maculis in nigro candidis, maioribus lenticula: & alæ ipsæ uariægatæ, serrata specie digestis in quendam uersum maculis. crura sine calcaribus, cætero similia gallinaceis. locis gaudent paludosis lacustribusq̃. Fœminæ maribus adeo similes sunt, ut uix dignoscere genera possis. Hæc Clytus. Histrus tradit meleagrides à nullis auib⁹ quæ aduicis sunt unguibus uiolari. Oua generant meleagrides punctis distincta. pullos suos uelut perosæ negligunt. At contrā pauones fœminæ suæ sponte studiosius pullos enutriunt. Hæ sine custode tuto uagantur: maioremq̃ pabuli partem sibi & pullis acquirunt. Hoc genus auium cum trinitum expleuit, optime progenerat. siquidem tenerior ætas, aut sterilis aut parum fœcunda est. hoc tempore & colores pennarum uarios recipit. coitus uere & partus breui à coitu agitur: itaque post admissuræ tempus confestim matricēs custodiendæ sunt, ne alibi quā in stabulo fœtus edant: maximēq̃ temporibus quibus parturiunt pluribus stramentis exaggerandum præcipiunt auiarum, quo tutius integri fœtus excipiantur. Nam fere pauones cum ad nocturnā requiem uenerunt, perticis insistentes enituntur oua: quæ quo propius ac mollius ceciderint, illibatam seruant integritatē. Excludit pauo diebus tricenis aut paulo tardius. semel tantummodo anno parit oua duodecim, aut paulo pauciora: nec continuatis diebus, sed binis ternisue interpositis. primiparæ octona maxime edunt. Hæc Aristoteles. Pauo, inquit Plinius, parit primo anno unum aut alterum ouum, sequenti quaterna quinq̃, cæteris duodena non amplius: uerum, ut alij tradunt, fœminæ quæ non incubant, ter anno fere partus edunt: at quæ fouent oua, totum tempus fœcunditatis aut excludendis aut etiam educandis pullis consumunt. Primus est partus quinque fere ouorum, secundus quatuor, tertius aut trium aut duorum esse consuevit. Irrita & subuentanea illa pauones etiā pariunt. Mas dum fœmina incubat aduolans oua frangit, desiderio incubatium: quapropter noctu & in latebris pariunt: & earum curatores gallinis subiiciunt incubanda oua pauonina. Pullos præterea suos mares persequuntur uelut alienigenas priusquam illis cristarum nascatur insigne: crinitæ enim pauoni in capite exeunt arbusculæ. Viuit pauo annis uiginti quinque. Colores incipit ferre in trimatu. Amittit pennas cum primis arborum frondibus: recipit cum germine earundem. Cauda, quæ pauoni magna est, etiam decidua est, & utranque ob causam nullius in uolatu usus. Huic uni natura formæ uolucris dedit palmam: nec id quidem corporis specie, sed penarum pulchritudine. Masculus pauo gallinaceam salacitatem habet: atque ideo quinque fœminas desiderat. Porro signa sunt extimulatæ libidinis, cum semetipsum (aduerso maxime sole, quia sic fulgentius radiat) uelut mirantem, caudæ gemmantibus pinnis protegit, & singularum capita oculata pinnarum locis suis exerit, cum stridor e procurrens. Idē cauda, ut modo diximus, amissa cum

Рано.
Рани.
Табс.
Табс.
Табс.

A ſa cum foliis arborum, donec renaſcatur iterum cum flore, pudibundus ac mœrens quærit latebram. Vicia quæ gallinaceo generi nocere ſolent, eadem has aues infeſtant. Sed nec alia remedia traduntur, quàm quæ gallinaceis adhibentur. Pauonina caro dura eſt fibroſaque, & concoctu difficilis. Pauones ſimum ſuum (cuius eſt ad oculorum uitia uſus efficax) reſorbere tradunt, inuidentes hominum utilitatibus. In India gallinacei naſcuntur maximi, qui criſtam habent non rubram ut noſtri, ſed ita uariam & floridam, quemadmodum coronam ex floribus cōtextam. Pennas poſteriores minime inflexas habent, neque in orbem reuolutas, ſed latas, quas cum nō erigunt, ut pauones trahunt, eorum pennæ ſmaragdi colorem gerunt.

Gallinacei Indici.

B 1 In mari Tuſco, inquit Varro, ſecundum Italiam contra montes Liguſticos. 2 Numidiez, inquit Plinius, in parte Afriæ Numidia. 3 Corpus frequentibus, Si cui contigerit emendatior Athenæi codex, hūc locum legat græce, quem nos ob exemplaria mendosa toride uerbis exprimere non potuimus, coniectura noſtra contenti, una cum Hermolai interpretatione. 4 Hæc luculentiſſime expreſſit Lueretius lib. 2, Caudæque pauonis larga cum luce repleta eſt, Conſimili murat ratione obuerta colores: Qui quoniam quodam gignuntur luminis iſtu, Scire licet ſine eo fieri non poſſe putandum.

De columbaceo genere.

Cap. CXXVIII.

Columborum poſſeſſio non abhorret à cura boni ruſtici: nam forcius quamuis longe minor ſit, quàm eſt gallinarum, maiorem tamen reſert quæſtum: nā & octies anno pullos educat, ſi eſt bona matrix, & pretiis eorum domini complent arcem, ſicut eximius author M. Varro nobis affirmat. Quæ proprie columba uocatur, (ſunt enim columbacci generis ſpecies plures) duo continet genera: unū agreſte, ut alij dicūt, ſaxatile, quod 1 habetur in turribus ac columinibus uillæ. Hæ propter timorem naturalem ſumma loca in tectis occupant: & in turres ex agro uolant ſuapte ſponte ac remeant. Alterum genus columbarum eſt clementius, quod cibo domeſtico contentum, intra limina ianuæ ſolet paſci. hoc genus maxime eſt 2 colore albo: illud agreſte, ſine albo, uario: quaquam in India luteas eſſe columbas ferunt. Ex his duabus ſtirpibus ſit miſcellum tertium genus fructus cau 3 ſa: atque incedunt in locum unum, quod aliqui uocant *quæpiſtos*, alij *quæpiſtos*: in quo uno ſæpe uel quinque millia ſunt incluſæ. Columbæ utraque palpebra conuiuent. Lienem habent paruum, adeo ut propemodū ſenſum effugiat. ueſica bilis in columbis non iecori adhæret, ſed aut uentriculo aut inteſtino. Vētriculum habent calidum columbæ, & facultatem concoquendi maximam. Cocunt intra annum columbæ: quippe quæ ſeſtrefeſ noſſe incipiant uenerē: uel, uti Plinius tradit, quinqueſtrefeſ faciſcant. Columbæ proprio ritu oſculantur ante coitum: & niſi ante mutuo oſculentur, mas non aſcendit ſed iunior ſit an ſenior intereſt: ſenior enim primū coitum oſculo exorditur, ſequentem & ſine oſculo agit: at iunior quoties libet coire, toties oſculatur. Igitur hic ritus columbarum proprius

Columbus.

Columba.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

Columba agreſtis.

ſaxatilis.

Columba domeſtica.

κοκοινος.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

πυρρα.

DE DIFFERENTIIS

est: atque etiam ille, ut scēminæ saliant, ac supergressu mutuo agant, si mas E non sit, & cum osculo ut mares: & quanuis nihil altera emittat in alteram, tamen plura sic oua quàm ex maris coitu pariunt: uerum nullus ex his enascitur pullus, sed sunt omnia irrita: quanquam & nonnunquam oua infecunda & irrita etiam ex maris coitu cum scēmina proueniunt. Columbe ouum paucioribus quàm decem diebus à coitu consistit & perficitur: & pariunt, inquit Plinius, à coitu die quinto. Pariunt fere bina oua: ac marē semper & scēminam pariunt, priorem marem, posteriorem scēminam: etenim cum pepererint primum ouum, uno interposito die secundum pariunt. Pariunt omnibus anni temporibus, pullósque educant, si locum apricum habeant & cibum: sin minus æstate tantum scētant. Sed proles præstantissima uere & autumno est: deterrima æstate & omni tempore calidiorē. Facultas F columbis retinendi oui, etiam tempore parturiendi est: nam si ab aliquo uexetur, aut penna in nido euulsa, uel quauis alia re infestetur, aut etiam sponte morosius habeat, ouum per tristitiam retinet, partumque differt. Nihil columbis scēcundius: pariunt enim decies anno, nonnullæ undecies: Ægyptiæ uero & duodecies. Et æstate quidem interdum binis mensibus terna edunt paria: nanque decimo octauo die excludunt, statimque concipiunt: quare inter pullos sæpe oua inueniuntur: & alij prouolant, alij erū- 3 punt: pulli autem cæci procreantur. Diebus circiter quadragenis concipit, & parit, & incubat columba: & hoc fere totum annum faciunt: tantummodo interuallum faciunt à bruma ad æquinoctium uernum. Incubant in hoc genere ambo uicissim, interdum mas, noctu scēmina. Excludunt uicesimo die, aut citra uicesimum diem ouum quod prius ediderint. Perforant ouum pridie eius diei, quo pullum excludunt: & fouent prolem ambo ad certū tēpus, eodem modo quo oua. Quin etiā scēminæ parturiētī mas adest, & cultu omniq; officio fungitur. Sæpe etiam scēminam pigrius euntem ad nidum propter partus laborem mas percutit, cogitque intrare. Exclusis iam pullis, alimentum illis parat, quod præmanducatum, in eorum os inferens suum, ingerit, atque ita præparat ad cibum recipiendum. Pullis primo falsiorem terram collectam gutture in ora inspuunt, præparantes tempestiuitatem cibo. Ita magna ex parte columbæ mutuo degunt amore, ut neque cum pluribus coire uelint, neque coniugium iam inde à primo ortu initum deserant, nisi cælebs aut uidua: sed interdū tamen nonnullæ etiam ex maritatis cum aliis coeunt. Pugna hoc animal est: alter alterum infestat, nidumque alter alterius subit, sed raro: nam etsi ex longinquo minus, tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicatur. Columbaei generis proprium esse uidetur, ne collum cum bibunt resupinēt, nisi satis hauserint: & ut large bibant iuuetorum modo. Frugibus uicētat columbæ: uiuūt autem uel ad octauum annum. Fertur à columba quodq; accipitrum genus cognosci: itaque cum accipiter prouolat, si sublimipeta est, manent quo constiterint loco: sed si humipeta qui prouolat est, non manent, sed continuo auolant. Cum auium mos sit, ut aliæ sese in puluere uolulent, aliæ sese lauent, aliæ nec puluere nec balneo utantur: columbi utrūq;

*Aliàs die 25.
Postridie scēmi-
næ, inquit Pli-*

tum

A tum lauare tum puluere solēt. Multiuaga auis columba: estq; ars illis inter se blandiri, & corrumpere alias furtōq; comitatiores reuerti: inducuntque alias in culumbarium, si cumino pascantur assidue. Columbarum caro facile concoquitur: succum efficit crassitie tenuitateque mediocrē. Præstantior autem est earum caro, quæ in turribus degunt quàm domesticarū: ex quibus nō nisi modice degustare expedit iis, qui exercitio minime utuntur, sicuti nec è gallinis. auxiliatur contra serpentum morsus columbarum caro recens cōcerpta. columbæ sanguis cruorem è membranis cerebri erumpentem cohibet. Columbinum fimum quod à colūbis agrestibus redditur, excalfacit & urit, misceturque uice napyos cum semine nasturtij siccū confusum cribratūmq; ad ea quæ rubefieri desiderāt: quales sunt diuturniores **B** affectus, ceu coxendicis morbus, hemicrania, uertigines, scotomata, cephalæa, & laterum, scapularum, ceruicis, lumborum inueterati dolores: nephritides & cæliaci dolores, podagræque & arthritides, quæ nondum poros in articulis contraxerint. Columbinum fimum ex aceto strumas discutit: laudatur & ad agyloplas, & albugines, & cicatrices: carbunculos perumpit cū melle, lini semine & oleo subactum: igni quoque ambustis medetur. Fimū columbinum cum oleo & uino potum uenerè inhibere: sed si lutea ex ouis quinque columbarum, admixto adipis suilli denarij pondere ex melle sorbeantur, uenerem concitare feruntur. columbarum syestrium fimum priuatim contra argenti uiui potum ualet. Genera columbarum quinque nū *Columbarum genera.*

Cuinago, pelias quæ liuia à nonnullis uocatur, & turtur: in his palumbi, turturis & columbæ sanguine utuntur medici ad recentia oculorum uulnera, ad oculos cruore suffusos atq; lusciosos. In columbis masculi sanguinem efficaciorē putant: uena autem sub ala ad hunc usum inciditur, quoniam suo calore utilior est. superimponere oportet splenium è melle decocto, lanamque succidam ex oleo & uino.

1 *τρυγίτης*, nonnunquam à Galeno, arbitror, uocatur & *τρυγίτης*. 2 De coloris uarietate in pennis ceruicis columbarum ita cecinit Lucretius lib. 2. *τρυγίτης*, *τρυγίτης* *τρυγίτης*.

Pluma columbarum quo pacto in sole nidetur

Quæ sita ceruices circum, collūque coronat?

Nanque aliās sit, uti claro sit rubra pytopa,

Interdum quædam sensu sit uti uideatur

D Inter coruleum uirides miscet smaragdos. 3 Columba cum peperit, inquit Athenæus, post die marem repetit. 4 Colūba citra dies triginta, inquit Aristoteles, psole expedita superiore parit. 5 Nisi satis hauserint, *λέγεται* *μικροί*: ita Theodorus: uetus interpres, quousque eis sufficiat. Suspecta mihi uidentur hoc in loco exemplaria Aristotelica. 6 Hæc Galeni est sententia: Sunt ex Arabum schola, qui tradant corpora pullorum columborum esse tardæ digestionis, & longæ moræ in stomacho: Rarus tamen, columbus, inquit, leuis est cibus, & subtilis. Et iterum, est cibus mirabilis ad caliditatem declinans.

De palumbo, ænade, peliade & turturæ.

Cap. CXXIX.

Palumbæ.

Palumbæ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Παλμβ.

Inter columbarum genera maximo corpore est palumbes: quippe quæ nonnullis locis gallinaceum æquet magnitudine. Colorē habet cinereū:

DE DIFFERENTIIS

caput subcæruleum purpureum: & nigrum oculi rotundissimum. In-
gluuiem habet præpositam ventriculo. Cantus in hoc genere omnibus si-
milis atque idem terro conficitur versu, præterquam in clausulâ gemitu,
hyeme mutis, uere uocalibus: hyeme nanque nõ gemit palûbes, nisi quòd
aliquando ex asperrima hyeme, cum placidum tempus successisset, gemue-
rit: id quod apud peritos in admiratione habitum est: cæterû inuente uere
gemere incipit. Camporum incola palumbes est. Coitus tempore testes pa-
lumbi magnitudine insignes, aliàs uero parui & omnino obscuri, ita ut hy-
bernis mensibus ne ullos quidem testes in his haberi nonnulli arbitrentur.
Palumbes & turtures trimestres coire fecundificareque aliqui referunt, argu-
mento quòd larga eorum copia est. Gerût uterum decem & quatuor die-
bus, ac totidem aliis incubant: & rotidè aliis sætus ita uolucer fit atq; perficitur, ut uix possit apprehendi. Bina pariût oua palumbes & turtur, & cum
plurimum terna: sed nunquam plus duobus pullis educunt: nonnunquam
etiam unum tantum: reliquum ouum semper irritum est. Pariunt autè ue-
re, nec plus quàm bis: atque ita si prior sætus corruptus est: pullos procreât
imperfectos. Incubatus tempore palumbium sæmina incubat à postmeri-
diano incipiens, totâque nocte & usque ad tempus ientaculi perseuerans:
in reliquo tempore munus idem mas subit. dignosci autem mäsne an sæ-
mina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu. Collum cum bibit non re-
supinat palumbus, nisi satis hauserit. Mare uno contenta & turtur & palû-
bes uiuit, nec alterum recipit: nidulâturque & palumbes & turtures sem-
per locis eisdem. & cum mares in aliis fere animalibus diuturniores quàm
fœminæ sint, in his marem prius quàm fœminam mori nonnulli aiunt. Vi-
uere autem palumbes ad tricesimum annum, aliquos ad quadragesimum
Aristoteles author est, uno tamen incommodo unguum, eodem & argu-
mento senectæ, qui citra perniciem reciduntur. Profunr squalores maxime
palumbis. Horum aliqui latent, aliqui non latent, sed cum hirûdinibus ab-
eunt, nec hybernare apud nos patiuntur: aliqui tamè semper uiuantur. Vo-
lant gregatim tum palumbes tum turtures cum accedunt, & cum suo tem-
pore abeunt. Palumbium caro durior est, quàm sit columborû, turturum,
turdorum, merularum uere aut paruularum auium: estq; concoctu difficilis
excrementosâque. In cōtractione neruorum caro palumbina in cibis pro-
dest & inueterata: in aceto decocta dysentericis & cœliaciis medetur: po-
sea uero ileon & tormina sanat. Palumbi sanguine utuntur medici ad ocu-
lorum uitia, uti in columbis indicauimus. De palumborum esu ita cecinit
Martialis coquus,

*Palumbus
torquatus.*

Inguina torquati tardant hebetantque palumbi.

Non edat hanc uolucrem, qui cupit esse salax.

*Circa, uinago.
Autûno tan-
tū conspicitur
inquit Athe-
nam.*

Secûdum magnitudinis locum in columbaceo genere ænas obtinet, id est
uinago, paulo maior quàm columbus, minor quàm palumbes est. Autûno
potissimum & conspicitur & capitur. Modus maxime capiendi eam, dum
se in aquam bibendo propendit. ueniunt ad nostra loca, cum iam fecerint
prolem. Frugibus quoque uiuit ut columba: & bina parit oua. Diuersum
certe

A certe genus à columba pelcias est, id est liuia: quippe quæ minor quam columba sit, & minus patiens mansuescere. liuet etiam plumis & pene nigricat: & pedibus rubidis scabrosisque est, paruaque adeo, ut nemo id genus alere uelit. In India liuiæ columbæ uirides pennas habet, ut primo aspectu, si quis in auium cognitione rudis sit, pſitacum nō columbam dicat. Rostri illis & cruor Græciæ perdicibus sunt similia. Discedunt hyeme liuiæ, nec apud nos hybernare patiuntur: plurimum curæ proli impendunt. Minimum in columbaceo genere turtur est, colore fere cinereo. Frugibus uiuunt turtures, bibunt, coeunt, gerunt uterum ac pariunt, nō aliter atque de palumbis diximus. Degunt ætate locis frigidis, hyeme tepidis: deoque ætate tantum apparet turtur: hyeme se cōdit aut discedit: nec enim hybernare apud nos patitur: nemo enim, prope dixerim, uidisse per hycmem uspiam turturem dicitur. Latere autem incipit præpinguis: & quanquam pennas in latebra dimittit, tamen pinguedinem seruat. Volant gregatim cum accedunt, & cum suo tempore abeunt. Turturi cum uocem reddit, pars nouissima alui uehementer citatur: euenitque nonnunquam crepitus alui. Turturis caro difficilius quidem concoquitur quàm columbarum, turdorum, merularum aut paruuarum auium: succum tamen probum gignit, si recte concoquatur. & temperatura sicca turtur est, præsertim si in locis mōtanis uictitarit. neque recens mactata edēda eius caro est: sed ubi uno, minimum, die adseruata sit: sit enim hoc pacto, ut & minime dura euadat, sed friabilis iam, & omnino uitio careat. Turturis sanguine utuntur medici ad recētia oculorum uulnera, uti in columbis dictum est: simum turturis albugines extenuat. Turtur cum pyrali pugnat: locus enim pascendi uictusque idem eorum traditur. Turtur quoque & chloreus pugnant: & occiditur à chloreo turtur.

*Pyralis.
Ignaria.
Chloreus,
Luteus.*

1 Palumbes Italiam autumnō felicituræ, quoniam pacto capiuntur, explicat Bionus in regione Latina. 2 Plurimum curæ: Vide an hoc intelligat Oppianus de columbis: nam id significat πλοῖες nonnuquam apud poetas. 3 Turtur uere ocultatur, inquit Plinius, pennasque amittit. 4 Turtures quo pacto capiuntur cantu & saltatione, legas apud Ælianum.

De phasiana, tetrace, erithrotaone, otide, & oto. Cap. CXXX.

1 Gallinam phasianus alimēti bonitate cōcoctionisque facilitate æquat, suauitate uincit. Auis est minime altiuola, sed terrena & pulueratrix. Phasianæ in Colchis geminas ex pluma aures summittunt subriguntque corniculis similes. Oua pariunt punctis distincta. Phasianum Epæncius tatarum, Ptolemæus tetarton uocari dixit & tetraona: nam tetrax alia auis est, & tetrax itē alia. Tetrax, ut Alexander Myndius author est, auis est magnitudine spermologi: colore figlino, sordidis quibusdam maculis lineisq; magnis uaria: frugibus uescitur, & quando pepererit, quadruplicē emittit uocem. Tetrax altera gallinaceum maximum superat magnitudine, specie porphyrii similis: ab auribus utrinque paleæ dependet, ut in gallinaceo, uox illi grauis. Tetrax quam Athenienses uragem uocant, nec tetrax nec arax.

*Phasiana.
Phasianus.
Tatarus.
Tetartus.
Tetraos.
Tetrax.
Tetrax altera.
Tetrax,
arax.*

DE DIFFERENTIIS

bori suum nidum committit, sed frutici: & non aliter atque alauda nidum E.
Erythraea. patere aures cupit. Decet Erythraeas suos nitor, absolutaque nigritia, in 4
superciliis cocci rubor. Alterum eorum genus uulturum magnitudinem ex- 5
cedit, quorum & colorem reddit: nec ulla ales, excepto struthiocamelo, ma-
ius corpore implens pondus, in tantum aucta, ut in terra quoque immobi-
lis prehendatur. Gignunt eos Alpes & septentrionalis regio. In auiariis sapo-
rem perdunt: moriuntur cōtumacia spiritu reuocato. Proxime iis sunt (ter-
tium scilicet genus) quas Hispania aues tardas appellat, Græci otidas, dāna-
Anis tarda. tas in cibis: emissa enim ossibus medulla odoris tedium ex templo sequitur.
Otus. Otides in Hispania frequētes, inquit Strabo. Otides, ut authores sunt Xeno-
phis. phon & Plutarchus, carnem habet suauem, & facile capiuntur. Sunt autem
otus. otides (quos & *otus* uocant) aues parum uolaces, & quæ uolando cito defati- F
gantur, non aliter atque perdices. Imitatrix hæc auis est, eorum præsertim
quæ ab homine fieri uiderit, ut eadem quoque facere conetur. Aucupes in
aduersum earum stantes, pharmaco quopiam oculos suos inungunt, un-
guento alio quod oculorum palpebras cōglutinet, haud procul inde in ua-
sculis apparatus: quod aues conspicatæ idem facere tentant, medicamento
ex uasculis accepto: itaque facillime apprehenduntur. Ales magna otis otus-
ue est: & tricenis diebus incubat. Gula eius tota ampla est & lata: ingluui-
es nulla. appendices habet paucas quasdam infra quæ definit intestinum. Fi-
dipes tribus insistentibus digitis, magnitudine gallinacei grandioris, colore co-
turnicis: capite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, lingua ossæ, gracili collo.
Equis mirum in modum delectari fertur, adeo ut si quis pellem equinā G
sibi induat, eo pacto quot libuerit capere posse: nonnulli *otus* uocarunt. Ut 6
uero alij otus colubæ est magnitudine. noctuæ similis, nō tamē auis noctur-
na) pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde & nomen illi, quasi
auritum dicas: nonnulli nycticoraca eum appellant: quidam latine & asio- 7
nem uocant. Hominum hic imitator in omnibus est: saltantes quoque imi-
tatur, & capitur haud difficulter, ut noctua, inter saltandū intentus ex imi-
tandi uoluptate in alterum aucupem, altero circumeunte, aut clanculum à
tergo stante. Ducem se præbet otus coturnicibus aliò migrantibus. *otus* 8
(quas & *otus* uocari tradit Galenus) caro media est inter gruum carnem
& anserum, non tam dura scilicet atque fibrosa quàm sit gruum caro. Ex-
crementosa est, ac proinde uitanda iis qui salubri, id est tenui uictus ratio- H
ne uti uolent.

Phasianica
auis, otus
otus.

1 Gallinæ, *otus* uocant nonnulli: ut Pollux & Athenæus. 2 Martial. lib. 13:
Argiua primum sum transportata carina:

Ante mihi norum nil nisi phasis erat.

3 *otus* an quadri-

partitam. 4 Alij legunt apud Plinium tetragonas, alij tetrahonas, alij tetraconas.

5 Alterum genus, hæc forsitan otis est Galeno atque Aristoreli: & otus Athenæo:
de quibus mox dicetur. 6 Orus, Plinius, Bubone minor est, noctuis maior. 7
Pennatorum animalium, inquit Plinius, buboni tantum & oro plumæ uelut aures.

8 Videtur ex Aristorele hoc loco quod ueneos habeat ungues: statim enim adiun-
git: Omnes uero aues unæ, &c. Considera.

De coturnice

A De coturnice, perdice, galerita, & aliis id genus quibusdani
terrenis grauioribusue: Cap. CXXXI.

Coturnices agre uolant, propter sui corporis pondus: sunt enim corpo- *Coturnix.*
re grandiore, quàm ut suis pennis deferre possint, uociferantq; ob cam *Grv.*
rem cum uolant: laborant enim quasi oppressa onere. Parua auis coturnix
est: cui præ cæteris hæc ptopria habentur, ut & ingluuiem infra amplam, &
gulam prope uetriculum amplam & latam habeat. Fel aliis earum uentri;
aliis intestino adhæret. Fœmina coturnix, ut author est Alexander Myn-
dius, collū habet gracilius: neq; sub mento nigra illa adsunt quæ maribus:
& si disseccatur, ingluuiens inuenitur non adeo ampla, cor uero magnum,
& fel intestinis adnexum. Testes maribus sub iecinore continentur, ut in
B gallinaceis. Nunquam in arbore, sed humi consistit coturnix, & humi ni-
dulatur, sicuti & perdix & reliqua generis eiusdem, quæ scilicet aues gra- *Perdix.*
uiores sunt, & non alte uolant. Nidos autem non faciunt, sed facta in apri- *In aprico, in §.*
co area, atque uepribus quibusdā & materia huiusmodi cōgestis, quoad *Alp.*
accipitrum & aquilarum iniuriam deuitare possint, oua edunt & incubāt.
Mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt
suo uolatu iis cibum administrare. Refouent suos pullos sub seipfas ducē-
do more gallinarum & coturnices & perdices. nec eodem loco & pariunt
& incubant, ne quis locum percipiat longioris temporis mora. Mares cum
diffugerit fœmina ut incubet, tumultuant, clamitant, pugnamque inter se
conferunt: (hos autem *χέλιες* uocant, id est cælibes:) qui autem uictus fue-
rit, sequitur uictoris uenerem patiens. uerum hoc non ita fieri semper, sed
C certo tempore anni planum est: usque adeo tum perdices tum coturnices
copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & sæpenumero capiti-
bus eorum residant. Coturnix uel in pugna ipsa garrula est, & ante pugna
mares canunt. Coturnicibus ueratri semen gratissimus cibus: quam ob cau-
sam eas damnauere in mensis, simulq; comitalem propter morbū despui-
suctum, quem solæ animalium sentiunt præter hominem. Adeo tamen pa-
latis uidentur gratæ, ut in auariis pastæ pinguësque ueneant cate, sicuti &
3 quæ miliaria dicuntur. Discedunt coturnices mense Augusto in calidiora *Miliaria.*
loca, nisi pauca locis apricis remanserint, & pinguiore per id tempus ca-
piuntur. Et cum ad nos redeunt, aduolant gregatim non sine periculo na-
Duigantium, cum appropinquauere terris: quippe uelis sæpe insidiūt, & hoc
semper noctu, merguntq; nauigia. Iter est his per hospitia certa. Austro nō
uolant, humido scilicet & grauiore uento: aura tamen uchi uolūt, propter
pondus corporum uirēsque paruas. Aquilone ergo maxime uolant. Cum
ad nos ueniunt, terrestres potius quàm sublimes, & sine ducibus pergunt:
4 at cum hinc abeunt, ducibus oto & lingulata & ortygetra proficiscun-
tur, atque etiam cenchramo, qui eas noctu hortatur, excitat, admonetque
itineris, perseverantiórque festinat peruenire ad expetitas sibi terras. Hu-
ius uocem cum senserint aucupes, intelligunt parari discessum. A cotur-
nicibus magnitudine tantum differt lagopus, croceo tinctu, in cibus gratif-
sima. Est & alia lagopus, pedes leporino uillo ei nomen hoc dedere, cætero

DE DIFFERENTIIS

candida, columbarum magnitudine. Non extra tertam in qua nascitur ea E
 ucfi facile: quando nec uiua māsuefcit, & corpus occifā statim marcefcit.
 Neque perdix altiuola eft, fed terrā propinqua uolat, ſpatiiſque breuibus:
 Nec facit in ramis altóque cacumine nidos.

Propter humum uolitat, ponítque in ſepibus oua.

Perdix ingluuiem habet præpoſitam uentriculo, & appendices quaſdā pau
 cas infra quā definit inteſtinū. In Paphlagonia bina perdicibus corda. coi-
 tus tempore teſtes habét perdicēs magnitudine inſignes, aliās uero omni-
 no obſcuros: ita ut hybernīs menſibus ne ullos quidem teſtes in his haberi
 nonnulli arbitrentur. perdicē non pingueſcere tradunt. nidificāt, pariunt
 & incubant oua ſcēminā non aliter ac de coturnicibus diximus. Mares itē
 libidinis intemperantia ſimiliter tumultuant, clamitant pugnāmq; inter F
 ſe conferunt. Pariunt ſcēminā oua nōnunquam quindecim aut ſexdecim.

*Videbitur forſi-
 tan Ariſto. his
 in locis non ſa-
 tis ſibi coſſtare
 lib. 6. hiſt. ani-
 malium, c. li. 9.*

Et bina ouorum receptacula faciunt nonnunquam perdicēs: in altero ſcē-
 mina incubat, in altero mas: excludítque ſua uterque & educat. Nonnun-
 quam uero oua mares quæ compererint, peruoluunt & frangunt præ ſua
 ſalacitate, ne ſcēmina incubet: quod ne accidat ſcēmina contra emolliens,
 clanculo diffugiens parit: ſed fit ſcēpius, ut præ turgore parturiendi, quolibet
 loco edat, & mare præſenti: uerum ut oua ſeruentur, nunquam ad ea ſubito
 accedit. Plerumque uero ſcēminā tranſſuchunt partus, ut mares fallant. Et ſi
 quis hominum ubi incubent, propinquabit, egreſſæ matres uenientibus ſe-
 ſe ſponte efferunt: & ſimulata debilitate uel pedum uel alarum, quaſi ſta-
 tim capi poſſint, grefſus fingunt tardiores. Hoc mēdacio ſolicitant obuios G
 & elidunt, quoad prouecti lōgius à nidis auocentur. Coitus tempore uo-
 lant tam mas quā ſcēmina ore hiantē, exertāque lingua: uel, ut Ariſtote-
 les refert, ore hiantē exertāque lingua & mares & ſcēminā cocunt. Neque
 in alio animali par opus libidinis: ſi contra mares ſteterint ſcēminæ, eo quo
 ad libidinem excitantur tempore, aura ab his ſlante, prægnantes fiunt. Ple-
 runque etiam uoce marium, utero ingraueſcunt, ſi geſtiunt ac libidine tur-
 gent. Quin & uolatu quoque ſuperne marium effici idem poteſt: quaſi ui-
 delicet mas ipſe in ſcēminā ſcētificum ſpiritum demittat. Puluere ſe uo-
 lutare ſolēt perdicēs. Earum uita amplius quā ad ſexdecim annos durare,
 exiſtimatur. In Italia alterum eſt perdicum genus, magnitudine minore,
 & uolatu incompoſito: roſtro minime rufo. Perdix uulture maior ex India H
 ad Cæſarem miſſa eſt. Perdicēs ſane cum ubique liberæ ſint, ut aues uniuerſæ,
 in Bœotia non ſunt: nec cum uolant, ſui ſunt iuris: ſed in ipſo aere, quas
 tranſire non ualeant, metas habent, ut nec in Atticum ſolum tranſmeent.

*De cauſis ho-
 rum pulcherr-
 mū inuenies cō-
 tēplationē lib.
 de generat. a-
 nimalium.*

Perdix altera.

Syroperdix.

Syroperdix in Antiochia Piſidia, perdice minor eſt, & niger excepto ro-
 ſtro, quod ruſum ſpectatur. lapides deuorat atque conficit. Non manſue-
 ſcit, ſed ſemper perſeuerat ſerus eſſe. Eius carnes & denſiores ſunt quā cæ-
 terarum, & ſuauiorem cibi uſum præſtant. Perdicis caro facile concoqui-
 tur, probūmque generat ſuccum: quæ tamen minime recens edēda eſt, ſed
 ubi unum, quā minime, diem ſuſpenſum adſeruaueris: ita nanque eius
 durties facile amittitur. Quæ circa Cirtham perdicēs inueniuntur, carum
 caro

A caro ingrati saporis est, neque edendo sunt. Si sorbeantur oua perdicis, putantur fecunditatem facere, lactis quoque copiam. Perdicis fel atque gallinæ ad medicinæ usum aliis præstat. Fel perdicum cum mellis æquo pondere, contusis oculis inungitur: per se uero ad claritatem: Hippocratis (ut putant) autoritate adiicitur, quod in argentea pyxide obseruari iubent. Oua perdicum in uase æreo decocta cum melle, ulceribus oculorū & glaucomatis medentur. Sanguis perdicis oculorum ulceribus recentibus, & oculis cruore suffusus illinitur atque lusciosis. Currunt ut perdices rusticulæ: de qua Martialis,

Rustica sum perdix: quid refert? si sapor idem est:

Carior est perdix, sic sapit illa magis.

Rustica perdix
Alias, si sapit.

B Terrena quoque & pulueratrix attagenæ est, neque uolax multum: corpore re quàm sit perdix paulo grandiore, toto dorso punctis maculisue insignis colore aliàs figlino ad subrufum magis tendente. Ob corporis grauitatem alarūque paruitatem, canibus facillime capitur à uenatoribus. Auis multipara est attagen, frugibūsq; uiuit, & pulueratrix est. Quondam existimatus inter raras aues: iam & in Gallia & Hispania capitur, & in Alpibus etiam. Auis uocalis aliàs, captus uero obmutescens, adeo ut nullam edat uocem, tantum abest ut māsuecat. Traducti autem attagenes ad Pylas ex Ly-
9 ciæ, (ut Socrates author est) coturnicum uocem aliquandiu edidere. Attagenæ caro facillime cōcoquitur, & probum creat succum. Attagen Ionius maxime celebratur, teste uel Coquo Martiale,

C Inter sapes fertur alitum primus

Ioniarum gustus attagenarum.

Attagas (tagenarium quoque uocari solet) pennas gestat maculis pūctisue uariiegatas. in locis uiuitat campestribus atque stagnantibus: idēque in Marathone frequens. Humi quoque uersatur, nec unquam in arbore cō-

10 sistit, quæ scolopax dicitur uel ascalopax. Per sepes hortorum capitur. magnitudine quanta gallina est, rostro longo, colore attagenæ: currit celeriter, & hominem mire diligit. Quæ galerita, ab apice quem in capite gestat, quondam appellata est, postea alaunda gallico uocabulo dicta est, Græci corydon & corydalon uocant. Auicula hæc non in arbore consistit, sed humi, in uis & semitis ubique nobis occurrens, apicem in capite ueluti eri-

D istam ex pilis constantem gestans, pauonis in morem. Hæc & pulueratrix est. Alaudarum duo genera, alterum terrenum & cristatum, ut dictum est, galerita à crista appellatum: similis hæc est passerulus auiculisue, quos pyrgitas uocant, uerum maior est galerita. circa uias & semitas reperitur, ut diximus, hyemis præsertim tempore: alterum gregale, nec singulare more al-
12 terius, uerum colore simile, quanquam magnitudine minus, & galero carens, cibo uero idoneum. Cōdenso frutice nidificat alaunda. Alaundæ cum auibus uariis dictis dissident: oua enim inuicem exedunt: ardeolarum quoque oua diripit alaunda. Quæ apicem gestat galerita, inquit Galenus, in simplici iure elixa, colicos iuuat, si unā cum suo iure sæpe atq; assidue eda-

31 tur: assam scribit Dioscorides cæliacis prodesse. Et Plinius, coli uitium, in-

DE DIFFERENTIIS

quit, sanatur ab aue galerita assa in cibo sumpta. Quidā in uase nouo cum E plumis exuri iubent, conterique in cinerem, bibique ex aqua cochlearibus ternis per quatrimum: quidam cor eius adalligari femini: alij recens tepensque adhuc deuorari. Cōsularis Asprenatum domus, inquit Plinius, in qua alter ē fratribus colo liberatus est aue hac in cibo sumpta, & corde eius in armilla aurea incluso. Hæ fere suum nidum patere auræ cupiunt. Quem uero Bæotij meropa uocant, hic unus corporis grauitate prohibitus subli- me petere, subiens terræ cauernas, facit cunabula & parit, in specu scilicet sex pedum defossa altitudine. Et pēnæ huius auis intus pallidæ sunt, superne cœruleæ ut halcyonis: postremæ pinnulæ rubræ habētur. Parit sex aut se- 14 ptem astate. Apibus inimica hæc auis est. Sunt qui meropas genitorum se- 15 necitatem educare confirmant, educationis uicem reddere: ut parentes nō F modo senescentes, uerū etiam statim cum iam datur facultas, alantur ope- ra liberorum: nec matrem aut patrem exire, sed in cubili manentes pasci labore eorum.

Merops.
Apiafter.

ὄρνις.
Χοιός.

1 ὄρνις uoce diminutiuū dicitur: & χοιός quoque parua uocatur coturnix. 2 De coturnicis effrenata libidine leges apud Athenzum, lib. 9. 3 Miliaria à milio quo uescuntur, ut inquit Varro, de lingua Latina. Hæc an eadem sit auis cum cenchaamo, considerat lector. 4 Quam aucupij ratione capiatur coturnices in Italiam primo uere aduentantes, explicat Blondus in regione Latina. 5 Theodo- rus lib. 5 hist. animaliu, ad quinque & uiginti annos habet: sed errore, nō fallor, exem- plaris Græci, aut scriptoris. 6 Minime rufo, ὅτι κίτρινος βέβαιος, ita legitur apud Athe- nam: sed melius fortasse si expungatur ὅτι, ut sit rostro rufescente: sed nihil uolumus mutare. 7 Non ἀφελύς, sed ἀφελύς dicitur, si Athenæo credimus, & ἀφελύς lingua G Attica: punctis maculisue insignis, κατὰ γὰρ. 8 Frugibus uiuat: ἀφελύς γὰρ ὅτι. An potius: seminibus frugibusue erutis atque effossis uiuat, uti in Ispernologo, 9 In alimenti ratione coniunguntur fere attagenæ cum perdicibus, & apud Galenum & Oribasium, & ceteros medicos. 10 Gallinaginem uocat Theod. uernaculū uo- cem securus, ut scribit Hermolaus. Scolopax uel alcalopax, uide ne codex Aristoteli- cus mendosus sit in alterutro loco, an diuersæ sint aues. Homine mire diliger, αἰσίου- 11 ὅτι, uetus Aristotelis interpres ita reddidit: & diligit appropinquare ad homi- nes. 12 Lib. 8. hist. animaliu. Galerita inter eas aues numeratur, quæ hyeme latent: ubi equidem mendosa esse exemplaria crediderim: tum quod Aëtius dicat hyemis ma- xime tempore galeritas inueniri, tum uero quod etiam uetus Aristotelis interpres eo in loco, habet foredoz, cū aliis in locis pro galerita habeat corozas, aut eoroneon pro corydon. 13 Alterum gregale, Hæc forsitan est, de qua Hermolaus: similis est ala- 14 udæ terraneola uocata, nisi quod apice careat, in terra nidificans, unde nomen. Parus H (si Hermolao credimus) auis est ab alauda differens, (etiam si qui negant) palubo mi- nor aliquanto, subtus cædida, cætero pauoni similis, & crista quoq. 15 Cæliaci, for- sitan colicis legendum. 16 Postemæ pinnulæ. Ita Theodorus, καὶ ἡ ὑπερὶ τῆς πτερυγίας ὑπερβαίνει, id est (ut mihi certe uidetur) in summis alis rubræ. Plinius hæc ita red- didit, colore pinnarum, superne cyaneo, priori subruilo. 17 Astate, κατὰ τὸν ὄρνις.

Gallinago.
Scolopax.

De turdorum merularumque generibus, & aliis quibusdam, quæ cum iis similitudine quadā coniunguntur. Cap. CXXXII.

Turdus,
κίχλα.
Κυρία.
Τεχέις.

I Nomni certe rure, & intra uillarum septa pascebantur in auariis & turdi & merulæ. Turdorum tria sunt genera, unum uisciuorum, quod nisi uis- sco atque resina nō uescitur: & magnitudine picæ est: alterum τεχέις, id est pilare,

A pilare, quod sonat acute, & magnitudine merula est: tertium quod *ιδιόδε*
ιδιόδε quidam uocant, alij *τολάδε*: iliacum latine non inepte dixeris, mini-
 mum inter hæc, minúsque maculis distinctum. Turdi nidos ex luto, ut hi-
 rundines faciunt in secessu in excelsis arboribus. stragulum subiiciunt ex
 uillo & lana, interioraque nidi ex eisdem consternunt. Mutat turdus colo-
 rem: æstate nanque color circa collu uariis, hyeme cōcolor: uoce tamē e-
 dem est. Aliquot diebus hyeme latet, in uicināque abit, quo hybernūm pā-
 bulum petat. itaque in Germania hyeme maxime turdi cernuntur. expeti-
 tur à turdis & fagi glans. Turdorum caro durior est quā sit gallinarum,
 perdicum, attagenarum, & id genus aliarum auium: succum tamen, si pro-
 be concoquatur, & probum generat & minime excrementosum: estq; in-
 quit Martialis,

Inter aues turdus, si quis me indice certet,

Inter quadrupedes gloria prima lepus.

Turdus inassatus cum myrti baccis dysentericis medetur: turdos quo-
 que edisse cum baccis myrti prodest urinæ. Venere in Italiam Debria-
 censibus bellis ciuilibus trans Padum externæ & nouæ aues: ita enim adhuc
 uocantur, turdorum specie, paulum infra columbas magnitudine, sapore
 grata. Merularum duo sunt genera, alterū nigrum & uulgare, & rostrum
 illi rutilum: alterum candidum: magnitudine quidem compari, & uoce si-
 mili: sed circa Cyllenam Areadiæ familiare, nec usquā alibi nascens. Prius
 illud genus immutatur per tempora & colore & uoce: ex nigro nanque ru-
 scescit, & per hyemem strepitat, cum per æstatem tumultuante cantet. ro-
 strum quoque anniculis in ebur transfiguratur, duntaxat maribus. Merula
 postquam sibi nidū fecerit, stragulum subiicit ex uillo & lana, interioraq;
 nidi ex eisdem consternit, turdorum in morem. Bis parit merula, sed primū
 partus intereunt frigore hyberno: omnium nanque auium prima hæc pa-
 rit: posteriorem partum educat, & feliciter ducit ad finem. saliendo ince-
 dit merula. Latet hyeme: hoc est in uicina abit, nō occultatur, quemadmo-
 dum & turdus. Eius caro quod ad alimēti rationem attinet, nō aliter at-
 que turdorum durior est, sed probum generat succum, uti de turdis dixi-
 mus: & merula inassata caro cum myrti baccis dysentericis medetur. Est
 & altera auis *κασυφας*, id est merula à comicis uocata, nō cantans, sed muta.

D E merularum genere est *βαρος* auis, merula nigra similis: sed magnitudine
 paulo minor. uersari hæc in sinis & tectis solita est: nec rostrum rutilum ut
 merula habet. Merulis affine genus quoddam est uenaticum, colore nigrū,
 splendide canorum, recte ex eo uenaticū appellatum, quod ex auibus mul-
 tas sui cantus permullione ad se allicit & capit, quod si quando capta illam
 concluderis in caueam, muta permanet atque elinguis. Quæ caprimulgum
 appellant, auis montana est, magnitudine paulo maior quā merula (ut
 aspectu sit merula grandior, minor quā cuculus, moribus egnior mol-
 liorue. Parit oua duo aut tria cum plurima. intrat pastorum stabula, capra-
 rumque uberibus aduolat, factum propter lactis, unde nomen accepit: cum
 fuxerit, uber extingui capraeque excecari aiunt. *κας*, id est capella, alia auis

*Turdus pile-
ris.
ιδιόδε, & ιδιόδε.
τολάδε.
Iliacus turdus.
In cacumini-
bus arborum,
Plinius.
Hyeme Ια-
βιδεσθαι, ut
tu Theodorus,
marino distin-
ctus.*

Aues nouæ.

*Merula.
κασυφας.
κασυφας.*

*Hyeme balbu-
tis, inquit Phi-
nius, circa sol-
stitium muta.*

*Merula altera
βαρος, Baris.
Vetus inter-
pres, & rostrū
eius rubrum.
Venatica auis,
Venatrix.
Caprimulgus.
Αιγεβαλος,
Αιγικάβαλος,
Capriceps.*

κας, Capella.

DE DIFFERENTIIS

est: circa amnes enim & lacus uersatur. Fur nocturnus est: parum clare nā- E
que interdū uidet, sed noctu perspicax est. Sturnus quoque niger est, & 5
merulæ magnitudine, sed colore uario est. Sturnorum generi proprium
cateruatim uolare, & quodam pilæ orbe circumagi, omnibus in medium
agmen tendentibus. Hyeme abeunt & sturni simili modo atque merulæ
in uicina, propter hybernū pabulum, sed non aliter occultantur. Stur-
norum oryzam solum pascendum sterces simile est crocodileæ, quam uo-
cant, eiusque loco uenditur. Collurio auicula similis est merulæ, nisi quod 6
magnitudine sit pardali, mollicipitis, atque aliarum huiuscemodi. Vt in
merularum genere alia nigra tota est, alia uero candida: ita & suum ha-
bent colorem, cœruleus, chlorion, molliceps & pardalus. Cœruleus cya-
nósue auicula est colore tota cœruleo, quæ maxime in Scyro colit, saxa a- F
mans, urbanas commorationes odio prosequitur: his locis ubi magna ho-
minum solitudo est, ut montium iugis, delectatur: magnitudine minor
quàm merula, maior paulo quàm fringilla. pede magno est, scanditque
saxa, rostro tenui & longo: crure breui similiter ut pipo est. Chlorion totus 7
est luteus. coloris minime grati. hyeme hic non uidetur: sed æstiuo solstitio 8
uenit in conspectū. Discedit exortu arcturi syderis: magnitudine turturis
est. docilis & ad uitæ munera ingeniosus notatur: sed male uolat. Moli-
ceps colore totus cinereo, grandi & cartilagineo capite est: magnitudine 9
paulo maior quàm turdus. Ore firmo, paruo, rotundo: ualet pedibus, sed
pennæ inualens est. Eodem in loco semper sibi statuit sedem, atque ibidem
capitur: capitur autem maxime per noctuam. Pardalus auicula est colore G
tota cinereo, magnitudine proxima superioribus, sed pennis ac pedibus bo-
nis. magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc uidetis: uocē fre-
quentem nec grauem emittit. De fidipedibus quæ grauiores sunt, & quæ
in auariis aut fructus aut ganear causa pasci solebant, quæque iis quoquo
modo cognata sunt, hæc dicta sunt.

1 Quod uero sequitur in Aristotele, *ἡ ψῆς δ' αὖτις ἀλλήλους καὶ ἑαυτοὺς*, &c. ut e-
quidem arbitror, de hirundinibus intelligitur, non de turdis: etiam si Plinius addit, pe-
ne contexim, scilicet hoc ipsum de turdis intelligens. 2 Non *ψῆς* sed *ψαῖς* legit
Theodorus. 3 In textis, Græci *ὡς τῇ καρχηδόνι*, id est in siglinis. 4 Est apud Ari-
stotelem & *αἰγολόφος*, id est capriceps, cui gula inferiore parte lata est. lienem nō ha-
bet: sed uero adhæret simul & uentri & iecinori. 5 Theodorus, Niger est, albis dis-
tinctus maculis. 6 Ita ex ueteri translatione Græca lectio Aldina, & Theodorus,
ita. Collurio eisdem quibus merula uescitur: magnitudo, &c. 7 Tenui, & uetus H
interpres, angusto habet. *χρηστὴν*, fortasse *λεπτήν* erat legendum. 8 Torus luteus,
Theodorus, torus uiridans ex obscuro, *χλωρὸς ὅλος*. Hunc nonnulli marem esse arbi-
trantur in luearum genere. 9 Et cartilagineo, *χρηστὴν*: uide ne sit locus hic cor-
ruptus apud Aristot. uetus certe interpres non habet, sed solum, caput habet magnū.

De auibus carniuoris, & primo de aquilarum generibus.

Cap. CXXXIII.

IN auium genere quibus ungues adunci, prope dixerim omnes, carniuo-
ræ sunt, ut dictum est, ut genera aquilarum omnia, milui, accipitres: ue-
Aquila, αἰεὶς. scuntur tamen & glande in hoc genere pomisque nonnullæ. Ex his aquilæ
maximus

A maximus honos, maxima & uis quoque: quocirca ossa iis natura tribuit durissima crassissimæque, quibus & medullæ minimum inest. Nidificant aquilæ locis non planis, sed celsis: præcipue quidem arduis saxis & præcipiti-
 bus, sed arboribus etiam. Incubant tricenis diebus: oua pariunt terna, sed pullos binos excludunt, ut exuersu quem ad Musæum referunt authorem constat:

Excludit binos, edit terna, educat unum.

Sed quanuis magna ex parte sic fiat, tamen & tres uisi aliquando sunt pul-
 li: alterum nido in educando expellunt tædio nutriendi: quippe eo rem-
 pore ipsis cibum negauit natura, prospiciens ne omnium ferarum sortis ra-
 perentur. Vngues quoque earum inuertuntur diebus iis: albescunt inedia
 B penna: ut merito suos oderint partus. Sed pullum eiecitum ossifraga exci-
 pit & educat. Genera aquilarum non æque omnia prolem fastidiunt: sed dis-
 ficilior in alendo una cui nomen pygargo: benignior quæ nigra est (melan-
 ætos dicta.) Alunt aquilæ suos pullos donec potestas uolandi fiat: tum ni-
 do eos expellunt, post regione, quam ipsi genitores incolunt, tota exterminant,
 æmulos scilicet rapinæ. Et alioqui unum par aquilarum magno ad po-
 pulandum tractu ut fatietur, indiget: unde fit ne suos pullos ullo pacto ui-
 cinos habere patiantur. Prædantur locis non suo nido propinquis, sed lon-
 ge distantibus. A meridiano autem tempore operantur & uolant: prioribus
 horis diei donec impleantur hominum conuentu fora, ignæue sedent.
 2 Rapta non protinus ferunt, sed primo deponunt, expertæque pondus, tunc
 C deum abeunt. Venatur aquila etiam lepores, hinnulos, uulpes & reliqua
 quæ uincere ualeat. Condunt referuantesque aquilæ suo in nido quantum ci-
 bi pullis superfit: quod enim die quaque facultas uenandi non datur, fit in-
 terdum ne quod portent extrinsecus habeant. Viuit aquila tempore lon-
 go, quod diuturnitate nidi eiusdem declaratur. Senescitibus aquilis rostrum
 superius accrescit, incuruatque subinde magis magisque, ut demum fa-
 me intercant, non senio nec ægritudine. Rhodus aquilam non habet. Aqi-
 larum pennæ mixtas reliquarum auium pennas deuorare feruntur. Dis-
 fidet aquila cum dracone: uescitur enim aquila anguibus: cum ardeola etiã
 pugnat: unguibus enim ualens aquila aggredditur: ardeola autem repugnan-
 do emoritur. Sitta & trochilus cum aquila pugnant: sitta enim oua aquilæ
 D frangit: aquila tum ob eam rem, tum etiam quod carni uora est, aduersatur
 omnibus. Cum aquila etiam pugnat uultur & olor: uincitque eam sæpius
 olor. Cymindis chalcisue cum aquila pugnat adeo acriter, ut sæpius ambæ
 implexæ deferantur in terram, & uiuæ à pastoribus capiantur. Aquilarum
 fel acre admodum est, atque corpora exest: coloreque spectatur ærugi-
 neo. Hoc, ut fertur, si unã cum Attico melle inungatur, cui hebescent o-
 culi, plane uisum recreabit, reddetque oculos acutissimos. Lapis æcites
 in aquila: repertus nido custodit partus contra omnes abortiuum insidias.
 Aquilarum plura sunt genera: unum quod pygargus ab albicante cauda di-
 citur, ac si albicillam nomines. Versatur hæc in caplis, & lucis, & circa op-
 pida, hinnularia à nonnullis uocata cognomine est: môtcs etiam syluamq;

Pygargus.
Albicilla.
Hinnularia,
uicæ quies.

DE DIFFERENTIIS

*Plangus, vel
Plancus, vel
Clangus.
Νηπιφίτης,
Anataria.
Morphnos,
vel morphna.
Parnus.*

*In lacus, aliis
in latus.*

*Μολαινίτης,
Pulla aquila,
Fulvia.
Λαγοφίτης,
Leporaria,
Valeria.*

*Pernopterus,
Ορεσπλάγιος,
Ciconia mon-
tana.
Γυπαίτης.*

*Haliæetus.
Haliæetus.*

*Τηλαίος ή ήδης,
Χρυσάινος,
Stellaris aquila.
Media magni-
tudine, inquit
Plinius.*

fuis freta viribus petiti. Reliqua genera raro plana & lucos adeunt. Hæc ma-
xiime inter aquilas difficilem se præbet in fœtu alendo. Alterum genus se-
cundum magnitudine & ui, plangos nomine, *νηπιφίτης* etiam cognomi-
natur, id est anataria, & morphnos: Homerus parnon uocauit. Huic ui-
ta circa lacus stagnaue, & saltus quoque & conualles. Phomonoë Apollinis
dicta filia dentes ei esse prodidit, mutæ alias carenti lingua: eadem nigerri-
mam, prominentiore cauda: consensit & Boëthus. Ingenium est ei testudi-
nes raptas frangere è sublimi iaciendo: quæ fors interemit poetam Æschy-
lum. Aquaticas aues hæc appetit, mergètes sese subinde, donec sopitas las-
satæque rapiat. Spectanda dimicatio, aue ad perfugia litorū tendente, ma-
xime si condensa arundo sit: aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetat,
in lacus cadente, umbramq; suam nanti sub aqua à litore ostendente: rur-
sus aue in diuersa, & ubi se minime credat spectari emergente. Hæc causa
est gregatim auibus natandi, quia plures simul nō infestantur, resperfu pē-
narum hostem obcæcantes. Sæpe & aquilæ ipsæ nō tolerantes pondus ap-
prehensum unā merguntur. Tertium genus magnitudine minima, sed ui-
ribus omnium præstantissima hæc est. Colit montes & syluas *μολαινίτης* à
Græcis dicta, id est pulla aut fulua: & *λαγοφίτης*, id est leporaria: eadēmq; ua-
leria. Sola aquilarum fœtus suos alit atque educit: ceteræ fugant. Pernix
est & prompta ac pugnax intrepidæque liberalis non inuida est, modesta
etiam nec petulans: quippe quæ non clangat neque murmuret. Quartum
genus pernopterus, capite albicante, corpore maiore quàm ceteræ adhuc
dictæ, sed alis breuioribus, cauda longiore, uulturina specie, *ορεσπλάγιος* co-
gnominatur, id est ciconia montana, & *γυπαίτης* imbecillis & degener est
quippe quæ à coruo ceterisque id genus alitibus uerberetur fugeturq; gra-
uis est enim & uictu iners, famelica semper est & querelæ murmurationis,
incolit lucos. Nec ceterarum aquilarum uitiis caret: & bonorum quæ illæ
obtinere expers est. Sola aquilarum ex anima fert corpora: cetera cum oc-
cidere confidunt. Quintum genus quod haliæetus, hoc est marina aquila uo-
catur, ceruice magna & crassa, alis curuantibus, cauda lata. Moratur hæc in
litoribus & oris maritimis: & lacus quoque petit. Clarissima est oculorum
acies, librans ex alto sese, uisq; in mari pisce præceps in eum ruens, & dis-
cussis pectore aquis rapiens. Accidit huic sapius, ut cum ferre quod cepe-
rit, nequeat, in gurgitem demergatur. Haliæetus tatum (inquit Plinius) im-
plumes etiamnum pullos suos percutiens subinde cogit aduersos intueri
solis radios: & si conuiuētē stentēque animaduertit, præcipit è nido,
uelut adulterinum & degenerem: illū cuius acies firma contra steterit, edu-
cat. Haliæcti (ut Plinius author est) suum genus non habent, sed ex diuerso
aquilarum coitu nascuntur: & id quidem quod ex iis natum est, in ossifra-
gis genus habet. Mixto huius aquilæ felle cū melle Attico, inunguntur nu-
beculæ suffusionēque oculorum. Sextum genus *γυπαίτης* appellant, id est ue-
rum ac germanum, uelut solū incorruptæ originis: alij chrysaëton, alij stel-
lareum uocant. Maxima aquilarum omnium hæc est, maior etiam quàm ossi-
fraga: sed ceteras aquilas uel sesquialtera proportionē excedit: colore sub-
rutilo,

A' rutilo, rara conspectu. Hoc genus aquilarum hinnulos, lepores, græves, iæues¹
 12. cortales uenatur: quin et tauros inuadit. Ex aquilarum genere una tantum

quæ Iouis appellatur carnes non attingit, sed ad uictum illi herba satis est.

13. Quod ex haliaëtis natum est, in ossifragis genus habet, ut dictum est: è quibus uultures progenerantur minores: & ex iis magni, qui omnino non generant. Ossifragam Græci *εἰλω* & *ὄϊν* dicunt: aquilis cognatum genus unguis carniuorumque: eius magnitudo maior est quam aquilæ: color ex cinere albicās. Parum hæc oculis ualet: nubecula enim oculos habet læsos. Probe & fortificat & uiuit: cœnægerula & benigna est. Nutricat bene & suos pullos & aquilæ: cum enim aquila suos nido eiecerit, hæc recipit eos ac educat. Eiicit nanque suos aquila antequam uolandi tempus sit, adhuc

B parentis operam desiderantes, nec uolandi adeptos facultatē. Deiecti pulli uociferantur: sed ossifraga recipit eos benigne, & tuetur, & alit dum quantum satis sit adolefcent. Ossifragi uenter paulatim epotus, calculos cum lotio pellere proditur. Vnū est ossifrago intestinum mirabili natura, omnia deuorata conficienti: huius partem extremam adalligatam prodesse cœtra colum constat. Vultures minores ex haliaëtis progenerantur, uti modo diximus. Vulturum nanque duo genera: alterum paruum & albicantiū, alterum maius & coloris cinerei aut nigri. Vultur ut fere grauior, nisi ex procurfu aut altiore tumulo immissum non euolat. Nidificat in excelsissimis rupibus: unde fit ut raro nidus & pulli uulturis cernantur: ideo etiam fere qui putarent illos ex diuerso orbe nobis incognito aduolare fallō:

C quanquam enim difficile nidum eius alitis uideris, tamen uisus aliquando est: neque certe locorum pluriū incola auis hæc est. Edit non plus quam unum ouum, aut duo cum plurimum: & fœtus sæpe cernuntur fere bini. Vmbrius aruspex auctor est triduo ante aut biduo uolare eos, ubi cadauera futura sunt: & multi exercitum sequētes repente apparent. Cū aquila pugnat uultur: & inimici inter se sunt uultur & æfalo. Ex uolucris in auxilio contra serpentes primum uultur est. Annotandum quoque minus uirum esse nigri. Pennarū ex his nidore, si urantur, fugari eas dicunt: uulturis unguento fugantur, sed alios appetunt odores. Immisculum aliqui uulturis pullum arbitrantur: & sanqualem ossifragam: Massurius immisculum dicit esse pullum aquilæ priusquam albicet cauda: quidā post Mutium

D augurem uisos non esse Romę cōfirmare. Ego (quod ueri similis est, inquit Plinius) in desidia rerum omnium non arbitror agnitos. Sunt in Arcadia circa paludem quæ Tantali dicitur, aquilæ, quæ cyniæ uocantur, colore candido æque atque olores.

1 Plinius: Eiectos ab ijs cognatum genus ossifragi excipiunt, & educant cum suis.

2 Hæc tribuit Ælianus præcipue generi illi, quod chrysaetos & stellaris appellatur. Quam caute lepores uenatur aquila ostendit Aristoteles: quo uero pacto educantur instrunturque ad uenationem apud Indos, explicat Ælianus. 3 Lucius, τὰ ἄλλα.

4 Circa lacus, uerus interpretis in desertis & montanis. 5 Quæ fors, Lege Valeri. Max. lib. 9, & Gellium lib. 13, & lib. 7. Hæc de aquila in genere uel de haliaëto dicuntur, nisi codex sit mendosus apud Aristotelem. 6 Donec sopitas &c. Aristoteles ira, Donec uel stranguet in humore, uel per summa corripit. 7 Plinius, Sola sine clā-

Iouis aquila.

Ossifraga.

Ossifragus.

εἰλω.

ὄϊν.

Vultur.

Nubecula et c.

ὄϊν ἔσθια.

γὰρ.

Vultur, γὰρ,

αιγυπτίος.

Theophrast.

Vnguento nec

canitur.

Immisculum

sanqualeis.

Cynia.

DE DIFFERENTIIS

*Accipiter,
subaquila.*

Nisus.

Barbata.

gore sine murmuratione. 8 Percnopterus, ab alarum notis, inquit Theodorus, uel E
ab alarum nigritia. 9 *ῥυπαῖος*, Videtur Theodorus *ῥυπαῖος* hic legisse, id est sub-
aquila. Alis minimis, Plinius: Corpore maiore, &c. *μυχρὸν μὲν*, uetus interpres, Quā
titas etus est, quasi medietas aliorū: ubi suspecta forsitan uideri poterent Græca exem-
plaria, & legedum esse corpore minore. 10 Nisus in haliaetum muratus narratur.
Ouid. lib. 8 Metamorph. 11 Quæ Plinius hoc in loco de haliaeto narrat, alij ad
alia aquilarum genera referunt: ut Ambrosius lib. 5 Hexamer. & Aristoteles lib. 9 hi-
stor. animalū, nisi forsitan totum illud caput sit mendosum: quod sane suspicor. 12
Quonam modo tauros inuadit hoc aquilarum genus, leges apud Ælianum lib. 14.
13 Genus aquilæ quam barbatam uocant, Thulci ossifragam dicūt. Ossifragam ab
ossifrago distinguit Hermolaus, in Corr.

De accipitrum generibus.

Cap. CXXXIII.

F

*Accipiter,
negl.*

ET accipitrum quoque generi natura
Oraque adunca dedit, curuos dedit unguibus hamos.

Hi multo inter se magnitudine differunt. Color iis maculis distinguitur
ceu lineis. Fel habet accipiter iccori simul & intestino adhærens. Lien illi us-
que adeo exiguus, ut propemodum sensum effugiat: & uentriculus quoque
seruentiori: & quanuis uorax sit, auium tamen quas ceperit, cor nunquam
comedit. Nidulatur locis arduis & saxosis: & uicenis diebus incubat. Acci-
pitres tutius Massiliæ humi sctificāt, nec alibi nascuntur illis assueti genti-
bus. In Thraciæ parte homines atque accipitres societate quadam aucupā-
tur: hi ex syluis fructibus & arundinetis excitant aues: illi superuolantes
deprimunt: rursus captas, aucupes diuidunt cum illis. Accipiter Ægyptius G
mansuetior est quam sint alij. Accipiter decoctus in rosaceo efficacissimus
ad inunctionem oculi uiciorum putatur: item fimi eius cinis cum
Attico melle. Genera non pauciora quam decem esse accipitrum aliqui
prodiderunt. Plinius accipitrum genera inquit, xvi inuenimus. Differunt
autem, quod alij columbam humi cōsidentem feriunt rapiuntque, uolan-
tem non appetunt: alij super arborem aut tale quid conscendentem uenā-
tur: sin humi est aut uolat, non inuadunt: alij neque humi neque in sublimi
manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur. Fertur etiā a co-
lumbis quodq; accipitrum genus cognosci: itaque cum accipiter prouolat,
si sublimipeta est, manent quo constiterint loco: sed si humipeta qui prouo-
lat, est, non manent, sed continuo auolant contra naturam eius auxiliantes
sibi. Accipitrum genus primum uiribusque ualentissimū triorchis a nu-
mero testium nuncupatus: buteonem hunc appellāt Romani: miluo æqui- H
paratur magnitudine, semperq; cernitur, uti Aristoteles author est. Buteo 3
hostis est ranæ rubetæ & angui: rapit enim eos atque exedit. In Balearibus
in honore mensarum est. Secundum genus æsalona Græci uocant, qui 4
(si Plinio credimus) omni tempore apparet: cæteri hyeme abeūt. Æsalo &
uultur inuicem inimici sunt. Et uulpi quoque hostis æsalo est: ferit enim,
pilosque eius euellit, occiditque catulos, ut qui uncus habeat ungues: con-
tra coruus (ut qui uulpi amicus est) pugnat cum æsalone: unde fit ut uulpi,
cum ab æsalone percutitur, auxilietur coruus. Tercium circus, claudum
altero pede: cui cum uulpe quoq; inimicitia sunt, & propter communem
uictum

*Triorchis.
Buteo.*

*Æsalon.
Æsalo.*

Circus, uipus.

Αἰνέκτων: (carne enim uiuunt) uulpem inuadit & uulnerat. Ex ferociorum
 accipitrum numero circus est: & gallinarum domesticarum quoque pullis
 insidiatur. Et alia accipitrum genera sunt, asterias, id est stellaris, & per-
 nes, & palumbarius siue φαλαγγίτης φαβωνίτης, qui in ferociorum accipitrū
 numero censetur. Subuteones uel ὑποβιβάριαι appellantur accipitres, qui
 latiores sunt: alij perci, & αἰνέται uel fringillarij: alij λεῖς, id est leues: & φρω-
 λέχι, id est rubetarij: hi abunde uiuunt, & propter humum uolitant. Chal-
 cis raro apparet, rarus etiam in syluis: montes etenim incolit. nigro colore
 est, magnitudine accipitris, quem palumbarius nominant, forma longa
 ac tenui, Iones cymindem eam appellant: cuius Homerus etiam meminit
 in Iliade, cum dicit,

Asterias, stel-
 laris.
 Pernes.
 Palumbarius,
 φαλαγγίτης.
 Φαβωνίτης.
 Subuteo, ὑπο-
 βιβάριαι.
 Percus.
 Λεῖς, uel leuis.
 Chalcis.
 Cymindis,

*Asterias, stel-
laris.*

Pernes,
Palumbarius,

[illegible]

Subarcto, *subarcto*-
teu *teu*.

Λαῖος, mel' lenis.

Chalcis.
Cymindis.

B Chalcida dijperhibent, homines dixere cymindem.

6 Nocturnus accipiter est. Sunt qui hanc auem non aliā esse quā pyngem
uelint. Interdiu minus apparet, quia clare non uidet, sed noctu uenatior mo
re aquilæ. Et pugnat uero cum aquila adeo acriter, ut sæpius ambæ imple
xæ deferantur in terram, & uiuæ a pastoribus capiātur. Parit hæc ova duo,
& in faxis speluncæq; nidulatur. Genus accipitris tinnunculum uocat ru
stici, qui fere in ædificiis nidos facit. Columbas defendit hic, terrētque cæ
teros accipitres naturali potentia, in tantum ut uisum uocēque eius fu
giant. Hæc de causâ præcipuus columbis amor eorum. Ferūntque si in qua
tuor angulis defodiantur in ollis nouis oblitis, non mutare sedem colum
bas: uel uti narrat Columella, eius pulli singuli fœtilibus ollis conduntur,
stipantiâque opercula superponuntur, & gypso lita uasa in angulis colum
barij suspenduntur: quæ res auibus a morem loci sic conciliat, ne unquā de
ferant, multiuaga alioquin aue. Sunt qui Cenchrin tinnunculum uocat: Cenchridis
& accipitrum quoque generis hanc Græci faciunt. Ventriculus illi mini
me carnosus, sed ingluuici similis. Plurima in adunco genere parit: cum om
nes quibus ungues adunci, parcius generant. huius quatuor reperti sunt
pulli, sed plures etiam posse procreari apertum est. Rubrum est eius ouum
modo minij. sola fere aduncarum bibit. Cenchridis simum albugines ex
tenuat. Milui ex accipitrum genere magnitudine differit. Rapacissima &
famelica semper ales atque carnuiora. Ventriculum habet miluius calidū,
& lienem exiguum. sed quoque habet iecori simul & intestino adhærens.

Printed.

Tierärztliche

Ceramics

Afilmar.
 Afilmare,
 iafirmos.

D Videntur milui artem gubernandi docuisse caudæ flexibus, in cælo monstrante natura, quod opus esset in profundo. Oua pariunt milui bina magna ex parte, interdum terna: totidémque excludunt, uicenis diebus incubant. Hybernis mensibus latent paucis quibusdam diebus: non tamen ante hirundinem abeunt. Traduntur autem & solstitiis affici podagra. Miluus cum coruo pugnat: eripit enim miluus à coruo quicquid tenet, ut qui & unguibus sit præstator & uolatu. Piphex, harpa & miluus amici sunt. Laudatur milui iecur ad oculorum uitia: sed miluorum bilis acris admodum est, atque erodit. Colore quoque eruginoso ffectatur, & nonnunquam atro. In Ægypto autem colunt incolæ, quem accipitrem uocant: qui nec nostris simile quicquam habet, nec Ægyptiis: sed & magnitudine excellit, & ua-

Piphet.

Accipiter *As*
erythrus.

A ipsum ut fortiorem, ceteros pastus consortes occidere auctores sunt. Sed prudenter sane prolis suæ procreationem moliri uideretur cuculus: cum enim se timidum minimèque opitulandi potentem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quo seruari possint. Timiditate enim hæc auis excedit, quippe quæ ab auiculis uellatur, & præ metu earum fugiat. Cuculus immutatur colore, & uocem minus explanat cum se abditurus est, quod facere exortu caniculæ solet. Apparet autem ab ineunte uere ad eius hyderis ortum. Auem cuculum leporina pelle adalligatum, somnum allicere aiunt.

De nocturnis auibus, quæ unguibus sunt. Cap. CXXXVI.

NOCTURNARUM etiam auium nonnullæ aduncis unguibus sunt: hæc interdiu nequeunt cernere, & noctu uenando cibum sibi acquirunt. uerum non tota nocte id faciunt, sed uespertino & matutino. Venantur autem mures, laertos, sphondilas, parnopas, & huiusmodi alias quasdam bestio-
 1 las: *γλαυκώδες* græce dicuntur, id est noctuæ speciei habentes: quæ etiam superiore palpebra conniunt. Noctuam cætera aues omnes die circuo-
 2 lant, quod mirari uocatur, aduolantesque percutiunt: quapropter aucupes ea constituta, auicularum genera multa & uaria capiunt. In genere aduncæ noctua est. Gulam habet parte inferiore paulo latiore: & appendices pau-
 3 cas quasdam infra quæ definit intestinum. Lienem adeo exiguum, ut propemodum sensum effugiat. Diebus quibusdam paucis latitat hyeme. No-
 4 ctuas sexagenis diebus hyemis cubare & nouem uoces habere tradit Nigidius. Harum genus in Creta insula non est: etiam si qua inuecta sit, moritur. Dissidet cornix cum noctua: cornix enim meridie oua surripiciens noctuæ absumit, cum non clare interdiu noctua uideat: noctua contra oua cornicis noctu exedit: estque altera interdiu, altera noctu potentior: item noctua cum orchilo: nam is quoque oua exedit noctuæ. Noctua apibus contraria, & uespis crabronibusque, & sanguisugis. Noctuarum contra aues solers dimicatio: maiore circundante multitudine, resupinæ pedibus repugnant, collectæque in arcum, rostro & unguibus totæ teguntur. Auxiliatur acceipiter collegio quodam naturæ, bellumque partitur. Noctuas ferunt à cauda de ouo exire, sicuti & bubonem & trogonem, quoniam pondere capitū
 5 peruersa oua posteriorem partem corporum fouendam matri applicent. *Trogon. Alia trionæ, non trogonæ.*
 6 Noctua imbre garrula serenitatem, sereno tempestatem enuntiat. Ebriosis oua noctuæ per triduum data in uino, tedium eius adducunt. Noctuarum genus maximum asio est, quibus pluma aurium modo micat. Huius selle-
 7 centi glaucomata emedari dicitur. Nocturna auis & bubo est, & uncos unguibus habet. Plumas habet uelut aures. deserta incolit, nec tantum desolata, sed dira etiam & inaccessa. Noctis monstrum, nec cantu aliquo uocali, sed gemitu. itaque in urbibus aut omnino in luce uisus, dirum offensum est. Priuatorum domibus insidentem plurimis scio non fuisse feralem, inquit Plinius: uolat nunquam quod libet, sed transversus aufertur. Bubonis pedes usti cum plumbagine herba, contra serpentes auxiliari feruntur. Eiusdem ouo ad capillos remedia demonstrant. Quis autem, quæso, ouum bu-

DE DIFFERENTIIS

Ascalaphus. bonis uidere potuit, cum tam ipsam auem uidisse prodigiū sit. Ascalaphū E fabulantur in bubonem uersum. De quo ita cecinit Ouidius,

Ingemuit regina Erebi, testēmque prophanum
Fecit auem: parsūmque caput phlegetontide lympa
In rostrum, & plumas, & grandia lumina uertit.
Ille sibi ablatas fuluis amicitur ab alis:
In caput crescit: longosque reflectitur ungues,
Vixque mouet natas per inertia brachia pennas:
Fœdaque fit uolucris uenturi nuntia luctus
Ignauus bubo, dirum mortalibus onem.

Bubo.

Ascalaphus.

Byas.

Bubo.

Ἐλας, aluco.

Ἀργολίος,

Vulva.

Colaris.

Scops, ἐσκώψ, αῦψ.

Ἀισκώπης.
Perennes scop-
pes.

Nycticorax.

Apud nos, id
est in Creta.

Ascalaphus appendices quasdā paucas habet, ut noctua, adnatas infra quā definit intestinum. Byas græce dicitur (hunc & bubonem nonnulli uocāt:) F specie similis noctuæ est: sed magnitudine nō minor q̄ aquila. Nocturna 4
auis & aduncis unguibus aluco est, maior gallinaceo: picas uenatur. Hæc tria simili specie constant, aluco, ægoliος, & scopos. Ægoliος quoque (quam ululam interpretantur) nocturna auis est, & unguis, specie similis alu- 4
coni & scopi: aluconi compar: & picas quoque uenatur. Interdū raro apparet: sed noctu uagatur & pascitur: colit saxa & speluncas: pollet ingenio ac industria in uitæ muneribus. ægoliος quaternos nunquam edit pullos. Colarem ulula cæterisque adunci exedū, unde his oritur bellum. Vulva tel prædicatur ad albugines, suffusiones, caligines: adeps similiter ad claritatē. 5
Aluconi & ululæ specie similis est, qui scopos uocatur, & unguis quoque, & carne uescitur: uerum magnitudine minor quā noctua est: colore plū- 6
beo candidis quibusdam maculis distincto: in capite utrinque ad tempora emicant plumæ. Duo feruntur scopium genera: & hi quidem uocales, alij uero muti. Et aliqui omnibus anni temporibus apparent: & ob eam rem 6
ἰσκώπης, id est perennes appellantur, qui esui non sunt propter uitiū carnis. colorcm habent glaucum: alij autumnō interdum apparent, nec plus uno aut altero die immorantur, qui & esui sunt, & ualde probantur. Differunt 7
hi nullo fere alio à perennibus illis, nisi corpulentia pingui, & quod uox his deest, illis nō deest: & quod turturi aut palumbi æquales sunt. Imitatrix 7
auis hæc est, non aliter atque otus: & eodem modo capitur (ut aiunt) saltādi imitatione: & ut nonnulli tradunt scopes aues omnes oris expressione & articulata uoce longe superant: & quemadmodum psitacus & pica, sic H
scops hominum & aliarum auium uoces exprimere fertur. Nominantur ab Homero, inquit Plinius, scopes auium genus: neque harum satyricos motus cum insident plerisque memoratos, facile conceperim mentes: neque ipsæ iam aues nascuntur. Aduncis quoque unguibus est nycticorax, 8
quæ & noctu uenando cibum sibi acquirit: habetque (quemadmodum & noctua) appendices paucas adnatas infra quā definit intestinum. Non est 8
ubique locorum similis nycticorax. Apud nos, inquit Strabo, aquila equalis est, uocemque grauem edit: in Ægypto uero graculi habet magnitudinem, & uocem omnino diuersam. Nycticoracem nonnulli uocant otum, a uem scilicet illam quæ se coturnicibus hinc abeuntibus ducem præbet.

1 Ouidius

A 1 Ouidius de Nyctimene in noctuam mutata: Conspēctum lucēmq̃ fugit,
 Et à cunctis expellitur æthere toto. 2 Vin' (inquit Penicatus in Plauti Menechmo)
 affertur noctuam, quē tutu usque dicat tibi. Tutu noctuæ uox est. 3 Aliās, Quibus
 pluma auri modo micat: uel quibus pluma aurium emicat. 4 Aristoteles ita habet,
 οὐλοῦν τὸ μὲν ἄλλοις φέρεται, ὁ δὲ αἰγυλῶν, περὶ πτερίων: ambiguo sane sensu. Quod
 nec minus ambigue uerit Theodorus: Aluco maior gallinaceo est, ulula cōpar. Am-
 biguum scilicet an ulula sit *περὶ πτερίων*, id est specie similis, an magnitudine compar:
 & an sit gallinaceo compar, an aluconi. Verus interpretes ita habet, sensu paulo apertio-
 re, Heleos autē gallo maior, & agolius assimilatur ei multum: cuius sensum & nos se-
 cuti sumus. 5 Scops, Alionem uocat Theodorus: Tyrannio *σκόπας* esse nycticora-
 ces dixit: & *σκόπας* dici quasi *σκόπας τὸν οὐρανόν*, id est uocem noctu edētes. 6 *ἀλυσί-
 πτες*, Sempasiones uocat Theodorus. *ἀνὴρ δὲ ἀλυσίπτης*, inquit Athenæus, si uerum sit exē-
 plar. 7 Corpulentia pingui, Ita legit Theodorus apud Aristotelem: *τὸ πῆμα*: ue-
 rum Athenæus *τὸ πῆμα* habet, ut scilicet differat nō corpulentia, sed pernicitate. 8
 Cicumam uocat Theodorus. aliās, cicunia.

Aluco.

Sempasiones.

Cicumam.

De hirundinum generibus.

Cap. CXXXVII.

1 S Vnt etiam in genere non adunco quæ carne uescuntur, ut hirundo: so-
 lāque carne uescens auis, inquit Plinius, ex iis que aduncos ungues non
 habent: una quoque ex iis quæ carne uescuntur, bis anno nidificat: quæ (uti
 de ea cecinit Ouidius)

Hirundo,
 ἡλιδόνη.

Tecta subit: neque adhuc de pectore cædis

Excessere notæ, signatæque sanguine pluma est.

Hirundinum pennæ quandoque è nigris sunt albæ. Ventriculus hirundi-
 ni longior: & neque gulam habet ampliorem, neque ingluuiem. Fel earum
 Calii uentri, aliis intestino adheret, uel in eodem hirundinum genere. Vo-
 lucrum soli hirundini flexuosi uolatus, uelox celeritas: quibus ex causis ne-
 que rapinæ cæterarum alitum obnoxia est. Eadem demum sola auium nō
 nisi in uolatu pascitur: uerū ut pennis præualere, sic pedibus degenerare ui-
 2 detur. Hirundo nulla arte māuescit. Discedūt hirūdines hybernīs mēsis
 in uicina: & quidem uisæ sunt hirundines in locis quibusdā angustis nudæ
 atq; omnino deplumes. Discedunt ad arēturi ortū. Cōspiciuntur denuo ad
 vii cal. Mart. itaque semestres apparent. Auerse hirundines coire ferūtur,
 contra atque cætera auium genera. Bis anno nidificat hirūdo (ut diximus):
 & pullos edit imperfectos & cæcos: quorum adhuc recentium oculi, si quis
 stylo eos pupugerit, refanescunt, & cernendi uim postea plane recipiunt.
 Indociles quidem sunt, sed intelligentiæ rationem quandam in effingēdo
 D constituendōque nido ostendunt hirundines: luto construunt, stramento
 roborant. Si quando inopia est luti, madefactum multa aqua pennis pulue-
 rem spargunt. Ipsum uero nidum plumis floccisque consternunt tepesa-
 ciendis ovis: simul ne durus sit infantibus pullis. In enutrienda prole lum-
 ma æquitate alternant cibum tam mas quā scemina, obseruantes ne qui
 pullus acceperit, bis accipiat. Notabili munditia egerūt parentes extremē-
 ta pullorum: adultioresque circumagi docent, & foras saturitatem emitte-
 re. apibus iniuria hirundo est. Hirundo tam iuxta aquas uolitans ut penna
 sæpe percutiat, imbrem prænuntiat. Dicuntur hirundines excluso pullo la-
 pillum dare: itaque in uentre hirundinum pullis lapilli candido atque ru-

Plinius lib. 8.
 v 111. calend.
 Mart.Aliās, madra-
 facta.Lapis chelido-
 num.

benti colore, qui chelidonij uocantur, magicis narrati artibus inueniuntur. E
 Hirundinum caro recens cōcerpta auxiliatur contra serpentes. Vua & fau-
 cium dolor anginae mitigatur hirundinum cinere cum melle illito: sic & 3
 tonsillis succurritur & affectibus omnibus qui in gutture, aut columella,
 aut ore contigerint: nonnulli & ad uisus claritatem eo usi sunt. Anginis citif-
 sime succurritur cinere hirundinis ex aqua calida potu. Sed efficaciores ad
 omnia, quæ ex hirundinibus monstrantur, pulli syluestrium: figura nidorū
 eos deprehendit, multo tamen efficacissimi ripariarum pulli. Sunt multi
 qui cuiuscunque hirundinis pullum edendum censent, ne toto anno me-
 tuatur id malum. Strangulatos cum sanguine comburunt in uase, & cine- 4
 rem cum pane aut potu dant: quidam & mustelæ cineres pari modo admi-
 scent: sic & ad strumæ remedia. dant & comitialibus quotidie potu. In sale F
 quoque seruatae hirundines ad anginam una drachma bibuntur: cui malo
 & nidus earum moderi dicitur potus. Hirundinis rostri cinerem cū myr-
 rha tritum, & in uino quod bibitur inspersum securos præstare à temulen-
 tia tradunt. Inuenit hæc Horus Assyriorum rex. Alterum genus hiru- 5
 dinum rusticarum & agrestium, quæ raro in domibus diuersos figura, sed
 eadem materia confingunt nidos, totos supinos, faucibus porrectis in an-
 gustum, utero capaci: mirum qua peritia occultandis habiles pullis, & sub-
 sternendis molles. In Ægypti Heracleotico ostio molem continuatione ni-
 dorum euaganti Nilo inexpugnabilem opponunt, stadij fere unius spatio,
 quod humano opere perfici non posset. In eadem Ægypto iuxta oppidum G
 Copton insula est sacra Isidi, quam ne laceret amnis idem, muniunt opere,
 incipientibus uernis diebus palea & strameto, rostro firmantes, continua-
 tis per triduum noctibus, tanto labore, ut multas in opere emori constet:
 eaque militia in illis cum anno redit semper. Tertium est earum genus
 quæ ripas excauant, atque ita in terra fortificant: non faciunt hæc nidos. ri-
 pariam uocant Latini, drepanis à Græcis dicitur. rara auicula est, apparet æ-
 state tantum cum imber incessit: tunc enim & apparet & capitur. Riparia-
 rum pulli ad cinerem ambusti omnium hirundinum efficacissimæ mortif- 6
 ero faucium morbo, multisque aliis morbis humani corporis medentur.

*Hirundo,
Rustica.
Agrestis.
Syluestris.*

*Riparia.
Drepanis,
Falcula. Theo-
dor.*

*Riparia altera
Argathilis.*

*Apodes.
Cypseli.*

*Intra saxa u-
ni, infra. Pli-
nius, Nidificat
in scopulis.*

In genere item ripariarum est, cui nidus ex musco arido ita absoluta perfici-
 citur pila, ut inueniri non possit aditus. Sūt qui & argathilin in ripariarum
 genere numerent. Solerti porro ingenio argathilis suum instituit nidum: H
 intexit enim specie pilæ lineæ aditu arcto. Ut pennis præualere, sic pedibus 7
 degenerare uidentur hirundo, drepanis, & qui apodes dicuntur: hæc enim
 omnia & moribus, & uolatu, & specie proxima inter se conspiciuntur. Sunt
 uero apodes, quos aliqui cypsellos appellant, hirundinum adeo similes, ut
 haud facile discerni ab hirundine possint, nisi quod tibiis sunt hirsutis. Ni-
 dum specie cistellæ productæ longius longius fictæ ex luto, uno aditu dato
 arctissimo faciunt: idq; locis angustis intra saxa & specus, ut & beluas deui-
 tare possint & homines. Apparent apodes omnibus anni temporibus. Plu-
 rimum uolant quæ apodes uocantur, quia carent usu pedum. hæc sunt quæ
 toto mari cernuntur: nec unquam tam longo naues tamque continuo
 cur-

A cursu recedunt à terra, ut non circunvolitent eas apodes. Cætera genera residunt & sistunt: his quies nisi in nido nulla: aut pendent, aut iacent. Tormina sanant apodes ex uino decocti.

1 Hirundo, Theocrit. *θεοκρίτ. 7. κ. κ. ἑλενγία* *καὶ λέγει οὐ πνεύσας βατῶν φέδρασσιν ἀκρί- ολεωνών.* *δουσι.* Sunt qui putent *ἑλενγία* apud Theocritum hirundinem significare. Interpres Theocriti, ex Aristotele (ut scribit) *ἑλενγία* animal esse tradit, quod in locis uersatur palustribus: esse uero gemebundum, indeque *ἑλενγία* dici, noctūque præcipue laborare. Hæc ille. Ego uero apud Aristotelem non memini legisse *ἑλενγία* animalis genus esse: sed uocem quam edunt ranæ masculæ, cum ad coitum feminas cieant: coire uero noctu maxime. Aratus, ubi imbrium signa describit, ita habet,

ἢ τείζω ἔρποντι ὄρμαλι ἑλεωνών. Vbi scholiastes, *ἑλεωνών* aus est turturis in morem in desertis locis syluestribusue uisitans: uel, ut alij: animal est palustre articulis membrisque minime distinctum: oblongum terreno nemi simile, sed gracilius. Hoc (inquit) non nouit Aristoteles. 2 Discedunt, inquit Plinius, Africos secutæ montiū recessus (uel ut quidam legere malunt) apricos montium recessus. 3 Pullorum cinerem Asclepiades & Andromachus anginis illinunt: at Dioscorides tam matrum quàm pullorum cinere nitur. 4 Modum quo comburi debeant hirundinum pulli docuit Asclepiades, ut ex eo refert Galenus. 5 Hæc non genera hirundinum dixit Aristoteles, sed similia hirundinibus. 6 In genere, ita legendum censet Hermolans hunc locum apud Plinium, nescio quo pacto (ut scribit) ex Aristotele, Theodori fortasse uersionem secutus ex lib. 9 histor. animalium: alij legere malunt, in genere partharum. 7 Specie pilæ lineæ: *πῶς ὁ σφαίρα λίν.* Plinius Ex lino intexens.

De coruino genere, scilicet coruo & cornice, & de monedula.

Cap. CXXXVIII.

C 1 Corui non tantum carne aluntur, sed & alio pabulo. Circa urbes præci- *Corui, xix.*
pue uiuere solent: nec loca mutant aut latent, sed semper apparet. Coruorum pennæ interdum à nigris in albas transcunt. Rostrum coruino generi robustum ac prædurum est. Inguinem non habet coruus, sed eius uice gulam amplam & patentem: in coruis ipsis fel alius uentri, aliis intestinò hæret. Coruinum genus, coruus, inquam, cornix, monedula, coniugium nunquam desinit, neque mas scilicet feminam aut femina marem relinquit: minime quoque salax libidinosisque est, & raro coit. Generat coruus ante solstitium: oua uero non modo bina, ut aliqui uolunt, parit, uerū etiam plura, quaterna scilicet quinæue. Incubat autē uiginti diebus, & pullos cum iam potestas uolandi est, primum nido eiciit: deinde robustos iam regione tota expellit fugatque longius. Itaque paruis in uicis locisque artioribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, non plus bina coniugia sunt. Circa Cranonem quidem Thessaliæ singula perpetuo, authores sunt Callimachus & Theopompus. Genitores etenim abeunt ipsi, & compares ibi relinquentes, soboli loco cedunt. Coruus tauro & alino aduersarius est: quippe qui aduolans feriat, & eorum oculos laceret. Miluus cum coruo pugnat: eripit enim miluus à coruo quicquid tenet. Coruus uulpi amicus est: pugnat enim cum æsalone: unde fit ut huic, cum ab illo percutitur, auxilie-
tur. Aegrescunt corui sexagenis diebus, sit maxime antequam fici coquantur autumno. Prædicunt corui singultus quodam latrantes sequi concutiē-

DE DIFFERENTIIS

tes, si continuabunt, uentos: si uero carptim uocem resorbeant, uentosum est imbrem. Et ut Lucretius cecinit,

- Mutant cum tempestatibus unā
Raucifonos cantus cornicum secla uetusta
Coruorumque greges, ubi aquam dicuntur & imbres
Poscere, & interdum uentos aurāsque uocare.

Corui ouum in aereo uase permixtum illitumque derafo capite, nigritiam capillis affert: sed donec inarescat, oleum in ore habendum est, ne & dentes simul nigrescant: idque in umbra faciendum est, neque ante triduum abluendum. Alij sanguine & cerebro eius utuntur cum uino nigro: alij excoquunt ipsum, & nocte concubia in plumbeum uas condunt. Ouum corui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperos facit. F

Cornix, κερκίς

Cornici natura omniuora est: nam & litora petunt cornices, & quae unda eiecerit animalia aggrediuntur. Nucis duritiam rostro repugnantem uolantes in altum in laxa tegulasue faciunt iterum ac sapius, donec quassata perfringere queant. circa urbes praecipue uiuere solent: neque latent unquam, sed omni tempore apparent. Ales est inauspicata garrulitatis, à quibusdā tamen laudata. Huic quoque deest ingluuiēs: sed eius loco gulam habet latam & patentem. Incessu ambulant cornices, id est pedetentim progrediuntur, neque currunt neque saliant. Cornicum foeminae tantum incubant, alfidueque in opere perseverant: mares his cibum suggerunt, pascuntque incubantes. Pullos edunt imperfectos & caecos, magnamque proli curam impendunt: quippe quae sola in aduncorum genere etiam uolantes iam suos pullos pascens ipsa comitetur. Longa cornici uita est: & ab autumno corripitur morbo. Cornix cum noctua dissidet: cornix enim meridie oua surripit, noctua absūmit, cum non clare interdum noctua uideat: noctua contra, oua cornicis noctu exēdit: estque altera interdum, altera noctu potentior.

Tympanus.

A cornice occiditur tympanus. Imbres praenuntiat cornix, cum scilicet contra aquam clangores dabit perfundens sese. Et ut ait Vergilius,

Cum cornix plena pluuiam uocat improba uoce,

Et sola in sicca secum spatiat arena,

Et caput obiecit querulum uenientibus undis.

Et Cicero quoque,

Fusca cornix.

Fuscaque nonnunquam cursans per littora cornix.

Demersit caput, & fluctum ceruice recepit.

Cornicis carnes esse, & nidum illinere in longissimis morbis utilissimū putant: & in tertianis fiat potestas experiendi. Cornicis cerebrum coctum in cibo sumptum capitis doloribus remedio esse traditur. Monedulae quoque deest ingluuiēs, sicuti & coruo & cornici, sed eius uice gula habet amplam & patentem. Monedulam κελαιὸν uocat de cuius uenatione haec narrat Clearchus: Vasculum si statuatur oleo plenum, aues ad uasculi margines accedentes, effigiemque suam in oleo conspicata, sese immergunt: quo fit, ut pennis earum ex oleo concretis, facile capiantur. Monedularum tria sunt genera: unum quod coracias uocatur (latine graculum appellari putant) ;

magnitudine

Monedula, κελαιός.

Sed uide ne a-

pud Atheniā

pro κελαιός

scribi debeat

κελαιός.

κεραυός,

graculus.

A magnitudine quanta cornix, rostro rotundo & rutilo. In Lemno insula graculos ob id colunt, quòd aduerso uolatu occurrant locustarum exitio. Graculi sero à pabulis recedentes hyemem præfagiunt. Immensa in Insulubrum tractu examina sunt graculorum monedularumque, cui soli aui furacitas auri argentique præcipue mira est. Alterum monedularum genus lycos, *Lycos, Zycos,* id est lupus cognominatum est: paruum est & scurra. Tercium genus palmipes est, Lydiæ ac Phrygiæ terræ familiare. Monedula simili specie est a- *Spermologos, Frugilega, Spermato-* *gos.*
 6 Alexander Myndius, ab eruendis seminibus spermologos & spermatologos uocatur.

1 Apud Apuleium de deo Socratis, uulpes astute coruum laodant his oerbis, B Quantum ad decorem, pluma mollis, caput argutum, rostrum ualidum: iam ipse oculis perspicax, unguibus tenax: oam de colore quid dicam? Enimvero cum duo colores præstabiles forent, picus & niueus, quibus inter se nox cum die differunt, utriusque colorem Apollo suis alitibus condonauit, caodidum olori, nigrum coruo. 2 Apud Ouidium 2 Fastorum Phæbus coruo minatur:

At tibi cum lactens hærebit io arbore ficus,

De nullo gelidæ fonte bibantur aquæ,

3 Coracias, Idem fortasse pyr- *Pyrrhocorax.*

rhocorax Alpium peculiaris, luteo rostro oiger, & præcipuo sapore. 4 Graculos aues esse mihi solitarias, sed gregales apparet ex Varrooe de re rustica lib. 3.

5 Monedula, oï fallor, de secunda illa specie ἀντιοματικῶς dicitur: cui & Ouidius immensum illum auri amorem tribuit:

Scytonis accepto quod auara poposcet auro,

Murata est in auem quæ nunc quoque diligit aurum,

C Nigra pedes, oïgris uelata monedula pennis. *καλοῖς quoque pro hac secun- καλοῖς,*

da specie oononquam accipitur: ut apud Constantinum Cæsare de agricultura lib.

14 6 Spermologos. Aristophaois interpret, ἡ τῷ ἐν τῇ τοῦ ἀντιοματικῆς ἰδιότητι: ut uero Suidas, ἀπὸ τῆς τοῦ ἀντιοματικῆς ἀλλήλων. Et hanc Suidas auiculam esse dicit.

De pico martio, pistrace, pica, & quibusdam id genus aliis.

Cap. CXXXIX.

Sunt & paræ aues uncorum unguium, ut picus martius cognomine: *Picus Martius, ἀντιοματικῆς, πικρ.* cui & rostrum aduncum esse tradunt. Hic humi nunquā consistere patitur: cirrum in capite habet. Tūdit hic quercus uermium causa, & eorum *Picus arborea, πικρ.* 2 quos *οὐκίτης* uocamus: recipit enim egressos lingua sua, quam maiusculā & 3 latiusculam habet. Incedit per arbores uelociter omni quidē modo: sed & *Arborem cœ- ναίστ.* supinus quoque more stellionum. unguis habet commodiores quàm monedula ad tutiorem arborum reptationem: his enim affixis ascendit. Sunt pici martij cognomine tria genera: unum minus quàm merula, cui rubidæ aliquid plumę inest: alterum maius quàm merula: tertium non multo minus quàm gallina. nidulatur in arboribus: pullósque in cauis educant pici auium soli. Picorum aliquis (inquit Plinius) nidum suspendit in furculo primis in ramis cyathi modo, ut nulla quadrupes possit accedere. Picus martius pascitur formicis & iis qui in arboribus nascuntur uermibus: qui & percussu corticis sono pabulum subesse intelligit: cū uermes uenatur, tum uehementer excavare dicitur. Iam uero mirtelæes quidam, amigdalū quod rimæ inscruisset ligni, ita ut fixum constanter ictum reciperet, tertio ictu

DE DIFFERENTIIS

pertudit, & nucleum edit. Et Trebius author est clauum uel cuncum ad-
 ſum quanta ui libeat in arbores, in quibus nidum habeat, ſtatim exilire
 cum crepitu arboris, cum inſederit clauo aut cuneo. Pici martius in Tarcē-
 tino agro negatur eſſe. pici martij roſtrum ſecum habentes ab apibus, ue-
 ſpis, crabronibꝯ ſue non feriri traduntur. Vngues iyngi grandes, quæ ſimi
 les ut monedulis (uel, ut Plinio placet, graculis) exeūt. Iynx paulo maior eſt
 quàm fringilla, colore uario. digiti à calce iyngi bini, ut paucis quibuſdam
 auibus, eo quòd corpus eius minus quàm cæterarꝯ propoſum eſt in aduer-
 ſum. Linguam habet ſerpentibus ſimilem: quippe quam in longitudinem
 menſura quatuor digitorum porrigat, ruſumque cōtrahat intra roſtrum. 5
 Collum etiā circūagit in auerſum, reliquo quieſcente corpore, modo ſer-
 pentum: uoce autem ſtridet. Pſittace Indica auis (quam αἰρεπὴλαος dicūt,
 6 quaſi humanam linguam referentē) quemadmodum aliæ aues unæ, collū F
 habet breue & linguam latam, aptāque ad imitādum. Et loquacior cum
 biberit uinum redditur. Viridis eſt toto corpore, torque tātum miniato in 7
 ceruice diſtincta. Capiti eius duritia eadē quæ roſtro: ut ſi quando ad diſ-
 ſcendum plaga ſit admonendus pſittacus, ſerreo uerberetur radio: nec ſen-
 tit aliter ictus. Quæ accipit uerba pronuntiat: ſtudētque ut quod homines,
 loquatur. in ſyluis in conditam uocem, cuiuſmodi indoctæ aues ſolēt, mit-
 tit: non autem expreſſum os & explanatum habet. Dum pullus eſt, atque
 adeo intra alterum ſuæ ætatis annum, quæ monſtrata ſunt & citius diſcit
 & tenacius retinet: maior paulo ſegnius eſt & obliuiouſus & indocilis. Cum
 deuolat, roſtro ſe excipit, illi innititur, leuiorēque ſe pedum infirmitati G
 facit: cuius roſtri tanta duritia eſt, inquit Solinus, ut cum è ſublīmi præci-
 pitatur in ſaxum, niſi ſe oris recipiat, & quodam quaſi præſidio utatur ex-
 traordinariæ firmitatis. Inter nobiles & plebeos diſcretionem digitorum 8
 facit numerus. Qui præſtant, quinos in pede habent digitos, cæteri ternos,
 inquit Solinus. Minor nobilitas, quia nō ex longinquo uenit, ſed expreſſior
 loquacitas certo generi picarum eſt. Adamant uerba quæ loquuntur: nec
 diſcunt tantum, ſed diligūt, meditantēſque intra ſemet cura atque cogita-
 tione intentionem nō occultant. Nec uulgaris hiſ forma, quanuis nō ſpe-
 ctanda: ſatis illis decoris in ſpecie ſermonis humani eſt. Verum addiſcere
 alias negant poſſe, quàm quæ ex genere earum ſunt quæ glande uſcantur:
 & inter eas facilius, quibus quini ſunt digiti in pedibus: ac ne eas quidem
 primis duobus uitæ annis. Pica uoces plurimas cōmutat: ſingulis enim fere H
 diebus diuerſam emittit uocem. Picarꝯ genera longa inſignes cauda, uarię
 appellātur: proprium hiſ caluſcere omnibus annis cum leritur rapa. Pica 9
 nidum in arboribus facit, ex pilis & lana: parit oua circiter nouē numero,
 picæ cum diligentius uiſum ab homine nidum ſenſere, oua trāſgerūt alio.
 Glandes cum deficiunt colligit pica, & in reſpoſitorio abditaſ reſeruat.

Iynx.
 Torquilla.
 Turbo.

Pſittace.
 Pſittacus.
 αἰρεπὴλαος.
 αἰρεπὴλαος.
 Pſittace.
 Αἰρεπὴλαος.
 Αἰρεπὴλαος.

Pica, n. 1.

Varia.

- 1 Ouidius 14 Metamorph. de pica in auem mutato. - Duro ſera robora roſtro
 Figit & iratus longis dat uulnera ramis,
 Purpureum chlamydis pennæ traxere colorem,
 - Et ſulco ceruicæ præcingitur auro.

A 2 Linguam maiusculam, *μεγίστην*, fortasse longam. uetus interpres, quam habet longam & latam. 3 Sarpinus, Plinius, in subreptum, scilicet modo. 4 Theocriti interpres iynge eam auem nult intelligi, quæ *σπερπυγίς* dicitur: sed an recte hoc, an *τετταγίς*, secus, considera lector. Iynx sola, inquit Plinius, utrinque binos habet digitos. 5 Collum, Hinc torquilla uulgo appellata est, inquit Theodorus: quanquam turbo ab antiquis. 6 Solinus & Paulanias, Sola India mittit pſittacum. 7 Torque tantum *Τορκό*, miniato, Solinus, torque puniceo. 8 Hæc apud Plinium uidentur potius ad picas referri quam ad pſittacos. Ouidius lib. 5 Metamorph. de Pæonibus in picas mutatis, sic habet, - Nemonum conuitia picæ.

Nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit,

Raucæque garrulitas, studiūque immane loquendi.

9 Rapa duas habet sationes: seritur enim & uere ante calendas Martias & Augusto, ex Plinio & Columella & Palladio: uidetur hic Plinius intelligere de secunda satione, quæ mense fit Augusto.

De aliis quibusdam auibus, quæ uictus causa arbores & ligna feriunt contunduntque.

Cap. CXL.

Non alio magis quam uenatu uermiculorū circa arbores lignaue nascentium (*κρίπες*, & *σπίπες* Græci uocant) pipra uiuit, tum maior tum minor: utranque *σπυροχολάπτης*, id est picum martium appellant. Similes inter se sunt, uocemque similem emittunt, sed maiorem qui maior est. pascitur utraque ad ligna aduolans. Pipra cum lutea dissidet: oua enim inuicem exedunt. Ardeolæ quoque inimica est: oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipra. In iis est & auis quæ proprio nomine *κρηπλόγος* dicitur: magnitudine parua, quanta est acanthidis. colore cinereus distinctus maculis, uoce parua: hic etiam lignipeta est. Et *καλίσ* (galgulum interpretantur) lignipeta mirum in modum est: magnæque ex parte ad ligna aduolans pascitur. cui magnitudo quanta turturi fere est: color luteus, uocem emittit magnā. Incola maxime Pelopōnesi auis hæc est. Crex cum galgulopugnat: amici sunt galgulus & ledus: colit enim galgulus fruteta & nemora: ledus saxa & mōtes: suisque locis uterque contentus degit pacifice. De galgulis hæc refert Plinius. Galgulos quidem ipsos dependentes pedibus somnum capere confirmant, quia tutiores ita se sperant. galguli cum scætum eduxere hinc abeunt. Auis icterus uocatur à colore: quæ si spectetur, sanari id malum tradunt, & auem emori. Hanc puto latine uocari galgulum, inquit Plinius. Sitta quoque uiuit ligna contundens: mores huic pugnaces, sed minus hilaris, concinnus, cōpos uitæ familiaris. Rem maleficam ei tribuunt, quia rerū callet cognitione. prolem hæc numerosam facileque progignit. Cum aquila dissidet sitta, & oua eius frangit. Est & auicula quæ dācerthius nomine, cui domiciliū apud arbores, uictus ex uermiculis in ligno nascentibus, qui culicibus similes sunt (thripes uocantur): mores illi audaces, ingenium sagax, in uitæ officij uox clara. Quæ ungues habent aduncos, quæque carne fere pascuntur, aut uermiculis atque id genus bestiolis in ligno nascētibz: eorumque causa arbores lignaue petunt, fere persecuti sumus.

1 Pipra, &c. Theodorus piponem uocat. 2 Ad ligna, *πρὸς τὰ ῥύλα*, ad maceriem Pipa. uertit Theodorus. Aristoteles, ni fallor, & arbores uiuentes intelligit, & succis atque aridas: ut legi fortasse debeat, ad maceriem. 3 *κρηπλόγος*, Theodorus culicilegam dicit.

DE DIFFERENTIIS

xit. 4 Luteus, *λαφίς*: uetus interpres, citrinus: fortasse uiridans. 5 Cum galgulo, Hæc utraq; sententia est mihi quidem suspecta: tum quodd in Græca Aristotelis littera, quod Theodorus (cum galgulo) uertit, habetur *καλῆς* in posteriori uero galgulus *καλῆς* bis dicitur: tum etiam quodd interpres Arabicus non idem habet utroque loco nomen: nam pro galgulo in prior sententia aut nihil habet, aut orocco: in posteriori uero selecoz. Item quem Theodorus ledum, Aristoteles *λεβὴν* uocat. Postremo, quod Aristoteles dixit, *ὁ μὲν καλῆς πικρὸς πικρὸς ἐν αὐτῇ καὶ λίγυος*, Theodorus uertit, Colit enim galgulus fructu & nemora: quanquam & uetus interpres ante illum ita uertit, Feleoz uero manet prope fluuios, & loca in quibus sunt arborcs. 6 Ligna cōrundens, *ὑλοπομῦνξ*. 7 Rcm malficam, &c. *λίγυος φαρμακικὴ αἰών*, quod ita reddidit uetus interpres, Et nigromantici utuntur ipso, quoniam certificat in multis. 8 Viñus ex uermiculis, &c. *ὄρνις φάγος*: est & cerchnus, sed alia uidetur auis, quæ locustas deuorat: ex Aristophane in Auius.

Αἰεὶς.

Cerchnus.

Αἰεὶς φάγος, id est quæ spinis uiscitant.

Cap. CXLI. F

NON ligna arboræue, sed spinas appetunt nonnulla auium genera, atque in spinis uiscitant aut dumetis: uermem autem aut quoduis animal aspernantur: ut acanthis, carduelis siue traupis, & chrysometris. dormiunt hæc, & pascuntur eodem loco. In his acanthidi à uepribus spinis que uictus: neq; uermes nec ullum animal comedit. Victu & colore ignobilis est, sed ualet uocis amœnitate. Acanthis oua parit duodena, auis minima: hyeme ad loca nemoribus frequentia confugit. Acanthis & asinus inimici inter se sunt: asinus enim spinas tenellas adhuc pascit, à quibus acanthidi uictus est. Sunt qui *πικρὴ* quoque hanc auem uocari arbitrantur. Est autē *πικρὴ* (quasi uariam dixeris) auicula colore uario, & in dumetis uersatur. Quæ *πικρὴ* dicuntur, cum alaudis dissident: oua enim inuicem exedūt. **E**githus auis minima cum asino dissidet, propterea quodd asinus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat, nidósq; ægithi dissipet: ob id igitur, si uel rudierit asinus, oua deiiciuntur, & pulli præ metu decidunt: itaq; ob eam iniuriam aduolans, ulcera eius rostro excauat. Egithus uitæ cōmoditate & partus numero commédatur, sed pede claudus est. Traupis spinis uiscitat: uermem autem aut quoduis aliud animal aspernatur: hanc carduelem esse uolunt. Minimæ auium cardueles imperata faciunt: nec uoce tantum, sed pedibus & ore pro manibus. Chrysometris etiam in spinis uiscitat, & uermem quoque & quoduis aliud animal aspernatur, nō aliter atque traupis. Et hæc quidem in spinis dumetisque maxime uiuunt: uermiculos uero aut bestiolas alias ne attingunt quidem.

Acanthis.

Γουλις, Varia.

Ægithus. Salus.

Traupis.

Carduelis.

Carduelus.

Chrysometris.

Χρυσόμειρος.

Aurimæctis.

Acanthis.

Lipurinum.

Spinus.

Lipurinus.

Σπιρίς.

1 Acanthis, & acanthis, & lipurinum uocatur, spinum uertit Theodorus. Est uero *ωινός* apud Athenæum & Suidā auis genus: & *ωινός* apud Pollucem: uerū nondum constat an sit acanthis. Vergilius de acanthide,

Littorāq; halcyonem resonant, & acanthida dumi. 2 Oua deiiciantur. Pli. Quod illa adeo pauca, ut uocem omnino rudentis audita, oua deiiciat, pulli ipsi metu cadāt.

De iis auiculis, quæ maxima ex parte uermiculis aliisque id genus animalculis uiuunt, *σολομοφάγος* dicuntur. Cap. CXLII.

Passer, Passer.

PASSERES autem fere uermiculis aluntur: circa muros urbium uersatur: passer: minor est quā alauda. Eius pennæ ob temporis mutationem, (ut propter frigus) è nigris albidæ sunt. Neque gulam neq; ingluuiem amplam

A plam habet: sed uentriculus illi lōgior, qualis est auiculis fere omnibus. Fel
 in aliis uētri, aliis intestino iungitur. Passeres tum lauare tum puluerare so-
 lent: incedūt autem saliendo. Procliuius in uonerē auicula est & multipara:
 superfiliens coit, & cito perficit. Fœminæ maribus imbecilliores sunt, tum
 aliis corporis partibus, tum uero maxime ipso rostro. Sūt qui fœminas hoc
 in genere uiuaciores esse uolūt, quàm mares, (& id quidem ob marium sa-
 lacitatem:) capi enim has inter nouellos pullos, cognoscique laborum cal-
 lo asseuerant: mares uero anno diutius durare non posse arbitrantur, argu-
 mento, quod ueris initio nulli mentum ^{id est partes sub rostro proximas} habere nigrum spectentur: sed postea, tanquam nullus anni superioris ser-
 uetur. Terpsicles author est, uenerem concitare passeres in cibo, uel oua eo-
 rum. Passerum cinis sarmentis crematorum cochlearibus duobus morbo
 resistit regio. Passeres *Αεινους* uocant nonnulli, alij *φολιυτες*. Apud muros *Αεινους*.
 ueteres sepēsque uictum quarritat troglodytes, omnium auicularum mini *τρογολυται*.
 2 ma, præterquam illa quæ *Βασιλίσκος* appellatur, id est regulus. In multis quo- *Τρογολυτες*.
 que basilisco auiculæ similis est, nisi quod in fronte aureas non habet pen- *Βασιλίσκος*.
 nas troglodytes. Est uero troglodites basilisco regulœ paulo maior ma-
 gisque nigricans, tenui rostro, caudamque semper gerit subrectam, in aue-
 sa parte candicantibus maculis interpunctam. magis item garrulus quàm
 3 basiliscus est, & apud alarum extrema cinerei magis coloris. breues item sa-
 cit uolatus. In hyeme frequens ubique apparet hoc auicularum genus. in ci-
 bo calculum renum comminuit, & assa & sale condita, si assidue edatur: &
 Cne alius progignatur calculus, efficit. Eadem præstat & combustæ auiculæ
 4 cinis epotus: uerum sale obruitur integra, auulsis pennis: uritur autem unā
 cum pennis. In iis quæ uermiculis uicitant tyrannus est, auis minima: ut *Τyrannus*.
 cui corpus non multo grandius sit quàm locustæ. Cristani gestat rutilam, *Κριστα, λευκός*.
 cætera elegans auicula est cantūq; suauis. Vermiculos petit & spiza, frin- *Καντα suauis*.
 gillam uocant: floreo magnitudine æqualis, orospizæ non admodum dissi- *Ενερθεως*.
 milis, & magnitudine quoque. Spiza contrā quàm turtur, æstate tepidis lo- *Spiza*.
 cis, hyeme frigidis degit. Orospezes (quasi montis fringillam dixeris) spizæ *Φριγγιλλα*.
 similis, & magnitudine proxima: sed collo cæruleo, & in montibus degit. *Οροσπιζες*.
 uermiculis maxima ex parte uiuit. Spizites, ægithali, id est pari species est. *Μοντιυ φριγγιλλα*.
 Sunt autem pari tria genera: horum maxima spizites, siue fringillago est,
 D quippe quæ fringillam æquet magnitudine: alter *λεπτός*, id est monticula co- *Spizites*.
 gnomine est, quoniam in montibus degat, cui cauda longior: tertius cæte- *Φριγγιλλα*.
 ra quidem similis illis, magnitudine discrepat: est enim corpore exiguo. Pa- *Παρος*.
 rus, ut aiunt, plurima oua parit. Inferunt iniuriam apibus auiculæ, quas pa- *Ανιχθιδες*.
 ros uocant. uermibus fere uiuunt. Para ænanthe græce dicitur, (ac si ui- *Οπανθης*.
 tifflorem dixeris.) statos latebrę dies habet, ex oriente syrio occultata, ab oc- *Μοντικολα*.
 casu eiusdem prodit: quod miremur, ipsis diebus utrunque. Melancory- *Παρα æνανθε*.
 phus etiam uermibus pascitur, atricapillam uocant. Hanc plurima edere *Μελανόρυθος*.
 5 oua aliqui referunt post Africum struthionem: Iam uel decem & septem *Ατρίκαπilla*.
 oua eius reperta sunt: sed plura etiam quàm uiginti parit, & numero impari
 semper, ut narrāt. Proprium huius & luscinia præter ceteras aues, ut lin-

Melancoryphus.
Ficedula.
Συγκυλός.

Συγκυλός.
Ελαίος.
Ρυβίος.
Λυψίνια.
Αυδύς.
Phylomela.
Λυψίνια uocis
uarietatem ele
gantissime de
pinxit Plinius,
Quod ad uinum,
ut aiunt.

Erithacus.
Rubecula.
Salix.
Phoenicurus,
Φοινικίτρος.
Χλωρίς.
Luteola.
Curuca.
Επιλαίς.
Υπελαίς.
Asilus.
Batis.
Rubetra.

Ἰφιδόχορ.
Περὶ γένους
φουδίου.
Περὶ γένους
βασιλίου.
Regulus.

guæ summæ acumine careant. Melancoryphi & ficedula uicibus commu-
 tantur: fit enim incunte autumnno ficedula, (& hoc nomen non nisi autumno
 habet,) ab autumnno procinus melancoryphus: nec inter eas discrimen ali-
 quod, inquit Aristoteles, nisi coloris & uocis est. Ficedula, inquit Plinius,
 formam simul & colorem mutant. Auem autem eandem esse cōstat, quia
 dum immutaretur hoc genus, utrūque conspectum est nondum perfecte
 mutatum, sed cum utriusque proprium quiddam inesset. *Συγκυλός* Alexander
 Myndius in parorum, siue ægytholorum genere numerat, quæ à nonnullis
λαϊός, ab aliis uero *πυρρίος* appellatur: *συγκυλός* uero cū iam ficus maturuerint. 8
 Epicharmus *ἐπικυλός συγκυλός* in ficum maturitate capi dixit. Luscinia, ut
 modo diximus, præter cæteras aues hoc habet commune cum melancory-
 pho, ut linguæ summæ cacumine careat. Mutat quoque & uocem & colo-
 rem: canere nanque solet diebus ac noctibus quindecim sine intermissu
 cantus, cum sylua fronde incipit opacare. Dein canit quidem, sed non as-
 siduo: mox adulta æstate, uocem mittit diuersam, non insuper uariam aut
 celerem, modulatamque, sed simplicem. Singulis quidem sunt cantus: &
 non idem omnibus, sed suis cuique. Certant inter sese, palamque animosa
 contentio est: uicta morte finit sæpe uitam, spiritu prius deficiente quàm
 cantu. Iam uero luscinia modulos suos pullos docere, uersusque, quos imi-
 tarentur, tradere uisa est. Audit tum discipula intentione magna, & reddit:
 uicibusque reticent. Intelligitur emendata correctio, & in docente quæ-
 dam reprehensio. Canunt in lusciniarum genere tam mas quàm femina:
 cessat tamē femina à cantu, cum incubat pullōsque educat. Colore etiam
 immutatur luscinia: & quidem in terra Italia per id tēpus alio nomine ap-
 pellatur. Apparet non diu: abdit enim sese & latet: & hyeme quidem non
 cernitur, usque ad uernos dies. Parit æstate quinque aut sex oua cum pluri-
 mum. Inuicem transeunt & phœnicurus & erithacus. Estque erithacus
 hyeme, idem phœnicurus æstate: nec alio fere inter se differunt, nisi pecto-
 ris colore & caude: uermiculis pascuntur erithacus & pyrrhulas. Chloris
 à colore dicta pallido (ὀχρὰ) inferioris suæ partis. magnitudine alauda est:
 uermiculos peti: parit quatuor aut quinque. Nidum sibi ex symphyto her-
 ba euulsa stirpitus facit: sed stragulum subiicit ex uillo & lana. In arbore ni-
 dulatur, & in eius nido parit nonnunquam cuculus. uermes pascitur &
 curuca. In huius nido cuculus parit: fouet illa, & excludit, & educat: quo
 quidem præcipue tempore pinguis & grati saporis pullus cuculi est. Inter
 eas aues quæ uermibus pascuntur numeratur & asilus, & batis. Et hæc qui-
 dem uermiculis uiscitant.

1 Passeres, &c. *Ἰφιδόχορ* nonnunquam pro struthocamelo accipitur, sed frequentius
 ut sit generale ad omnes auiculas, sicuti & *φουδίορ*, qui passeres dicuntur, à Galeno, ni
 fallor, *πυρρίτι* *φουδίου* uocantur, & *πυρρίτι*. 2 *βασιλός* est apud Aristotelem in-
 ter eas quæ uermes pascuntur: an alia sit auis à *βασιλόν* *ἄετις* & Pauli cōsidera leior:
 Theodorus regulum uocat: uerum de rege aue, quæ *βασιλός* dicitur, iofra in trochilo.
 Colore, inquit Paulus Ægioeta, inter cinereum & uiride: uel fortassis inter cinereum
 & pallidum, ut legatur *ἰφιδόχορ* pro *χλωρό*. 3 Cinerei magis coloris, Num coloris ma-
 gis uarij: *λαρρίτρος*. 4 Quomodo & sale conditur & uritur, docet *ἄετις*. 5 Stru-
 thionem,

A thionem, &c. τὴν ἐν Λιβύῃ φασὶν αἰετος interpres, passerem qui est in Libya dixit: & ite Albertus. 6 Ficedula quod ficus edat, hoc nomen sortita est, ut inquit Varro: quod & Martialis testatus hoc disticho est,

Cum me ficus alar, cum pascar dulcibus uvis,

Cut potius nomen non dedit uua mihi?

7 Αἰμυλῆς & αἰμυλῶς, auis sunt nomina apud Pollucem: hæc ut sit auis in alia, Αἰμυλῆς nondum cōstat. 8 Πλαίης, &c. Vide ne sit Athenæ liber mēdosus hoc in loco. 9 Αἰμυλῶς, Pyrrhulus eadem uidetur, quæ phœnicurus: quanquam Theodorus rubicillam interpretatur, cum phœnicurum rutilicillam uocet: si cui secus uideatur, non contendo: το Rubicilla. Chloreus (quem Theodorus quandoque luteus) quandoque luteam uocat) mea quidem sententia longe alia auis est, & maior quàm chloris: nam iustar & chloteus pugnans, & occiditur a chloreo rurtur. Adhæc chlōreus & pipra dissident: oua enim in uicem exedunt. Et coruus & chloteus pugnant, ut refert Plinius: nisi forte exemplaria hoc in loco sint mendosa. In hoc genere luteatum nonnulli uitronem marem esse opinantur.

De auibus, quæ circa aquam uiuant: primò de uolacibus.

Cap. CXLIII.

Vermiculis etiam uiuit anthus: nec iis solum, sed herbis quoque pascitur. Colit hic paludes & amnes, & fidipes est: coloris pulchri & uictus facilis. Eius magnitudo quanta fringillæ. odio equum habet: pellit enim equum a pabulo herbe, qua nescitur anthus. Nubeculans hic nec ualens acie oculorum est: uocem equi imitatur, & aduolans equum territat atque fugat: sed qui interdum excipitur, occiditurque ab equo. Ut hic equi uocem, ita auis est quæ boum mugitus imitetur in Arelatensi agro, taurus appellatur. Clara, alioqui paruâ. Trochilus parua auis, rex autem in Italia uocatur: apud aquas uiuit. Crocodilis hiantibus trochili auēs inuolantes depurgant dentes, & os ipsum totum: quo munere & ipsi aluntur, & crocodilus sentiens secum commode agi, nihil nocet: sed cum egredi auem uult, ceruices mouet ne comprimatur. Sed uaria sunt trochilorum genera & nomina, nec cum iis omnibus fœdere deuincitur amicitiamque colit crocodilus: sed cū solo nūcupato eladorincho societatem atque amicitiam seruat. Condensa loca incolit trochilus & foramina. capi difficile potest, & fugax est: uictus probitate & solertia præditus. uocatur idem αἰετός & εὐανθής, id est senator & rex: quapropter aquilam cum eo pugnare referunt. αἰετός priuatas contra hostiū inimicitias gerit. Elea inspectat paludes ab arundinibus. parua corpore est, sed uoce proba, & cum primis uitæ cōmoditate nota. Condidit ætate in umbra & aura, hyeme in sole & apricis. Genus halcyonum aquas adamat, lacus scilicet & fluuios: sed apud mare halcyon quoque uer fatiatur, & à mari uictum petit. Duplex hoc genus est, alterum uocale, arundinibus insidens: alterum mutum, quod ampliore corpore est. Minores in arundinetis canūt. Halcedo paulo amplior est passere: colore tum cæruleo, tum uiridi, tum etiam leuiter purpureo insignis: uidelicet nō particularim colore ita distincta, sed ex indistincto uarie resurgens corpore toto, & alis, & collo. Rostrum subuiride est, longum & tenue: collo gracili, inquit Plinius, ac procero. talis species eius est. Nidus marinæ similis pilæ, & iis quæ halofachnæ dicantur, præterquam colore, qui leuiter rufus est. figura proxima

DE DIFFERENTIIS

cucurbitis medicinalibus, iis quibus collum porrectius est, magnitudo amplior quàm maximæ spongiæ. Inania quoque habet cauis spongiarum similia. Renititur ferramento acuto, ut uix possit discindi: sed si unà & ferro tundis, & manu collidis, facile perinde ut flos maris aridus (halosachnem dico) confringitur: os eius per quàm angustum, quoad sit exiguus aditus, ut etiam si uertatur mare, influere nequeat. Ambigitur ex quam materia componatur: uidetur tamen è spinis potius belones piscis constitui: piscibus enim halcedo uiuit, sed amnes etiam subit ascendens longius. Fortificat totò suæ ætatis tempore. parere nata menses quatuor incipit: partus huic maxime quinque ovis consistitur. Circa brumam parere solita est. dies earum partus qui maria quoque nauigare nouere: sternitur enim mare halcyonum fertur, & inde nomen ii dies traxere, septem scilicet ante brumam, & septem à bruma: quomobré quoties bruma serena existit, dies halcyonæ appellantur. Septem primis diebus nidum cōficere auem hanc fertur: reliquis septem parere educarèque. Dies halcyoneas fieri circa brumam non semper nostris locis contingit, ait Aristoteles: at in Siculo mari pene semper id euenit: ut uero Plinius, in reliquis partibus est quidem mitius pelagus: Siculum utique tractabile. Halcyonè uidere rarissimum est: fere enim circa uergiliarum occasum brumamque ipsam apparet: & ubi primum per portum non plus quàm nauem circunualarit, statim abit, ut nusquam præterea uideatur. Antigonus author est halcyonas cum senuerint cerylos uocari, quos tamè Aristoteles separare uidetur. Apud mare, inquit, halcedo uersatur & cerylus. Idem quoque Antigonus tradit cerylos à nonnullis mares halcyonas appellari: aliis ceyx mas est & halcyone fœmina. ut elegantissimo carmine ostendit Ouidius de Ceyce & Halcyone coniugibus, quos fabulantur in huius generis aues mutatos:

Tandem superis miserantibus ambo

Alite mutantur: fatis obnoxius iisdem.

Tunc quoque mansit amor, nec coniugale solutum est

Œdus in alitibus: coeunt fiuntque parentes:

Pérque dies placidos hyberno tempore septem

Incubat halcyone pendentibus æquore nidis.

Halcyonem. Fit in mari halcyonem appellatum ex nidis (ut aliqui existimant) halcyonum & ceycum: alij è sordibus spumarū crasse scētibz, alij è limo uel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera, inquit Plinius, cinereū, spissum, odoris asperi: alterum molle, leuius, odore fere algæ: tertium candidioris uermiculi: quartum pumicosius spogiæque putri simile, pene purpureum: quod optimum, id & Milesium uocatur: quo candidius autem, hoc minus probabile est. Vt uero Galenus tradidit, unū eorū densum est & graue, fetidum: olet enim pisces putridos, figura spongiæ simili: alterum figura oblongiore, rarum & leue, odorem refert marinis fucis similem: tertium uermis figura, colore purpurascēte, substantia molli, Milesium id uocant: quartum æque atque secundum genus rarum leuèque, succidæ lanæ simile: quintum postremo extima superficie leui, interna uero habet aspera: odore

Dies halcyonides, Plinius.

Κέρυλος, αἰθνήλος, Ἀρτίς, Cerylus, Ceyx.

Milesium.

A dore quidem nulló, sed quòd gustu manifestam præferat acrimoniã. Hoc & omnium halcyoniorum calidissimum est: ut quod uel pilos exurere possit. Halcyonij genus omne discutit & abstergit, acri scilicet & calida uis: magis tamen minúsue pro cuiusque generis acrimonia caloréque, & quòd aliud alio partes habeat tenuiores. Nam cum prima duo genera ad alphas, lichenas, leprásque & pforas utiliter adhibeantur, & præterea splendidam reddant cutim, id nõ præstabit quod ultimo loco dictum est: quippe quod non summam tantum cutim exterit: sed abradit & exulcerat. Milesium omnium est tenuissimum: itaque ustum alopeciiis medetur ex uino fuluo & tenui illitum. Vires habet minime omnium efficaces quartò halcyonij genus, ut Galeno placet. Vfus, inquit Plinius, tostis & sine oleo mire B lepras, lichenas, lentigenes tollunt cum lupino & sulphuris duobus obolis. 10 halcyoneo utuntur & ad oculorum cicatrices. Phœnicopterus avis est la-

Phœnicopterus.
rus.

Dat mihi penna rubens nomen: sed lingua gulosis

Nostra sapit: quid si garrula lingua foret?

11 Ad hæc lacus & fluuios petunt albiculae, schœniclos, cinclus, & tringa, 12 quæ omnes caudã motitant: quin etiam calidris, cui cinereus color distinctus uarie. Schœniclos in iis minor est turdo: aquas adamat, & cauda illi motitat. alaude amica avis est. Cinclus minor ite est, quàm tringa: nõ apud C lacus solum & fluuios, sed uitam etiam apud mare traducit. Astutus hic & capi difficilis est: sed captus maxime mitescit. Læsus hic est & prope mutilus: incontinens enim parte sui posteriore est: ideo suapte natura & per se, ut aiunt, nidum sibi construere non potest, sed in alieno parit. Hæc semper caudam motitat. Tringa inter minores has aues maxima est: turdo enim æquiparat. Hæc & circa aquas uiuit, & caudam motitat.

Albiculae.
Calidris
Schœniclos.
Iunco.
Cinclus.

Tringa.

1 Elea, Theodorus (nisi culpa sit librariorum) hanc auem confudit cum gnaphalo. 2 Alterum genus eorum, inquit Plinius, magnitudine distinguitur & cantu. 3 Pilæ figura, inquit Plinius, paulum eminenti, ore perquam angustò grãdiũ spongiarum similitudine. 4 Theodor. Magnitudo maximis amplior quàm spongiæ. 5 Nidum ubi intertexere, in mate deferunt: ubi fluitans ab intereurstantibus undis earum opus probatur: & partes quas aqua ineidés ostendit non firmas esse, ita sarcunt, ut neque si percussarint saxo rûpatur, neque ferro discindatur. Ita Ælianus. 6 Plinius, Putant ex spinis aculeatis cõstitui: pifeibus enim uiuunt. 7 In lacebras abit, Plinius. 8 Cerylos, Theodorus carulos dixit. 9 Numerantur ab Aristotele ut diuersæ aues halcyone & cerylus, eum differant tantum sexu, sicuti & melæoryphus & siccula pro diuersis numentur in eodem capite: & erithæus & phœnicæus: eũ tamen non differant specie, sed affectione quadam. 10 Videtur phœnicopterus insigni esse magnitudine, ex Suetonio in Caligula. Hostiæ erant phœnicopteri, pauones, erithrotaones: non tamen inter maximas aues numerandus, sed inter mediocres magnitudine potius uidetur ex Cor. Celso. Iuuenalis in Satyr. Et Sythiæa uolucres & phœnicæpterus ingens. Heliodorus de rebus Æthiopicis lib. 6. *ἡ φαινίπτερος* dixit, id est phœnicopterum Niliacum. 11 Albicula apud Theodorum habetur, sed non in nostris exemplaribus Græcis. 12 Omnibus iis color cinereus, ut habet uetus interpret.

Cerylus.

DE DIFFERENTIIS

De laro, charadrio, fulica, æthya & catarracta.

E

Cap. CXLIIL.

Larus, λάρος.

Larus auis aquatica est, uorax admodum & gulosa: cui gula tota ampla & lata est. In petris maritimis nidificant lari. Oua bina ternæque pariunt æstate: nec unquam latent. Lari duplex genus, alter colore est cinereo: hic circa lacus & fluuios uiçitat: alter albus est, & à mari uiçtu quærit, ac proinde cum brentho & harpa dissidet larus: quandoquidem & hæ à mari uiçtum petunt. Eadem ob causam, quia scilicet uiçtus earum similis est, inimica harpæ & phoix est: cui peculiare præ cæteris est, ut oculos auis deorare potissimum appetat. Harpa quoque cum triorchæ accipitre dissidet: & communibus inimicitiis harpa & miluus contra triorchin pugnant. Ga-

Brenthum.

Harpa.

Phoix.

Gavia.

Charadrius,

χαράδριος.

Rupex.

Fulicula.

Cepphus,

κεφφός,

Fulica.

uia eadem quæ larus creditur. In petris, inquit Plinius, nidificant gaviæ: æstate, dissidet anates & gaviæ. Auis per alba illa, inquit Apuleius, gavia, quæ super fluctus marinos natat, demergit sese propere ad oceani profundum gremium. Charadrius à mari uiçtum petit. degit plurimum in saxis & cauernis. Præua hæc auis & colore & uoce est: & noctu apparet, die aufugit. Morbo regio medetur, (ut affirmant quidam) si ab ægro uel conspiciatur duntaxat. Quocirca qui auem uendunt, abscondunt eam ne ab ægro prius uideatur, quam eam uendiderint, ut author est Euphranius: alij non hoc uisum, sed in cibo efficere asseuerant. Cepphus (fulicam interpretantur) circa mare uiçtitat. Cepphi spuma capiuntur: appetunt enim eam auidius: quocirca spuma inspersa eas uenari in usu est. Caro earum probi odoris est, excepta parte posteriore, quæ circa clunes est, quæ sola limum olet: sunt autem pingues. Cepphi, inquit Aratus, cum relicto mari gregatim in terram gaderuo uento reuolant, uentum prænuntiant. Fulica, ut Plinius tradit, cirrhum in capite pro apice gestat. Fulicæ matutino clagore tempestates prænuntiant: & ut carmine quoque ex Arato tradit Cicero, qui & fulicem eam uocat,

Cana fulix itidem fugiens ex gurgite ponti,
Nuntiat horribiles clamans instare procellas,
Haud modicos tremulo fundens ex gutture cantus.

Et Vergilius,

Iam sibi tum curuis male temperat unda carinis,
Cum medio celeres reuolant ex æquore mergi,
Clamorémque ferunt ad littora: cumque marinæ
In sicco ludunt fulicæ.

H

Æthya.

Æthya circa mare uiçtitat, & in aqua degit. æthya cum frequentius in mare sese immergunt tempestates nauigantibus futuras præfagire ferunt: huius causam reddunt, quod tranquillo mari progredi non audent æthya marinarum beluarum metu: at cum tempestatem præsenferit, audacter progreditur, quod tunc temporis marinæ illæ beluæ in altum abierunt: uerum Auratus æthiæ, inquit, maria aut stagna fugientes pennasque in terrâ rostro purgantes uentum præfagiunt. Æthya saxis maritimis oua bina ternæque statim à bruma pariunt ineunte uere: nec ullo tempore latent. Æthya uentriculum

A uentriculum amplectuntur nonnulli, tanquam medicamentū, quod concoctioni conferat: uerum (ut inquit Galenus) neque ipse facile concoquitur, neque quicquam ad aliorum concoctionem iuuat. lecur autem inueteratum exsiccatumque ex aqua mulsā binis cochleariis potum, secundas
 8 eiicere author est Dioscorides. Eandem esse æthyam cum *κεφάλαιον θαλάσσιον*, id est cum cornice marina authores sunt Hesichius & Suidas. Et mergū quoque eandem esse auem nonnulli tradunt. Mergus, inquit Plinius, insatiabilis
 9 auis est, eo quod à uentre protinus recto intestino (minime inquam flexuoso) trāseunt cibi. Mergi in arboribus nidificant: pariunt oua plurimum
 10 terna, idq; incipiente uere: nec unquam latent. Inter aquaticas mergi soliti sunt deuorare quæ cæteræ reddunt. Mergi pennas rostro purgātes, uentū,
 11 maria quoque aut stagna fugientes, tempestatem præfagiunt: ut & Vergilius testatus est,

Iam sibi tum curuis male temperat unda carinis,
 Cum medio celeres reuolant ex æquore mergi,
 Clamorēque ferunt ad littora.

Vocem nonnunquam mutare mergum author est Lucretius:

Accipitres atque ossifragæ mergique marinis
 Fluctibus in falso uictum uitamque petentes,
 Longe alias alio iaciunt in tempore uoces.

Mergi totam speciem, seseque immergendi frequentiam pulchre depinxit Ouidius in Æfaci in mergum mutatione:

C Utque nouas humeris assumpserit alas,
 Subuolat, atque iterum corpus super æquora mittit.
 Pluma leuat casus: furit Æfacus, inque profundum
 Pronus abit, lætisque uiam sine fine retentat.
 Fecit amor maciem: longa internodia crurum,
 Longa manet ceruix, caput est à corpore longe.
 Æquor amat, nomēque tenet, quia mergitur illo.

Cataracta mari uicitat: & cum se in altum immerferit, manet nō minus temporis, quā quo spatium transieris iugeri. Minor quā accipiter auis hæc est: gula eius tota ampla & lata est.

D 1 Larus, *λάρος, ἐν φάργῳ πρὸς τὴν θάλασσαν*. Athenæus. 2 *βρηνδης*, Theodorus anate *βρηνδης* interpretatur. 3 Ex hoc Plinij loco forsitan Theodorus apud Aristotelem *βρηνδης* anate uertit. 4 Charadrius, Inter fluuiatiles uidetur Aristophanes hanc auem numerare in Auib: *οἱ χαράδριοι καὶ τὰ ἄλλα περὶ τὴν ὄρεα*. 5 Cephphus, Theon Arati interpretes, Auis & gracilis atq; macra admodū, uti carnis nihil habere uideatur, sed ossa solum & pēnas. 6 Quo pacto fulicæ spuma capiātur, ostendit Nicander in Alexiphar. 7 Limm olet. Quæ sola foret, ita reddit uerus interpres. 8 Æthyam, Arrianus in Pontici maris navigatione *κεφάλαιον θαλάσσιον* unā connumerat cum *αἰθίᾳ*, tanquam aues diuersas. Eadem fortasse apud illum est, quæ coruus marinus uocatur: de quo infra. Mergum etiam bungam à poetis uocari author est Phocion grammaticus. 9 Quibus animalibus intestina recta sunt, inquit Aristoteles, ea ciborū uida sunt. 10 Mergi in arboribus nidificant, inquit Plinius. Qui mergum eundem esse cum æthya sentiunt, locū hunc Plinij aliter legant necesse est. Io. Claymondus ex coniectura ita legendum arbitrat, Gauriæ in petris nidificant: mergi etiam in arboribus

DE DIFFERENTIIS

uerum codices omnes, quos equidē uiderim, in altera litera consentiunt. 11 Maria-E quoque aut stagna fugientes, & cætera. Neque hæc quidem æthyx conuenire uidentur.

De clorio, crece, ortigometra & glottide.

Cap. CXLV.

Ελ.δ.α.ε.ς.

Crex.

Crexibin magnitudine comparat Herod. uti infra uidebitur.

Ortigometra, ορτιγμουῖας.

Tardi incrementi, θυδαλῆς.

Glottis.

ἡλωτῆς.

Lingulata.

ELorius auis est apud mare uictitans creci similis. cælo tranquillo ad litus pascitur. Habet porro crex rostrum longum & acutum ferratū-que: crura item lōga: & digitus pedis posterior, qui loco calcis geritur, minutus est. Crex pugnax est, & ingenio ualens ad uictum, sed cætera infelix. Cum galgulo pugnat, & merula, & uireone: nocet enim his & eorū pullis. Lacustribus auib. similis ortigometra est, quæ ex iis una est quæ duces se præbent coturnicibus hinc abeuntibus. Magnitudo illi turturis, crura longa, auis timida, tardique incrementi. Glottis etiam ex iis est quæ duces se præbent coturnicibus hinc commigrantibus: cui forma quoque similis est auib. lacustribus: hæc linguam exerit prælongam, unde illi nomen. Hanc in initio blandita peregrinatione auide profectam pœnitentia in uolatu, cum labore scilicet subit, reuerti incomitatum piget & sequi: nec uquam plus uno die peragit, in proximo hospicio deserit: uerum inuenitur alia, antecedente anno relicta: simili modo in singulos dies.

De ardeolarum generibus, porphyrione & hæmatopode.

Cap. CXLVI.

Ardea,

Ardeola,

ἰσουλῆς.

Ouidius de Ardea urbe in a-nem mutata.

AFluuiis & lacubus uictum petit ardeola: cui, ut inquit Ouidius,

Et sonus, & macies, & pallor, & omnia captam

Quæ deceant urbem: nomen quoque mansit in illa

Vrbis.

Volat ardea protensis in auersum cruribus, quibus loco uropigij utitur ad uolatum dirigendum. Ardeolæ pipra inimica est: oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipra. Aquila etiam cum ardeola pugnat: unguibus etenim ualens aquila aggreditur: hæc autem repugnando emoritur. Et hostes sunt sorices & ardeolæ inuicem fortibus insidiantes. Rursus amici cornix & ardeola contra uulpium genus communibus inimiciis. Ardea in mediis arenis tristis hyemem prænuntiat: uel, ut Aratus prodit, herodius, cum ad mare magno cum clangore uolat, imbres prænuntiat: sed cum præter consuetum morem relicto mari, terram etiam cum clangore petit, uentos. Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, asterias, id est stellaris. Pellæ coitus difficilis est: uociferatur enim mas, & sanguinem ex oculis (ut aiunt) emittit. parit etiam ægre scemina, summoque cum dolore. Sagax & in uictu quæritudo operosa est & cœnæ gerula. Agere interdum solet: colore tamē est prauo & aluo humida. Prælium cū iis inicit, à quibus læditur: hoc est cum aquila, à qua rapitur: cum uulpe, à qua noctu capitur: cum alauda, à qua oua eius diripiuntur. Reliquarum duarum, cādida colore est pulchro, & coit, & nidulatur probe in arboribus. Pascitur in paludibus, lacu, campis & pratis: & hanc inter aues altero oculo carere tradunt. Sed asterias, quæ & ἰσουλῆς, id est pigra cognominata est, (ut cognomé sonat) iners otiosaque est. Est & quæ ἁλμασποδῆς, id est albardeola uocatur, quæ magnitudo

Herodion fulicam nonnulli uocant.

Pella,

Pellor,

ωιδῆς.

Ἀλκῆς ἰσουλῆς.

Candida, uel alba ardeola.

Asterias, stellaris.

ἰσουλῆς.

ardeola pigra.

Albardeola,

ἁλμασποδῆς.

dine

A dine minor est, rostro lato porrectoque. Ardeolæ rostrum in pelle asinina fronti adalligatum, somnum allicere aiunt. Putant & per se rostrum eiusdem effectus esse uino collutum. Et crura lōga habet porphyrio, collū-
 1 que longum & angustum: & uolat porrectis erutibus, ut ardea, cum uropygium ad uolatum ineptum habeat. Auis est Lybica porphyrio, ut auctor est Alexander Myndius: uerum, uti Plinius refert, Balearæ insulæ porphy-
 2 rionem mittunt: laudatissimi in Commagene. Gallinacei magnitudine est porphyrio, colore cœruleum imitante. Rostra porphyrioni & prælonga crura rubent, pedibus fissis. Auium quibus longa sunt crura solus porphyrio morfu bibit. Cibus omnem aqua subinde tingit: deinde pede ad rostrū ueluti manu affert. Volatu porphyrio minime in sublime fertur: puluerationis insatiabili gaudio tenetur. in locis ubi columbæ se lauare solent la-
 B uatur: nec prius tamen se uel in puluerem dat uel in lauacrum, quàm ambulando certa spatia confecerit. In magnificis splēdidisque domibus porphyrio ludiera delectatio est: quarum intra claustra solutus errat. Porphy-
 rionem qui eibi gratia in cœnis apposuerit hominem scio neminem, inquit Ælianus. Scribit Polemon porphyrionem, si in edibus nutriatur, mulieres anxie obseruare, sensumque adulterij habere: ac significare id patrifamilias in cuius domo alitur: & id quidem haud alio modo quàm sese iugu-
 3 lando. Hæmatopus multo minor est quàm porphyrio, quamquam eadem crurum altitudine: rostrum quoque illi & crura rubent. nascitur in Ægypto. insitit ternis digitis. Præcipue ei pabulum muscæ: uita in Italia paucis
 C diebus. Clitarchus in India scribit uoluerem nomine horionem nasci, magnitudine herodio æqualem, rubris cruribus, oculis cœruleis, sic musica instructum, ut naturæ munere tam suauiter canat, ut ipsas Sirenes lace-
 1 re possit.

Porphyrio.
 πορφυριον.

Hæmatopus.

Horion.

1 πορφυριον, alia auis est apud Athenarū, & latiporphyræ alia. 2 Cœruleum imitante, αμαυροπυριον: uel, ut habet Aristophanis interpres, αμαυρον, id est cœruleo, uel fusco, uel nigro. 3 Hæmatopus, aliàs himatopus.

ταρσος, Latiporphyræ.
 himatopus

De grue, platea, ciconia, & ibide.

Cap. CXLVII.

D Rues ad paludes aduolant: & de ultimis, prope dixerim, in ultima: ex Scythicis enim cāpis ad paludes Ægypto superiores, unde Nilus proflu-
 1 uit, ueniunt: quo in loco pugnare cum Pygmæis dicuntur. Immenfus est tractus quò ueniunt, inquit Plinius, si quis reputet à mari Eoo. Rostrum habent grues longum. Balearicæ grues cirrum in capite gestant. Coeūt grues non confidente humi fœmina, sed stante: & quàm celerrime rem peragūt: mas enim supersiliens, cito, ut passerēs, perficit. Pariunt oua bina. In incessu ante se pedes iaciunt. In grandiorum alitum genere grues tantum mutant colorem, & in senectute nigrescunt. Grues etiā multa prudenter faciunt: loca enim longinqua petunt (ut dictum est) sui commodi gratia: & uolant flatu secundo alte, ut procul per spicere possint: & si nubes tempestatis uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt. Ideoque grues silētio per sublime uolantes, serenitatem: in mediterranea uero festinantes uentum

Grus, καρχήδων

Grues Balearica.

DE DIFFERENTIIS

prælagire feruntur. Ducem etiam habent: & eos qui clament in extremo agmine dispositos, ut uox percipi possit, quo gregem uoce cōtineant. Illud quoque animaduersum, grues cum maria transmittunt, trianguli efficere formā: eius autē summo angulo aër ab iis aduersus pellitur: deinde sensim ab utroque latere dilatante se cuneo, porrigitur agmē: quæ sequuntur grues, in tergo præuolantium colla & capita reponunt: quod quia ipse dux facere non potest, (quia non habet ubi nitatur) reuolat fessus, ut ipse quoque quiescat: in eius locum succedit ex iis quæ assequitur: eaque uicissitudo in omni cursu conseruatur. Cum consistunt, excubias habent nocturnis temporibus lapillum pede sustinentes, qui lassatis somno decidens, indiligentiam sono coarguat: cætera dormiunt capite subter alam condito alternis pedibus insistentes. dux erecto prospicit collo, & quod senserit uoce significat. Eadem mansuetæ lasciuiunt, gyrosque quosdam indecoro cursu uel singulæ peragunt. Corn. Nepos, qui diui Augusti principatu obiit, cum scriberet turdos paulo ante cœptos saginari, addidit ciconias magis placere quàm grues: cum hæc nunc ales inter primas expetatur, illā uero nemo uelit tetigisse. Gruum caro, inquit Galenus, tota fibrosa durāque est: qua tamen uesci solemus postquā pluribus à morte diebus quasi cōputruerit. In Balearibus insulis uipiones in mensarum honore sunt: porto uipiones uocāt minores grues. Gromphæna autem in Sardinia narrat grui similē, ignotā iam etiam Sardis, ut existimo. Platalea etiā migrant, & de Strymone amne ad Istrum aduolant, prolemque ibi faciunt: rostrum habet platalea magnū. Hanc sibi cibum quærere aiunt aduolantem ad eas aues quæ se in mari mergunt: quæ cum emerferint piscemque ceperint, usque eo premere earum capita mordicus, dum captum illæ amittant, atque ita capturam extorqueat. eademque hæc auis scribitur conchis se solere complere, easque cum stomachi calore concoxerit, euomere: atque ita hiantibus iam testis, eligere ex iis quæ sunt esculenta. Ciconiæ circa lacus & fluuios degunt: sed quoniam è loco ad nos ueniant, aut quò se referant incompertum adhuc est: è longinquo uenire non dubiū eodem quo grues modo, illas hyemis, has æstatis aduenas: hyeme nanq; latent ciconiæ. Abitura congregantur in loco certo: comitataq; sic ut nulla sui generis relinquatur, nisi captiua & serua, ceu lege prædicta die recedunt. Nemo uidit agmē discedentium, cum discessurum appareat: nec uenire, sed uenisse cernimus: utrumque nocturnis sit temporibus. Incessu pedes ante se iaciunt ut grues. Sunt qui ciconiis non inesse linguas confirmēt: uerum sonum, quo crepitant, oris potius quàm uocis esse. ciconiæ nidos eosdem repetunt. Eximia illis inest pietas: etenim quantum temporis impenderint fortibus educandis, tantum & ipsæ à pullis suis inuicem aluntur: ita impense nidos fouēt, ut incubitus assiduitate plumas exuant: & genitorum senectutem inuicem educare inuulgatū est. Noceri eis omnibus quidem locis nefas ducunt, sed in Thessalia maxime, ubi serpentum immanis copia est: quos dum escandi gratia insectantur, regionibus Thessalicis plurimum mali detrahunt. Proinde honos iis in Thessalia serpentum exitio tantum, ut capitale fuerit occidisse, eadem legibus poena quæ in hominidam

Vipiones.
Gromphæna.
Platalea.
Πλατεια.
Platea.

Ciconia.
Pelargus.
Πελαργός.

homicidam. Trāspadana Italia iuxta Alpes Lariū lacum appellat, ad quem ciconiæ non permancant. Contra uenenata omnia ciconiarum uētriculus ualeat. Ciconiæ pullum qui ederit, negatur annis continuis lippiturus. Figura & magnitudine ciconiæ similis est ibis, auis māsuetissima. graditur magna tarditate: nec eam ocyus quispiam ingredi uideat, quā molli gradu & tardo. Inuocant & Ægyptij ibes suas contra serpentium aduentum: in-cunte nanque uere (ut aiunt) angues alati ex Arabia in Ægyptum frequen-tes aduolant, quos ibes interficiunt: eāque ob causam auem hāc colunt Ægyptij. Duplici genere distinguuntur ibes. Sunt enim aliæ candidæ, aliæ nigrae. Candidæ apud Pelusium tantum nō sunt, cum in reliqua tota Ægy-pto habeantur. Nigrae contra, apud Pelusium tantū, in cætera Ægypto nul-^{libi.}læ. Extra Ægyptum non progrediuntur ibides. Incolis tum utiles sunt, tum
B inutiles molestæq;: utiles quidem, quod serpentes aliæque noxia animalcu-
la, & omnia macellorum purgamenta deuorant: inutiles uero & molestæ,
quod omnia deuorant, nec facile arceri possunt. Herodotus ita distinguit:
Ibis quæ serpentes oppugnat, nigra tota uehementer est, cruribus gruinis:
rostrum adūco, eadem quæ crex magnitudine. Alteri generi gracile caput ac
totum collum, pennæ ubique candidæ præter caput ceruicēque atq; ex-
tremas alas & nates, quæ partes nigrae sunt: cruribus atque rostro priori si-
mile hoc genus est. Cinis ibidis sine pennis crematæ potus, tormina sanare
traditur.

*Aliæ candidæ.
Strabo. aliæ,
inquit, colore
ciconiæ.*

*Rostrum adūco,
περὶ τοῦ ἰβὸς
ἔστιν.*

1 Platalæ, Aristoteles, οὗ δὲ πτερυγίου τὸ πρὶν περὶ τοῦ γαστρίου. 2 Cum sto-
C machi calore. Aristoteles, οὗ δὲ πρὶν περὶ τοῦ γαστρίου, hoc est: ubi sua inpluue coeunt,
uel ea parte quæ ante uentriculum proxima est. Plutarchus hæc tribuit herodio.

De aquaticis grauioribus, quæ omnes palmipedes sunt: de anserum
generibus, de ore & onocrotalo. Cap. CXLVIII.

Palmipedum quæ grauiores sunt, circa lacus, & amnes uersantur: huius
generis anser præcipue rusticis gratus est: nam elausæ pascuntur in nes-
sotrophis & anates, querquedula, boscaes, phalarides similesque uolu-
cres, quæ stagna & paludes rimantur, sed maiore impensa: anser autem nō
magni fructus, sed minimi oneris est. Anseri gula tota ampla & lata est: &
D appendices quasdam paucas habet infra quā desinit intestinum. Iecur sar-
tilibus in magnam amplitudinem crescit: exemptum quoque lacte multo
augetur. Anseres in aqua coeunt: à coitu sese aquis ingurgitant. Anseribus
admittendis, ut Varro & Columella prodidere, tempus aptissimum est à
bruma: atque ad pariendum & incubandum à calēdis Martij usque ad sol-
stitium. Pariunt uere, inquit Plinius, aut si bruma coiuere, post solstitium
quadragesimo die prope. Bis anno, si priorem fœtum gallinæ excludant: a-
liās plurimā oua quindecim, paucissima septem. si quis surripiat, pariunt
donec rumpantur. hæc Plinius. Singulæ, inquit Varro, non plus quater in
anno pariunt: uel, ut Columella, singulæ ter annō pariunt, si prohibeantur
fœtus suos excludere. Pariunt autem singulis fœtibus oua, primo quina, se-
quenti quaterna, nouissimo ternā. Fœminæ tantum incubant: pullis autem

*Palmipedes,
περὶ τοῦ ἰβὸς.
Anser, ἔστιν.
Alias, boschia-
des.*

*Solstitium Co-
lumbella fit ul-
tima parte mē-
sis Iunij.*

DE DIFFERENTIIS

formandis excludendisque triginta diebus opus est, cum sunt frigora: nam tepidis quinque & uiginti satis est. negatur anser aliena excludere oua, nisi subiecta quoque sua habuerit. Supponuntur autem gallinis huius generis oua, sicut paionina, plurima quinque, paucissima tria: ipsis autem anseribus incubanda subijci utilissimum uouem aut undecim: supponuntur autem paucissima septem, plurima quindecim. Pullis anserum urtica cōtactu mortifera: nec minus auiditas, nunc satietate nimia, nunc suamet ui: nam si anserculus adhuc parum firmus & indigēs ciborū peruenit in pascuum, fruticibus aut solidioribus herbis oblectatur ita pertinaciter, ut collum ab-rumpat. In legendo anserum gregē obseruare solēt, ut mares fœminasque quāam amplissimum corporis, & albi coloris eligantur: quod plerūque pullos similes sui faciūt. Nam est & aliud genus uarium, quod à fero mitigatum, F domesticum factum est. Id neque æque fœcūdum est, nec tam pretiosum: propter quod minime nutriendum præcipiunt. Hoc auium genus, candi-dum præcipue, nutriendum: non quia magni sit fructus, ut dictum est, sed quia minimi oneris: attamen præstat ex se pullos atq; plumam, quam nō, ut in ouibus lanam, semel demetere, sed bis anno, uere & autumnō, uellere licet: rursus enim plumigeri uestiuntur molliorq; pluma, quæ corpori quā-proxima: & è Germania laudatissima. Candidi ibi, uerūm minores ganzæ uocantur: est uero Aristoteli anser maior, est & minor, qui gregatilis est. Anser solertiores custodiam præbet quāam canis: nam clangore prodit in-sidiantem. Anseres continuo clangore intempestiui hyemem præfagiunt. Anserum caro excremento la est, concoctūque difficilis: atque domesticarū G omnium auium calidissima, humidissimaq; & crassissima: ut eodem ordi-ne apud ueteres habita sit cum struthocameli carne: alæ tamen nihilo sunt cæterarum auium alis deteriores: uentriculi suauitate etiam superāt. Iecur quoque anseris in cibo gratum est, concoctioni facile optimisque succi: & qui abunde nutriat, si alimenta quæ anseri antea præbentur, lacte fuerint imbuta: Testes anserum in cibo ad sobolem procreandam iuuare serun-tur: lingua uero singulari quadam proprietate stranguriæ prodest. Sanguis anseris aduersus uenena in antidotis misceatur: maxime uero contra lepores marinos ualet cum olei æqua portione. Item contra mala medicamēta omnia asseruatur cum Lemnia rubrica & spinæ albæ succo, pastillorū dra-chmis quinq; qui in cyathis ternis aquæ bibātur. Anserinus adeps calidior H est, & partium magis tenuium q̄ saillus: qua ratione corpora facilius pene-trat, & eorum quæ intus & in corpore sunt, acrimoniam magis obtūdit. Ex anserum adipe in Cōmagene Syriæ fit unguentum odore iucundo, pa-riter & medicamētum celeberrimi usus, quod à gente dicitur Commage-num: utilissimum ad perfrictiones, conuulsionēs, cæcos ac subitos dolores, omniāque quæ a copis curantur. Adeps anseri labris fissis prodest, si eo perlinātur: aurium grauitatē dolorēque sedat instillatus: quidā adiiciunt luc-cum cepæ & alij pari modo. Si aqua in aurē intrauerit, præcipuū remediū est anserinus adeps cum cepæ succo. Stercus anserinum (ut auctor est Gale-nus) præ nimia acrimonia nullius est usus. Chenalopex circa lacus & amnes uersatur

*Ganzæ, aliās,
ganzæ, ut Rhe-nanoplacet.*

Cōmagenum.

*Χηναλῶπις,
Chenalopex,
Vulpanser.*

A uersatur. Est uero chenalopex corpore quàm anser minor, sed animi robore superior atque ad inuadendum audentior, ut qui se ab aquilæ, felis ac cæterorum hostiũ iniuriis melius defendat. Pullos suos uehementer amat: eandemque operam, quam perdix, in eis tuendis ponit: nam ante suos sætus sese prouoluens, aucupi spem sui capiendi præbet: hi uero interea dum uenator illuditur, elabuntur: quibus fuga elapsis, is sese alis eleuãs discedit: ac sæpe, ut pulli facilius euadant, capiendum se uenatoribus præbet. Parit chenalopex nonnunquam oua hypenemia. Anserũ generis sunt chenalo-
 2 peces, & quibus lautiores epulas nõ nouit Britânia, ceramides, sero anseres minores. Olor grauius habet corpus:

Nec se cæloque louique

Olor,

κύνθη,

cygnus,

κύμν.

B Crêdit, sed

Stagna petit patulosque lacus: ignemque perosus,

Quæ colat elegit contraria flumina flammis.

- Collumque à pectore longe

Porrigitur, digitosque ligat iunctura rubentes:

Penna latus uelat: tenet os sine acumine rostrum.

Appêdices quasdam habet olor paruas infra apud intestinum. oloribus ut alter alterum deuoret in more est maxime in uolucrum genere. Aquilam, si pugnam cœperit, repugnantes uincunt olores: ipsi autem nunquam nisi prouocati inferunt pugnam. Canere soliti sunt, & præcipue iamiam morituri. in mari Africo hoc sæpe sentiri ferunt. uolat etiam in pelagus longius.

C Præcipue faciem purgat atque erugat cygni adeps. Olorum similitudinem

4 onocrotali habent: nec distare existimarentur omnino, nisi faucibus ipsis inesset alterius uteri genus. huc omnia inexplabile animal congerit, mira ut sit capacitas: mox perfectâ rapina, sensim inde in os reddita in uerâ aluum ruminantis modo defert. Gallia hos septêtrionalis proxima Oceano mittit. Onocrotalorum duo produntur genera, alterum aquatile, alterum solitudinis. Diomedæas aues luba cataraçtas uocat: & eis esse dêtes oculos: que igneo colore, cætero candidas tradens:

Onocrotalus.

Si uolucrum quæ sit dubiorum forma requiris,

Vt non cygnorum, sic albis proxima cygnis.

Magna pedis digitos pars occupat: oraque cornu

Diomedæ

aues.

Cataraçtas

D Indurata rigent, sinemque in acumine ponunt. Hæc Ouidius.

Solinus uero, Forma, inquit, illis quæ fulcis, color candidus, ignei oculi, ora dentata. Congreges uolitant: duo super iis duces, alter agmen ducit, alter cogit. Cum fortuum adest tempus, rostro scobes excauant: deinde surculis in uersum superpositos imitantur texta cratium, & sic cõtègunt subtercauata: hanc struem comprimunt terra quam egresserant, cum puteos excauarent: sic nidos moluntur bifori accessu. Aditus qui dimittit ad passus in ortum destinatur: qui excipit reuertêteis, occasum uersus est: ut lux morantes excitet, & receptui non denegetur. Aluum exoneraturæ aduersis flatibus subuolant, quibus proluuius longius auferatur. Aduenas barbaros clangore infestant: Græcis tantum adulantur, miro discrimine. Hæ in solo

DE DIFFERENTIIS

loco totius orbis uisuntur in insula cōtra Apulix oram, quæ tumulo ac delubro Diomedis insignis est.

1 Vnguētū, Huius cōpositionē uideas apud Plī. lib. 10, ca. 22, & 29, ca. 3. 2 Alij uero apud Plinium hoc pacto legi malūt. Anserum generis sunt penelopes, & quibus lautiores cpulas non nouit Britannia, chenalopeces, fere anseres minores: uerum penelops (si Aristophanis scholiastæ credimus) anatī similis est, columbæ magnitudine: uel, ut alijs placet, anate maior (nisi fortasse pro *μῆλα* scribi debeat *μυῖα*.) Penelops, ut refert Aristoteles, circa lacus uersatur & amnes. 3 Ceramides, alij legūt chenerotes. 4 Onocrotalos Festus truones uocat. Onocrotali, ut quidam existimant, dicti sunt ab asinino, quem in aqua faciunt, rudite.

De anatino genere, & alijs quæ anatibus similes sunt. Cap. CXLIX.

Anas.
ἄνα, uel
ἄνα.
Anates Pontica.
Anates Pontica.
Ἰανκίτις,
Glancium.
Boscas.
Colymbis.
Colymbus.
Urinatrix.
Phascades.
Ἰνία, ὀρεία.
Phalaris.
Phalaris.
Boschides.
Querquedula.

E Palmipedum grauiorum genere anates sunt, quæ & circa lacus & amnes uersantur. Anatī gula tota ampla & lata est: appēdices quoq; pauca habet infra quā definit intestinum. Anas mas, ut Alexander Myndius prodit, maior est femina, & colore magis uario. Anates solæ, quæque sunt eiusdem generis, in sublime prouinus scē tollunt; atque euestigio cælū petunt, & hoc etiam ex aqua: itaque in foueas quibus feras uenamur delapsæ solæ euadunt. Veneno anates Ponticas uiuere autumant. anates pennas rostro purgantes uentum præfagiunt. Anatis caro durior est, quā sit turdorum merularū uel aut paruorum auium. Quod uero traditur in torminibus mirum est: anate apposita uentri transire morbum, anatēmq; emori. Sanguis anatum Ponticarum aduersus omnia mala medicamenta pollet: itaque & spissatus seruatur, uinōque diluitur. Mithridatis inuentum autumant sanguinem anatum Ponticarum miscere antidotis, quoniam ueneno uiuerent. Similes anatibus sunt, sed minores paulo, quos glaucia Græci uocant ab oculorum colore. Anatī quoque similes, sed minor est & boscas: circa lacus quoque & amnes uictitans. Mas in hoc genere magis uariius cernitur: habent & mares rostra sima atque minora. Inuenitur & boscadis genus quoddam anate maius, sed minus chenalopecce. Quas ab urinandi uoluptate colymbidas & colymbos nominant. omnium aquaticarum quæ palmipedes sunt, & in lacubus aut amnibus uictitant, minimæ sunt: atrī ac sordidi coloris, acuto rostro. soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Phascades paulo maiores sunt quā colymbides: cætero similes anatibus. Est & uria dicta, non multo minor anate: rostro lōgiore: Hæc ac tenui, colore sordido figlino. Angustum & phalaris uocata rostrum obtinet: caput rotundius, uentrem subcinericio colore, dorsum nigricans: hæc & circa lacus & amnes uictum quærit. Phalarides in Seleusia Parthorum, & in Asia laudatissimæ.

1 Anates, ἄναί *ἄναί* dicuntur ab Aristophane, quasi cingulum candidū habentes, ut uult scholiastes. *ἄναί* *ἄναί* uocauit Aratus aues marinas, quæ in insulis sunt. 2 Boschidas dixit Columella: sed uide an sint exemplaria uera. 3 Magis uariius, *ἄναί* *ἄναί*. 4 *Ἰνία* *Ἰνία* *Ἰνία*, *Ἰνία* *Ἰνία*, id est sepiissime merguntur, uel urinantur. 5 Longiore, *Ἰνία* *Ἰνία*. 6 Sordido figlino, *Ἰνία* *Ἰνία*. 7 In hoc lacustium genere nominantur à Vartone & Columella, *Querquedula*.

De coruis

A De coruis aquatilibus. Cap. CL.

CORUI aquatici naturaliter caluēt, quibus apud Græcos nomen est inde Phalacrocoraces aues Balearium insularum peculiares, iam etiam in Alpibus capiuntur. Qui corax, id est coruus appellatus est, magnitudo illi est quanta ciconia, sed crura breuiora: palmipes natansque, colore nigro. Insidit arboribus, & nidulatur in iis unus ex hoc genere. Et hæc quidem aues circa aquas uictum sibi quarunt.

Coruus aquatilis.
Phalacrocorax.
Coruus marinus.
κόραξ.

1 Corax, κόραξ ὁ βαλκάνιος hæc est, ni fallor, apud Arrianum in ponti Euxini navigatione, & alia ab æthya: quanquam aliter uideatur Suidæ & Hesichio, uti supra in æthya.

κόραξ ὁ βαλκάνιος.

De brinthe & upupa. Cap. CLI.

B MONTES autem colunt & syluas upupa & brinthus: cui & uictus probus, & uox sonora est. Upupa quoque montium incola est & sylvarum, coturnice paulo maior: & ut poeta de tyreo ait,

Brinthus.
Upupa.

-Cui stant in uertice crista,

Prominet in modicum prælonga cuspidē rostrum:

Nomen epops uolucris est, facies armata uidetur.

Epops.

1 Obscena pastu auis, crista uisenda plicatili, contrahens eam subrigensque, per longitudinem capitis a rostro residentem. Eminent pennæ, inquit Pausanias, in galeæ modum. Upupa una in suo genere non nidificat: sed stipites arborum subiens, parit sine ullo stramento in cauis: & nidum potissime & stercore hominis facit. Trimestris auis upupa est: quippe quæ cum fornum eduxerit abit, &

Deserta quærit nemorum, & inuias plagas, ut Æschylus testatus est. Colore etiam immutatur tempore æstatis & hyemis, ut idem author est,

Colore speciem multimodo pingit suam:

Nam uere candicans ubi extitit nouo,

Æstate tum deinde ut recanduit seges,

Alas repente uarias maculatus quatit.

Vagatur hic semper fastidiens locos,

Deserta quærit nemorum & inuias plagas.

D INDICAM upupam Indorum rex amores deliciasque suas ob eius uenustatē circungestat. Upupæ cor in lateris doloribus laudatur.

1 Crista, &c. τριπίς dixit eā Aristophanes, quasi triplicē habentem in galea cristam, uti in scholiis habetur: forsitan ab insigni crista dictum est. 2 In suo genere, ἡ αὐτὴ τῆς αὐτῆς ποικίλλεται. 3 Nidum hominis stercore luti loco circumliniit, inquit Ælianus.

De auibus partim peregrinis, partim monstrosis. Cap. CLII.

IN Hercynio Germaniæ saltu inuisitata genera alitum accepimus: quarum plumarum ignium modo luceant, quamuis densa uox obtegat & densæ tenebras. unde homines loci illius plerumque noctu rationem uia moderantur indicio plumarum refulgentium. Authores sunt omnibus annis cater-

Hercyniæ aues.

DE DIFFERENTIIS

Memnonides, uel Mēnonia aues. uatim aduolare Ilium ex Æthiopia aues, & configere ad Memnonis sepulchrum, quas ob id Mēnonidas aut memnonias uocant. Hoc idem quinto quoque anno facere eas in Æthiopia circa regiam Memnonis exploratum sibi Cremutius tradit. Aues hæc terrā Mariandineam incolere ferunt, colore nigras: corporis forma accipitris simili. Carne abstinēt: eis enim ad cibum semina satis sunt. Seleucides uocantur auiculæ, quæ iugiter locustas, quas ἀπλάβρις uocant, edunt, easdēque celeriter excernunt. Harū aduentum ab Ioue precibus impetrāt Casij montis incolæ, fruges eorum locustis uastantibus. Nec unde ueniant, quōue abeant, compertum est: nusquā cōspectis, nisi cum præsidio earum indigetur. inexplabilem habent deuorādi naturā. Scythicæ terræ incola auis est otidis magnitudine, quæ binos pro-

Seleucides aues,

Scythica auis.

Rhynchaces.

Scylla.

Phœnix, & similes.

creat pullos. & quæ pepererit oua, non incubitū fouet, sed condita in lepore aut nulpina pelle relinquit: atque ita obuoluta in summa arbore collocat: cūque à uenatione uacat, custodit: & si quis scandit, impugnat & uerberat alis, p̄inde ut aquilæ faciūt. Apud Persas gignitur auicula rhynchaces nomine, in qua nihil inuenitur excrementi: sed interna omnia adipe plena: quo fit, ut eam aere atque rōre solum nutriri arbitrentur. Chloriten dicunt magi gemmam inueniri in Scyllæ auis uentre, congenitam ei: ferōque includi iubent ad quædam prodigia moris sui. Æthiopes atque Indi discolors maxime & inenarrabiles ferunt aues: & ante omnes nobilem Arabia: phœnicē: haud scio an fabulose unum in toto orbe, nec uisum magnopere. Manilius senator author est, neminem existere, qui uiderit uestetē. Nam ut tradit Ouidius: -Nec fruge nec herbis,

Sed thuris lachrymis & succo uiuit amomi.

G

Aquilæ narratur magnitudine, capite honorato, cristis faciē caput plumbeo apice honestante: plumarum serie, medio exeunte alio: auri fulgore circa colla, cætera purpureus, cæruleam roseis caudam pennis distinguentibus,

Et Tyrio pinguntur crura ueneno.

4

Viuere quadraginta & quingentis annis: uel ut aliis placet sexcentis L. X: senescentem casia thurisq; surculis (uel ut tradunt alij, cinnamīs) construere nidum, replere odoribus, & superemori. Ex ossibus deinde ac medullis nasci primo ceu uermiculum, inde fieri pullum prodit idem Manilius.

Fœmina sit uel masculus hæc, fortasseq; neutrum:

Felix quæ ueneris fœdera nulla colit.

H

Ipsa sibi proles suus est pater, & suus hæres:

Nutrix ipse sui, semper alumna sibi.

Cinnamomum. Cinnamulæus. Cinnamomus.

Hæc atque alia de phœnice Lactantius. In Arabia quoque cinnamomus aut cinnamulgus auis appellatur, quam surculos cinnamomi portare, ac nidum ex his conficere aiunt. Nidificant excelsis arboribus & ramis: ad quos quoniam non est peruenire ob ramorum altitudinem & fragilitatem, accolæ congeries illas plumbatis petunt iaculis: deiectasque pretiis uendunt amplioribus: quod hoc cinnamum magis quàm aliud mercatores probet. Aues dacnades nuncupatas Ægyptij ad potentium coronas alligare soliti sunt, ut uellicando & assidue cantitando potanteis à dormiendo sustineāt.

Dacnades.

In maris

- A** In maris Caspij infulis auem quādam nasci ferunt, quæ magnitudine anserem superet: pedes autem habeat grui persimiles: dorso sit uehementer rubro, uentre uiridi, collo albo & disseminatis maculis croceis distincto: non minus quàm duo cubita longo, rostro nigro. uocem similem ranis mittit. *Aues Caspiæ.*
- Auis etiā Caspia est, uel potius Indica: (nam in India etiam nascitur) anseris magnitudine: & lato quidem, sed tenui capite, cruribus paruis. uario colore distinguitur: nam eius dorsum purpureum est, uenter maxime coccineus est: caput & cutis exalbescunt: uocem caprinam mittit. Apud Caspios etiam fama est aue procreari magnitudine maximi gallinacæ, uersicolore uarietate florentem: supināque uolare, & sub collum extensis cruribus ipsum iisdē subleuare, tū catelli uocē edere: neque in sublime, sed circū terram idcirco uolare, quōd in altum non queat sese attollere. *Catreus.*
- B** ram idcirco uolare, quōd in altum non queat sese attollere. Catreum etiam forma pulchritudine auem Clitarchus prædicat, pauonis magnitudine: cuius pennarum extremitates smaragdi similitudinem gerunt. Quæ si alios intueretur, eius oculi quō sint colore nescias: si te aspiciat, purpureos dices. Quod in aliorum oculis album, illius pallidum est. peracuto uidendi sensu prædita est. capitis plumæ partim candidulis ocellis, partim guttis quibusdam aliis in alias implicatis distinctæ sunt. Eius pedes sandaracini: & uox canora. eam in deliciis maxime omnium auium Indi habent, ut qui aspectu illius impleri non possint. ex oculis facula splendet, ut lucidissima flammula similis sit. gregatim uolant, ut nubes esse uideantur. Auis in India nasci fertur: magnitudine triplo maior otide, ore permagno & longis cruribus: eam absorbum quiddam sonare: summæque eius alas pallidas: cæteras uero pennas cinericias esse: Indi celā uocant. In India auis ad sturni magnitudinem accedens, uariis coloribus picta nascitur, quæ & humanā uocem effingit, & psittacis uocalior, & maiore est docilitate. Nō tamē humanum uictum æquo animo sustinet: sed libertatis desiderio famem potius quàm seruitutem amplectitur: cercionem appellant, quōd similiter caudā atque cinclus mouet. *Cercio.*
- Paruularum quarundam auium Indicarum genus in excelsis rupibus nidificat: quatum magnitudo perdicū, sandaracino colore: Indi sua lingua dicerum solent nominare: Græci, ut fertur, dicæum. *Dicæum.*
- D** ius sterces si quis milij magnitudine sumpserit in potionem dissolutum, ad uesperam morietur: mors suauis somno similis est, & nullum omnino sensum doloris habet. Quamobrem sum mopere Indi id assequi studēt: ipsum etenim malorum obliuionem existimant inducere. Quod quidem ex India muneri missum rex Persarum omnibus rebus antefert & asseruat, infanabiliū malorum remedium, si sumere sit necesse: neq; apud Persas quifquam alius quàm rex id habet. Peregrina auis & gnaphalus esse uidetur, quippe quæ raro in nostris locis appareat, inquit Aristoteles. Gnaphalus uoce proba est, & colore pulchro: necnon ingenio ualeat in uitæ officiis, & specie præ se fert decoram. Incēdiaria auis inauspicata est: propter quam se penumero lustratam Urbem in annalibus inuenimus (inquit Plinius): quæ sit auis ea, nec reperitur nec traditur. quidā ita interpretantur incēdiariam, quæcūque apparuerit carbonē ferēs ex aris uel altaribus: alij spinturnicem *Spinturnix.*

eam uocant. Sed hæc ipsa, inquit Plinius, quæ esset inter aues, qui se scire diceret non inueni. uerum Festus spinturnix, ait, auis genus est turpis figuræ, occurrit: unde artificu perditis. Spinturnix ea græce dicitur, ut ait San-

Cliuina auis.

Clamatoria.

Prohibitoria.

Subis, uel

Subis.

Tragopanades

Tragopan.

Pegasus.

Griphes.

rgi.

tra *uidetur*. Cliuinam quoque auem ab antiquis nominatam animaduerto ignorari: quidam clamatoriam dicunt: Labeo prohibitoriam. Et apud Nigidium subis appellatur auis, quæ aquilarum oua frangat. Tragopanam uel tragopana plures affirmant maiorem aquila, cornua in temporibus curuata habentem, ferruginei coloris, tantum capite phœniceo. Equidem & hanc auem, inquit Plinius, & pegasos (quos Æthiopia generare dicitur) equino capite uolucres, cornibus armatos: & griphas auritos aduncitate rostri, fabulosos reor. Porro griphas sunt qui tradunt quadrupes uolucres esse, corpore & unguibus leoninis: ore & alis aquilinis, sed candidis oculis igneis, & capite cuiusmodi pictores fingunt, alites ferocissimas. Maculas quasdam griphibus inesse, quidam aiunt, quales pardalibus. in Asiatica Scythia aurum effodere, & cum his assidue bellum esse Arimaspsis circa metalla.

Stymphalides.

Circa Stymphali aquas, aues anthropophagos fuisse aiunt: quas Hercules sagittis confecit: uerum Pisander Camireus Hercule minime aues interfecisse, sed crotalorum strepitu abegisse tradit. Arabiæ terræ deserta loca, & alia fert ferarum genera, & aues quoque stymphalidas cognominatas, leonibus ac pantheris in homines haud minus atroces: inuolant enim in eos, dum illas aucupantur: rostrisque feriunt, atque adeo interficiunt, & quæcunque ex ære aut ferro gestant homines, ea perforant aues: sin uero ex cortice ueste cõtexerint crassiorẽ, nõ aliter stymphalidum rostra corticibus, quàm minorum auium pennæ uisco inhærent. Sunt autem stymphalides gruum magnitudine, ibis specie, sed rostra habent ualidiora, nec adunca more ibis. cirrũ in capite gestant. Aues istæ Arabicæ Arcadicis cognomines, an eiusdẽ fuerint generis, nihil affirmo (inquit Pausanias): alioqui fieri quidẽ potest, ut cum natæ primũ in Arabia fuerint, earum pars aliqua in Arcadiã ad Stymphalim fluuium uolauerit: indeque nomẽ stymphalidũ ortum, cum aliud tamen nomẽ forsitan apud Arabas sortitæ sint. Esse in maledictis antiquis strigem conuenit, sed quæ sit auium constare uon arbitror. Has ita depinxit Ouidius:

Strix, strig.

Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis,

Canicies pennis, unguibus hamus inest.

Nocte uolant, puerosque petunt nutrices egentes,

Et uitiant cunis corpora rapta suis.

Carpere dicuntur lætentia uiscera rostris:

Et plenum potò sanguine guttur habent.

Est illis strigibus nomen: sed nominis huius

Causa, quod horrenda stridere nocte solent.

Sirenes.

Fabulosum autem arbitror, inquit Plinius, de strigibus eas infantium labris immulgere. Nec Sirenes impetrauerint fidem, licet assertet Diuo Clitarchi celebrati authoris pater in India esse: mulcerique earum cantu, quos grauatos somno lacerent. De his ita cecinit Ouidius,

-Vobis Acheloides undæ,

Pluma

- A** Pluma pedéſque auium, cum uirginis ora geratis, Deinde,
 Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures,
 Tantæque dos oris linguæ deperderet uſum,
 Virginei uultus, & uox humana remanſit.

1 Otidis magnitudine. Hoc in loco uetus Ariſtotelis interpres habet, Non minot aquila: ut legiſſe uideatur apud Ariſtotelem, *ἐπὶ τοῦ οὐδὸς ὡς ἀνθρώπου*. nō *αὶ οὐδὸς*, ut legi-
 git Theodorus, & ante illum Plinius. Et mihi certe quadare magis uidetur Ariſtote-
 lis contextui, ut legatur *αὐτὸς οὐδὸς* quàm *αὶ οὐδὸς*. nō propter phraſin ſolū, ſed quòd antea
 uerba plura fecerat Ariſtoteles *οὐδὸς αὐτὸς οὐδὸς*: uerum nihil mouro. **2** Quando &
 ubi uſus eſſe traditur phoenix oſtēdunt Solinus & Plinius: ſed quæ falſa eſſe nemo du-
 bitarit, inquit Plinius. De phoenix lege Herodotū, Ouidiū in Metamorph, Claudi-
 um & Lactantium. **3** Solinus, Capite honorato, in conum plumis extantibus, cri-
 ſtatis faucibus. **4** Solinus, Poſtera parte purpurē absque cauda, in qua toſcis pen-
 nis cœruleus interſcribitur nitor. **5** Gnaphalus, &c. Hæc omnia reſert Theodotus
B ad ueliam auem, ex Græco exemplari (ut opinor) mendoso: nam & in noſtris exem-
 plaribus & ueteri traditionē tanquam diuerſæ ponuntur aues. **6** Solinus, Cor-
 nibus atietinis proferens armatū caput. **7** Hæc ales, inquit Solinus, pegasi ſcilicet
 equinū nihil præter aures habet. **8** Griphas præſcis Latinis picos appellatos tra-
 didit Nonius, ut Plaut. in Aulul. Pici diuites, qui aureos montes colunt: eos ſolus ſu-
 pero. **9** Sitigem, &c. Hæc ſyria græce nuncupatur: uide Hermolaum in ſtriæ uo-
 cabuli explanatione poſt annotationes Plinianas.

Pici,
 Syria.

De ſtruthiocamelo.

Cap. CLIII.

Struthio Africus, quem & ſtruthiocamelum uocant, animal eſt natura
 duplicis: partim enim auem, partim quadrupedem reſert: quippe qui ut
 non quadrupes pennas habeat, ut non auis, neque ſublimis uoler, nec pen-
 nas ad uolandum commodas gerat, ſed pilis ſimiles. Irem quaſi quadrupes
C ſit, pilos habet in palpebra ſuperiore: & glaber capite & parte colli ſuperio-
 re eſt: itaque cilia habet utrinque piloſiora: ſed quaſi auis ſit, infra pennis
 regitur. Bipes etiam tanquam auis, biſulcus tanquam quadrupes eſt: ut ue-
 ro alij, in capite pilis minutis, oculis groſſioribus nigris que, nō diſſimili for-
 ma & colore camelis: collo oblongo, roſtroque acuto. Magnitudine non a-
 uis, ſed ceruorum eſt. Africi autem uel Æthiopici ſtruthiocameli altitudi-
 nem equiris inſidentis equo excedunt, celeritatem uincūt: ad hoc detum-
 datis pennis, ut currentem adiuuent. Vngulæ uero ceruus ſimiles, biſulcæ,
 comprehendendis lapidibus utiles, quos in fuga contra ſequentes ingerūt
D pedibus. Oua pariunt complura, quæ propter amplitudinem pro quibus-
 dam habentur uafis: conoſque bellicos & galeas eorum pennis adornant.
 Concoquendi ſine delectu deuorara, mira natura: ſed non minus ſtolidi-
 tas in tanta reliqui corporis altitudine: cum colla frutice occultauerint, la-
 tere ſeſe exiſtimantium. Struthiocameli caro, ut & reliquæ partes omnes,
 excrementoſa eſt concoctūque difficilior. Venriculus nonnullis in prætio
 habetur, & loco medicamenti quod concoctionem adiuuet: qui tamē ipſe
 non facile concoquitur, tantum abeſt ut aliorum ciborū concoctioni con-
 ſer. Scuum ſtruthiocamelinū efficacioris ad omnia uſus, quā eſt adeps
 anſeris. Animalium eorum quæ inrer ſanguine prædita, terreſtria appella-
 uimus, eo ſcilicet quòd aërem recipiant, partuſque faciant in terra, indica-
 tæ iam differentiæ ſunt. Hinc natura aquatiliū dicitur.

Struthioca-
 melus.
 Struthocame-
 lus.
 Struthio Afri-
 cus.
 Iſtæ & c. & c.
 c. & c.
 Iſtæ & c.
 Struthio.
 Struthio.

De ſtruthi-
 uenatione lege
 Strabonē lib.
 16. & Oppia-
 num de uenat-
 io. lib. 3.

DE ANIMALIVM DIF- B FERENTIIS LIBER VIII

Continet ea quæ in sanguineo genere aquatilia dicuntur: quæ scilicet in aqua uiscitant, & in aqua quoque pariunt, uidelicet piscium & cæterorum genera.

De piscibus, & primo de eorum partibus exterioribus.

Cap. CLIIII.

Piscis, 1x81s.



Nter ea quæ aquas incolunt, piscium genus unum est ab aliis distinctum: quod & forma F cuariat numerosiore. Habet id caput & pro- na & supina ea parte qua uenter & uiscera cō- tinentur. Caudam cōtinuam indiuisamque fere parte gerit posteriore, sed uarie. Mutila- tius autem est piscium genus atque imperfe- ctius quàm auium, partibus exterioribus: pi- scium etenim nulli ceruix, nulli manus aut pedes: sed nec alas habet, sed pinnulas quas-

dam: nulli testes aut intus aut foris, nulli mammæ: neque meatum genita- lium ullum habet piscium genus foris conspicuum, sed continuo ac simpli ti corpore à capite in caudâ usque porrigitur. Capita piscibus proportionē G corporum maxima: oculi omnibus sine palpebris: uerum non duri, sed lu- brici. Auditus uero olfactusue nullum continent membrum manifestum: quod enim uideri tale potest per loca narium, id non ad cerebrum usque transmeât: sed partim obseptum & cæcum mox desinit, partim ad bran- chias fertur: audire tamen atque olfacere pisces palam est. Sunt autem qui uel maxime animalium pisces auditu ualere arbitrentur: uidelicet hominū experimento, qui assidue in mari uersentur, remque piscatoriam percallēt. Sunt etiam qui liquidius inter pisces audire prodantur, ut lupus, mugil, sal- pa & alij quidam: cætera piscium genera minus audiunt. Sunt in piscium genere oris discrimina: aliis enim os ante & promptum est: aliis infra parte supina, ut cartilaginei generis maximæ parti: quam obrem hoc genus nisi H conuersum resupinetur, cibum corripere nequit. Adhæc differētia existit, quod aliis os: reuissum est, ut iis quæ carne uestiuntur: iis enim uires ore cō- tinentur: aliis subinde est in arctius compressum & coarctatum, iis scilicet qui non carne uestiuntur. Dentés habent omnia piscium genera ferratos pectinatimque coeuntés, excepto scato, & acutos: atque serie dentium multiplices fulciuntur. Piscibus etiam data quidem est lingua, sed imperfe- ta incertaque, ac minime explanata: ossa enim nec fere absoluta est, sed adhæret, extrema eius parte tantummodo discreta. In lingua etiam dentes nonnullis & in palato & toto ore: ut turba uulnecura molant, quæ attritu subigere non queunt: præterea in os uergentes, ne excidant cibi, nullū ha- benti-

Huius rei ar- gumentum ui- deat apud Ari- stotelem lib. 4. hystor. animal.

- A** bentibus retinendi adminiculum. Palatum etiam quibusdam adeo carnosum est & molle, ut si parum diligenter aduertas, lingua id esse uideatur, ut cyprino. Piscibus nullum omnino collum esse dixeris, aut breue admodum ex duabus solum primis uertebreis compositum. Branchias autem pisces *ἔχουσιν* habent peculiarem, quibus humorem, quem ore acceperint, reddunt: atque etiam pinnas, quas magna ex parte quaternas gerunt, binas scilicet parte prona, & binas supina. Et hæc quidem in piscibus similiter quodammodo habentur, atque alæ & crura in auibus: his enim alæ duæ superne dependent: illis pinnulæ duæ parte prona: his pedes resupinæ parti subduntur, illis pinnulæ infra adhærent fere iuxta pronam partem. Binas illas quæ parte prona lateribus geruntur, omnes fere habent: reliquis quæ subditæ sunt carent nonnulli ex iis qui longi sunt & corpulenti: ut anguilla, ut conger & mugilum genus, quod in lacu Sipharum nascitur: & præterea quæ tænia appellatur. Iis uero qui prælongi sunt, atque magis serpentis speciem referunt, ut murena, nullæ omnino sunt pinnae, sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: quibus neque branchiæ integræ atque discretæ, ut cæteris piscibus habentur. Cartilaginei quoque generis aliqua pinnis carent, uidelicet quæ plana sunt & caudam habent, ut raia & pastinaca: suæque ipsa latitudine natant. Ranæ tamen pinnas habere uidemus: & quæcunque suam latitudinem colligunt in mucronem. Et branchias ipsas quidam pisces operimento spineo intactas continent: at cartilaginea omnia cuticulari tantum operimento operatas. qui intactas habent, iis in obliquum
- C** utroque latere tenentur: qui tegumento illo spineo carent, cartilaginea dico, iis fere si plana sunt, parte inferiore supinæque habentur, ut raia. Rana autem deductas in latera habet branchias: sed si oblonga sunt, eorum lateribus adhærent, ut in quouis mustelino genere (quod galeodes uocant) cernitur. Item branchiatorum ipsorum, aliis simplices branchiæ sunt, aliis duplices: omnibus tamen simplex est, quæ nouissima corpori admota est: & aliis paucæ, aliis multæ: uerum in utroque latus æque partitæ omnibus sunt. Habent quibus paucissimæ sunt singulas branchias utrinque, easque duplices, ut aper: aliis binæ utrinque, alteræ simplices, alteræ duplices, ut cōgro, scaro: aliis quaternæ utrinque simplices, ut accipenser, dētici, murena, anguilla: aliis quaternæ duplici ordine, nouissima excepta, ut turdo, perca, siluro, cyprino: his qui galeodes dicuntur etiā duplices & quinæ utraque ex parte sunt: gladio octonæ duplices. Ita branchiarum colligitur numerus. Sed præter branchiarum discrimen, pisces à cæteris animalibus differunt, eo quod non pilis, ut terrestria quæ animal generant, non cortice, ut nonnullæ quadrupedes quæ oua pariunt, non penna, ut genus auium, integuntur: sed plurimis squama cutis operata est: quæ præ sua rigiditate tenuitateque facile auellitur. Pauci quidam scabri sunt, cutemque habent asperam: paucissimi leues: cartilaginea enim squamis carent, sed aspera cute fere muniuntur: leuia sunt per pauca: conger autem & anguilla & thunni leues sunt.
- S**quama integuntur illi pisces tantum, qui ouum arenidum friabilem pariunt: nam ex longis conger tale ouum non edit, nec murena. qui autem

*ἔχουσιν.**Pinnas, πτερὰ γὰρ.**Duplici ordine, διπλῶς.*

DE DIFFERENTIIS

squamis integuntur, iis extenuatis ac senescentibus duriores crassioresque efficiuntur squamæ. Testes non habent pisces, sed nec genitale ullum foris conspicuum, sicut nec ullum aliud animalium genus quod careat pedibus: meatus tamen idem est coitus, qui & sicci excrementi: quæ quidem similiter tam in feminis eorum quàm in maribus sunt. Piscibus cauda ad natatum data est, quæadmodum auibus utropygium ad uolatum dirigendū: sed continua fere ac indiuisa: uerum cauda ipsa nō omnibus similis est: sed cum ceteris non euariet, planorum nonnullis spinosa, & longa, & gracilior est, ut torpedini & pastinacæ, & si quid aliud huiusmodi cartilagineum est: quorundam carnosā quidem, sed breuis, ut ranis accidit.

1 Arenidum, *ἄρα. Ἀρενίς*, quia non continuū, sed quoddam arenulentum est, ita diffundi in multa potest. *ἄρα. Ἀρενίττις. ἀμυδρῶς*, id est fungosam & friabilem corpulentiā transtulit Theodorus, in mollibus, scilicet in sepio.

De piscium interioribus partibus.

Cap. CLV.

Gula paucis piscibus inest, ut congro, anguillæ: iisque breuis, sed plurimis ab ore statim sequitur uenter: quocirca sæpius euenit grandioribus nonnullis, ut dum per impetum insectantur minores, uenterculus in os procidat. Piscium cor suum mucronem non ad pectus spectantem, sed contrā quàm in aliis spectatur animantibus, ad caput & os habet: extremūque eius inde pendet, quā branchiæ dextræ atque sinistræ inter se coeunt copulanturque. Sunt etiam meatus alij de corde ad branchias tendentes singulas pro ratione magnitudinis, hoc est maioribus maiores, & minoribus arctiores: inter quos in maioribus crassā admodum & candida fistula est, quæ de cordis extremo oritur. Pisces omnino pulmonē non habent, neque arteriam: (non enim respirant) sed branchias uice pulmonis obtinent, quibus diximus modis. Piscium iecinora maxima ex parte pallidiuscula sunt. Iecoris partes in quibusdā adeo dirimuntur, ut bina esse iecinora uideantur, ueluti cartilagineis. Iecur adipeum nonnullis est, ut cartilagineis: quorum iecinoribus colliquatis oleum facimus. Lien piscibus partim non magnus est, partim uero notæ gratia duntaxat habetur. Fel habent omnes pisces: sed aliis iecori adiunctum est, ut musteligenis, siluro, squatinæ, leuiraiæ, torpedini: atque ex longis anguillæ, belonæ, zygenæ: aliis, & **H** magnæ quidem parti, intestino annexum est, dependens à iecore meatibus quibusdā perpetuis summæ tenuitatis: & aut semotius a iecore, aut propius, ut ranæ, accipenser, dentici, murenæ, gladio. Nonnulli etiam toto intestino prætextum continent, ut amia. Sæpe etiam genus idem utrūque patitur situm, ut congri: aliis enim ad iecur, aliis infra sepositum adhæret. neque renes neque uescicam pisces habent. Venter piscibus unus & simplex est, sed figura uaria est: alij enim modo auium uentriculum habent carnosum, ut mugilis: nonnulli uentrem intestino similem habent, ut scarus, qui **2** & ruminare solus piscium creditur. Intestinum etiam simplex est replicās se, simileque sibi in omnibus eius partibus. Piscibus magna ex parte superne cir-

- A ne circa uentriculum exeunt appendices, ut in iis quasi lacunis cibum conditum macerent atque concoquant: nonnullis complures, ut gobio, galeo, perca, scorpion, mullo, sparo. at mugili parte altera plures exeunt, altera una tantum: aliis pauca, ut hepar, glauco, aurata. Tum autem eiusdem speciei consortes inter se differunt: auratarum enim aliis plures, aliis pauciores. Sunt etiam quibus nulla omnino sint, ut magna cartilagineorum partu cæteris ita ut aliis pauca, aliis uel plurima habeantur: omnes tamen ad ipsum uentrem eas appendices habent. Pisces testibus carent, ut modo diximus: sed *νεπως*, id est meatus continet binos, qui à præcordiis uenæque maiore exorti bifurces, utrumque spinæ latus perreptet, coeantque superne in unum caput, atque ita ad ostium excrementi finiunt: (quod enim ad spinam est, id superius nomino.) hoc ergo inferitur atque in locis tenditur foeminarum. Pleni ij meatus in maribus *Αρσ*, id est humoris fortifici redduntur tempore coitus, latissimæque patent eo tempore, etiam imperitis, (æque in maribus atque illi qui in foeminis in matricem feruntur,) attrituque piscium mutuo, atque adeo etiam si compresseris, facile semen ipsum effluet genitale candidum. ubi uero id temporis præterit, incerti uel meatus ipsi interdum redduntur, ut de testibus in auium genere expositum est. Differunt inter se meatus genitales maris & foeminæ, tum aliis rebus, tum etiam quod maris lumbis inhaerent firmitus, foeminæ mobiles sunt. Piscium uulua bifida sunt, & non ut auium supra iuxta septum, sed infra habentur sicut bipedum aut quadrupedum quæ animal pariunt, sed tenues & membrana con-
- C stantes & longæ: ita ut in minutissimis pisciculis partem uulua utranque, dextram scilicet & sinistram iungi in faciem unius oui uideatur. At galeis reliquisque cartilagineis uulua bipartita pertinetque supra ad septum, quomodo auibus est, & infra quoque porrecta: atque etiam de medio sui bipartiti sinus arctior ad septum usque pertendit: ac oua hoc in loco ad septi originem maxima pro parte consistunt: mox prolapsis in spatium latius, fetus animales excluduntur. Piscibus ouiparis non infra apud aluum, sed lumbis adhærens uulua continetur: at cartilagineis uterus utrumque situm habet, scilicet in parte priore & ad lumbos: partem enim uulua superiorem, in qua oua gignuntur, sub septo ad lumbos & pronam habent, inferiorem ad
- D aluum: hac enim iam procreant animal. Piscium ossa proportionem similia sunt animantium terrestrium uiuiparorum ossibus: qui enim inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent, ut ea quæ cartilaginea appellantur. in iis nanque quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est: quæ etiam humorem in medullæ speciem continet. Quæ autem oua pariunt, spinam continent: quæ perinde ut spina dorsi in quadrupedum genere habetur. Sed proprium in piscibus est, quod nonnullis spinula quædam prætenues separatim per carnem inhaerent. Piscium sebum adipem præ se fert: nec enim concrecere solet. Cartilaginea nullo discrete adipe carni uentriue adhærente pinguescunt: eorum tamen quorundam iecinoribus colliquatis oleum facimus. Pisces genitura loco *Σίφο* habent, id est genitale quoddam uirus sui generis, quod meatibus quibusdam continetur,

*Sparo, aliis
scaro.*

οίγος.

*Alias, partem
utranque.
Alias, summum
utranque.*

*Χορδονόχοι
εστ.*

*Χιμαίον.
Spinula, χιμαίον
εστ.*

DE DIFFERENTIIS

qui à septo uenâque maiori oriuntur, ut ante dictum est. Semen eiusmodi E
genitale habent mares omnes præter anguillam.

1 Respirare etiam pisces contendunt nonnulli, ut apud Oppianû lib. 2 de pisc. & Plinium. 2 Intestino, &c. *ἰντῆρος* potius lego apud Aristotelē hoc in loco, quàm *ἰντῆρος*: tum ex ueteri translatione, tum ex lib. 3 de partibus animalium, cap. 14.

De sexus discrimine in piscibus: deque eorum coitu, & aliis quæ
ad generationem pertinent. Cap. CLVI.

Epitrageæ. Piscium maxima pars consummatur mare & fœmina. In piscium tamē
genere sunt qui omnino sexus discrimen alterutram in partem non ha
beant: nonnullis enim nec mares nec fœminæ gignuntur. Sunt enim pisciû
nonnulli epitrageæ appellati, qui nec ouum nec semen prolificum unquā F
habeant: sed qui solidiores pinguiorēque in eo genere sunt, iis intestinum
paruum est, & laus præcipua in pastu. Nec desunt quæ absque maribus sexu
uno fœmineo formentur: sunt enim genera quædam, ut passerum, erythri
norum & chanarum, in quibus omnibus oua reperiuntur. Hæc perinde pa
riunt ut aues oua, quæ hyphenemia dicuntur: uerum ea quæ aues concipiūt
pariuntque etiam sunt infœcunda: piscium uerò nonnullis, cum spontina
ediderint oua, euenit, ut ex his animal progerneretur: in his tamen, si in eo
genere mas est, infœcunda manent oua, quæ sponte constiterint, nisi mas
suum asperferit semen. Piscium fœminæ plerumque maiores suis maribus
euadunt: ut qui ex cartilagineis parui sint, & pars plurima gregalium, &
genus omne laxatile. Fœminas quoque maribus esse uiuaciores constat, eo G
quod fœminæ uetustiores quàm mares capiantur. Pisces non coire existi
mauere quidam: sed mares uentrem ad arenas fricando semen exprimere:
fœminas deinde ore exforbere, atque hoc pacto concipere. coeunt tamen
pisces omnes in quibus sexuum discrimen reperitur, uel admotis inuicem
partibus supinis, exceptis planis cartilagineis: quanquam eorum coitus qui
oua pariunt, rarius cernitur: quoniam congressionē quamprimum digres
sio sequatur: fieri tamen ita eorum coitum uisum est. Tanta enim celerita
te rem peragunt pisces, ut etiam piscatores complures lateant: nemo enim
eorum aliquid tale cognitionis gratia obseruat: ueruntamen coitus eorum
uisus aliquando est. Ex cartilagineis autem plani, iidemque habentes cau
dam, ut raia & pastinaca, & reliqua huiusmodi, non solum ad motus supi
nis, sed etiam tergo fœminarum supinis marium superpositis (modo cau
da nullo impedimento ob crassitudinem sit,) coeunt. Squatinæ & quibus
plenior cauda est, his attritu mutuo partium supinarum coitus agitur. Sūt
qui se uidisse confirmant nonnulla ex cartilagineis auersa, modo canū ter
restrium cohærere. Coitus etiam tempore complura ex his sibi adhærentia
capiuntur. Piscium cæterorum diuersa genera coire, uisum à nemine est:
squatinam solam & raiam hoc facere creditur argumento piscis cuiusdam
qui nomen ex utroque compositum trahit, rhinobati. Conceptus pisciû
magna ex parte uerno agitur tempore: sed tamen & æstate, & autumnino, &
hyeme nonnulla coitu implentur. Apud Lesbium insulam omnia tam pe
lagica

A logica quàm Eutypica patere solent in Eutypo, & coeunt autumno, pariūt uere. Cartilaginea etiam autumno mares cum feminis congregantur: sed uere subeunt Eutypum disjuncta, neque coniugium reperitur ullum donec pariant: uerū nec pariter omnibus aut simpliciter aut generatim id euenit, sicut plurimæ parti, ut uero tempore concipiant neque etiam ceteris temporibus tam numerofo partu fertiliscant quàm uere. Denique latere non decet, ut stirpium & quadrupedum animantium generi, plurimum interesse ex regione nō solum ad ceteram corporis scēlicitatem, sed etiam ad coitum partumque ampliore: sic in piscium quoque ratione locis ipsis discrimen plurimum oritur, non ad magnitudinem tantum, habitumque uegetiorem, uerū ad coitum etiam & partum: ut iidem alibi pluries generent, alibi minus. Tempore coitus cum mares meatu illos genitales plenos iam seminis genitales habent, modo quo dictum est, formæ mares sequentes uentrem eorum suis pereutiūt rostris: quo etiam fit ut mares semen & celerius fundant & largius. Tempore, deinde partus mares feminas sequentes, quæ illæ oua ediderint, ipsi mordicus fere uorant: pisces uero ex iis quæ remanserint, oriūtur, quibus scilicet mas sctæm aspersit genitale. Sub partu enim mas sequens, semen ouis quæ reliqua sunt, aspergit, & quæ uitale id uirus contigerint, ex his pisciculi enascuntur: quæ uero nō attigerint liquor masculi ille uitalis, sterilefcunt & irrita sunt. Nō omnibus enim id contingit ouis in tanta multitudine: alioqui replerentur maria & stagna, cum singuli uteri innumerabilia concipiant. Discrimine partus sic discrepant pisces, ut alij oua pariant, alia animala pariunt oua omnes qui squama integuntur: animal omnes qui genere cartilagineo continentur, excepta rana. genus enim cartilagineum tam planum quàm mustelinum animal generat: reliqua oua pariunt. Sed nec cartilagineis quidem foetus sine ouo: pariunt enim intra se primum oua, & augent atque excludunt, præterquam rana: mox animal foras pariunt. Oua piscium imperfecta eduntur omnium, excepta rana, & putamine duriusculo intacta: quæ postquam edita sunt, foris augentur & perficiuntur: inetemctum enim omni simile uermibus est. Animal enim quæ uermem pariunt, primo exiguum edunt, quod per se augetur sine ullo annexu: ita & piscium oua in mari cresunt: sed quædam summa celeritate, ut murenarum: quædam paulo tardius. Ouum piscium non bicolor ut auium, sed unicolor omnium est, & album magis quàm luteum, tam antea quàm postea cum foetus insidet. Et piscium generatio ex ouo, quanuis ab auium generatione differat, simili tamen agitur modo, siue intus siue foris est ouum: quippe cum & foetus in summo ouo nascatur, membrana obducta: & uenæ similes inter inicitæ spergantur, & caput & oculi: denique partes superiores principio sunt pręgrandes: in crescente etiam foetu, humor parj modo subinde absumitur: demum nihil superest quod non foetus subierit, sicuti de uitello auium expositum est. Adhuc cibus in aluo suggeritur eodem modo pisciculis albus, quo auium pullis luteus: nutritur enim non ex luteo, cum oua piscium unicolora sint, sed neque est luteum à candido separatum, sed miscetur in iis ista usque-

DE DIFFERENTIIS

quaque & confunduntur. Fœtus, ubi absumptus fuerit oui humor, nuclei figura iam constante: & primum nullum accipiunt cibum, sed ex oui humore iam hausto crescunt. post nutriuntur aquis dulcibus usquedum satis augeantur. Piscibus autem hoc commune omnibus est, ut celeri incremento perficiantur, sed præcipue coracino inter minores: orphus uero breui ex paruo insignem magnitudinem accipit. Qui oua pariunt pisces, in his ouū ipsum arenidum est, & tota uulua ouis referta est: itaq; fit ut in paruis quibusdam pisciculis oua tantummodo gemina esse uideatur: nam ob tenuitatem exiguitatemque uulua incerta in iis est. De coitu piscium satis dictū iam est. Partus autem piscium neque eodem tempore, neque simili modo omnium fit: nec pari temporis spatio geritur uterus. Pisces plurimi semel anno pariunt, ut ij sere qui *χρῆσι*, id est fusanei ex argumento cognomi-

*Arenidū, fœtus
dusor, nō fœtus
dusor.*

*Χρῆσι, id est
fusanei pisces.*

nantur, quia solum retibus capiuntur. quidam tamē sæpius: sunt enim qui bis pariunt, ut saxatiles omnes: & in iis nullus ter parit. Non desunt qui omnibus anni temporibus pariunt, ut murena. Pariunt pisces plurima sui parte mensibus iis tribus, Martio, Aprili, Maio: Autumno pauci, ut salpa, sargus: & nonnulla similia, paulo ante æquinoctium: adde iis torpedinem & squatinam. Sunt certe quæ per hyemem suos edant partus, ut lupus, mugilis, belone. Mugilum quoque genera grauiscere mense Decēbri incipiunt, geruntque diebus tricenis. Per æstatem mense Iunio thunna circa solstitiū parit: spargi etiam per æstatem pariunt: & qui pelagici sunt, æstate magna ex parte pariunt. Nec etiam pari temporis spatio geritur uterus: alij nanq; diebus tricenis serunt uterum, alij minus. Pariendi terminus piscium compluribus est, ubi uermiculi nati in uentre fuerint: innascuntur enim minuta quedam animalia uermium specie, partumq; expellunt. Profecto omne genus piscium celeriter adolescit, & præcipue in ponto: quippe cum incrementum singulis diebus intelligatur. Omnino ita existimandum est, ut eisdem piscium generi, non iisdē locis degenti, nec coeundi uterūque serendi tempus esse idem, nec fertificandi, nec in magnitudine proficiendi. Verum hæc nos ita exponimus, inquit Aristoteles, ut magna ex parte res euenit. Lacustres & fluuiatiles pisces quinto suæ ætatis mense uterum gestare magna ex parte incipiunt. pariunt omnes intra annum. Nec semen generationis simul omne emittunt mares, nec ouum sœminæ: sed modo marinorum hi quoque semper intra se aliquid plus minúsue, sœminæ ouorum, mares liquoris prolifici retinent. Cyprini quinquies aut sexies anno, chalcis ter, reliqui semel edunt oua. Pariunt omnes in fluuiorum stagnantibus locis, & lacuum arundinetis, ut phoxini & percæ. Non solum patres cum paribus, sed etiam admodum grandes cum paruis conueniunt, admoventque meatus, quos aliqui umbilicos uocant: qua quidem parte sœmina ouum, mas liquorem uenerem depromit. Et oua quæ liquor ille uitalis contigerit, admodum glutinosa adduntur, & candidiora ex templo cernuntur: maioraque reddi eodem die propemodum dixerim. paulo autem post, oculi fœtus existunt conspicui, pregrandesq; apparent: quæ ex ouis non attigerit liquor masculi ille uitalis, hæc sterilia redduntur, ut in

*Semen genera
tionis, fœtus.*

*Umbilici pi
scium.*

marino

Amarino etiam genere euenire diximus: mas deinde oua quæ edita sunt custodit, fœmina ab it cum peperit. Pisciculus iam ex fœcundis ouis incrementum accipit, detrahatur uelut putamen, quod membrana est ouum ambiens & pisciculus. Horum quibusdam tardius incrementum ex ouo est: idcircoque silurus mas, uel quadraginta aut quinquaginta assidet custodiens oua, ne à piscibus occurrentibus absumentur. at minorum nonnulla, uel tertio die speciem pisciculi capiunt. Fœminas cum parturiunt sæpè numero singulas, mares tredecim sequuntur. Mox fœmina oua procedendo emittit: mares sectantes semen illud suum ouis respergunt, ut modo diximus. uerum plurima pereunt: quod enim fœmina non stabilis, sed mutans continue parit, dissipari oua necesse est, uidelicet ea quæ non in materiæ inciderint aliquam, cui hæreant; sed excepta unda ferantur. Habent mares omnes semine genitale præter anguillam: quæ neutrum neque ouum neque semine fortita est. Pisces maximam quidem ex parte ouo gignuntur, ut dictum iam est: quidam tamen uermes nascuntur, ut mugilum genus quoddam, & aliorum fluuiatilium piscium: ad hæc anguillarum genus. Sed sunt qui & limo & arena proueniunt, etiam ex iis generibus quæ per coitum & oui primordio generantur: quod tum aliis locis palustribus, tum apud Gnidum factum olim memoratur: stagnis enim sub canis ortu resiccat, & limo iam arido, ubi primum imbribus restagnare loca inciperet, pisciculi nascebantur generis mugilum. Quod per coitum procreatur, magnitudine ^{maxima} id est haleculæ parua: nec in his aliquid uel oui uel seminis continebatur. Quæ autem nec ouum nec animal pariunt, omnibus iis ortus uel ex limo uel ex arena, uel etiam ex putredine per summa aquæ facta agitur, ut in anguillis & apuarum generibus. De coitu & partu atque de omni piscium generatione dictum iam est.

¹ Epitragæ, ab hirci sterilitate sic dicti, ut uult Theodorus. ² Quo uero differt piscium generatio ex ouo ab aui generatione, pluribus ostendit Aristoteles lib. 6. histor. animalium.

De ratione uictus piscium.

Cap. CLVII.

Pisces omnes forturam, etiam piscium, suo tempore deuorant: reliqua uictus ratio non eadem omnibus inest: alij enim carniuori sunt, ut cartilaginei, & congrei, & alij quidam. Alter etiam alterum edit: maiorumque minores sunt præda, exceptis mugile & cephalo: ij enim soli carne omnino abstinent: alij non carnibus tantum uescuntur, sed & alia deuorant: alij nanque cæno uescuntur, ut cephalo: alij cæno & stercore, ut dasquilli: alij alga, ut scarus, melanurus: alij & carne uescuntur & alga, muschogq; & conchis, & cæno, ut nulli. salpa stercore & alga: porrum etiam petit, & cucurbita capitur. Uescitur mugilis unusquisque alga & arena. è cephalorum genere est, qui non nisi mucore uescitur suo. Anguilla plurimam dulci humore uiuit: nam qui in piscium genere humorem accipiunt, cum non potus, sed cibi potius gratia assumunt. Viuit fluuiatilis tum sese mutuo deuorantes, tum ex herba, tum ex radice, & si quid in cæno comperiant. nocte potius pascere, interdiu secedere in altum solent. Cæteris piscibus captura minorum

Aa ij

DE DIFFERENTIIS

*Dromas,
Δρομας.*

*Coniugales,
συζυγας.*

*Cursor,
Κυρσο.*

à fronte agitur ore, ut solent narare: at chartilaginei (quæadmodum etiam E delphini & omnes fere cetacci generis) resupinati corripunt: habent enim os subter. Victus causa ineunt prælium maiores contra minores: maior enim quisque atque robustior minorem infirmiorémque deuorat. Et piscium alij gregatim degunt amicitieque sunt, ut qui dromades uocantur & thynni & hamia: alij non gregatim, inimicique uiuunt. Qui amici sunt congregantur partim cum utero ferunt, partim cum fœtum ediderint. Est sane plurima piscium pars gregatilis: nec ullus grex caret duce: & horum nonnulli non modo gregales sunt, uerum etiam coniugales. Greges statis temporibus (ut modo dixi) constituunt: scilicet cum uterum gerunt, aut post partum. Coeunt in gregem non solum quæ eiusdem generis sunt, sed etiam quibus idem aut similis pastus appetitur, modo abundet cibus: nam lupus & mugilis quamquam inimici sint capitales, tamen statò tempore congregantur. Talis piscium uictus est.

- 1 Potrum, *πρωτορ*, id est marthubium, ita habetur in nostris exemplaribus Græcis.
- 2 *Δρομαδες* Theodorus cursores uocat & cursiones: ut lib. 6 histor. animalium. Æstate pariunt omnes, qui cursiones uocat.

Quod loca mutant pisces uarie, atque latent. Cap. CLVIII.

Locum etiam mutare solent pisces: alij enim ex ponto aut in pontum tranant: alij per hyemem ex alto in litora teporis gratia ueniunt: contra æstate ex litore in altum uitantes æstum discedunt. semper quæ imbecilliora sunt prius utrauius ratione discedunt: ut scombri ante quam thûni. Perunt autem pontum tum pastus gratia, qui uberior & comodior ibi propter aquarum dulcium admixtionem suppeditatur: facit enim copia amniû loci illius, ut mare sit dulcius, & cibus largior habeatur, quem iidem fluuij deferunt: tum etiam propter partum: sunt enim ibi loca ad partionem aptiora & tutiora: (beluæ nanq; magnæ pauciores ibidem sunt, nec in ponto fere quicquam maleficum est,) & humor dulcior ac potulentior fœtum melius educat. Quin & latet piscium complures: alij hyeme, ut hippurus & coracinus, thûnus, & pisces saxatiles, omnèq; cartilagineum genus, diebus scilicet frigidissimis: nonnulli æstate, ut glauci: non enim fere capiuntur hi nisi statis quibusdam temporibus, eisdemque semper: cum cæteri omnes fere semper capiuntur. Saxatiles uero coniugatim mares cum fœminis conduntur, quomodo & fœtificare solent: ut turdi, merule, perca. Duo Iacus Italiæ, inquit Plinius, in radicibus Alpiû, Larius & Verbanus appellantur, in quibus pisces omnibus annis uergiliarum ortu existunt squamis cõspicui crebris atque præacutis clauorum caligarium effigie: nec amplius quam circa eum niensem uiuunt.

De coloris mutatione in piscibus, uocèq; & somno. Cap. CLIX.

Mutant colorem pisces nonnulli pro anni tempore, (quemadmodum & ex auibus quædam) ut qui merula uocantur & turdi: uere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt. Phuca etiã mutat colorem: cum enim

A enim ceteris temporibus cāda sit, uerno uaria redditur. Pisces uocis quidem expertes sunt: quippe qui neque pulmodem neque arteriam aut guttur obtineant, sed sonos quosdam stridorēsque mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra & chromis: his enim quasi grānitis quidam emittitur: chalcis quodāmodo stridet. cuculus perinde ut cuculus auis obstrepit, unde nomen accepit. Necnō cartilaginei generis nonnulla *τελῆς*, id est stridere uidentur: uerum ab iis uocem emitti ulla, recte dici non potest: at sonum siue strepitū reddi uerius dixeris. Dormiunt pisces noctu potius quā interdiu: & magna ex parte uel ad arenam, uel ad lapidem aliquem procubentes quiescūt imis gurgitibus, uel sub saxo aut limo abditi. Plani autem pisciū arena sese occultant: deprehenduntur sicut ipsius arenæ, tollunturque: si scina percussit: cartilaginea uero ita interdū dormiūt, ut uel manu tollātur.

Limo, *Σίμα*

De ualētudinis piscium differentiis, tum ex locis,
tum ex temporibus.

Cap. CLX.

Loca pro sua natura piscium gentia quæque sibi habent ad incolumitatem commodiora: quod enim litorale aut pelagium est, huic suo loco pro naturæ desiderio uersari cōmodius est: quod autem ambigit, id cōmode utroque degere potest: sed sunt loca quædam singulis propria, in quibus rectius ualeant. Limosa regio planum educat piscem, ueluti soleam, rhombum, passerem: at arenam gurgites planos quidem non pessime, sed pelagios melius pascunt, ut auratas ac dentices. nec omni mari potest piscis omnis inesse, ut helops, qui Pamphilio profundo nec alio mari pascitur, ut Atlantico faber. Cōmodiora piscibus (quod simpliciter dixerim) loca sunt ea quæ algarum copia scærent: pinguiore enim locis his capiūtur. nam & quibus alga in cibo est, abunde hic pascuntur: & quibus caro appetitur, plures pisces sibi reperiunt. Intērest etiā aquilonia loca sint, an aultrina: genus enim longum aquiloniis melius uiget: & quidem æstate loco eodem in aquiloniis plures longi quā lati capiuntur. Sed discrimen piscium diuersitate etiam locorum ac temporum existere potest: ut circa Cretam insulam gobiones omnesque saxatile genus satis pinguescit. Lupi pisces in Tyberi amne inter duos potēs meliores sunt: rhombus Rauēnæ, murenæ in Sicilia, elopes Rhodi. Illa non in nouissimis mira, amarissimos esse pisces ad Pelen insulam & ad Chæcemonas: contra ad scopulū Siciliæ & Leptim Africæ, & Eubœiæ, & Dyrhachium: rursus ita salso ut possint falsamenta existimari, circa Cephalēniā & Ampelon & Paron & Deli petras: in portu eiusdē insulæ dulces. Quam differentiam pabulo constare non est dubium. Thūnus post arcturū melior est, æstate deterior. Vigēt pisces ouipari fere ueris tempore donec pariāt, uiuipari autumno: & mugiles item, & mulli, & reliqui generis eiusdem. Pariendi tempore laborant omnes pisces: unde fit ut tunc potissimum ruant in terram: seruntur porro graui stimulo agitati in terram. Innascuntur enim in uentre minuta quædam animalia uermium specie, quæ partum expellunt, ut dictum antea est. atque omnino id temporis motu perpetuo incitantur donec pariant: à partu statim requiescunt.

Aa iij

Piscibus omnibus (exceptis quibusdam paucis) imbres conducunt, tum ad E
 ceteram sanitatem, tum etiam ad partum: contraque anni sicci incōmodi
 sunt: annis enim pluuiis non modo plus cibi nascitur, uerum etiam pluui
 humore plurimum iuuantur: ueluti etiam quę terra gignuntur: olera enim
 quanuis rigentur, tamen nō tantum proficiunt quantū imbre: quod idem
 arundinibus etiam lacu prognatis euenit: nihil enim fere accrescunt, nisi
 aquę pluuię incidunt. Ex pluuiis autem ipsis æstiuī imbres commodiores
 sunt parti maximę pisciū, & præcipue cū uer, & æstas, & autumnus imbri
 bus abūdauerint: hyems cōtra scēnior fuerit. Locis autē frigidis parum ui
 gent: & hyeme maxime infestātur, qui lapidē in capite habent: ut chromis,
 lupus, phanger, umbra: facit enim lapidis rigor, ut per algore gelent & defi
 ciant. Sed cū plurimis pisciū generibus imbres conducāt, quibusdā tamē F
 nocent, ut mugili, cephalo, & ei qui à nonnullis myrinus uocatur: fit enim
 ut pluuiis multi excācentur, si modum aqua excesserit, atque ad postremū
 malo eodem intereant. quod tamen non magis imbrium copia quā al
 gore accidere uidetur: iam enim quibusdam in locis multi capti sunt cæci
 cum hyems fuisset asperriam: multi etiam albos habētes oculos capti sunt.
 Piscium uisus maxime fallitur circa solis ortum & occasum. ac proinde re
 tibus capiuntur præcipue non multo ante quā sol oriatur, aut postquam
 occidit: quippe cum noctu quiescant, luce autem iam clariore melius ui
 deant. Morbus pestilens nullus incidere piscibus uniuerfis uidetur, qualis
 plerunque hominibus & quadrupedibus nonnullis accidit, tum feris tū ur
 banis: agrotare tamen & ipsi putatur. Et quidem piscatores pro morbi in
 dicio capiunt, cum aliquot extenuatos languentibus similes, & colore im
 mutatos inter multos pingues ac ualidos eiusdem generis ceperint. Mari
 num genus ita se habet: fluuiatile & lacustre peste quidem & ipsum immu
 ne est, sed nonnullis morbi incidunt proprii: glanis enim canis exortu po
 tissimum syderatur & tonitruo sopitur magno: quod & cyprino accidit,
 sed leuius. Chalcida pediculi multi sub branchiis innati interimunt, quod
 nulli ex cæteris accidit.

In alimenti medicamentique ratione piscium discrimina.

Cap. CLXI.

Q uod ad alimenti rationem attinet, non parua est piscium differentia. H
 Alimento sane quod ex piscibus prouenit, sanguinē gignit tenuio
 rem quā quod ex pedestribus: adeo ut nec abunde nutriat, &
 per insensibilem halitum celerius digeratur. estque eorum caro tempera
 mento frigidiore humidioreque. Pisces, prope dixerim omnes, boni succi
 esse iudicantur, exceptis lacustribus, palustribus, & qui in immundis flumi
 nibus ac turbidis degunt. Præstantissima uero eorum piscium caro habe
 tur, tum ad bonos gignēdos succos, tum ad gustus uoluptatem, qui in mari
 syncero uictitant, ubi dulci aquę non miscetur: maxime uero ubi regionē
 uenti perflauerint: & ubi neque limoso neque tranquillo litore continetur
 mare. Qui non apud litora sed inter saxa & scopulos degunt, indeq; *in mari*
 id est

A id est saxatiles appellantur, saluberrimi omnium sunt: modo caro eorum minime dura sit, ut phycides, iulides, perca, scarus, merula, turdus. Hi neque alimento utuntur uario, nec loca mutant, nec fluctatilibus aquis gaudent: ideoque perpetuo manent inculpati: omniumque mollissimam simul ac maxime friabilem habent carnem: quamobrem & concocti sunt faciles, & probum generant succum, sanguinemque crassitudine mediocrem: & humectant modice. corpus quoque recte & alunt & augent: neque excrementosi sunt, neque flatum gignunt: & ut Mnesitheus prodidit, uel siccius præbent alimentum. Saxatiles, ut diximus, carnem habent mollem & friabilem, ac proinde saluberrimam: alij molli quidem sunt carne, sed minime friabili, utpote quibus innatus est succus quidam lentos pinguisque: alij nihil uiscidum pingue habent: qua quidem in re cum saxatilibus conue-

Turdos & merulas Mnesitheus non inter saxatiles numerat, sed inter μαλακοσφύρεις.

Mollioris carnis pisces, μαλακοσφύρεις.

B niunt: eò tamen quòd caro illis durior existat differunt: cuiusmodi sunt mul-

Duri pisces, σκληροσφύρεις.

li & pelagici propemodum omnes, nisi qui forte prauo alimento suam corruerint carnem. Qui duri sunt crassiorem corpori præbent in cibo succum, ægréque conficiuntur: nam neque in uentrem concoctio, neque in iecino-
re uenitque, in sanguinem mutatio, nec denique, quæ in singulis sit partibus adsimilatio, tam facile in duram habentibus carnem, perficitur, quam mollem. Duram habent carnem scorpij, pagri, trachuri, orphi, glauci, caniculæ, congridi, hamæ, coracini, myli, thunni, atque id genus alij: cartilaginea quoque omnia præter torpedinem & pastinacam. Mediocritatem obtinent nonnulli pisces inter durum ac molle, qui scilicet neque tam molles sunt

C quam qui mollissimi: nec duram carnem habent, quales sunt murenæ, lacerti, passeret, rhombi, cythari, sciænæ, hepatis: (& ut Xenocrati placeat, aselli,) hos omnes Philotimus ἀπαλοσφύρεις, Mnesitheus μαλακοσφύρεις uocant, id est teneros pisces. Hominibus in otio uiuentibus, senibus, imbecillibus & uoletudinariis accommodatissimum ex his atque saxatilibus gignitur alimentum: qui autem corpus exercent, ualidius desiderant. Quod uero ad succi crassitiem tenuitatemque pertinet, in symmetria omnisque excessus mediocritate consistunt pisces saxatiles, pelagici & litorales, ut gobij, murenæ, buglossi, aselli, omnesque qui neque insuauis maluit odoris neque glutinosum quicquam gustu præ se ferant. Grandiores pisces omnes (quos

ἀπαλοσφύρεις, μαλακοσφύρεις.

D cetaceos uocant) crassum tenacemque succum præstant. Saxatiles pisces febrientibus picrocholitis utiliter in cibo dantur: nec ipsis minus aselli conueniunt, nisi si qui præpe lacum aut magnum flumen, quod in mare decedat, depasti, humidam magis glutinosamque habeant carnem. Proxime asellos sunt buglossus & torpedo: itemque lupus & mulus, post mugil & pelago. Qui ἀπαλοσφύρεις uocantur, saxatilibus humidiorum præstant succum: & iis qui à morbo conualescunt sunt magis idonei, & uentrem quoque & urinam uehementius cient. E marinis piscibus saxatiles, uti Diphilus prodidit, facilius corrumpuntur, bonum præstant succum, leuésque sunt, & modice nutriunt, atque abstergerendi uim obtinent. Pelagij contra, copiosius nutriunt, difficilius concoquuntur digerunturque. Pelagicis litorales præstât, inquit Aristoteles: quippe qui cibo copiosiore melioréque potiantur: tum

Κητώδεις, Cetacei pisces.

DE DIFFERENTIIS

etiam bene ex calido frigidoque temperata sunt loca magis terrena: quo fit E
ut caro eorum piscium magis constet: cum pelagiorum humida, mollis so-
lurâque sit. Sed discrimen horum quoque, diuersitate etiam locorum ac tē
porum existeret potest: ut thunnus post arcturum, uti diximus, melior est,
æstate deterior. Lupi pisces in Tyberi amne inter duos pōtes meliores sunt,
inquit Plinius: rhombus, rauennæ, murenæ in Sicilia, elops Rhodi. Qui
tamen pelagij dicuntur, longe perstant iis qui limoso litore uiuunt, aut ubi
in mare influit amnis: tum ut ex iis probus gignatur succus, tum etiam ad
saporis gratiam. Deteriores sunt, qui in paludibus aut maris stagnantibus
locis uersantur: his etiam peiores sunt, si stagnantia loca in quibus uiuunt
angusta exiguae sunt, & neque magnos recipiūt fluuios, neque fontes ha-
bent scaturientes, neque multum est quod effluat. Quod si nihil penitus ef- F
fluat, sed perpetuo stabilis maneat aqua atque immobilis, longe sunt dete-
rior. Excrementitia penitus mucosâq; & omnino pessima caro est eorū,
qui sordidas limosâsque aquas incolunt: ubi uero fluuios multos ingentē-
que præscepit mare, (uti in Ponto fit) qui locis eiusmodi degunt pisces, quod
præstantiores iis qui in paludibus nutriuntur, eò sunt inferiores iis qui in
syncero mari uiſitant: mediūque locum obtinent inter pelagios ac flu-
uiales pisces. Marini autem pisces suauiores sunt fluuiatilibus, ut Xeno-
crates prodidit. facile in corpore digeruntur: sanguinēque procreant co-
piosum, & bonum in corpore reddunt colorem. Qui autem in fluuiis aut
stagnis uiſitant, ut idem author est, stomacho sunt ingrati, crassiorē suc-
cum gignunt, nec tam facile permeant. Sunt tamen & inter fluuiatiles qui G
marinis minime cedāt, ut in Nilo coracinus. In Rheno perca & in Tyberi
lupus: uiſtus enim in huiusce generis locis probus est, & qui abunde suppe-
ditatur. Porro eorum qui in fluuiis degunt, cæteris præstat qui in eo amne
capiuntur, ubi & aqua copiosa est, & celeriter fluit: mali contrā sunt, qui
in paludosis stagnantibusue fluuiis uiuunt. Omnium autem pessimi, qui
in fluuiorum ostiis uiſtum queritant, in quos cloacarum, balnearū aut co-
quinarum, uestiūm ac linteorum sordes, cæterâque urbium purgamenta
defluunt. Qui in piscinis seruantur pisces, si ad pelagios conferas, ingrato
sunt sapore. qui è mari in fluuios ascendunt puros ac lymphidos, suauiores
sunt iucundioresque: qui uero in aqua stagnante limosa clauduntur, quan-
uis pingues, insuaues tamen sunt. Pisces quicunque herbis radicibusque o- H
ptimis ad saturitatem pascuntur, ij meliores euadunt: qui autē cænis her-
bis malisue succi radicibus uiſtant, aut iis quæ ex urbibus expurgantur,
(uti modo diximus) pessimi: putrescuntque ac male olent, si post capturam
paulo diutius seruentur. Nec minus & qui in aquis uiciatis degunt, mali o-
doris atque insuaues mucosique euadūt: cūque sint aliis longe pingui-
ores, citissime putrescūt. Minime uero tardissimēque omnium putrescunt,
qui puro ex mari uiſtum petunt, boniq; odoris sunt & sapore iucundo: pin-
guitudinis autem uel nihil uel mininum in se habent. Qui in paludibus
aut fluuiis gignuntur, eorum caro fere spinis abundat: quod in marinis ra-
ro accidit. Pisces cum impleri incipiunt à coitu boni omnes sunt: sed pro-
cedente

*Alias, in Ty-
berino agro,
uide infra in lu-
po.*

A cedente utri tempore alij præstant, alij non. Mæna utero grauis melior est: coracinus etiam cum utero fert optimus est. mugilis uero & lupus & reliqui fere omnes squama intacti, deteriores sunt cum ferunt. Similes sibi ferentes & non ferentes pauci sunt, ut glaucus. Hæc Aristoteles. Xenocrates autem, uere inquit, cum utero gestant, optima est piscium maxima pars: ætate præstant phagri & synodontes. Hepatus autumnu uilescit, ut qui uiosum tunc procreat succum: lupi uero ac mugiles eo tẽpore gratiores habentur. Subeunt etiam fluuios piscium genera cõplura, & præstāt in fluen- tis & lacubus, ut amia, mugilis. gobiones etiam pinguescunt, qui in fluuios ascenderint. Fluuiatiles & lacustres optimi sunt post partum & seminis emissionem, postquam cibo se refecerint: sed nonnulli etiam cum ferunt, cõmendantur, ut saperdes: alij damnantur, ut silurus. Cum ceteri omnes mares suis sœminis sint præstantiores, glanis sœmina præstāt suo mari: & in genere anguillarum quoque meliores sunt, quas sœminas nominant. Viti- antur senectute pisces: & quidem thunni ad rem salsamētariam senes im- probi sunt: multum enim carnis sale absūmitur, quod idem uel in ceteris piscibus euenit. Pisciculi recens nati facile in uentriculo corrumpuntur: qui uero cetacea specie sunt & magni, duri sunt, concoctu difficiles & sto- macho ingrati: qui autem & ætate & magnitudine sunt media, concoctio- nem pariter & digestionem facilius admittunt. In partibus quoque pisciũ discrimen est: quę nanque caudæ proximę sunt, suauēs existunt, & melius- cule nutriunt, ut quę sui motione exercitentur magis: quę uero ad uentrẽ **C** pertinent, pinguetudinis nonnihil habet: ac proinde stomacho innatant, & per aluum facilius redduntur. Dorsum carnem habet duriorẽ: caput ue- ro etiam minus præbet alimenti, & quod non facile digeritur. Rursum pi- sces asii, Xenocrates ait, nutriunt magis, nec tam facile permeant: iurulenti minus exhibent alimenti & citius permeant: frixi gustui suauēs, sed stoma- cho minus grati, faciliq̃ue corrumpuntur: minus nutriunt, & uentriculo in- natant. Piscium genus omne dum adhuc spirat, (ut ita dicam) coquen- dum est: non enim facile seruari patitur, nisi carnem admodum duram ha- beāt. Piscium ius, qui recentes sunt, modo per se, modo cū uino aluum mo- uet: idem & urinas cit è uino maxime. Priuatim uero ad hunc usum confi- **D** citur è phycide, scorpione, iulide & percis, atque aliis saxatilibus molliori- busq̃ue: & qui uirus minime resipiunt, ex aqua, oleo, sale & anetho. addit Plinius apium, coriandrum, & porrum. Ius piscium in patina coctorũ cum lactucis tenasum discutit. Piscium adipem ad suffusiones imposuere nõ- nulli. Omnium piscium fluuiatilium marinorũque adeps liquefactus o- leo, admixto melle, oculorum claritati plurimum confert. Piscium natura generatim ita se habet.

De cartilagineis.

Cap. CLXII.

Q Vicquid inter marina pedibus orbatum & branchias habens animal generat, sub cartilagineorum nomine continetur, præterquã rana. *Cartilaginea.*
Cartilagineis omnibus quod per dorsum proportionatum of-

Apariunt enim intra se primum oua, & augent atque excludunt, præterquã
rana: mox animal foras pariunt. Oua, maximã quidem ex parte, iuxta præ-
cordia omnibus: sed nonnullis non iuxta præcordia, sed in medio uulue cir-
ca spinam oua adhærent, uti modo diximus: unde aucta in imum transfe-
runtur uteri locum, efficiunturq; animalia infrà ad genitale, umbilico hæ-
rente ad uulvam: ita ut ouo absumpto partus nõ aliter fiat, quàm in iis quæ
iam inde à primo ortu animal generant. Omnia fere cartilaginea simul &
oua parte superiore continent complura, & alia maiora, alia minora, & in-
feriore animalia iam exclusa. unde fit ut genus id piscium sæpius mense &
parere & coire nonnulli arbitrentur: quippe quod non simul uniuersa ede-
re soleat quæ conceperit, sed particulatim repetens sæpe & diu peragens: ut
dum superius oua contrahit, inferius concoquat atque perficiat. Superfec-
tant cartilaginea, & ferunt utero mensibus cum plurimum senis: & cum tẽ-
pus pariendi instat, repetit litus & uada, pelago & alto relicto gurgite, ut
neque tempore careant, & progeniem tutius collocent. Oua omniũ cute mol-
liore operta sunt, præterquam ranarum, quod unum solidum durumq; est.
Omne genus cartilagineum minus fortificat, quia animal gignit. Carni-
bus tantum uestiuntur cartilaginei: & resupinati corripunt pisces quos de-
uorant: habent enim os subter, ut ante diximus. Motus eorũ lentus pigerq;
est: ut qui non spina aut neruo corroboratur, sed cartilagine. Latent omnes
diebus frigidissimis. In hoc genere torpedo & pastinaca molliorem habet
carnem atque suauem, & quæ modice aluum moueat, nec concoctu diffi-
cilem: quæ & mediocriter corpus enutriet, sicuti & alia quæ carnem habet
mollem: ut nonnunquam in piscium etiam saxatiliũ penuria his uti pos-
sis. Raia uero leuiraia & squatina atque alia id genus duriora sunt, & con-
coctu difficiliora: alimentum autem præbent copiosius, quàm aut torpedo
aut pastinaca: senibus tamen inutilia sunt. Diphilus omnium cartilagineo-
rum carnem concoctu esse difficilem, succumque gignere flatuosum pro-
didit: usumque eorum assiduum ac diuturnum uisus hebetudinem pro-
creare.

*Animalia iam
exclusa, & mu-
tata uia.*

1 Plana sunt, &c. τὰ πλάγια πλάτῃ uocantur hæc ab Aristotele lib. de animalũ
gressu. 2 De his plura uideas apud Aristotelem lib. 6 histor. animalium, & lib. 1 de
D generatione animalium.

De cartilagineis planis.

Cap. CLXIII.

Planorum piscium unũ genus est, quod pro spina cartilagineam habet,
ut raia, pastinaca, squatina, torpedo: & quos bouis, lamia, aquila, rana
nominibus Græcia appellat. Raia piscis est cartilagineus planus: cutim ha-
bet asperam, & caudam quoque spinosam ac longam. pinnas nõ habet, sed
ipsa extrema corporis sui latitudine natat. Branchias habet nõ à latere, sed
parte inferiore & supina. genitale fœminæ simile muliebri est. Coeunt raie
non solum ad motus inuicem partibus supinis, sed etiam tergo fœminarum
supinis marium superpositis. Raie in utero gerunt testacea quædã, in qui-
bus humor ad oui similitudinem consistit: figura eius testæ similis tibiariũ

Raia.

Ainnascitur, dentium dolores mitigat, inquit Dioscorides: quos & frāgit atque excutit. Pastinacæ radiō scarificare gingiuas in dolore utilissimū prodidit Plinius. Conteritur is & cum helleboro albo illitus, dentes sine uexatione extrahit. Pastinacæ item radiū adalligatus umbilico, existimatur faciles partus facere, si uiuenti ablatus sit, ipsāque denuo in mare demissa. Iecur pastinacæ in oleo decoctum, lichenas & lepras tollit. pruritū scabiēque, non hominum modò, sed & quadrupedum efficacissime sedat.

Est & torpedo piscis cartilagineus plahus:

Hæc grauis & mollis, sunt nullæ in corpore pigro

Vires: & nimium premitur grauitate. natantem

Non credas, liquidis ita clam subrepat in undis:

Torpedo;
νίπαι.

B Duas parte prona iuxta caudam pinnas habet; pro reliquis latitudine utitur: & utroque sui corporis semicirculo, quasi geminis pinnis natat. caudam habet lōgam atque spinosam. Huius iecori tenacitas nulla præfertur: Fel habet iecori annexum. prope litora cernosa uictitat, ut Oppianus tradit. Parit circa autumnum paulo ante æquinoctium. Fœtus etiā suos & emittit & recipit intra seipsam, ut Squatina. & iam quidem uisa est torpedo grandis, quæ fœtus intra se circiter octoginta haberet. Condi per hyemem torpedines terra, hoc est uado maris excauato, tradunt, quod frigoris causa eas facere Theophrastus existimauit. Sunt qui duo torpedinis genera tradunt: marinum scilicet & fluuiatile. Quæ de torpedinis solertia narrantur, uera omnino certaque sunt, inquit Aristoteles. Torpedo pisces quos appetit, afficit ea ipsa quam suo in corpore continet, facultate torpendi: (ipsa tamen non torpens) atque ita retardos præ stupore, capit & uescitur: Abdit se in arena & limo: tum pisces qui adnatantes obtorpuerint, corripit: quam rem plerique à se conspectam retulerunt. Plato torporem appropinquantibus tangentibusue inferre torpedinem tradit. Quinetiam procul & è longinquo, uel si hasta uirgæue aut fuscina attingatur, uel piscatoris linea, quāuis præualidos lacertos torpescere: quālibet ad cursum ueloces alligari pedes proditur. Torpedo, ut Galenus author est, mollem habet carnē & suauem, nec concoctū difficilem: quæ corpus mediocriter alit & aluum modice emollit: qua & nonnunquam in saxatiliū piscium inopia, eorum loco uti liceat. Icesius torpedinem, exiguum in cibo præbere succum tradit:

D & cartilagineum quoddam in se continere, quod stomacho sit pergratum. Diphilus cum alioqui uirosam torpedinem concoctūque difficilem esse dicat: quæ circa caput tamen sunt partes, & teneras esse, stomacho que gratas, & concoctū faciles prædicat: aliās uero minime: optimas quoque esse quæ paruæ sint, præsertim si in simplici iure coquantur. Torpedo uiua adhuc diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet: id quod illi ob stuporem quem affert accidere putatur. Oleum quoque in quo uiua torpedo sit decocta, uehementes articulorum dolores illitum lenit. Euersam sedem prociduamque coercet apposita torpedo, ut prodidere quidam. Lieni medetur imposita torpedo. Mirum & quod de torpedine inuenio: si capiatur cum luna in libra fuerit, triduōque adseruetur sub dio,

faciles partus facere: postea quoties inferatur, adiuuare. Venerem inhibet E fel torpedinis uiuæ genitalibus illitum.

Rana marina.

Rana piscatrix
Βάτραχος,
Βάτραχος ἁ-
λίος.

Et uisus turpes, & molles tergo ranae planorum piscium genere sunt, quod pro spinâ cartilaginem habet. Rana caput amplum atque spinis asperum: quo fit ut sobolem non recipiat intra se. Ranae non ipsa sua latitudine natant, sed pinnas habet: & quæ pro niori parti accommodantur, eas infra gerunt propter amplitudinem partis superioris: quæ autem parti supinæ commissæ sunt, eas iuxta caput adiunctas habent: nihil enim latitudo impedit, quo minus moueantur. Rana tamen contra quàm alia plana cartilaginata deductas in latera habet branchias, eas tamen non spineo tectas operimento continet, (ueluti ea quæ nō cartilaginea sunt) sed cuticula. Posteriores partes carnosas habet rana: F

Plinius, Eminentia sub oculis cornicula exerrat. Opipianus, Cornicula quedā cādidā sub mēto enascitur.

& caudam quoque carnosam & breuem. Dependunt illi ante oculos gemina quædam, quæ longitudine capilli speciem referunt, quorum extrema rotundis quibusdam præpilantur, quasi escæ causæ additis: his, inquam, ubi locis arenosis aut sæculētis obturbato solo se absconderit, piscatur attollēs illa pendentia fila, assultantēsq; pisciculos pertrahens, donec tam prope accedant, ut eos suum in os adducat. Fel habet rana semotum à iecore, intestinis commissum. Rana cartilaginatorum sola, non animal sed ouum parit: quod & solidum durumque est, neque tamen proprie oui similitudinē habet, cum sit squamosum atque asperum. edit oua simul omnia, & iuxta terram. Rana inter cartilaginea fertiliſſima numerosius: uerum quod de facili pereunt, hinc efficitur, ut appareant pauca. Ranarum marinarum ex uino & aceto decoctarum succus contra uenena bibitur, & contra ranæ rubetæ G uenenum, & contra salamandras. Quæ de ranis ad dentium dolores sunt descripta, omnia ex marina efficaciora. Ex hoc cartilagineorum pisciū planorum genere & bos est, latitudine ingenti: ut qui in duodecim sæpe cubi- 10 torum latitudinem porrigitur: corpore in tanta uastitate carnosum, pramoli atque imbecillo. Dentes intus parui & occulti, ac proinde

Bos, Βόψ.

-Non uiribus ullis

Confidit: sed fraude uiros in funera pellit.

Hinc grati pastus, hinc mollia membra palato

Grata suo, & sēuo nimium iucunda sapore.

Lamia.

Non longe à litore uersatur in locis cœnosis. Lamia quoque in hoc cartilagineorum planorum genere est, magnitudine insigni: quæ tamen nonnunquam aniarum gregem aggressa, uulnera accepisse uisa est. Et item *Aquila, ἄνθρ.* aquila cum his numeratur, quam & Philotimum inter pisces duræ carnis recte adnumerasse dicit Galenus.

Βάτραχος, Βάτραχος.
Βάτραχος.

1 Raia, βάτραχος ἁλίος, nomen habet ex eo quod cauda quibusdam aculeis constat ad similitudinem rubi agrestis mora ferētis. Hæc Massarius. βάτραχος & βάτραχος Athenæus tanquam uarios pisces numerare uidetur. Et Sophron, ἁλίος piscem quendam nuncupauit: sed an idem sit qui βάτραχος non explicatur. 2 Figura eius testis, &c. Hæc sententia non habetur in ueteri Aristotelis translatione, & mihi certe uidetur suspecta. 3 Molliore, &c. ἐνυάλος legitur apud Athenæum, sed uide an rectius legeretur ἁλίος.

- A 4 Squalus (de quo est apud Plinium, nisi exemplaria sint mendosa, quod scilicet autumnus parit circa æquinoctium) idem videbitur forsitan cum Squatina: sed Massarius hoc loco non squali, sed galei legendum censet. 5 Obruit, &c. Plinius, Abdira pinnas excitas mouet specie uermiculorum. 6 Verberat, &c. *ἡ ἀβδύρα πῖς ἐν τῷ πύματι, ἢ κελύφα ἢ ἀλῶς ῥαβδύρα*, uetus interpret, Cum latuerit, habet in orificio quandam partem sicut uirgam. 7 Venenatus, Huius mali uenenum pulchre describitur ab Oppiano lib. 2. de piscibus. 8 Pinnis natat, &c. iuxta, huc, inquit Massarius, caput parte prona ueluti duo foramina spectantur: os uero infra parte supina, ut pastinacæ. 9 Pinnas habent, &c. Suspectus uidetur hic Aristotelis locus de pinnis ranarum & torpedinis. 10 Bouem numerauit Aristoteles uno in loco cum cetis: forsitan ob ingentem eius magnitudinē, & quodd animal patiat uiuum. Bos quoque à Strabone inter Niloticos pisces numeratur: an idem sit piscis, nondum constat. Item apud Oppianum inter cetos habetur malthæ (*μαλθα*) quæ à corporis mollitie nomen traxit: idem ne sit cum boue, an similis: 11 Sed fraude, &c. Quo pacto homines natantes per fraudem capiat bos, lege Oppianum lib. 2 de pisc. 12 Lamia quoque, &c. *λαμία* piscis ferox est ceracens: an eadem sit cum lamia an diuersa: & an eadem sit, quæ proximo capite carcharius uocatur.

De cartilagineis oblongis, ut de galeis & iis quæ *γαλιόσθι* dicuntur. Cap. CLXIII.

- 1 ET qui galei uocantur, quanuis non plani, cartilaginei quoque sunt. Quinas hi ex utroque latere adherentes branchias habent, easque duplices, nouissima excepta. In his circa excrementi ostium, maribus omnibus binæ quædam pendent, quibus sœminæ carent. Habet & galeus plures appendices superne circa uentericulum. sel habet iecori annexū. iecur ipsum fissum est: & partes in utroque latere, dextro scilicet & sinistro ita sepositæ sunt, ut non eadem origine contineri uideantur, sed binæ esse iecinora. Habet uulua in galeorum genere paulo à præcordiis inferius ueluti mammas albidas, quæ non nisi grauidis insunt. Porro galeorum non una est species. Differunt autem galeorum generis pisces inter se ratione uteri: nonnullis enim medio uulua circa spinam oua adherent, ut caniculis: spinaces uero galei oua ad præcordia continent super mammas. Ceteri galei bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel: & qui stellares uocantur, sæpissime, quippe qui bis mense putantur parere: quod ideo uidetur, quia oua eorū non simul perficiuntur. Ceteri foetus suos & emittunt, & metu aliquo imminente recipiunt intra seipsos, præter unum spinacem: maxime hoc faciunt porcylos & alopecius: ceteri minus ob cutis asperitatem. Galeorum plura sunt genera, canicula, quam Græci *κανικα* uocant: alij *σπίλαι*, alij *σπίλαι*, & *σπίλαι* uulpecula, quæ & *ἀλφει* & *ἀλφει* & *ἀλφει*: spinax uel *ἀστὴρ*, id est stellaris, quem *σπίλαι* alij uocant. Vna omnibus forma uictusque idē est. ueluti cristam habent extantem prope caudam, sed in reliqua dorsi spina nullam. Differunt uero inter se maxime ratione uteri, uti modo diximus. Duram omnes carnem habent. ceteris suauitate præstat, quæ asterias uocatur, teneriorque est & melior, ut Icesius author est. Canicula galeus (ut Xenocrates tradit) & qui illi sunt similes, sapore uirus referunt, & malum procreant succum. Porro caniculæ trifariam dicuntur: unum genus ferox est, quod inter cetacea numeratur: magnitudine thynnos superat, quos & deuorat.

DE DIFFERENTIIS

Hæ urinantes circa spongas, graui periculo infestant: atroxque cum his di-
 micatio. In mari rubro tanta est earum copia, uix ut respicere è naui (nedù
 3 urinare) tutum sit nauigantibus, remos plerunq; ipsos inuadentiù: Theo-
 phrastus carchariam uocat: & canem carchariam Archesstratus. In amnes
 nonnunquam subit canicula. Huius caro, quæ prædura atque excrementi-
 tia est, in vulgi cibum sale maceratur, in quatuor partes dissecta: ingrati au-
 tem saporis est atque mucosa: idèoque non nisi raro absque sinapi aut oxe-
 lao aut alio id genus acri quopiam condimento edi solita. Ex iis qui bene
 periti sunt, aliud ex aliis membris, aliud ex ore pharmacum colligit, quod
 cynosphastrum appellant: Nicander Colophonius carchariam lamia quoq;
 uocari tradit, & scyllam. Alterum caniculæ genus centrine uocatur, acu-
 4 leo insignis, quem ad ceruicem gestat, quod in aliis galeorù generibus non F
 conspicitur: uel, ut alij produnt, innati sunt iis aculei duri, alter in capitis
 summo uertice, alter in cauda: atque uenenatum quiddam habent. cibo in-
 grata & hæc est grauiusque odore. Hæc & inter galeodeis pisces numeratur, 5
 & malefica est ictu aculei uenenofo. Tertium canicularum genus, idèmq;
 galei species, γαλιός uocatur, id est galeus canicula, & σκύμος, & σκύμιος, &
 σκύλιος & σκυριος. colore est uario. Caniculis hisce in medio uulvæ circa spinā
 oua adherent: quæ cum accreuerint, absoluta feruntur per uulvam bifurcē
 annexamque ad præcordia. Caniculæ testacea quædam gerunt in utero, in
 quibus humor ad ouī similitudinem cōsistit. figura eius, testæ similis tibia- 6
 rum ligulis est: meatūsque sunt capillamētorum specie in testis: fœtus de-
 inde, rupta dilapsa que illa testa proueniunt. Cum cæteri galei bis anno pa- G
 riant, (uti modo diximus) canicula semel parit in uere. Fœtum ubi aliquis 7
 imminet metus, in se recipit, & rursus emittit, ut & cæteri galei. Galeus ca-
 nicula uiroso sapore est, & malum procreat succum. Dentium dolores se-
 dantur cerebro caniculæ in oleo decocto adseruatoque, ut ex eo dentes se-
 mel anno colluantur. γαλιός ἢ αλοπυλίας, id est uulpecula, gustu similis est ter-
 restri uulpeculæ quadrupedi, unde illi nomen. Oua ad præcordia continet
 super mammas illas: quibus, ut descenderint, iam absolutis, fœtus innasci-
 tur. Fœtus suos frequentissime emittit & recipit alopecias. Pisces, qui uul-
 pes marinæ nuncupantur, cum se deglutisse hamum senserint, hoc modo
 sibi opitulantur: transglutientes magnam lineæ partem usque ad tenuio- 8
 ra fila, lineam ita abrodunt. Archesstratus, inquit, uulpem galeum piscem H
 Rhodi optimum esse: & canem pinguem à Syracusanis uocari. λευκός, id est 9
 spinaci idem generandi modus, qui uulpeculis est: oua enim ad præcordia
 continent spinaces super mammas illas: quibus ut descenderint iam abso-
 lutis, fœtus innascitur. Spinax unus ex galeis recipere intra se prolem spinæ
 impedimento non potest. & hoc quoque illi peculiare, quod cor habet pen-
 tagonum. Galei λεῖος, id est leues uocati, oua per uulvam mediā, ut canicu-
 la gestant: quæ postea in utrunque uteri sinum descendunt, & animal gi-
 gnitur umbilico hærente ad uulvam, ita ut ouo absumpto, partus non ali-
 ter atque in quadrupede contineri uideatur. λευκός, id est stellaris, quem
 λευκός alij uocant, parit sepiissime: quippe qui bis mēse putatur parere: quod
 idè

Carcharias.
 Canis carcha-
 riæ, γαλιός
 χειρῆς.

Cynosphastrū.
 Lamia, scylla.
 Centrine, κα-
 τεῖν.

Γαλιός κύων,
 Galeus canicula.
 Σκύμιος,
 Σκύμιος,
 Σκύλιος,
 Νέριος.

Αλόπηξ, ἢ αλο-
 πυλίας.
 Vulpecula, uul-
 pes marina.

Canis pinguis.
 Λευκός,
 spinax.

Λῶς γαλιός,
 leues galeus,
 uel muscelus.
 Λευκός, stel-
 laris, πικίλος

A ideo uidetur, quia oua eorum non simul perficiuntur. ſepiffime foetus ſuos intra ſe recipit & emittit. Cæteros galeos ſua uitate tuncit aſterias: eſtq; tenerior & melior, ut Iceſius prodidit. E galeorum genere eſt & qui apud Romanos maximo habetur in pretio, quem galexian uocant. Hic in Græco quidem mari nuſquam uidetur naſci. & cum cæteri galei duriorem habeant carnem, hic teneriore carne præditus eſt. Quæ galei uocantur, ita ſe habere palam eſt: quæ autem γαλε, id eſt muſtelæ appellatur, ſimilimæ ſunt murenis: nullamque cum muſtelo communitem habent. in Silphio lacu naſcuntur plurimæ. De muſtela hæc cecinit Auſonius,

Galexias, γα-
λιſίας.

γαλι, muſtela.
Μυρενι, τυρ
τωοςίη.

Quæque per Illyricum, per ſtagna binominis Iſtri

Spumarum indicij caperis muſtela natantum,

In noſtrum ſubuecta fretum: ne lata Moſella:

Flumina tam celebri defraudarentur alumnò,

Quis te naturæ pinxit color? atra ſuperne

Puncta notant tergum, quæ lutea circuit iris:

Lubrica cæruleus perducit tergora fucus.

Corporis ad medium fartim pingueſcis: at illinc

Vſque ſub extremam ſqualet cutis arida caudam.

Ut uero alij, muſtela breuiſ piſcis eſt & iecorino adeo ſimilis, ut eundem eſ ſe diceres. Pupillæ oculorum ad cyaneum colorem accedunt: eius mentum quàm iecorini maius eſt, & minus quàm chremytis. algas depaſcitur, & ſaxatilis eſt: atque ſimiliter ut muſtela terreſtris omnium cadauerum in quæ

C incidit, oculos exeſt. Proxima eſt ſcaris mēſa generis dūtaxat muſtelarū, inquit Plinius, quas mirū dictu inter Alpes quoque lacus Rhetiaë Brigan-
tinus æmulas marinis generat. Comitiali morbo correptis datur muſtelæ marinæ iecur.

Muſtela ma-
rina.

1 Galei uocantur, &c. Theodorus muſcelos uocat. 2 Squalus, ut equidem ar-
bitror, apud Pliniū lib. 9 galeus eſt, cap. 24 & ſi: quanquam Maſſarius in priore capite
non ſqualum ſed galeum legi mauult. 3 Pugna ſpongiatorum cum canibus mari-
nis pulcherrime deſcribitur à Plinio lib. 9. 4 Scyllam, &c. Eſt apud Oppianum ſcy-
tale, quæ in alto degit pelago, raro litora adiens: uide an ſit eadem quæ ſcylla, an Op-
piani exemplaria ſunt mendosa, & legendū potius ſit σκυλλάρη pro σκυτταίη. 5 An
idem piſcis hic ſit, qui apud Ouidium in Halieuricis inter pelagios piſces numeratur:

Muſtelus.
Squalus.

Scytale.

Cercyrōſque ferox ſcopulorum ſine motatus,

uel cercutos, κερκυροι apud Cercyros, cer-

D Oppianum, qui in ſaxorum cauernis uideatur. 6 Suſpectus mihi quidem uidetur curoſ.

hie Ariſtorelis locus, uti prius in taia admonui. 7 Quomodo ſærum emitti & re-

cipit, docet Oppianus lib. 1 de piſc. 8 Hoc in loco libentius ſecuti ſumus ueterē Ari-

ſtorelis interpretationem quam Theodori uerſionem, ex Oppiani quoque & Plinii autho-

ritate. 9 Spinaces, inquit Maſſarius, ſic à ſpinis quæ binæ & albæ eminet dorſo nun-

cupari. 10 Marinis, aliàs murenis, ſed potius legendum arbitror marinis: ut ſcilicet

comparentur muſtelæ, quæ lacuſtres ſunt, marinis piſcibus uel optimis, uel marinis,

ſcilicet muſtelis, de quibus Plin. hoc loco lib. 32: & inter marinos piſces Columel. lib.

8 audias muſtelas habere: & Ennii uerſus eſt apud Apuleium apolog. prima,

Omnibꝯ urelupea præſtat muſtela marina.

De piſcibus longis.

Cap. CLXV.

Q Vi longi ſunt piſces & corpulenti, ut anguilla, conger, ut mugilū ge-
nus quod in lacu Sypharum naſcitur, parte corporis prona binas ha-

Bb iij

DE DIFFERENTIIS

bent pinna: sed quæ in cæteris piscibus supina parte habetur, carent ex iis E nonnulli. Iis uero qui prælongi sunt & serpentis speciem magis referunt, nullæ omnino sunt pinna, ut murenæ: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: & iis neque branchiæ integræ sunt atque discretæ, ut cæteris piscibus habentur. Genus piscium longum aquiloniis locis melius uiget. Et quidem ætate loco eodem in aquiloniis plures longi quàm lati capiuntur.

De murena & aliis quibusdam longis.

Cap. CLXVI.

*Murena,
Μύρην.
Ταπρινία.
Ταπρινίος.*

*Myrus,
Μύρος.*

Ardens auratis murena notis, inquit Ouidius.

Alias, laetum

Hæc Ouidius in Halicæ. anthiæ tribuit, non murena.

MVrena prælongus piscis est, & serpentis potius quàm piscis speciem 1 referens. pinna nullas habet: sed flexuoso impulsu corporis adnatum ita mari utitur, ut terra serpentes ad gressum: modòq; simili repit in hu more, & in sicco quoque nonnunquam: nec ullæ huic branchiæ, inquit Pli nius. Licinius Macer murenas tantum scemini sexus esse tradit: Aristote 2 les myrum uocat maræ qui generat. Discrimen, quod murena uaria & infirma est: myrus unicolor & robustus, colore laticis. Myrum præterea, Do rion author est, nullas per carnem sparsas habere spinas: sed totum in ali mentum utilem esse, & carne admodum tenera. Sunt uero duo eius gene ra, alterum nigrum, alterum subrusum est: præstat qui niger est. Ad mure nam reuertamur: dentes tam intus quàm extra os possidet. In Gallia septê trionali murenis omnibus dextra in maxilla septenæ maculæ ad formam septentrionis aureo colore fulgent duntaxat uiuentibus, paritèrque cum anima extinguuntur. Tenuissimum his tergus, contrà anguillis crassius. Branchias non habet murena integras articulatasque, ut cæteri pisces: qua 3 ternas tamen utrinque possidet, & eas simplices. Fel habent murenæ femo rum à iecore, intestinis commissum. excunt in terram, & sæpe in ea capiun tur. Licinius Macer (ut diximus) murenas tantum scemini sexus esse tra dit: & concipere è serpentibus in sicco litus elapsas, id quod falso credi af firmat Andreas. Murenarum certe coitus, ut & Aristoteles prodidit, com plexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpentum. Murena omnibus anni temporibus parit oua parua: cuius partus & numerosior est, & ex par uo in maximum cito adolefcit. Murena neque in stagnis gignitur, nec te mere fluuios ipsam subire inuenias: nonnunquam tamen & quæ in utroq; 3 uisitant, in mari scilicet & aqua dulci, reperiuntur. Partim pelagia partim 4 litoralis murena est, sed fere in saxorum cauernis degit: & sola ex pretiosis piscibus (quanuis Tharsensis Carpathiæque pelagi quod est ultimum, uer nacula) quouis hospes freto, peregrinum mare sustinet. Sola carne uestitur murena. pinguescere iactatu traduntur. latent autem quibusdam anni tẽ poribus. Ouidius prodidit in eo uolumine quod Halieuticon inscribitur, murenæ rete circumdatam maculas appetere ipsas consciam teretis ac lu brici tergi: tum multiplici flexu laxare donec euadat. Murena ut hæserit ha mo, amplius deuorat hamum, admouetque dentibus lineas atque erodit. Idem infixam hamo inuertere se, quoniam sit dorso culcellato, ipinæque li neam præsecare. In piscinis nonnullis commisceri eas cum alterius notæ piscibus

A piscibus non placet: quia si rabie uexantur, quod huic generi uelut canino solet accidere, saeuissime persequuntur squamosos, plurimosque mordendo consumunt. Fuste non interimi murenas aiunt, easdem ferula protinus.

Animam in cauda habere certum est, (inquit Plinius) eaque icta celerrime
 4 exanimari: at capitis ictu difficulter. Nouacula & ferrum quæ pifce tacta sunt, olent. Murenæ morsus uenenosus est: eademque comitantur sympto-
 mata, quæ uiperæ morsum: uerum perniciosas illas teretes esse minoresque
 ac uarias, atque è uipera prognatas tradit Andreas. Murena polypo hostis
 est & carabo, atque cum utroque pugnat. Probantur ex murenis maxime

5 è Siculo fredo quæ *ῥαται* & Latine flutæ dicuntur, quòd in summo superna-
 tantes, sole torrefactæ curuare se posse, & in aquam mergere desinant: atque
 ita faciles captu sint. Carnem habet murena nec durā nec mollem, sed me-

B diocrem: quæ item succum procreat neque tenuem neque crassum, sed me-
 diocrem: quæ tamē in uitiosis aquis degunt, pessimæ sunt. Alunt murenæ,
 inquit Icelius, nō minus quàm anguillæ aut congrī. Murenæ morsus, ipsa-
 rum capitis cinere sanantur. Lichenas & lepras tollit murenarum cinis cū
 mellis obolis ternis. Est & murena quædam fluuiatilis, cui spina unica est,

ut Dorion prodidit, non aliter quàm asellorum generi, quod callariam di-
 cunt. Serpentis quoque speciem refert anguilla, piscis longus ac levis: binas
 habet pinnas iuxta branchias, quas utrinque quaternas gerit simplices, eaf-
 que exiguas: gula quoque illi exigua: fel in iecore inest. In omento sebū pin-
 guēque paucum, & in paucis inest: plurimæ eo carent. Nō est in iis genus ma-

C sculinum scæmineūm: nec per coitum procreantur, nec pariūt oua. Nec
 uero capta unquā aliqua est, quæ aut semen genitale aut oua haberet. Mea-
 tus quoque uel femini uel uulua: accommodatos nulla rescissa ostendit: sed
 hoc unum fere inter sanguinea genus, totum sine coitu, sine ouo procrea-
 tur: quod ita esse argumento constat, quòd in nonnullis scæclētis stagnis,
 aqua omni exhausta, & limo detractō, anguillæ denuo generātur ubi aqua
 accesserit pluuia: nam ficcis temporibus gigni nequeunt, etiam in stagno
 perenni: quippe quæ imbre & uiuant & alantur. Conuolutis sibi inuicem
 anguillis attritu corporum mutuo, ut nonnulli tradunt, mucor quidam in
 arenam limūque distillat: ut uero aliis uidetur, atterunt se scopulis: ea stri-

D gmenta uiuescunt. nec alia est earum procreatio: nam anguilla neque mas
 neque scæmina est, ut modo diximus, neque prolem ex se aliquā potest pro-
 creare. Quam autem differentiam maris & scæminæ anguillæ notarūt qui-
 dam, scilicet alteram caput habere amplius atque oblongius, alteram, hoc
 est scæminam, repandius, hæc non maris ac scæminæ differentia est, sed ge-
 neris: non sunt enim scæminæ, sed quia aspectu à cæteris differunt, scæminæ
 appellantur. & sunt in anguillarum genere meliores quæ scæminæ uocan-
 tur. E fluuiis in mare descendunt anguillæ: & in utroque humore degunt,
 marino scilicet & dulci. Anguillæ octonis uiuunt annis: durāt & sine aqua
 senis diebus aquilone spirante, austro paucioribus. At hyemem eadem in
 exigua aqua non tolerant, nec in turbida: idēque circa uergilias maxime
 capiuntur, fluminibus tum præcipue turbidis. Anguillæ pauca: quædā cer-

Plota, fluta.

*Murena flu-
uiatilis.*

*Anguilla,
ἰγγήλιος.
ἰγγήλιος.*

Mucor, ῥαται.

DE DIFFERENTIIS

risque locis uescuntur limo atque eduliis, si quis apponat: sed plurimæ dulci humore uiuunt, idq; qui uiuariis anguillariis dant operam (ἰχθυόλιες dicuntur) summo opere curāt, ut quā maxime pura syncerāque sit aqua af fluens semper & effluens per ripas, ubi uiuaria extruuntur: in turbida nanq; breui suffocatae intercunt: ideoque quo eas facilius capiant, aquam perurbant. pascuntur noctibus: interdiu in luto quiescunt. exanimis pisciū solæ non fluitant. Anguillæ quanuis uel ex purissima capiantur aqua, succum probum nunquam efficiunt, sed lentum pituitosūq;. Et anguilla palustris sapore magis ingrato est quā marina: sed uberius alit, ut Diphilus author est. Icesius autem anguillas inter pisces optimum procreare succū, & stomacho admodum gratas esse prædicat: abundēque nutrire, & edētes facile saturos reddere. & Macedonicas anguillas inter fassamenta numerat. Cōger (quem & gongrum appellant) gryllus quoque à nonnullis uocatur, anguillæ similis est, lōgus leuīque ac lubricus. Pinnulas tantum binas habet: & binas utrinque brāchias, altēras simplices, alteras duplices. gula illi exigua est. In fellis situ ambigit: aliis enim ad iecur, aliis intrā sepositum adhæret fel. Conger ad ingentem crescit magnitudinē, præsertim in Sicione, ut Eudoxus author est. Congrorum generatio, ut Oppianus tradidit, nō aliter fit atque anguillarum, attritu scilicet corporum mutuo, indēque mucore quodā in arenam limūmue distillante ex quo nascuntur congrid. uerūm ut Aristoteli uidetur, congrid fœturam intra se continent, ouum scilicet, sed minime arenidum, quale in piscibus cernitur qui squamis integuntur. Nec ipsa fœtura satis patet in utero pinguedine obeso: est enim prolixiuscula, ut G in serpentibus, quod certe ignis periculo innouescit: pingue enim absumitur atque euaporatur, oua autem crepitant & extrusa dissiliunt. adhæc si palpitantes & atteras digitis, pingue leue utique senseris: ouum autē duriusculum. Congri itaque alij pingue habent, ouum nullum: alij contrā, pingue nullum, ouum autem quale modo exposui possident. Congrorum genus duplex, albicantes pelagij sunt: at uero nigricantes ambigunt, partimq; pelagij, partim uero litorales sunt. Viētitant autem frequenter in paludibus & ad fluuiorum ostia, ubi copia influit aquæ dulcis:

Et fluctus cœno commixtus uertice multo

Voluitur à terra.

Carne tantum uescuntur congrid, uti docet Aristoteles. Congri polypos edunt: leue enim & lapsū congrid corpusculum hostis in dimicatione effugit. Conger & murena caudas inter se prærodunt. Conger, ut Philotimo placet & Galeno, duram carnem habet: quæ tamen concoctu non admodū difficilis est, uti Xenocrates docuit, nec mali succi. Nutrit copiose, uerūm 8 ori non adeo gratus est. Acus siue belone, quem & aculeatum uocamus & rhapsida, piscis est longus, tenuis & leuis, rostro præacuto & in cornu modum duro. Dentes non habet, ut refert Athenæus: fel habet iecori annexū. 9 fœtificat sero, & hyeme parit. Vnus piscium dehiscēte utero non tam propter multitudinem ouorum, quā magnitudinem parit: habet enim hūc rimam quandam sub uentre imo, ut cæcæ serpentes, τρυφεύς uocant, à partu uiuit

Anguilla Macedonica,
Cōger, Gōger.
τρυφεύς.
Gryllus.

Acus, belone.
Rhapsida.
Aculeatus.
Ἰχθυόλιες.

- A uiuit, & uulnus coalescit: & modo phalangiorum proles parentem offusa circumdat, & si retigeris, fugiunt. Victrix belone locis partim saxosis, partim arenosis. Postquam laqueos retiâque piscatorum euasit belone, uti refert Oppianus, dum conuersa morfu lacerare retia cupit, dentibus hæret in lino, atque ita capitur. Stomacho minime grata belone est: malum procreat succum, facillèque corrumpitur & parum nutrit, ut Xenocrates prodidit: ut uero Diphilus, concoctu difficilis est, sed probum efficit succum. Belonæ sphyræna similis est, eam Athenienses cestram dixerunt. Sudis Latine *Sphyræna* appellatur, quæ à Græcis sphyræna, rostro similis nomine, magnitudine inter amplissimos rarus, sed tamen non degener. Duplex carum genus, utrūque longum. Si reti claudatur sphyræna, serpentis in morem è maculis clabitur: adeo lubrico est tergo. Gregatim degunt sphyræne. Saporem non admodum grato sphyræna est: sed succum gignit bonitate mediocrem, & qui copiosius nutriat, quàm qui è congro. Zygenæ piscis longus est, ut prodidere quidam: ab aliis uero inter cete numeratur ferocissima. Zygenæ fel adnexum iecori est. Caro zygenæ & dura est & insuauis. Zygenæ cum sit asper & infausto infelicique, non est prospera nauigantibus. Forma (ut Oppianus scribit) anguillæ proxima est echeneis, pisciculus sesquipedalis: quinque digitorum crassitudine, ut Trebius Niger prodidit. Qui cum uidere, inquit Plinius, limaci magnæ similem esse dicunt. Saxis affluctus est, pelagiûsque, raro litora petens, colore nigricante fuscoue: rostro acuto atque prope in hami morem incuruo. Hanc errore nonnulli pedes habere prodiderunt: expes autem omnino est: sed quoniam pinnas habet pedibus similes, hinc fit ut pedibus instare uideatur. Hoc piscem carinis adhaerente, naues tardius ire creduntur, inde nomine imposito: & è nostris quidam Latinis remorâ appellauere eum. Ruant uenti licet, & sequant procellæ, imperat furori, uirésque tantas cõpescit, & cogit stare nauigia, quod non uincula ulla, non anchoræ pondere irreuocabili factæ. Hæc prætoriam Antonij nauim Acciaco Marte tenuisse fertur: & postea Caij Caligulæ. Ad mirandum certe, quomodo adharés teneat, nec idem polleat in nauigium receptus: mirumque è Græcis alij lubricos partus atque procidentes contineri ad maturitatem alligato eo, prodiderunt: alij sale adseruatum adalligatumque grauidis, partus soluere: ob id alio nomine odynolyontè appellari. Præterea hanc esse eius uim adseruati in sale Trebius niger arbitratur, ut aurum quod reciderit in altissimos puteos, ad mortus extrahat: tamen in cibos non admittitur. Oblongo corpore musculus est, *μυσταύρος* Græci uocant, piscis paruus, cauda tenui. Dentes nullos habet: sed pro his, setis, suillis similibus intus os hirtum, & linguam etiam ac palatum. Balenam antecedit musculus, & oculorum uice fungitur, monstratque uiam ducitque per æquor, nec balenæ solum dux est, sed & ceterum aliorum, ut tradit Oppianus: nam cete non longe cernunt. *Βάλλαι* in quodam Lybiæ flumine nascuntur septenarium cubitorum, quæ branchias habet perforatas, ita ut per eas respirare possint, inquit Strabo. *Βάλλαι*, id est hirudines, quas & sanguifugas uocant, nonnulli captas seruant: diuersus etenim earum ad extrahendū san-

Sphyræna
Sudis
Cestra

Zygenæ
Libella

Echeneis
Exornit
Remora

Colore nigricante
Græci μυσταύρος
Βάλλαι, *fuliginea*
nostris

Remora

Odynolyontè
Alia, appellauere

Musculus marinus

μυσταύρος
Alia, Græci linguam etiam appellant
Βάλλαι

Hirudo
Sanguifuga
Βάλλαι

guinem usus est. quippe eadem ratio earum, quæ cucurbitarum medicina- E
 lium ad corpora leuanda sanguine, spiramenta laxanda, iudicatur: sed ui-
 tium, quod admittit semel desiderium facere circa eadem tempora anni
 semper eiusdem medicinæ feruntur. decidunt satietate & pondere ipso san-
 guinis, aut sale cineræ aspersæ. Quod si forte hirudinum penuria sit, aut
 cum admoventur, pauciores quàm pro desiderio adhæserint, forcipe cau-
 da inciditur: ita enim fiet ut effluente ex ipsis sanguine, ab attractione non
 desistant, donec cinere aut sale aspergatur. Scire autem oportet, hirudines
 non sanguinem qui in intimo corpore est extrahere, sed eum qui in extre-
 ma carne continetur exugere. Aliquando, inquit Plinius, affixa relinquunt
 capita: quæ causa uulnera insanabilia facit, & multos interimit: inuehiunt-
 que uirus remedio uerso: maximeque rufæ ita formidantur. Ergo sugentia F
 ora forcipibus præcidunt: ac ueluti siphonibus defluit sanguis, paulatimq;
 morientium capita se contrahunt, nec relinquuntur. Hæc Plinius. Incedunt
 hirudines parte corporis priore præcedente, & quod reliquum est corpo-
 ris, ad illam contrahunt: & hoc quidem pacto, uno ex loco in alium ferun-
 tur. Capillum denigrant sanguisugæ, quæ in uino nigro diebus quadragin-
 ta computruere: alij in aceto sextariis duobus sanguisugarum sextarium
 in uase plumbeo iubent putrescere totidem diebus, mox illini in sole.
 Soranatus tantam uim habere tradit, ut nisi oleum ore contineant qui tin-
 gunt, dentes quoque eorum denigrari dicat. Palpebrarum & aliis quoque
 locis nascetium pilorum, psilothrum sanguisugarum, cinis ex aceto illitus
 esse putatur. comburi eas oportet nouo uase fictili. In Gange Indiæ Statius 16
 Sebosus haud modico miraculo affert uermes brachiis binis LX cubitorum G
 cæruleos nomine & colore, (hi nomen à facie traxerunt) adeo robustis uiri-
 bus, ut elephantos ad potum uenientes, mordicus comprehensa manu ipso-
 rum, rapiant in profundum. Ctesias Gnidijs author est, in Indo fluuio be-
 stiarum ferarum experte, uermem nasci, qui eorum qui in ligno gignuntur
 & aluntur uermium, speciem habet. Hunc ad septem cubitorum longitu-
 dinem, & eo amplius excrefcere: cuius crassitudinem decem annos natus
 puer manibus uix circûplecti queat. Huic in superiori oris sede unus dens
 inest, in inferiori alter: ambo quadranguli cubitalem longitudinem habet:
 & quodcunque siue animal siue lapidem comprehenderit, facillime cõte-
 rit. Interdiu ima in sede fluminis uersatur, noctu ad terram procedit, & in 11
 quodcunque inciderit, uel equum, uel bovem, uel asinum cõficir, atq; in suas
 sedes trahit: & in flumen abstrusus, membra omnia, excepto uentre, exest.
 Ac si interdiu fame premitur, siue camelus siue bos in ripa bibit, uiolenti-
 simo impetu, summa labra mordicus comprehendit, & robusto tractu in
 aqua protractum edit. eius pellis duorum digitorum crassitudine est. Huc
 cum ceperint, triginta dies appensum tenent: atq; ex eo in fictilia uasa cras-
 sum oleum stillat: quod quidem ipsum regi Indorum apportant. Huius ea
 est uis olei, ut sine ullo igne eius infusa hemina, quencunque lignorum a-
 ceruum comburat. Ac si uel hominem uelis, uel aliud animal exurere, pri-
 mum ut hoc infuderis, funditus statim deflagauerit.

*Hirudines
rufa.*

*Cæruleus.
vermis.*

A 1 Etiam lib. i. histo. animalium videtur Aristoteles murenam separare à piscibus natandi modo. 2 Pliniani codices plurimi pro myro myrinum habent: verù myrino, ut Aristoteli placet, (Theodorus murinum vocat) umbres nocent: sit enim ut plurius multi excrescant, si modum aqua excefferit. Colore laricis, *ἄμυρος τῆς μύρης* ita legit Theodorus: Athenæus vero *ἰνός*, id est colore anis, quæ iynx dicitur: cui lectioni cōsentire videtur & vetus Aristotelis interpret. Sed scrupulus restat, quòd Athenæus addidit, *ἵασι τῆς ἰνῆς καὶ ἰνῆς*, ut scilicet in omnibus partibus tam externis quàm internis unius sit coloris. Nihil volui mutare, sed admonere. Smyrus etià à Plinio inter marinos pisces numeratur, verum tanquam alterius generis à murena. 3 In utroque. Inter eos pisces numeratur etià à Galeno, qui in utroque humore, scilicet in mari & aqua dulci uiuant. In lib. de cib. bo. malique suc. 4 Vetus codices nonnulli habent, Nouacula pisces quæ tacta sunt, ferrum olent, ut sit nouacula piscis. 5 Sicu-
lo fredo, &c. Martialis lib. 13.

Quæ natat in Siculo grandis murena profundo,
Non ualet exultant mergere sole cutem.

B Fluræ. Theodorus etià *ῥυάδες* fluras interpretatur lib. 4. histo. animalium. Rhyades *ῥυάδες* quories piscium lorua uel nautis sentina eiecta est, fugiunt ut odorem sentientes. Libro autem quinto, rhyades per *ῥυάδες* panunt: Theodorus spargos vocat. Libro 6, rhyades piscium genera dixit solitaria, id est quæ solitarie uagantur: *ἰς ἃς ῥυάδες πῆς ἡ ῥυάδα τῆς ῥυάδας*, id est: parit solitariorum genus in uere. Sed uide ne mēda in his locis subsit in Græcis exemplaribus, & Gryllus, inquit Diphilus, similis est anguillæ, sed insuauis. 7 Vescuntur. Hæc non de congro, sed de murena narrat Oppianus. Aliter hunc locum uertit Theodorus, sed nos hic & Græcam secuti lectionem, & ueteris interpretis sensum ira reddidimus. Et ex Plinio quoque lib. 9 polypum congru lacerant. 8 Ori non adeo gratus *ὡς ἡ ῥυάδα*: forsitan *ὡς ἡ ῥυάδα* apud Oribasium.

9 Duro. Addit Massarius, dorso cœruleo ad viride inclinante: uentreque argentei coloris. Et Albertus Magnus Spinam habet uiridis coloris. 10 Piscium dehiscēte. Dehiscēte propter multitudinem utero, inquit Plinius. 11 Sphyræna. Mirum quòd dicat Plinius hunc & alios quosdam pisces, de quibus in hoc lib. 32 scribit, à nullo auctore nominatos. Sphyræna Theodorus malleolum uocat. 12 Sciquipedalis. Apud Plinium legunt hic quidam, semipedalis. 13 Brachias habet perforatas. Et gulam perforatam habent ad respirandum: Elianus. 14 *ἡ δὲ μάλα περὶ τῆς βραχίας*, id est emulgere: sanguinem nanque curi ad mortem exungunt. Quo pacto seruantur, atque ad usum accommodantur, monstrat Galenus lib. de hirudinibus. 15 Branchiis binis. Alias, brachiiis binis 1 x cubitorum. Solinus ita habet, Hi bina habet brachia longitudinis cubitorum non minus senum.

De planis piscibus, qui *ἡ ῥυάδα* dicuntur, id est qui passerina sunt specie.

Cap. CLXVII.

D *ἡ ῥυάδα τῆς ῥυάδας*, id est pisces qui passerina sunt specie (qui & plani uocantur) eodem modo natant quo coelites, & altero oculo orbatu incedunt: nam eorum natura à recta figura peruersa est. Psettaceum genus non coit: nec enim in eo genere mas est, sed oua in omnibus reperiuntur. Limosa regio, ut Columella prodidit, planum educat piscem, ut solem, rhombum & passerem. Cibo suauis sunt, & probe nutriunt rhombus, passer & buglossus. Passeres à rhombis situ tantum corporum differunt, dexter resupinatus est illis, passeri leuiss. *ῥυάδα*, quam passerem uocamus, buglossus similis quodammodo est: non tamen omnino eiusdem speciei: buglossus nanque caro, ut Galenus affirmat, & tenella magis est, & in cibo suauior, atque in omnibus præstantior quàm passeris: quanquam nec illius caro dura est, sed me-

DE DIFFERENTIIS

diocritus. Xenocrates autem buglossum & psettam, carnē habere durā & E
 corruptioni minime obnoxiam, probūque gignere succū & alium me-
 diocriter ciete prædicat. ut uero Diphilus, psettæ & buglossi suauēs sunt, &
 copiosum præbent alimentū. Buglossi caro, ut docet Galenus, ex iis est, quæ
 succum gignunt neque crassum admodum neque tenuem, sed qui usque-
 quaque mediocritatē obtineat: qua & in saxatiliū penuria eorum lo-
 co uti licebit. neque uictus utrique prorsus eadem ratio est: buglossus nāq;
 loca arenosa magis, passer crenosa amat. Cynoglosson quoque psettam uo-
 cant Athenienses, à buglossō diuersum. Rhombum Diphilus buglossō &
 psetta nihilo deteriorem iudicat: quod scilicet ad saporis gratiam pertinet,
 alimentū, quod ex eo præstatur copiam. Mediocritatem obtinet rhombus
 inter duram & mollem carnem ait Galenus: asello tamē durior est. Xeno- F
 crates autem duram esse eius carnem, nec facile corrūpi posse: oportere ue-
 ro rhombum magnum uno die adseruatū, postea coquere: in uentriculo
 egre concoctionem pati, sed nutrire abunde. A rhombis passerēs (uti modo 3
 diximus) situ tantum corporum differunt: dexter resupinatus est illis, passeri
 leuus. Latus admodum piscis rhombus est, uel Martiale teste:

Quauis lata gerat patella rhombum:

Rhombus latior est tamen patella.

Rhombi abditi pinnas exertas mouent specie uermiculorum: ita Plinius.
 Aristoteles uero de ἰσθῖα, Cum nullam, inquit, sui corporis partem intectā
 reliquerit, uerberat radiolis sui oris, quos piscatores uirgulas uocant: quas 4
 pisciculi cum aspexerint, adnatant quasi ad algas quibus uesci soliti sunt. G
 Lienī medetur (ut aiunt) rhombus uiuus impositus, dein remittitur in ma-
 te. Buglossō atque passerī suthilis tænia est, piscis tenuis gracilisue, & in ci- 5
 bo quoque gratus, & qui paruo igne indiget. pinnas habet tantum binas.
 Tæniæ frequētes & optimæ nascuntur in Alexandria Canopo & Seleucia
 Antiochiæ. Tæniæ iecur siccatum pondere xiiii cum oleo cedrino per-
 unctis pilis i x mensibus, psilothrum palpebrarum esse putatur. Citharus 6
 piscis planus rhombo similis est: uerum rhombus teneriorem habet carnē:
 neque huius tamen caro dura est, sed mediocris, uti iudicat Galenus. Est au-
 tem, ut Xenocrates prodidit, stomacho ingratus: malum procreat succum,
 sed non facile corrumpitur. Alga pascitur, in arenosis locis uictitans. Den-
 tes habet ferratos, linguam solutam, cor album atque latiusculum. appen- H
 dices habet plures superne circa uentriculum. In hoc genere alius rufescit
 aut flauescit, alius candidior est. Hæc ex Athenæo. In mari rubro, inquit
 Ælianus, piscis nascitur, cuius corpus ita figuratum est, ut similitudinem
 lingulæ eius latitudo gerere feratur. Squamæ non magnam tangenti as-
 peritatem habent. subaureo est colore, & lineis à summo capitis uertice
 ad extremā caudam sic distinguitur, ut eas cytharæ fiduculas contentas es-
 se dicas, unde is citharus appellatur. Os illi pessum it & subsidit, idemq;
 nigerrimum est, atque cingulo crocæo circumligatur. uertex uarietate dislin-
 guitur, fulgore aureo & nigris quibusdam lineis. Pinnae aureas habet. rufo
 colore multipliciter nariatur. Cauda est nigra præter extrema: ea enim cā-
 didissimo

ἰσθῖα δὲ
 ῥόμβος
 Archestratus.
 Cynoglossus.
 Rhombus.

ἰσθῖα.

Tænia, tænia.

Alii hoc loco
 Plinii legunt
 channa iecur.
 Citharus.
 κίθαρῖς.
 κίθαρῖς.
 κίθαρῖς.

A didissimò colore asperguntur. Alij item pìcti nasci dicuntur, toto corpore purpurei, ceteris interuallis aureolas lineas possidentes: eorum uero caput cingulis uiolaceis illustratur, uno quod est ante oculos ad branchias perti-
nente, altero secundum oculos usque ad medium caput excurrente, alio au-
tem tanquam monili sic collum circumplicante. Piscis est, ut nomen indi-
cat, Apollini facer, ut & Apollodorus author est, sicuti cytheria Veneri, In-
ter planos pisces, ut author est Dorion, unà cum psetta & buglossò nume-
ratur & eschatus, quem etiam corin uocant. Lato quoque generi epodas
ex Ouidio adiecit Plinius, eorum ex numero quorum nomina apud nemi-
nem alium reperiuntur.

B Rhombum, &c. Nusquam Aristoteles (quod meminèrim) rhombum nominat;
sed *ῥόμβος* (ut refert Athenæus) Latini *ῥόμβος* rhombum uocant: Theodorus passere
rem interpretatur. Galeus *ῥόμβος* à rhombo distinguit, & pro una specie *ῥόμβος* acci-
pit, quam Plinius passerem uocat, & nonnunquam psetta: ita & Athenæus frequen-
ter. itaque *ῥόμβος* quasi genus uidetur esse rhombo & passeris: & item unam significabit
speciem, passerem scilicet, uti sentit Hermolaus in annotationibus in Plinium. Passer
inter aues *ῥόμβος* uocatur: at *ῥόμβος* piscis est apud Aristotelem alius à passere, cui fel,
inquit, non longe à iecore est intestinis commissum. Theodorus non habet. *ῥόμβος*.
Buglossus. Coniicit Hermolaus buglossum latine soleam dici: & quem Plautus atque
Varro lingulacam nominant, aut solea est, aut illi non absimilis. Plauti locus est in
Casin. cum dixit ullificus, Vin lingulacam? (Respondit senex) Quid opus est? quando
uxor domi est: ea lingulaca est: nam nunquā tacet. De solea & psetta ita refert Plinius.
Terra quidem, hoc est uado maris excauato, condis per hyemes psettam soleamque tra-
dunt. Item, solea cum rhombis non intrant portum. Lieni medetur solea piscis im-
positus. & Ouidius in Halieut.

Fulgentes soleæ candore: & concolor illis

Passer: & Adræco mirandus sistrò rhombus.

3 Dexter resupinatus, &c. Addit Massarius asperum esse rhombum: quandoquidem
ossa quædam rotunda aculeata habeat, quemadmodum raia. **4** Verberat, &c. *ῥαβδίζω*
ῥαβδὸς τοῦ ῥαβδιστοῦ, ἢ ῥαβδὸς τοῦ ῥαβδιστοῦ, Verus interpret, Et cum laruerit, habet
in orificio quandam partem sicut uirgam. **5** *ταυρίος* Theodorus uitam uocat. Te-
nuis gracillius, *λεπτὴ*. **6** *ἀνιῶς* sunt apud Athenæum: an iidem pisces, an potius le-
gendum sit *ἀνιῶς*? **7** Cytharus, &c. *κίθαρς* etiam dicitur: *κίθαρς* apud Pollucē,
an sit idem? **8** Lato quoque, &c. Ouidius quoque in Halieut. latos epodas cū so-
lea, passere & rhombo connumerauit.

De piscibus quibusdam litoralibus saxatilibusque, de scaro.

Cap. CLXVIII.

D **1** Pud antiquos nobilissimus habitus accipenser nullo nunc in honore
est, inquit Plinius: sed scaro datur principatus hodie: ut qui ceteros o-
mnes suauitate præstet. Hic solus piscium dicitur ruminare: huic etenim
uni aquatiliū dentes plani & non serrati. Litoralis piscis scarus est, circa
petrolia herbosaque loca degens: herbis nāque uescitur & phuco præcipue.
Solitarius hic est, (ut author est Aristoteles) & carniorus quoque. Sed Plinius,
herbis, inquit, dicitur uesci, nō aliis piscibus. Linguam habet paruam,
& quæ ori non ualde adhæreat: cor triquetrum & candidum, lienem nig-
rum. Superne circa uentriculum exeunt appendices complures, binas ut-
rinque branchias habet, alteras simplices, alteras uero duplices. ætate opri-

Cc

DE DIFFERENTIIS

mus habetur. Noctu fere nō capitur: dormit enim in cauernis latitans. So-
lus piscium, ut refert Oppianus, magnam edit uocem. Vacat Eurypus Py-
raeus scaro & thryssa, & reliquis spinosioris generis: ita Aristoteles. Scarus, 3
inquit Columella, totius Asiae & Graeciae litoribus Sicilia tenus frequen-
tissimus exit. nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enauit ad Ibericum
mare: itaque ne si capti quidē perferantur in nostra maria, diuturni quēat
possideri. Vti uero Plinius refert, scarus mari Carpathio frequēs, promon-
torium Troadis Lectum sponte nunquam transit. Inde aduectos Tyberio 3
Claudio principe Optatus praefectus classis, inter Hostiensem & Campa- 4
nia oram sparsos disseminauit: postea frequentes inueniuntur Italiae in li-
tore, non ante ibi captae. Alga uescitur, uti diximus, phucōue marino, eōq;
capitur. Fallitur quoque à piscatoribus per foeminas, quas amore nimio F
prosequitur. Mirum scari ingeniu Ouidius prodidit in eo uolumine, quod
Halieuticōn inscribitur: scarum inclusum nassis, non fronte erumpere, nec
infestis uiminibus caput inserere: sed auersum cauda ictibus crebris laxare
fores, atque retrorsum ita erumpere. quem luctatum eius, si forte alius scar-
us extrinsecus uideat, apprehensus mordicus cauda adiuuare nixus erum-
pentis. Duo esse scarorum genera prodidit Nicander Thaxterenus, alterū
onian uocari, alterum æolon. Saxatilis est scarus, ut diximus: & caro illi, ut
Diphilus scribit, tenella, fragilis, suavis, leuis: atque facile & concoquitur.
& in corpus digeritur, modicēque aluum mouet. Non sine praecautione ta-
men scaro (praesertim recenti) uescendum suadet: pascitur enim nonnun-
quam marino lepore: quo fit, ut eius interanea cholera excitent. Xeno-
crates scarum cito in uentre corrumpi dixit. Scari piscis marini iecinore ad G
parotidas utuntur nonnulli.

*Vide ne men-
dosa sint in
hoc loco exem-
plaria. Aristoteli-
ca.*

*Scarum apud
Varronē etiā
in piscinis dul-
cibus seruat.*

*Quo modo ca-
piatur lepes ap-
ud Oppianū
lib. 4. de pisc.*

Græc. ἀσάρις.

*Ruminalis,
μύρσις.*

SCARUM.

1 Sed scarò, &c. Scarus, inquit Plinius, principalis hodie. Extat Ennij uersus apud
Apuleium apologia prima, de scari praestantia: Scarum praeterit, cerebrū Iouis pe-
nē supremi. 2 Dicitur ruminare, &c. Ruminat & piscis, quem ab ea re ruminalē
quidam appellarunt, μύρσις. ita Theodorus Aristotelis uerba regulis: mihi uero ita uet-
tendum uidetur, Ruminant & pisces (scilicet quidam) & quem ab ea re μύρσις, id est
ruminalē appellant: ut incertum adhuc sit, in quo animalium genere numerari de-
beat μύρσις. Athenæus ex Aristotelis auctoritate scribit scarum esse carniuorum. 3
Scaurus habetur in codicibus nostris, & hic in cap. 16 lib. 8, & cap. 17. 4 Optatus,
&c. uide an ita legendum sit, an Optanus uel Otauius: ex Macrobio lib. 3 Sat. H

De mullo, coccyge & aliis quibusdam similibus.

Cap. CLXIX.

*Mullus,
τεῖλαν,
τεῖλιν,
μυλάτις.*

Post scarum mustelamque, ex reliqua nobilitate, gratia maxima & co-
pia mullis. Nomen his Fenestella à colore mulleorum calciametorum
datum putat: trigle à Græcis uocatur, ut nonnullis placet, quia ter anno pa-
riat solus saxatilius. Rufus piscis est, gemina barba insignis fere: sed nullū a
expirantem uerficolorē quadam & numerosa uarietate spectari, procere
gulae narrant, rubentium squamarum multiplici mutatione pallescentem,
utique si uitro spectetur inclusus. Litoralis piscis est, in arenosis fere litori-
bus uiatans: & inter saxatiles quoque à nonnullis, sicuti ab aliis inter pe-
lagios

Alagios numeratur: quandoquidem secedit nonnūquam & in altum mare:

Plures habet appendices superne circa uentriculum: gregatilis est. Ter anno parit, sed autumnō potissimum. oua sua limo committit: unde fit, ut se-
3 ro parere uideatur: diutius enim frigus continetur in limo. Mullus postea quam ter pepererit, sterilis redditur, inquit Athenæus: gignuntur etenim illi in utero uermiculi quidam qui semen eius deuorent. Mullis magnitu-
4 do modica, binasque libras ponderis raro admodum exuperant: nec in uiuariis piscinisue crescunt, cum sit mollissimum genus, & seruitutis indig-
nandissimum. Septentrionalis tantum hos & proxima occidentis parte

non gignit oceanus. Vigent nulli potissimum autumnō. Eorū genera sunt

*Non in quibus-
dam exemplari-
bus expūgitur.*

plurimum & phucis uelcuntur marinis, & ostreis, & limo, & aliorum pi-
B scium carne: & barba gemina insigniuntur inferiore labro. Sunt & qui bar-
ba carent: uerum laudatissimi barbati, ut Sophron auctor est, *κακίπας* uocan-
tur. Xenocrates ita distinxit, Mullus pelagius, qui & optimus, perquam rū-
bicundus est igneoue fulgore & ueluti minio auroque splendescens, quō à

τοματίς.

saxatili genere maxime differt. barbam quoque gerit. Lutarium ex iis ui-
6 lissimi generis appellat, ut qui cæno & sordibus uel uilissimis pascitur. nec

*Mullus lutan-
rius.*

litoralibus gratia, laudatissimi ex mari purissimo, & qui conchylium sa-
piunt: qui cancellos deuorant, & grauiter olent & gustui ingrati sunt. Pre-
duram carnem habent nulli, sed friabilem tamen: quo fit, ut nihil habeant

Mullus:

in se aut lentum aut pingue, sed nec mali succi quicquam. Difficulter con-
coquitur, nec facile corrumpitur: quod si probe concoquatur, nutrimenti

plurimum præbet. Stomacho grata est nulli caro, (inquit Diphilus) mo-
dicèque astringens, & aluum sistit, præsertim assanā fixa grauis est & con-

C coctu difficilis: sanguinem autem elicit quouis modo parata. Iucunda qui-
dem est nulli caro, inquit Galenus, atque hominum naturæ familiaris: as-

*Αιματος ἔχ-
ουσα.*

siduo tamen mullorum esu, oculorum aciem hebetari prodit Dioscorides:

Mullos in cibo inutiles neruis inuenio fieri, inquit Plinius. Mulli grandio-
res nec adeo suauis sunt carne atque minores: nec concoctu tam facili, ut

quæ dura admodum sit. Et ut in uniuersum dicam, mullus neque tantam
habere suauitatem, neque corpori salubris adeo uidetur, ut tantopere expe-

ti debeat. Cum itaque quendam interrogassem, inquit Galenus, qui mul-
los prægrandes ingenti pecunia comparauerat, quamobrem tam studiose

D eos expeteret, propter iecur potissimum respondit se grandissimos emere:

7 deinde & propter caput. Mullus si crudus atque dissectus admouetur,
marini draconis, aranci ac scorpionis iectibus medetur. Contra omnia ue-

eneficia ex mensuris mulierum auxiliatur mullus: item cōtra pastinacam,
& scorpiones terrestres marinosque, & dracones, & phalangia illitus sum-

ptusue in cibo. Vomitiones nulli inueterati tritice in potionē concitant.
Eiusdem recentis è capite cinis, contra omnia uenena, priuatiim contra fun-

gos auxiliatur. Attritis quoque imponitur cinis è capite mullorum: con-
buritur autem in fictili uase: illini cum melle debet. Carbunculos discutit

mullorum: salsamenti cinis: quidam capite tantum utuntur cum melle.
Mullum lutarium semper comitatur fargus nomine alius piscis: & cœnū

Sargus:

DE DIFFERENTIIS

fodiente co(fodere enim potest) hic descēdit & pascitur: imbecillioresque E
ne codē adnarent arcet: piscis aliqui saxatilis inter herbosa saxa uiētans.

*Sargus & me
lanurus, παλιν
ρεξιμὸς πικρὸς
μικρὸς ρεξιμ
μὸς dicitur a-
pud Atheniā.*

Insignis sargusque notis, insignis & alis:
Et spinis ueluti palis horrentia terga
Occulit, ut totus ualido mucrone tegatur.
Nec dextram iniicies, rigeant quod tergora densis
Sentibus.

Sargus bis parit, uere scilicet & autumnō paulo ante æquinoctiū. Fert ute-
rum dies triginta, coit mense Decembri. Sargus cum hamo tenetur, ad sco-
pulos lineam terit: astutum certe piscem esse sargū tradit Numenius. Ma-
res pro fœminis contendūt: quo in certamine qui uictor euaserit, solus fœ-
minis potitur omnibus. Caprarum miro amore tenentur sargi: ut sapissime F
ementita earum specie decepti capiantur. In cibo laudatur sargus: est enim 8
stomacho gratus, probū generat succum, faciliq; in corpus digeritur, abū- 9

Sarginus.

*Pediculus pi-
scis.*

*Coccyx.
Cuculus.
Τεργάλα.*

de nutrit, & aluum mouet. Gregalis piscis sarginus est: sed sarginum alium
esse à sargo, Epicharmus author est. Vt circa mullum lutarium sargus, ita
in mari quod à Cyrena in Aegyptum panditur, piscis pediculus nomine,
circa delphinum est: qui omnium pinguisissimus efficitur pabuli copia, quæ
delphini opera suppeditatur. Rufus est & coccyx, id est cuculus, ut author
est Numenius: & mullo similis, ut Pseusippus. Quo fit ut nōnulli trigolam
ab similitudine coccygā appellent: sed partes posteriores squalidiores ha-
bet trigola. Coccyx ambigit: hoc est partim pelagius est, partim apud litora
degit arenosa. Coccyx piscis perinde ut cuculus auis obstrepat, unde nomē
accepit: caro illi dura est. Hirūdinem quoq; piscem (nam est & hirūdo po- G
lypo similis) Pseusippus mullo similem esse tradit: chelidona Græci uocant.

*Hirundo.
Chelidon.*

Chelidon sel habet scorsum à iecore intestinis cōmissum. Volat hirūdo sa- 10
ne perquam similis uolucris hirūdini: sublimisque adco uolitant hirundi-
nes, ut mare ne attingant quidem: altiūque in uolatu sese attollunt quā
miluus, non tam alte tamen quā lolligo: & pinnis stridere sentiūtur: sunt
enim his pinnae latae & longae. Item pelago gaudens, & nigro tergore mil-
uus subit in summa maria. Piscis ex argumēto appellatus lucerna, linguā-
que ignea per os exerta tranquillis noctibus relucet. uolat autem miluus
(λεγεα uocant) cum sibi à maiore pisce metuit, sed summa tātum maria at- H
tingens: neque enim tam alte se effert quā aut hirūdo aut lolligo, ut ne-
scias uolitet ne an super aquā natet. Quoties uero cernatur miluago extra
aquam uolitans, tempestates mutari Trebii Niger author est. Carnem ha-
bet miluus coccygi cuculōe alioqui similem, sed duriorem. Rubellio quē 11

*Milvus.
Miluago.
λεγεα.
Lucerna.*

*Erythrinus.
Erythrinus.
Rubellio.*

erythrinum & erythinum uocant, litoralis piscis est, & arenosa loca inco-
lens: uel, ut Aristoteli placet, pelagius magis. In hoc genere non reperitur
mas: omnes enim ouis grauidę capiūtur: neque mas ullus adhuc uisus est:
quamobrem de his nōdum compertum habemus quod fidem faciat satis.
Erythrinus sapore iucundo est, & alimentum præbet copiosum. in cibo si-
stet aluum: si in uino suffocatus moriatur, uenere[m] ciere dicitur uinum il-
lud epotum, ut ait Xenocrates: uel uti refert Plinius, rubellio in uino putre-
factus,

A factus, iis qui inde biberint tedium uini affert. Venerem concitat erythini
 12 in cibo sumpti. Et rutilus pagur (pagrus etiam & phagrus dicitur) similis
 erythrino est: & modo pelagius modo litoralis, in saxorum cauernis degens.
 Lapillum in capite continet: ideoque hyeme pregelida maxime infestatur:
 facit enim lapidis rigor, ut per algore gelet. Cor illi triquetrum est: solitarius
 est & carniuorus. Vere pagrum uigere sentit Aristoteles: at canicula exor-
 tu edendum suadet Arcestratus. & caput in eo precipuum: duram habet
 13 carnem, & quæ nec corrumpitur facile, nec aluum ciet. Est & fluuiatilis pha-
 grus: sed marinus præstat. Niloticus est piscis, qui (uti refert Ælianus) aduen-
 tantem Nilum præsentens præcurrit, futuramque aquam Ægyptiis præ-
 nuntiat. Pagro similis atque erythrino hepatus est: qui & lebias à nonnullis
 B appellatur, colore nigricante. estque piscis solitarius, carniuorus. dentes ha-
 14 bet pectinatim cœcutes: oculos, quam pro corporis ratione maiores, cor-
 triquetrum & candidum. lapillos gerit in capite duos, ut Hegesander au-
 15 thor est, colore splendorque ostreis similes, rhombi figura: felle caret. Ap-
 pendices habet quædam paucas superne circa uentericulum. Saxatilis est,
 ut Diocles prodidit: & in cauernis latitat in alto mari. Hepati caro, ut Gale-
 nus docuit, duritie mollitiæque mediocriter est: autumnio uilescit, author
 Xenocrates.

Pagrus.
 Pagrus.
 Phagrus.
 Phagrus.
 Phagrus.
 Phagrus.

Hepatus.
 Hepatus.
 Albus.
 Lecorinus.

1 De nullis calcamentis, uide Hermolaum in annotationibus in Plinium.

2 Ouidius in Halientic.

-Tenui suffusus sanguine nullus. Addit Massarius, Si uiuus desquametur, san-
 guinem colorem habet. Epicharmus τειλας uocauit κίχρη τοῦ συδερκετος, id est
 C gibbas, ab eo quod earum formæ contigit. 3 Sero parere. οὐδὲ γινετο, Vt sero patiat:
 ita Theodorus ad Græcam lectionem. Et uetus interpretes aliter: sed mancus est. 4
 Binâque libras. Mulli trilibris meminit Horatius lib. 2. Sermon. & quadrilibris Seneca
 epist. 96: sed rara hæc. Mullum etiam 1 x x x librarum in mari rubro captum Lici-
 nius Mutianus prodidit, inquit Plinius. 5 Eorum genera plura. Mullorum genera
 forsitan pabulo maxime discreta intelligemus: sicuti & de purpura dixit Plinius. Alge
 se, enutritu alga: ostrophagum, cœnchis: carniuorum, carue: lutatiu. apud limonæ. 6
 Lutatum. An hæc fortasse triglis sit Oppiano, quæ in cœnosis litotibus uiuicat? 7
 Iecur potissimum. Mulli iecur quo pacto appareretur condiaturque, docet Galenus lib.
 3. de aliment. 8 Decepti capiuntur. Quo pacto fallantur spargi à piscatoribus sub
 caprarum specie, legito apud Oppianum. 9 Sarginus. Theodorus sargiacu uoca-
 uit, nisi mendosus sit codex. 10 Volat hirudo. Quod de hirudine scribunt, hirudine
 scilicet uolare, &c. à de altera hitudine potius dicitur, quæ polypo similis est: cum
 D dicat Plinius, eam nō pisci, sed uolucris hirundini similem esse. Massarius aliter sentit:
 equidè adhuc nihil affirmo. Non me latet, huius sententia uerba apud Plinium aliter
 à nonnullis distinguuntur: sunt enim qui hunc Plinii locum hoc modo legant. Volat hitu-
 do sane perquam similis uolucris hirudini, item miluus: ut scilicet hic finis sit illius ca-
 pitis: deinde alterius principij. Subit in summa maria piscis ex argumento appellatur
 lucerna, &c. ut scilicet diuersi sint pisces miluus & lucerna. Nos à uetustis exemplari-
 bus non recedimus. Et certe Plinius ipse lib. 2. cum lucernam inter marina numerat,
 miluum non numerat. 11 Rubellio, à colore rufi, ni fallor: quanquam Oppianus
 lib. 1. (αἰδίν ἰπυρίαν, id est flauisq. erythrini dixit. Rubconq. etiam uocat hunc Theo-
 dorus ex Plinio) & rubrum uocat cum dixit Cyrenei, hyccam. Erythinus fluuiati-
 lis etiam fortasse uidebatur legenti primum caput lib. 3. de generatione animalium:
 nisi mendosus sit codex, quod certe suspicor: Nā quod statim in eo loco sequitur, (Et
 enim nonnulli statim habere oua uidetur, ut de his in historiis scripsimus) de phoxi-
 nianis.

Κίχρη.
 Glibbe.

Τειλας.

Sargiacus.

Rubeco.

Ruber.

Hycca, uxxx.

Erythinus flu-
 uianus.

A hic piscis, nec facile concoquitur, alimentum prabet copiosum, nec impro-
bum, sed tamen quod lentius est: non facile corrumpitur, & urinam ciet. Par-
tes quæ ad caput sunt, facilius cōcoquuntur: carnosiores uero graues sunt,
& concoctionem non tam facile recipiunt: teneriores sunt quæ circa cau-
dam. -Concolor illi Cantharus ingratus succo-, inquit Ouidius, *Cantharus*
partim litoralis, partim pelagius est. Cantharus nassa capitur, esca carabo, *uæ. Dup.*
aut polypo: sed utrouis alio. Cantharum Xenocrates author est, & grati sa-
poris esse piscem, & probū creare succum: qui & abunde nutriat, facilēque
in corpus digeratur, & aluum modicē cieat.

1 Et fulvi synodontes, dixit Ouidius in Halieutic, eo forsitan modo, quo Oppianus *ἰσχυρὸν ἰχθυον*. 2 Dentex Columellæ pelagijs est piscis, qui & arenoso gurgite optime pascitur. 3 Nidificat. Atqui Ouidius in Halieutic, *Dentex*.

B Atque autum dulces nidos imitata sub undis portus de salpa dixisse uidetur. Cremys uel chremys apud Athenzum lapillum in capite gerit. Et ἡλμα- apud Aristotelem inter eos pisces numeratur, qui acutissime audiunt. An uel eremys uel chremys idem sit qui chromis? cum Theodorus hunc omiserit: & quod chromis additus sit ab exploratore aliquo, tanquam magis notus quam chromis: aliqui locus ille Aristotelis suspectus est. Chremes item apud Oppianum piscis est, qui in paludibus uidetur, & fluuiorum ostiis: an idem sit cum chrome, an diuersus? Iecorino, ut uidetur, similis est chremys, ex Aliano. 4 Ouidius in Halieuticis non orphum sed orphan uocat, modò ablit menda, & inter pelagios pisces recenset. An sit idem cum orpho, consideranda epithimura habet ὀρφύς. 5 Meatus, ὀρενὸν ἰστέον, ita legendum arbitror, non ὀρενόν. 6 Cantharus, &c. Theodorus scarabeum hunc uocat. Scaraba-

De anthiarum generibus. Cap. CLXXI.

His natura non dissimili anthian esse docuit Icesius. Porro anthian nō-
nulli sacrum pisces vocauerunt: quādoquidem quo in loco anthias sit,
nullam ibi beluam esse confessum est, quo iam indicio secure spongiatores
urinantur. Sed id casu sic euenire dixerim: quo modo & ubi sit limax, neq;
sus est neque perdix: omnes enim limaces ab his eduntur. Frequens hic pi-
scis apud Chelidonias Afrix insulas, & circa Sarpedonem promontorium,
Anthicon petris sunt pascua grata profundis.

Non illis semper gaudent, vulgòque trahuntur
Quò gula, quò ventris iubet infatiata libido.

D Ante alios, istos compellunt æstra palati.

Anthias æstate parit, hyeme in cibo optimus est. strepitu gaudent, eoq; al-
lecti nonnunquam capiuntur. Anthiæ cum unum hamo teneri uiderint,
spinis quas in dorso ferratas habent, lineam secare traduntur, eo qui tenet-
ur extendente, ut præcidi possit. Hæc Plinius: at uero Ouidius,

1 Anthias (inquit) iis tergo quæ non uidet, utitur armis.

Vim spinæ nouitque suæ, uersoque supinus
Corpore, lina secat, fixumque intercipit hamum.

² Nam, ut Oppianus scribit, dentibus aut nullis armatur, aut certe obscuris obtusisue: sed si hamo detinetur, plurimum renititur, magnasque ostendit in renitendo vires. Anthiam stomacho minime gratam esse, sed probum tamen generare succum Icesius author est, facileque excernitur. Anthiarum

DE DIFFERENTIIS

Ενυπνίς.
Κυλινθίς

Callichthis.
καλλιχθίνος.
Callionymus.

Callionymus.
Pulcher.
Vranoscopus.
Agnus, αγνός

Ημερόκαλπος.
Νυκτερίς.
Νυκτερίς.

Helops.
Ellops.
Elops.
Hellops.

Accipenser.

Species quatuor: aliae nanque fulvae, aliae candidiores, nigricant aliae. Sunt E
& quos ἑνυπνίς & κυλινθίς uocant, quasi magnos aut cauos habentes oculos
dixeris: quādoquidem supercilium in iis ueluti in orbem ducitur. Anthian
quoque alij callichthin uocant, alij callionymon: nonnulli elopa: & alij ly-
con. Quos tamen diuersos esse pisces Dorion affirmat: est enim callichthis
(qui & callionymos à quibusdam uocatur) serratis dētibus; & carniuorū,
& gregalis: atque, ut sentit Oppianus, pelagius, & qui non admodum lito-
re gaudeat. Hunc sacrum piscem cognomine uocant: nam ubi callichthis
est, noxia magnarum non cetera monstra ferarum apparēt: & si hamo de-
tinetur, ingente ui renititur. Callionymus Aristoteli litoralis piscis est, idē
qui & uranoscopus uocatur ab oculis, quos in capite ita sitos habet, ut etiā
si noluerit, non potest non suspicere celū: nonnulli agnum uocant. Fel cal-
lionymo in iecore inest proportionē corporis maxime omnium pisciū co-
piolū. Vranoscopus malum procreat succum, & saporē habet uirosū,
ut Xenocrates author est: & cibus grauis, ut Diphilus prodidit. Et sunt qui
callionymum dicant esculentum esse: plerique negant. Fel callionymi ocu-
lorum suffusioni, albugini, & hebetudini obscuritatiue medetur. cicatrices
sanat, & carnes oculorum superuacuas consumit: auribus utilissimū, cum
rosaceo infusum. Ignauus piscis est hemerocætes: oculos hic habet in sum-
mo uertice, os inter oculos medium. Interdiu semper dormit, noctu uigi-
lat oberrans: indeque à nonnullis nycteris uocatur. Piscis uoracissimus, &
nunquam edendo satiat. nec cessabit unquam,

Donec cum rapido disrumpat uiscera uentre:

Et nimio pastu uita spoliatur onustus.

Est tantæ lignum, crapulae uentrisque rapacis:

Apprendat si quis piscem, dein porrigat escas,

Dum cibus ore tenuis, pastu & summa ora replentur,

Arripiet.

Ellopa quoque nonnulli anthian uocant: eundemque esse quē callichthin
& callionymum arbitrantur. Dorion distinguit, uti modo diximus,

Est pretiosus helops nostris incognitus undis, ut scripsit Ouidius.
Pamphilio nanque mari profundo nec alio pascitur: quanquam Arche-
stratus ellopen ex Syraculis præcipue laudare uidetur. Branchias quaternas
habet utrinque simplices. Fel à iecore semotū est, & intestinis commissum. H
Helopi palmam saporis inter pisces multi dedere: estque stomacho gratus,
abundē nutrit, & aluum facile mouet, ut Xenocrates docuit. Appion gram-
maticus eundem esse ellopa & accipenserem tradidit. Sed falluntur, ait Pli-
nius, qui eundem accipenserem existimauerunt: quanquam & peregrinus,
& apud antiquos piscium nobilissimus habitus accipenser est: tanta nan-
que erat apud Romanos ueteres accipenseris gratia, ut à coronatis ministris
cum tibicine & cantu in conuiuium introduceretur. Vnus omnium ac-
cipenser squamis ad os uersis contra aquam nando meat. Nullo nunc in ho-
nore est: quod quidem miror, inquit Plinius, cum sit rarus inuentu. Piscis
est non equidem magnus, figura ad triquetrum accedēs, rostro potrectio-
re. Hu-

Arc. Huius piscium generis, uel minimus non minoris uenire solitus est, mil-
le nummis Atticis. χιλις δρα-
χμῶν.

1. ἱσθίον ἰσθίον, id est sacrum piscem alij quoque pompilum uocant, alij delphina, a-
li piscem, quem λεῖον, id est candidum appellant: alij auratam: alij denique ἱσθίον ἰσθίον
significare dicunt, αἰσθίον ἰσθίον, id est sacrum piscem, ut ἱσθίον βοῶν. 2. Fulux (αὐλοπύριον).
Cynedi soli piscium lutei, inquit Plinius, qui an sint ex hoc genere nondum constat:
sicuti neque an cum cynedidis iidem sint alphestæ. Sunt autem alphestæ, pisces toto qui-
dem corpore ceri coloris, quibusdam tamen partibus admixto purpureo. Capiuntur
autem fere, ut aiunt, bini, alter ad alterius caudam insequens. Alphesticus Aristoteli
αἰσθίον, id est fului aur rutili coloris est. Est & αὐλοπύριον, ceris, tenella carne piscis, stomacho
gratus, uentrem mouet, succus ex eo & crassior est, & abstergeri uim haber. Κνυλοπύριον,
aulopion qui circa insulas Tyrrhenicas versantur ceraceum quendam piscem appellant
magnitudinem maximum, qui etiam cum thynnus pugnat, & contra piscatores nonnun-
quam decertat, & sæpissime uictoriam reportat: cum est captus, eximia forma spectat-
B. tur, oculis est patulis, rotundis, magnis, dorso cæruleo & uentre candido. à capite ad
caudam pertinens aurea quxdam linea in orbem desinit. Ex his nonnulli cicures
sunt, quos sancti piscatores ut beneficos ab aliis internoseunt, eosque tanquam du-
ces sectantur, nec comprehendunt unquã: alij feri sunt aulopij, quos & capiunt pesca-
tores & occidunt. Hæc Ælianus. 3. Hæc ex Oppiano. Eadem supra de anthia ex
Aristotele dicta sunt. 4. Halefursion, inquit Hermolaus, sunt qui pro callionymo
piscem capiunt. 5. Hemeroces, &c. Hic cum callionymo aut idem est, aut certe nõ
dissimilis: neque Aristoteles Pliniusque aut Athenæus hoc nomen habet, neque contra,
Oppianus callionymum nomen, quod meminerim. 6. Nycteris: Lippius noctuam
uerit. 7. Ellopa, &c. Theodorus accipenserem uocat. Elaps alius piscis ab ellope,
apud Iul. Pollucem. Ouid. in Halieutic.

Halefursion.

Noctua.

Accipenser.

Elaps.

Túque peregrinis accipenser nobilis undis.

Ob raritatē laudatur à Martiale,

Ad palatinas accipensera mittere mensas.

Ambrosias ornant munera rara dapes.

8. De accipenseris pretio & nobilitate apud antiquos, plura leges apud Mactob. lib. 3.
Satur. 9. An de accipensere hæc, an de galco Rhodiaco potius dicantur apud Athe-
næum, considera.

Accipenser.

De lupo & asellis.

Cap. CLXXII.

P Ræcipuam olim auctoritatem fuisse lupo & asellis, Corn. Nepos & La-
berius poeta mimorum tradidere. Lupus (λύκος Græci uocant) lapi-
dem in capite gerit: ideoque algore maxime infestatur: linguam habet os-
seam atque adhaerentem, cor trigonum: ut inter pisces liquidius audit. so-
D. litarius est & carniuor, uti prodidit Aristoteles. Lupus quanuis pelagius
sit: (ita enim uocantur & qui in mare profundum secedunt:) in paludi-
bus tamen maritimis (quas λυσιόθυλοι uocant) & fluuiorum ostiis fre-
quens est: præsertim ubi copia dulcis aque influit. Et iis maxime locis for-
tificat, ubi flumina exeunt in mare: sæpius uero in fluuios ascēdit. Hunc pi-
scem, inquit Galenus, in aqua dulci natum non uidi: in paludes tamen &
fluuios è mari ascendisse conspeximus: eoque fit ut raro paruus, quemad-
modum mugil sæpius inueniatur. Bis anno parit lupo, prior partus æstate
perficitur: uerum posterior, qui scilicet hyeme accidit: infirmior est. Cum
alios pisces complures intra piscinatum septa, tum etiã sine macula (nam
sunt & uarij) lupos includimus. Fuscina interdum lupo sæpenumero capi-
tur dormiens, alioqui minime fuscina posse capi existimatur. Lupum piscē

Lupus, λύ-
κος.

reti circumdatum atenas arare cauda, atque ita conditum trāſiſſe rete, pro- E
didit Ouidius. Quapropter ſolertia in tuendo ſeſe lupum aliis præſtare pi- a
ſcibus nonnulli prodidère: uerum, ut Plinio placet, minus in prouidendo lu-
pulis ſolertia habet: ſed magnum robur in pernitando: nam ut hæſerit ha-
mo, tumultuoſo diſcurſu laxat uulnera, donec excidant inſidia. Lupus &
mugilis quanquam inimici ſint capitales, tamen ſtato tempore congregan-
tur. Cum fert utero lupus deterior eſt. Luporum laudatiſſimi, qui appellan-

Lupus lanatus

tur lanati à candore mollitiæque carnis. optimio ſapore iudicantur in Tybe
ri amne inter duos pontes. Hæc Plinius. Lupus marinus, inquit Xenocra-
tes, quo maior eſt, eo durior euadit. Optimus autem eſt qui magnitudine
mediocri eſt: tenellus enim & ſtomacho gratus, bonique ſucci eſt: ſuauiſ
quoque & copioſum præbens alimentum: facileque & per corpus digeri- F
tur, & per aluum deſertur: contra qui in piſcina ſeruantur incluſi, ſapore
ſunt minus grato. Cum in utroque humore uiſtiter lupus piſcis, marino
ſcilicet & dulci, qui in puro mari degit, inquit Galenus, longe præſtanti-
or eſt eo, qui in mixtis uitiatisue aquis uiuit: atque quod ad ſucci probitatem
attinet, ne auiſus quidem montanis multum cedit. Optimis quoque ma-

Lupus marinus,

maculoſus.

*Λαῖνος ἰσχυ-
ρῆς υἱος.*

*Lupus Foroiu-
lienſis.*

Perſeum.

rinis piſcibus æquari tradit Xenocrates fluuiatiles lupos, maculoſos ua-
rioſue, (ita uocò *ῥαῖς μαδον*) ex Tiburtino Aniene. Lupū appellat Foroiu- 3
lienſes piſcem ex quo garum faciunt. In mari rubro piſcis naſcitur quem
perſeum Arabes ſimul & Græci nominant, aſpectu lupo ſimilis, pari ma-
gnitudine cum anthia maximo. naſo eſt leuiter adūco, cingulis aureis diſ-
tinguitur, quæ à capite exorientia oblique feruntur, & ad uentrem uſque G

Aſellus.

Bacchus.

Callarias.

ῥῖος, ῥῖονος.

perſeum Arabes ſimul & Græci nominant, aſpectu lupo ſimilis, pari ma-
gnitudine cum anthia maximo. naſo eſt leuiter adūco, cingulis aureis diſ-
tinguitur, quæ à capite exorientia oblique feruntur, & ad uentrem uſque
pertinent. frequentibus & prægrandibus dentibus munitus eſt. Ex omni-
bus piſcibus qui in eo mari uerſantur, robore & audacia maxime excellere
dicitur. Aſellorum, inquit Plinius, duo genera: collyri minores, & bacchi,
qui non niſi in alto capiuntur: ideoque prælati prioribus. Et callarias aſel-
lorū generis, ni minor eſſet. Quos Plinius aſellos, Græci *ῥῖος* uocant, & *ῥῖ-
ονος*, id eſt aſinos & aſellos: quos Philotimus *ῥῖος*, alij *ῥῖονος* dixere, inquit
Galenus. Eſt uero *ῥῖος* & *ῥῖονος*, ut Ariſtoteles prodidit, (inquit Athenæus) 4
piſcis minime gregatilis, cuius os magno hiatu reſciſſum eſt, non aliter at-
que galei: & qui ſolus inter piſces cor in media aluo gerit: & in cerebro la-
pillos habet molari forma. *ῥῖος*, inquit Ariſtoteles, caniculæ temporibus ca-

Molari forma

*ἰσχυρῆς ὑ-
λῆος, id eſt ro-
tundos.*

lidiffimis latet: indicio autem eſſe uidetur, quòd longo interpoſito tempo- H
re capiatur. Cum piſces uenatur *ῥῖος*, obruit arena ſeſe: cūque nullam ſui
corporis partem intactam reliquerit, uerberat radiolis, quos in ore geſtat, 5
quos piſcatores uirgulas uocant, quas piſculi cum aſpexerint, adna-
tant, quaſi ad algas quibus ueſci ſoliti ſunt. Differunt autem (ut Dorio tra-
diſ) *ῥῖος* & *ῥῖονος*: *ῥῖος* quidam *ῥαῖς* appellarunt: *ῥῖονος* autem *ῥαῖς ῥαῖς* & *ῥαῖ-
6*
ῥαῖς: nonnulli uero *ῥαῖς*: alij *ῥαῖς*, ut reſert Euthydemus. Archeſtratus
ῥῖος à quibuſdam *ῥαῖς ῥαῖς* uocari dicit. Oniſcus, ut Oppianus ſcribit, in locis
paſcitur cenofiſ & herbidiſ: at onos non niſi in alto mari minoribus piſci-
bus inſidiatur: qui & caniculæ temporibus latet. Cūque hamo tenetur, non 7
facile ſequitur trahentem: ſed plurimum reluſtando; piſcatori nō paruū
faceſcit

ῥῖος, ῥαῖς.

ῥῖονος.

ῥαῖς ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

ῥαῖς.

A faciescit negotium. Afellorum caro, inquit Galenus, mollis quidem est, sed non eque ac saxatiliū friabilis. Xenocrates mediam habere substantiam mauult eam inter molle & durum, & succum probum eundemque copiosum gignere. Afelli ipsi non parum inter se discrepant: nam qui in syncero mari uiscitant, proboque utuntur alimento, carnis bonitate cum saxatilibus contendunt: qui uero prauo aluntur nutrimento, aut in aquis quoquo modo mixtis degunt, (præsertim uero si uiciose fuerint aquæ) mollē quidem habent carnem: uerum ob pinguedinem lentoremque, neque suaves adeo iam sunt, & alimentum gignunt extremētōsum. Ex asello pisce lapilli, qui plena luna inueniuntur in capite, adalligantur lineteolo contra febriū circuitus. Bacchus, ut Xenocrates tradit, mediocris est substantiæ: ut uero B Diphilo placet, bonum procreat succum: sed qui non facile edoquatur, & uirosum quid in se habeat. Afelli nomen à colore diductum est, ut Varroni placet, sicuti & umbræ turdique.

1 Quos sine macula lupos uocat Columella, iidem fortasse sunt quos Plinius lanatos dicit: quos uero Columella uarios, eos Oribasius *λεπτομήλεις*, id est maculosos, 2 Er piseæ mormyres (mormylos uocant alij) eodem modo retia declinant, in arenâ sese condentes. In arenosis litoribus uiscitant. Mormyros (à Theodoro mormur dicitur) æstate parit. Copiose nutrit mormylus, inquit Iecius, (Epicharmus mormam uocauit) Arcestratus pisces inutiles, neque tempore ullo bonum esse dixit. Considera lector, an eiusdem an diuersorū piscium sint hæc nomina omnia. 3 Ex Strabone. Est Anio fluuius in Tiburtino agro, qui in Tyberim influit tertio ab urbe miliario: ut refert Blondus in Vmbria. In hoc fluuiio tradit Iouius magnam esse eorum piscium copiam, quos troctas uocamus. Hermolaus hoc in loco apud Plinium pro eolliyi callariæ legit, ex Athenæo, ut scribit: uerum Plinius ipse lib. 32 separauit callariam ab asellorū genere: quandoquidem asellis minor est callarias. Apud Athenæum Dorio refert quoddam *κακὸν ἰσίδιον* uocare *ἰσίδιον*. Euthydemus *κακὸν ἰσίδιον*, Arcestratus *κακὰ ἰσίδια*. 4 Aristoteles (quod meminerim) *ἰσίδιον* ne nominari quiddē, sed *ἰσὶν*. 5 Verberat. Vetus interpres, Habet in orificijs quandā partem sicut uirgā, &c. Vide supra in squatina, & item in rhombo. 6 Unus idemque piscis bacchus uocatur, onifeus & schellaris, uti alio loco ex Dorione refert Athenæus. 7 *ἰσὶν τὰ θρόν*, id est segnē ignauū me uocat Oppianus: & inter magnos pisces illum enumerat lib. 3 de pise.

De umbra & glauco.

Cap. CLXXIII.

1 Vmbra, quam *σκιά* uocant & *σκιάδιον*, lapillos etiam in capite habet: D ideoque algore infestatur. Sciæna cum metuit, caput oculosque abscondit, aut in cauerna quapiam, aut herbis marinis, reliquo corpore neglecto, ita se totam abscondi putans. Sciænae caro minime quidem dura est, sed mediocris: quæ tamen saxatilibus duriuscula sit. Sciæneus, inquit Xenocrates, bonum gignit succum: facile in corpus digeritur: saporis est iucundi: nutrimentum præbet non admodum copiosum. Sciænae interanea, & squamæ combustæ, pauos discutiunt. Siena alia esse uidetur à sciæna: nam sciæna, uti Oppianus scribit, in saxis herbosis degit: siena uero in saxis nudis. Vmbra quoque fluuiatilis habet Aufonius,

Effugiens oculos celesti leuis umbra natatu.

Glauco quoque à colore, uti arbitramur, cæruleo dictus, pelagius piscis est:

latetque æstate mediis feruoribus dies sexaginta. Appedices habet paucas

Glauco, *τλαύκερ*.

superne exeuntes circa uentriculum. Fectum, cum metuit, ore recipit, rur-
susq; emittit. Capitis in cibo præcipua laus: uel ut Arcestrato uidetur, ro-
stri maxime, (*sternulus*) uocant, sicuti in cõgro capitis totius. In maiorum pi-
scium numero cõsentur, qui à nonnullis *turni* uocantur, id est qui in partes
secantur ad patinam. Claro illi dura est. in omnibus lupo inferior est: & ut
Xenocrates prodidit, non minus à lupo uincitur, quàm ipse sparum supe-
rat. Verrucas tollit glauci iecur. Glaucus è iure sumptus (uel uti aliis placet, 3
glauciscus) mulieribus lactis copiam facit. Glauciscus, inquit Diphilus, in 4
cibo similis est cephalo & mugili.

Glauciscus.

*Umbra ma-
rina.*

1 De umbra marina extat Ennij uersus apud Apulcium. Melanurum:
Turdum merulamq; umbramq; marinam. 2 Later æstate. Quidius in Halieut,
Ac nunquam æstiuo conspectus sydere glaucus. 3 Glauci iecur. Hermolaus P
hoc in loco Plinij glau iecur legit, non glauci. 4 Glauciscus piscis an idem sit cum
glaucio, an alius, considera lector.

De sparò & aurata.

Cap. CLXXIII.

Sparus.

Sparulus.

SPARUS (de quo Ouidius in Halieuticis,
Et super aurata sparulus ceruice refulgens)
Xenocrate, uti modo diximus authore, lupo & glauco in cibo deterior est.
Icesius uero ita prodidit, Sparus, cum aliis plerisque piscibus copiosius alit:
tum uero quàm mæna meliorẽ succum progenerat. Diphilus sparũ æcrem
esse prædicat, carne tenera, minime uirofa, stomacho grata, concoctu haud
difficili, & quæ urinam citè: fixa tamen difficilium concoquitur. Auratæ, 1
quam chryfophryn Græci à fulgente splendore uocant, in gustus suauitate G
primas partes tribuit Icesius. uerum uti Martialis cecinit,

*Aurata,
χρύσος φρυ.*

Non omnis laudem pretiũque aurata meretur:

Sed cui solus erit concha Lucrina cibus.

*Onos, Plinius,
q̃ellus.*

Ioniscus.

Litoralis piscis aurata est, partim saxosis partim arenosis locis degens: pela-
gius quoque. uonnunquã appendices habent auratæ superne exeuntes cir-
ca uentriculum, aliæ plures, aliæ pauciores. Parit aurata æstate. parit uero,
ut lupo, in iis maxime locis qua flumina exeunt in mare: quin etiã in ma-
ritimis paludibus auratas quoque gigni apertum est. medijs feruoribus la-
tet, ut onos, plurimum temporis. Hyeme aduersa ualitudine laborat. Fusci
na sæpenumero capitur interdiu dotmics, ut lupo: alioqui minime fusci-
na posse capi existimatur. Auratam Ephesij ioniscum uocarunt, ut Arche- H
stratus author est. Aurata carnem habet cãdidam, solidam, & quæ bonum
procreat succum, abundẽque nutrit, facile digeritur atque excernitur.

*Orata.
Chryfos.*

1 Auratæ. Orata, ut Festus inquit, à colore auri: quod rustici orum dicebant. Au-
rei coloris chryson habet Plinius. ex Ouidio: qui in Halieutic. inquit:

- Et auri chryfophrys imirata decus. Oppianus in Halieutic. lib. 1.

ἄλλα χρύσος ἰμαίμενος, id est ut uertit Lippius, Aurata à splendore nomine dicta.

De turdo, merula & aliis quibusdam saxatilibus. Cap. CLXXV.

INTER saxatiles scarus, ut dictum est, principatum obtinere creditur: secũ-
dum uero locum Galenus merulæ ac turdo tribuit: tertium deinde iuli-
di,

Adi, phycidi & perca. De scaro satis diximus. Merula, quæ κέρυφος græce di- *Merula.*
 citur, inter saxatiles laudata, colore est subobscurus uiridante. Merula mas *κέρυφος.*
 est, uti Oppianus tradit: turdus uero (νύχταλιν uocant) fœmina, inter saxatiles *Turdus,*
 quoque nobilis, inquit Plinius, & μελαρόσκαπτος, id est nigris quibusdam macu- *κίχης.*
 lis insignis. Merula & turdus mutant colorem: uere enim nigrescunt: post
 uer albedinem suâ recipiunt: & hyeme latent. Branchias habet turdus utrin-
 que quaternas, easque duplices, excepta nouissima. Mollis utrique caro est,
 & quæ probum creat succum: qui tamen per halitum facile digeritur, ne-
 que copiose admodum nutrit. Turdum nonnulli τρωγλον, alij αὐλίαν uocant. *Τρωγλον.*
Turdorum cōplura sunt genera. Iulis (ut Galeno placet) saxatilis piscis est: *Αιολία.*
 cuius caro & concoctu facilis, & corpori humano saluberrima est. Et Op- *Ιουλία, Ιωλίσ.*
 piano quoque iulis piscis saxatilis est in muscosis algosisq; saxis uiuēs: par-
 uus admodum pisciculus: uerum hominibus in mari natantibus & urinā-
 tibus uenenato morfu infestissimus. Agmine dēso adhærēt iulides immotē
 corporibus natantum, non aliter atque muscæ solent in autumno. Os huic
 (inquit Ælianus) sceleratissimi ueneni refertum est, quēcunq; piscem de-
 gustarit, inhabilem ad esum, perniciosūmq; ei qui postea gustauerit efficit.
 Hominem quoque non minus morfu perlequitur mus, (μύς à Græcis uoca- *Μύς, μύς.*
 tur) piscis alioqui paruus: sed duro tergo & dentibus robustis. Est & μύς
 qui capricus dicitur. caro eius uirus olet & dura est, difficiliorq; concoqui- *Capricus.*
 tur. cutis ori grata est. Phycis, qui & phycus dicitur, saxatilis piscis & tenel- *Phycis.*
 lus est: perca similis est spinis uallatus. mutatque colorem: cum enim cæte *Phycus.*
 ris temporibus candida sit, uerno uaria redditur. eadem pisciū sola ex ma- *Φύκης.*
 rinis piscibus nidificat ex alga atque in nido parit. Et cum cæteri pisces, qui *Ρυκα.*
 oua pariunt, semel pariant, pusillæ phycides bis anno pariūt. Differt in hoc
 genere mas à fœmina, quod mas nigrior & squamis amplioribus est. Phy-
 cides, quamquam cætera abstinent carne, tamen squillas sapenūmero appe-
 tunt. Mollem carnem habent phycides, probūmq; succum gignunt, qui
 facile diffatur: nec multum nutriunt. Facile corrumpuntur, inquit Diphil-
 us, minimēq; uirosæ sunt. Est & phycen huic similis, pisciculus saxatilis & *Phycen,*
 tenellus: facilēq; (ut perca) corrūpitur. Phycidi perca similis est, quæ & per- *Φυλιά.*
 cis dicitur, piscis & amni & mari cōmunis, id est marinus & fluuiatilis. sa- *Perca.*
 xatilis est circa muscosa algosāque uictitans, uirgulis lincisq; quibusdam *Percis.*
Duarius. Branchias habet utrinque quaternas, easque duplices nouissima ex- *Ρύκην.*
 cepta: plures quoque appendices superne circa uentriculum. Parit fluuiatili- *Ρεγμυοπι-*
 lis perca in fluuiorum & lacuum paludibus, id est quæ prope fluuios aut la- *νίλος.*
 cus stagnant, (πυλινιδες uocant) in arundinetis. In partu continentem emit- *Perca fluuiatilis.*
 tunt suum sæctum, eo quo ranæ modo: adeo enim sæctus ipse continuo filo
 sibi cohæret, ut eum piscatores ex arundinibus colligant. De fluuiatili per-
 ca hæc cecinit Ausonius,

Nec te delicias mensarum perca silebo,
 Amnigenos inter pisces dignande marinis,
 So us puniceis facilis contendere mullis.
 Nanque & gustus inerts, solidæque in corpore partes

Segmentis coeunt, sed dissoctantur ariftis.

E

Perca alimentum gignit saluberrimum, & quod concoctu facile est: uerū, ut inquit Diphilus, æque atque phycis facile corrumpitur. Pro locorum tamen ratione in quibus uiscitant, perca nonnulla uarietas contingit. Quæ in Rheno gignitur perca, marinis piscibus in succi probitate æqualis est, ut prodidit Xenocrates. Perca falsæ ē capite cinis, melle addito, uerendorum pustulas discutit. Channe aut chaune, phycidi & perca similis: pelagius piscis, ut Aristoteli placet, & carne sola uescitur. Circa saxa uiscitat, ut scribit Oppianus, alga muscōque plena. Colorem habet, uti ex Aristotelis sententia refert Athenæus, nigro rutilōque uarium, aut in nigro rufescentem, & maculis lineisue quibusdam distinctum. Huic uenter prope os positus est: adeo ut cum minores pisces insequitur, uentriculus illi in os nonnunquam procidat ob uoracitatem. Channe omnes grauidæ capiuntur. Et ex se

Concipiens channe gemino fraudata parente est, inquit Ouidius.

Carnem habet channe mollem quidem & tenellam, sed quàm perca tamē duriorem. Channe iecur siccatur pondere. x. l. i. i. cum oleo cedrino, perunctis pilis nouem mensibus, psilothrum fit palpebrarum.

*Alibi legitur, nō
channæ iecur,
sed tenia iecur*

1 Viridante, &c. Merulaque uirentes dixit Ouidius: Athenæus uero κίαντες μελάγχου. 2 Iulis, &c. An idem sit piscis Galeno & Oppiano qui ἰούλις uocatur, ambiguum uidetur. 3 Vide an fortasse hoc in loco apud Athenæum legi debeat (ut cōducit Hermolaus) ὅς προνίρ, id est ius 4 Spinis uallatus. ἡ ἑστία φέρει καὶ πικρὸν ὄνυχα.

Y.

De melanuro, coracino & aliis quibusdam. Cap. CLXXVI.

Melanurus.

Saxatilis piscis est melanurus: & propelitora in locis arenosis alga passcitur. Coracino similis est piscis uarius, notis pluribus nigris insignis, non aliter atque sargus. Percarum ducem Numenius melanurum dixit. Viribus haud magnis est, sed solers: non facile reti aut nassa capitur: nec ad passionem mari tràquillo, sed tempestatibus agitato proficiscitur: capitūque tunc temporis apud litora esca ex caseo & pane. In Stabiano Campaniæ ad Herculis petram, inquit Plinius, melanuri in mari panem abiectū rapiunt: iidemque ad nullum cibum in quo hamus sit, accedunt. Xenocrates melanurum stomacho gratum esse prædicat, probūque gignere succum: & qui facile digeritur, abundeque nutrit, atque haud difficulter excernitur. H Iecus melanurum sargo similem esse tradit: uerum succi bonitate atque suauitate inferiorem: probe tamen nutrire & succum procreare modice astringentem. Melanuro similis est melanderinus: & coracinus melanpro 2 similis est: pecten hunc uocant Nili accolæ. Et Alexandrini παλάρης: Parnic- 3 no autem Rhodius etiam platistaticon uocari dixit, ἀνάλαι quoque nonnulli coracinum uocant: alij tamen alium piscem significare æolian contendunt. Est uero coracinus piscis amni & mari communis. colore est nigricante, præsertim in pinnulis. lapidem gerit in capite. Grægalis piscis est: & parit autumno inter algas locis densis. Fert uterum longo temporis spatio: & cum utero fert, optimus est coracinus, perinde ut mæna. Parit etiam nōnunquam mæsse tritici. loca saxosa incolit & herbida, latet hyeme: neque capi

*Melanderinus.
Coracinus,
καρχήνις.
ῥάλας.
πλαίστις.
Platistacos.
Æcolias.*

A capi solet nisi certis quibusdam temporibus & eisdem semper. Prodest coracino ferme, præter ceteros pisces annus squalens, quia teporem potius affert. Cum alij pisces magna celeritate adoleſcant, hoc coracino præcipue accidit inter minores. carnem habet duram, & ad salituram idoneam, uti infra docebimus. Coracinus marinus parum corpori præbet alimenti, idq; bonum mediocriter, ut Icesius prodidit. Sed coracinus in Ægypto principatum obtinet, & præcipue qui in Nilo nascitur: ideoque Nilo peculiarem esse piscem uoluerunt nonnulli. hunc Xenocrates, uel nobilibus marinis piscibus æquari tradit. Dorion coracinum à nonnullis saperden appellari, optimumque in palude Mæotide gigni prodidit. Porro saperdes, ut Aristoteles author est, inter fluuiatiles lacustrésque pisces, cum uterum gerit, commendatur. Xenocrates *λέγεται* scribit piscem esse præduræ carnis, qui & in maiorem auctus magnitudinē durior euadit, sapore uiroso, difficulter in corpus digeritur. Est & *λέγεται* apud Athenzum, carne quàm sit hicrax durior. Coracinorum carnes aduersus scorpiones ualent impositæ. fel eorum uisum excitat. Coracinum fluuiatilem sale maceratum *κρίνεται* appellant Alexandrini: hoc inter fassamenta facile concoquitur digeriturque, abunde nutrit, minimèque mali est succi. Coracini fassamenta pauos discutiunt & carbunculos.

1 Theodorus oculatam uocat: uerum Plinius utrunque enumerat piscem eodem prope uersu, tanquam uarios, lib. 32 cap. 7. Oculatā Celsus inter mediz materiz pisces duriusculos numerat. Melanurus Athenzus *ὀφιοειδὲς καὶ τοῦ χρομίου καὶ* *μυλῶος χρομίου* dixit. 2 *ψύλλος*, quem Numenius *ψόρος* uocauit: an idem sit, nide apud Athenzum. 3 Coracinus, *κορχίνος* dicti sunt, quod assidue oculos moueant, inquit Athenzus: *πλευρῖται* uocari scribit Massacius, à lata figura: Theodorus quandoque coruulum, nonnunquam graculum uocat. Porro graculo similem draconem marinum dixit Plinius, *καὶ κορχίνος ἡ πύρρος αἰδομένη* *χρῶς*, id est, ut uertit Lippins, Et nigro cui nomina dicta colore. Coracinus. Athenus quoque ex Aristophane *μυλῶος πύρρος* & *κορχίνος* uocat. Epicharmus *καρχίνος* *καρχίνος* dixit.

De exocæto & cordulo. Cap. CLXXVII.

Miratur Arcadia suum exocætum, appellatum ab eo, quod in sicco somni causa exeat. Circa Clitorium uocalis hic traditur & sine branchiis: idem aliquibus adonis dictus. Piscis est colore subfuluo subrufoue: cui à branchiis utrinque ad caudam usque protenditur linea siue uirgula candida. Est autem figura minime lata, sed terete, magnitudine paruis mugilibus, qui apud litora inueniuntur æquali: hoc est longitudine octo digitorum aut semipedali. Et, ut paucis rem absoluiam, pisciculus qui tragus uocatur, similimus est exocæto, præterquam quod tragus infra gulam nigrum quoddam gerit, quod tragi, id est hirci barbam uocant. Est autem exocæto piscis saxatilis, ut qui petrosis locis uiuit. Hic mari tranquillo unà cum maris effluxu egressus dormit in sicco inter lapillos ad solem cōuersus: qui ubi satis quieuerit, sese denuo aqua uersus reuoluit, donec ab undis marinis recipiatur. Obseruat quoque tunc temporis aues marinas, quæ in litore paſcuntur, sæpe nanque illum aggrediuntur. Has cum uidcrit, quantum po-

Tragus.
Squalidus.
ἀγροδύτης.

Cordulus.
κέρδυλος.
κέρδύλη.

Teragur.
κέρυλος.

test, fugit quocunque modo saliendo reptandóque, donec in aquam perre- E
pret. Tragus uero cui similem diximus exocetum, infráque gulam nigrú a
quoddá habere quod tragi, id est hirci barba uocatur, pisciculus squalidus
est, minimúmque aut succi continens aut pinguedinis: uiúitat apud lito-
ra herbosa. Excunt in terram & alia aquatilia, ut qui marini mures uocan-
tur, & polypi, & murenæ: sed inter ea quæ bráchias habent, qui terram pe- 3
tit, ut inde cibum accipiat, unum adhuc tantummodo nouimus (inquit A-
ristoteles) cordulum nomine. Pinnis hic caret, sed bráchias habet & pedes,
& caudam præterea laxam & latam. Natátque pedibus & cauda, quam si- 4
mitem siluro habet, quoad paruum magno licet conferre. quadrupes idem
est, ut ad ambulandum idoneus: egressusque cibum petit in terrá.

1 Subfuluo. Oppianus, *ῥαγροδύτης*: Athenæus, *ῥαγροδύτης*, id est subrufo. 2 Tragus, F
&c. Teragus paruus piscis est ex Ouidio, an idē an alius à trago, nondum constar. 3
Inter pisces non inter quadrupedes cordulum numeramus: tum Aristotelem secuti au-
thorem, tum etiam quia branchias habet, quod piscium proprium est: *κέρυλος* etiá uo-
cat eum Numenius. 4 Laxam, *μακρόν*: uetus interpretēs, non spissam.

De marino dracone & scorpione.

Cap. CLXXVIII.

Dracomar-
inus.
δρακῶν,
Draco.
δρακῶντες α-
μύην ἡθου-
αίην, inquit
Oppianus.

Dracunculus.
Graculus.

Hæc fere de
serpente mari-
nâ ab Aristot-
ele narratur.

Scorpio.
Scorpius.
Scorpio mari-
nus.

Litoral is piscis est draco marinus, partim in arena, partim inter saxa de- 1
gens: cætero quidē corpore (ut Ælianus prodidit) aliis piscibus similis:
caput uero atque oculorum magnitudo terreni draconis speciem similitu-
dinémque gerunt: magni enim sunt & uenusti: maxillæ etiá similitudinem
quandam habent cum terrestribus. Et pellis quoq; non procul abesse à ter-
reni draconis pelle palpanti uidebitur. Simul & infestis & uenenatis arma-
tus est aculeis: habet nanque in brachiis aculeos spinasue uenenatas ad cau- G
dam spectantibus. Quidam aliud uolunt esse dracunculum: est autem, ut Pli- 2
nius tradit, graculo similis. Draco marinus captus atque immisus in are-
nam, cavernam sibi rostro mira celeritate excauat. Draconem marinū car-
nem habere duram uescientibus omnibus apertum est. Draco marinus ad
spinæ suæ qua ferit, uenenum ipse dissectus & impositus, uel cerebro toto,
prodest. Dentiū dolores sedantur ossibus draconis marini scarificatis gin-
giuiis. Quemadmodum draco marinus, sic & scorpio lædit, dum manu at-
tollitur: aculeo nâque uenenofo armatur: piscis partim pelagijs, partim li-
toralis. Est enim duplex scorpionum marinorum genus, ut Icesius author H
est. Sapore præstant atque alimenti bonitate qui pelagij sunt: hi rufo
sunt colore. Alterum genus subatrum est, palustre potius atque cœnosum.
Vario colore scorpius esse tradit Epicharmus. Plures habet scorpio appē-
dices superne circa uētriculum. bis anno parit. Caro scorpionum dura est,
& cum sinapi manditur. Vt uero Icesius scribit, cartilagineam duritiē ha-
bet scorpius: alimentumque præstat copiosum: facileq; excernitur, ut qui
absterforiam uim habeat, qui pelagij & rufo colore sunt, uberius alunt. Ico-
cinoris doloribus scorpio marinus in uino necatur, ut deinde bibatur. Scor-
pius marinus necatus in uino, uesicæ uitia & calculos sanat: lapis qui inue-
nitur in scorpionis marini cauda, pondere oboli potus. Pavos discutit sco-
pio in uino decoctus, ita ut foueantur ex illo. Scorpij marini fel alopecias
replet:

A replet: oculorum suffusioni, albugini, hebetudini obscuritatie medetur. Vel ut alij tradunt, fel marini scorpionis rufi cum oleo uetere aut melle Attico incipientes suffusiones discutit: inungi ter oportet intermissis diebus. 3 eadem ratio albugines oculorum tollit. Scorpæna, inquit Xenocrates, durâ Scorpæna, habet carnem, saporis minime ingrati. In mari rubro sagittarius gignitur, Sagittarius, erinacei speciem habens, firmis & bene longis armatus aculeis.

1 Ab Ephippo *σπικκωρίς*, id est dracæna vocatur. 2 Spinæ, *ἀχέρδης*: uenenum Dracæna, habent, sed minime mortiferum. 3 Plinius scorpænam & scorpium tanquam diuersos enumerat: Athenæus quoque differre tradit scorpium & scorpænam & colore & succo. Scorpidas quoque narrat Aristoteles in alto sanctificare: necdum constat an sint Scorpides, è scorpium genere.

B De mugilum generibus.

Cap. CLXXIX.

1 Non in saxosis locis, sed in maritimis paludibus sere uicitat mugilū Mugil. genus, & apud fluuiorum ostia, ubi copia influit dulcis aqua: atque Mugilis. in iis maxime locis parit. Mugil, ut inter pisces, facillime audit. Ventriculū κατ' αὐτῆς. habet auium modo carnosum: & altera uentriculi parte plures exeunt appendices, altera uero una tantum. Mugilum genera plura sunt: sed quatuor 2 præcipua numerantur, cephalus, chelon, sargus & myxos: ita Aristoteles. Cephalus, Icesius autem, Leuciscorum, inquit, id est mugilum plura dicuntur genera, κεφάλος. cephalus, cestreus, chelon & myxinus: quorum cephalī & suauitate & suc- χελών. ci probitate cæteris præstant. Secundum locum obtinent, qui κατὰ λέιν dicun- λευκίσκος. tur: iis inferiores sunt myxini: sed omnium deterrimi chelones, qui & bac- κατὰ λέιν. chi banchiue appellantur. Hæc Icesius. Euthydemus duo prodidit mugilū Μύξινος. genera, spheneæ (quod ieiunum est & figuram refert quadrangulam) & δι- Βάκχας. dactylea, qui latitudinem habet minorem quàm duorum digitorum. Βαίτης. Dorian mugilis marini species duas posuit, cephalum & ῥῆιν, id est ieiunum. Διδάκτωρ λέιν. Sunt qui omne mugilum genus sponte oriri opinantur, sed non recte: nam Νῆστι. & oua eorum fœminæ, & semen genitale mares habere cernunt: uerum Ieiunus mugil. genus quoddam eorum est, quod nō coitu, sed limo arenæue enascatur, ut quod apud Gnidum olim factum memoratur. Stagnis eorum sub canis or tu rescicatis, & limo iam arido, ubi primum imbribus stagnare loca inci perent, pisciculi nascebantur generis mugilum, quod per coitum procrea D tur magnitudine menulæ paruulæ: nec in iis aliquid uel oui uel seminis cō- 4 tinebatur. Et genus quoddam mugilum reperitur in fluuiis lulentis, in Mugil fluit. quo nec mas est nec fœmina. Nasuntur & in Sipharū lacu mugiles, qui bi titis. nas tantum pinnulas habent. Qui chelones dicuntur & sargi, myxi atque Chelones. cephalī, grauescere mense Decembri incipiunt: geruntque diebus tricenis. Sargi. Parit cestreus iis locis maxime, quā fluuius exit in mare, ut dictū est. Et in- Myxi. ter primos pisces partum accelerat: parit nanque hyeme. In piscium gene- Cephalī. re alter alterum sui generis edit, excepto mugile. Cephalus & κατὰ λέιν soli car- Cestreus. ne omnino abstinent: cuius rei argumentum est, quod neque in uentre tale quid unquam habentes reperiuntur: neque esca in eos ex carne utimur, sed panis ossa. Neque oua fœtusue cestrei ab ulla belua uiolantur: ideoque co-

DE DIFFERENTIIS

*δολιχονιδεστ
minime gulo-
sum esse: κά-
τρηα, dicit Op-
pianus.
Alias, eidem
tam incanta-
facilitas.*

piosi existunt: sed cū adoleuerit, tunc à cæteris piscibus corripuntur. Ve-
l icitur mugilis unusquisque phuco algæ, atq; arena. Gulosus omniū ma-
xime mugilis est atque infatiabilis, inquit Aristoteles: quocirca uentre di-
steto grauescit: & cum sit ieiunus, uilis est. Cum hic metuerit, caput absco-
dit, corpus totum occultari credens. Eidē tamen tanta facilitas, ut in Phœ-
nice & Narbonensi prouincia, coitus tempore ē uiuariis marem linea lōga
per os ad branchias religata emissum in mare, eadēque linea retractum,
fœminæ sequantur ad litus: rursusque fœminam mares partus tēpore. Scit
mugil esse in esca hamū, insidiāsque non ignorat: auiditas tamen tanta est,
ut cauda uerberando excutiat; cibos, capitur autem esca, ex pane, lacte &
menta. retia saltu nonnunquam superat. Viget mugilis autumnō: deterior
est cū fert utero. Cū plurimis piscium generibus imbres conducāt, mu-
gili tamen nocent: fit enim ut pluuiis multi ex his de facili excæcentur, si
imodum aqua excesserit. Et cum pisces omnes, dum uterū gerunt, graui sti-
mulo agitentur, ita ut in terram exiliant, omnium maxime mugilē ita so-
licitari certum est. Mugil & lupo quanquam inimici sunt capitales, ta-
men statō tempore congregantur. Sæpe mugiles cauda abscissa uiuunt: ab-
roditur uero à lupo eius cauda. Subit cestreus in amnes & lacus, ibiq; pro-
spete degit. Cestres (ut Artemidorus tradidit) ascēdunt in Nilum uerē, cum
prægnantes sunt: descendunt autem paulo ante pleiadum occasum unā o-
mnes parituri: & tunc quoque in septa incidentes capiuntur. Sunt mugiles
(ut Icesius author est) boni admodum succi: facile excernuntur, nec multū
alunt. Porro ex alto mari mugil optimus habetur, sapore iucundo, subacri,
lupo nihilo inferior. subiens hic purū lympidūmq; flumen carnis duritiem
temperat, euaditq; delicatior: qui uero in limosis lacubus stagnantibusue
locis capitur, uirosior est. Attritis imponitur cinis ē capite mugilū: cōbu-
ritur autē in fictili uase: illini cū melle debet. Inter fassamēta mediæ materiæ
Cestreus est. Bāchi, quē quidam myxinon uocāt, fel aurius utilissimū est.
Inueniūtur in bāchi piscis capite ceu lapilli: hi poti ex aqua, calculosis præ-
clare medētur. Mugilū genus præstantissimū cephalus est, nomen à capitis
grauitate sortitus. Est uero cephalus alter, qui chelon dicitur: alter phereus.
Cephalus, quē chelona uocāt, litoribus gaudet: sed prope paludes maxime
uiētat, aut ad fluuiorum ostia ubi copia influit dulcis aqua: alter eiusdem
generis trāllitoranus, qui non nisi mucore uescitur suo: quāobrem semper
ipse ieiunus est. Pascuntur limo cephalī: quo fit, ut graues & sordidi sint. Pi-
scem ipsi nullū omnino edunt, sed & carne penitus abstinent: cuius rei argu-
mentum est, quōd nihil tale in uentre unquā habentes, reperiūtur. Et quo-
niam uersari in limo solent, efferunt se, urinanturque sæpe, ut corporis sor-
des mucūm ue abluant. Oua sortisq; eorum à nulla belua uiolantur: qua
propter copiosi existunt: sed cum adoleuerint, tunc à cæteris piscibus corri-
pituntur, maximēque ab archana. Parit cephalus ad æquinoctiū autumnā-
le, & eius fœtus nouissime fere omnium apparet. De cephalo Galenus hæc
prodidit. Cephalus ex eorum piscium genere est, qui squamis integuntur.
Nascitur autem non in mari solum, sed in paludibus ac fluuiis: quo fit, ut ce-
phali

*Banchus.
Myxinos,*

*Cephalus.
Chelon.
Labeo.
Cephalus trās-
litorianus.*

Archanus.

Cephalus.

A phali non paruum inter se discrimen habeant: ut uideri possit cephalus pelagius alterius esse generis, carnēque ipsa plurimū differre ab eo, qui in palude uiuit, aut fluuio, aut limoso aliquo stagno, aut cloaca, qua expurgatur urbium stercorearia. est enim eorum caro qui in cœnosis & sordidis aquis uiētiant, excrementi mucique plena: sicut optima eorum qui in puro mari uiuunt, præsertim si uentorum flatibus agitur. Inter pisces cephalus maxime utraque aqua utitur, marina scilicet & dulci: & hanc habet naturam, ut aduerso flumine natans, quàm longissime à mari discedat. Et hic quidē cephalus numerosas illas ac paruas spinas non habet, sicuti neque marinorum quispiam alius: uerum qui ex fluuio aut palude in mare descendit, non secus ac congeneres huiuscemodi, spinarum plenus est. Hęc de cephalo Galenus. Pausanias quoque cephalos lutosos esse pisces testatur: cœnosisq; locis & fluuiis turbulenti gaudere. Cephalī præstantiam statim indicat gustus: qui enim præstantior est, & suauior sentitur & acrior, pinguedinisque expers: at contrā, qui piugues sunt atque insipidi, ij tum in gustu, tum uero ad concoctionem sunt deteriores, stomachoque aduersi, & malū procreāt succum. Hic ramen si sale condiatur, (nam & cephalī sale adseruātur) longe quàm ante præstantior euadit: nam quod in eo mucosum uirosūque est, id totum deponit. Recens autem salitus iamdiu in sale adseruato melior existit. Leuciscos uocant nonnulli pisces quosdam in fluuiis genitos, alterum cephalorum quem esse rati. Est autem leuciscus cætera quidem ut quequaue cephalo similis, nisi quod leuciscus candidior paulo est, capitēque minore & sapore acutiore. Quod ad alendi facultatem attinet, cephalo fluuiatili similis est. De cephalo autem fluuiatili ita cecinit Aufonius: capitonem uocat.

Insipidi, et
πάλω γὰρ
ἐκλυθη.

Leuciscus.
Ἀλευκισκός.

Cephalus fluuiatilis.
Capiro.

Squameus herbosas capiro interlucet arenas,
Viscere præteneris fartum congestus aristas:
Nec duraturus post bina trihorā mensis.

1 Mugil & καρχήδον tam genus quàm speciem significant: uocātur etiam mugiles à quibusdam πλάγας. Mugil apud Varonem etiam in piscinis dulcibus seruatur. 2

πλάγας.

Labrus.

Labeo.

Sargo.

Musco.

Oxyrinchus.

D 3 Bacchi legitur apud Athenæum: uide an potius banchi legendum sit. Sed banchum alteram speciem uocant quidam, quæ myxinos dicitur, uti infra explicabimus. 4 Mugil fluuiatilis etiam oxyrinchus uocatur, ut Dipylus prodidit. 5 Siphium lacu mugiles, &c. An sint hi mugiles potius ex anguillarum genere? 6 Ieiunus utilis, &c. Videtur Theodorus hoc in loco legisse, ὁπότε ἡ μὲν ἰσὺς: uerum nos Aladinam secuti litteram Græcam, quam & iisdem uerbis citat Athenæus, ita reddere maluimus. 7 Cephalus, &c. Theodorus capitonem uocat. Cephalum alium à cephalino, qui & ἐπὶ λινῇ uocatur, Theodorion auctor est. 8 Pherzus, &c. aliàs περαιοῖς, id est transitoranus, ut uerit Theodorus: hoc est, ut ego arbitror, qui lōgius à litoribus degit. 9 Euthydemus & Dorion hæc non de cephalorum sed mugilum generibus reserunt: sed uarie, uti suprà uidere licet. 10 Mucore uescitur, &c. Est apud Aristotelem Pholis, quæ λίσ, quæ mucorem quem ipsa emitit, sibi obducit: ita ut in eo quasi cubili quiescat. 11 Et apud Aristotelem acharnas, quem ætate labora refert, atque eo tempore extenuari. Athenæus acharnū habet: & alio loco acarnan, qui suauis piscis est, & in gustu subaltringens: qui & medio-

Capiro.

Cephalinus.

ἐπὶ λινῇ.

Cephalus.

περαιοῖς, uel

φολίος.

Pholis, quæ λίσ.

Acharnas.

ἄχαρνος.

ἄχαρνος.

Acharnus.

DE DIFFERENTIIS

Acarina.
Ακαρνε.

eriter nutrit, & alium ciet. Acharnas, ut nult Xenocrates, neque stomacho gratus est, E neque probum generat succum. Dura carne est, nec facile corrumpitur. Et Plinius acat nen habet, an iidem sint pisces an diuersi?

De dasquillo, salpa & quibusdam aliis. Cap. CLXXX.

Dasquillus.
δασκυλλος.
Salpa, σάλπη.
Salpe.

P Ascuntur cephalo cœno, ut dictum est: dasquilli cœno & stercore. Salpa quoque stercore uescitur: uerum hæc natura, ut alij alibi pisces principatum obtineant, ut coracinus in Ægypto, zeus Gadibus: circa Ebusum salpa, ob sensu alibi: & qui nusquam percoqui possit, nisi ferula uerberatus. Stercore, ut diximus, uescitur salpa, piscis alioqui saxosis locis uictitans, algosisque & muscosis: atque alga pascitur herbisque. reperitur & in paludibus maritimis: sed esca fetida præcipue capitur, ut stercore. Quin & cucurbita capitur, quod ei ex omnibus uni euenit. Est uero piscis colore uari-
r¹us, uirgis uel maculis quibusdā rubentibus distinctus. Serratos habet den-
tes: & solitarius uagatur. auditum habet peracutum. Semel parit, ætatis sci-
licet initio locis plurimis: nonnunquam uero autumno. Gustui fere ingra-
ta salpa est, ut Archestratus auctor est: in usu autem cibario messis tem-
pore maxime habetur aut autumno: ut uero Xenocrates docuit, salpæ
quæ in alto capiuntur, sapore sunt iucundo, subacti: abundeque nutri-
unt, nec facile corrumpuntur: quæ uero apud litora, carnem habent durio-
rem, saporisque ingrati, & quæ malum procreat succum. Salpe expurgat ul-
cera in lintcolis conceptis. Gignitur & in mari rubro piscis stomateus
nomine, salpæ similis: uirgulas habens per uniuersum corpus extensas auri
speciem referentes. Binis quoque uirgulis insignis est piscis, qui seferinus
uocatur. Faber, qui & prisca consuetudine zeus appellatur, in Gadum
municipio generosissimis piscibus adnumeratur. in Atlantico mari pasci-
tur, nec alibi.

Alia, salpes.
ισομαλπίς.
seferinus.
Faber, ζευς.

1 Circa Ebusum, &c. Archestratus circa Mytilenem, Diphilus circa Alexandriam
salpas prædicant optimas. 2 Virgis uel maculis, &c. Oppianus, αἰολόδοι: Athe-
næus, πλίγχοις καὶ ἰσοσπίγχοις.

Degobione. Cap. CLXXXI.

Gobio.
Gobius.
κόβιος.
Gonius.
Cobius.
Cobio.
κόβιος.
Gobio flauis-
tilis.

P Iscis paruus gobio est, & ex iis qui parui perpetuo manent. Gobius ap-
pendices habet plures superne circa uentriculum. Pariunt iuxta litora
gobiones, suæque oua lapidibus committunt latiuscula & arenida. Subeunt
in fluuios nonnunquam: ibique pinguescunt. E gobionibus sunt qui in flu-
uiorum ostiis aut paludibus maritimis uictitant: partim etiam in laxis, &
partim in arena degunt. Qui saxatilis est, hunc Numenius κόβιον uocauit.
nec marinus solum piscis est gobio, sed & fluuiatilis, quem hoc modo de-
pinxit Aufonius,

Gobio non maior geminis sine pollice palmis.

Præpinguis, teres, ouipara congestior aluo:

Propexique iubas imitatus gobio barbi.

καυλίον.

Præterea alius albus est, nigricat alius, & alius uiridior est, καυλίον uocatur.

Gobionem

A Gobionem album Eurypi non esse pelagium certum est, inquit Aristoteles. Denique

Lubricus & spina nocuus non gouiis ulla est. Et,

Gouiis aculeo pugnat, funditque venenum.

Gobius spinosus.

Venenum, sed minime moriferum inquit Aelianus.

Gobiorum caro, inquit Galenus, ut alectorum & saxatilium piscium carne durior, ita mollior est quam mullorum: crassitudine uero & tenuitate mediocrem generat succum. Præstantissimus autem est gobio, tum ad uoluptatem, tum uero ad concoctionem digestionemque, & ad probum gignendum succum, is qui in arenosis litoribus aut inter saxa uiuit: qui uero in fluuiorum ostiis aut paludibus maritimis degunt, diuersam plane carnem habent ab iis, qui in puro mari uictitant: neque enim æque iucundi sunt saporis, neque succum tam bonum præstant. Quod si limosa fuerit aqua, aut urbem fluuius expurget, deterimus euadet qui in illa aqua gignitur gobio. Copiosum, inquit Icesius, sed non bonum procreat succum gobiones sapore grati: facile excernuntur, nec multum nutriunt. Gustui gratiores sunt candidi nigris: uiridium autem gobionum caro substantia est rariore, magis pinguedinis expers, succumque præstat tenuiorem, neque adeo copiosum: ob magnitudinem tamen magis alit. Gobios, qui saxatiles sunt, teneriorem habere carnem Diocles prodidit. Diphilus, gobij inquit, percis simile præstant alimentum. qui uero ex iis parui sunt & candidi, teneram habent carnem: minimæque uirus olent: probum gignunt succum, & facile concoquuntur: uirides squalidiores minusque pingues sunt. Gobius recens, inquit Dioscorides, si in suillum uentrem coiectus insuatur, & in aquæ sextariis duodecim, donec duo super sint decoquatur: tum excolatus & sub dio refrigeratus potui detur, alium sine molestia soluit: canum reptiliumque plagis utiliter imponitur. Gobionem saxatilem, uti modo diximus, nonnulli καὶθῆρ uocant. καὶθῆρ, id est (ut eequidem arbitror) paruo gobioni specie similis est βλαῖος. βλαῖος quoque piscis est in herbosis litoribus degens. Blennorum cinis, inquit Plinius, cum ruta, uesciæ uitia & calculos sanat. Epicharmus quoque uilem quandam piscem βαιῶνα nominat.

Gobio saxatilis.

βιλότρος.

βλαῖος.

βλεννός.

βαιῶν.

1 Gobio, &c. Siculi καὶθῆρ uocarunt: alij καὶθῆρ. Sunt qui καὶθῆρ & καὶθῆρ habent.

καὶθῆρ, καὶθῆρ, καὶθῆρ.

De apuarum generibus & similibus quibusdam aliis.

Cap. CLXXXII.

1 E Gobionibus paruis & ignobilibus, qui terram subeunt, creatur pisciculus qui αἰθῆρ dicitur apuæ genus. Porro quam apuam nostri, aphyen Græci uocant: quoniam is pisciculus è pluuiâ nascitur. Grauis cibus apua est & concoctu difficilis, ut Diphilus prodidit. Sunt autem apuæ plura genera: quæ aphritis & aphros, id est spuma uocatur, non ex coitu gignitur, sed ex terra arenosa consistit: quod quidem apuæ genus nec incrementum capit, nec prolem affert: & temporis longioris spatio perit, sed denuo nascitur: unde fit ut breui quodâ tempore excepto, omnibus fere anni temporibus generetur. Efferi id pisciculi genus funditus de terra, argumentum est, quod

Αἰθῆρ, qui in arena gignitur.

καὶθῆρ.

Αφῆρ.

Αφῆρ.

Αφῆρ.

Spuma.

DE DIFFERENTIIS

nisi tempore tepido non capiatur: utpote quod de humo ad summa tepo-
ris gratia ueniat. Fiunt locis umbrosis & tepidis, quoties temporis benefi-
cio solum tepescit, ut in Attica terra apud Salaminem, & iuxta Themisto-
cleum, & in Marathone: nonnusquam uel cum aqua de cœlo incessit ori-
tur pisciculus hic in spuma, quæ à copioso imbri cadente efficitur, unde no-
men spumæ (ἀφρίς) accepit: ferturque interdum per summa maris, (cum cœ-
lum tranquillum fuerit) & in spuma fluitat, perinde ac in fimo uermicu-
lus uoluitur: quamobrem in loca complura genus id apuæ affertur è ma-
ri: & copiose quoque generatur, & capitur anno tranquillo & humido. Iis
iraque ortus partim ex limo aut arena, partim per summa facta putredine
agitur. Reliquum uero apuarum genus, scortura piscium est: quæ etenim co-
bites dicitur à gobionibus, ut modo diximus, paruis ignobilibus creatur. F
Quæ uero phalerica uocatur, mēbradas gignit, quibus unā cum spinis ue- 4
sci solemus: sicuti & aliis quæ ex iis procreatur: uocantur autem trichides. 5
Ex iis trichia oriūtur, uile edulium, ut testis est Iulius Pollux. Trichias, uel, 6
ut Aristoteli uidetur, trichæus, cum pōtum ingreditur, uidetur & capitur:
sed exiens nusquam uisus adhuc est: sed hi soli Istrum amnē subeūt, unde,
quā diuiditur fluuius, per abdītum terrę meatum in Adriaticum mare de-
fluunt: argumento est, quod subeuntes ex Adriatico in meatus illos nun-
quam capiuntur: sed descendentes in Adriaticū semper. Trichias bis anno
parit. Est apuæ genus quoddā, quale in portu Atheniensium nascitur, quod
encrasilochos dictos progenerat. ut uero quibusdam uidetur encrasilochi 7
ex illo apuarum genere procreatur, quam cobitin appellari diximus: quin- 8
etiam genus aliud apuæ est, quod mænarum & mugilum sit scortus. Illa ue-
ro altera quæ aphros & apbritis dicta est, humida est, breuēque, ut dictum
est, tempus durat, & restant tandem caput & oculi. sed iam piscatores quē-
admodum deportare possunt inueniunt: sale enim aspersa plus temporis
adseruari potest. Et hæc certe cæteris quæ hactenus dictæ sunt omnibus
præstat. Cobitin etiam epseton pisciculus uocat Dorion: & illum quoque
qui ex athrine pisciculo procreatur. Est sane epsetus in apuarum genere pi 8
sciculus. epsetos uocat nonnulli pisciculos qui in fossulis relinquuntur Nilo
recedente. Præterea quoddā apuæ genus triglitē Dorion nominat. Kelsius 9
in apuarum genere quædam, inquit, alba & tenuis admodū est & spumea, 10
quā cibotū nonnulli appellant: alia pleniorē crassiorēque corpore, & sor- 11
didior: præstantior quæ nitida & tenuis est. Engraulis, ut scribit Oppianus,
apuæ genus est, pisciculus perimbecillis & timidus: ut qui grauissima sit pi
scibus omnibus præda. Engraulis cateruatim & uelut nodo indissolubili
colligati natant: ut nonnunquam uel nauim remorari possint: capiunturq;
retibus magno numero. Sūt, inquit Oribasius, pisciculorum minimotum
genera quædam, quæ sale adseruantur, quæ unā cum acrioribus oleis
eduntur. Vocantur alia κερκίδιον, alia βοείδης, alia κίλλιον, alia τριγλίδης, quæ 11
omnia & stomacho infesta sunt & aluum citant, nec facile corrumpuntur.
Apuarum tanta est Athenis copia, ut ob uilitatē (ut Chrysippus refert) uul-
gare sit mendicorum edulium: cum tamen aliis locis, ubi longe deteriores
nascuntur,

Cobites.

Phalerica.

Membradas.

Μαμβράδας.

Trichides.

Trichias.

Trichæus.

An hic tri-
chias idem sit,
an aliud piscis.

Encrasilochus

Ἐνκράσιλος.

Aphros.

Αφρίτις.

Epsetus.

Ἐψέτιον.

Κέρκιδιον.

Κίλλιον.

Τριγλίτης.

Cibotis.

Κιβώτις.

Engraulis.

Ἐνγκράυλις.

Κερκιδίον.

Βοείδης.

Κίλλιον.

Τριγλίδης.

Απύα.

A nascuntur, magno habeantur in pretio. Apua, ut Clearchus peripateticus docuit, piscis genus est molle ac tenerū adeo, ut admotū igni protinus decoquatur: & oleo feruenti iniectum, statim ab igne auferendum præcipiat Archestratus. Apua, membrades & trichides, piscesque id genus alij, quibus unā cum spinis vesci solemus, humidius præstant alimentum, statuosumque, dum in uentriculo concoquuntur, generant spiritum: ut qui decoctionem recipiunt minime æqualem, statim etenim caro ipsa concoquitur, sed spinæ tempore longiore perficiuntur.

Apua.
Membrades.
Trichides.

1 *κωκίς* dicitur, Theodorus gobionariā noeat. 2 Apua, &c. Aplua Theodoro, *Απύα* & *Αφύα* uocatur. 3 Oritur pisciculus. Apua proueniunt, ut docet Plinius, spuma maris incalcescente, cum admissus est imber. 4 Phalerica. *Φαλαγγί*, Lynceus Samius *Φαλαγγίς* & *Φύς* dixit. 5 Membrades appellatur, & *Μεμβράδες*, & *Μεμβράδες*, & *Μεμβράδες*. 6 *Τριχίδες*, Theodorus sardinas, & *Τριχίς* sardas uocauit: Dorion uero *Ποι* *Τριχίς* & *Τριχίς* appellat. Vtrunque Theodorus & *Τριχίς* & *Τριχίς* sardam interpretatur. Sed quis piscis sit sarda infra explicabitur. *Τριχίς* & *Τριχίς* an idem sit piscis nondum nobis cōstat: an nero apud alterutrum, Pliniū scilicet an Aristotele, menda sit. 7 Encrasilochos. Encralos alij legunt. Eundē piscem arbitrantur nōnulli esse engrasilochū, & engraulim. 8 Atherine an sit eadem quæ atherina: de qua infra. 9 Epsetos, inquit Hermolaus, a coquēdo nominatos arbitror: quos Artemidorus etiam psetos uocauit. Theodorus *Εψέτος* naricas interpretatus est: nescio quā uere, inquit Hermolaus. Piscis certe minimus est narica, ut Festus inquit. 10 Spumea, & *Φύς*, id est rariore substantia, arbitror. 11 Hæc arbitror, in apuarum genere numerantur. 12 Admotum igni. Hinc ortum est prouerbum, *ἡ τῆς ἀπύας*, quasi uidisse modo sufficit ad decoctionē.

Gobionaria.
Aplua. Αφύα.
Αφύος.
Φαλαγγί.
Αφύς.

Apua phalerica.

Μεμβράδες.

Μεμβράδες.

Μεμβράδες.

Sardina.

Sarda.

Encrasilus.

Pseti.

Narica.

C De trichide, thrissa & similibus quibusdam alijs.

Cap. CLXXIII.

ET trichidas, uti modo diximus, membrades gignunt: & uulgi cibus trichis est, & qui uili cōparatur. saltu simul ac cantu summopere gaudet, ut nonnunquam cantuum uoluptate captus exiliat ē mari. Trichida sunt qui arbitrantur eundem esse cum trissa: similes certe sunt trichides, thrissæ, chalcides & eritimi. Thrissæ, inquit Oppianus, chalcides & abramides ceteruatim natant locum semper mutantes, modo in alto pelago, modo apud litora uisitantur. Aristofus spinosusue piscis est thrissā, nec multum habet in se pinguedinis: neque succum in alimento præbet copiosum, sed cum tamēn, qui facile in corpus digeritur. Ascēdunt in Nilum thrissæ, sicuti & cetres soli fere piscium, ut Aristobolus author est, absq; crocodilorum metu. Qui Mareotin lacum accolūt, trissas illic cātū & testarū concrepātium consonantia piscantur: etenim cæ saltantes in piscatoria ad se comprehendendas explicata instrumenta incidunt: atque hoc pacto Ægyptij splendidam prædam consequuntur. Trissam nōnulli clupeam interpretantur, sicut alij alosam. Est autem clupea, authore Plinio, minimus piscis, qui attilum ingentem fluuij Padi piscem, uenam quandam eius in faucibus mira cupidine appetēs, motu exanimat. huic inter pisces primas partes tribuit Ennius poeta. Alosam autem piscem plebeium esse ostendit Aufonius hoc carmine:

Τριχίς.

Thrissa.

Thrissa.

Θεσσα.

Θεσσα.

Αλγυκίς.

Clupea.

Alosa.

Stridentēsque focis obsonia plebis alosas.

DE DIFFERENTIIS

Chalcis.

Chalcis trichidi atque trissæ similis est, piscis aristofus spinosusue: (aut sic- E-
cus & squalidus, hoc est ἀγρότης) neque multum in se pinguedinis cōtinet, 5
neque succum copiosum in alimentum præbet: facile tamen in corpus di-
geritur. gregalis piscis est. Et gregatim natat chalcides (ut modo diximus)
locum semper mutantes, modo in alto pelago, modo apud litora degētes.
In fluuiatiliū quoque numero chalcis est. Ter parit, & gregatim sua oua
gurgiti altiori mandat congesta. sonitum quendam & ueluti stridorē non-
nunquam emittit. Chalcis uitio infestatur diro, ut pediculi sub branchiis
innati plurimi interimant: quod nulli ex ceteris accidit. Chalcidas nōnulli
sardinos uocant. Aristoteles eritimos sardinos dixit. Est uero eritimus 6
chalcidi trissæq; similis, & in alendo quoque: quē Dorion condimēto sua-
uiorem euadere prodidit. Sale cōdiuntur nonnulli pisciculi, in quibus chal F
cis est & halecula.

Sardinus.

Eritimus.

Chalcis.

Halecula.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

Θερίων.

1 Thrissæ. Θερίων uel Θρίων alius, opinor, marinus est pisciculus uersicolor: thes-
sa à quibusdam uocatur & thetta. 2 Aristofus spinosusue. Theodorus spinosum
dixit. Græca Aristotelis exemplaria αἰ. Θρίων habēt, sed falso, ut opinor: Athenæus
ἀγρότης fortasse, id est squalidus, aut siccus. Θερίων Theodorus alofam uocat. 3
Ennij uetus extat apud Apuleium,

Omnibus ut elupea præstat mustella marina, &c. Sunt qui legant clypea.

4 Alofam. Atherinam Phauorinus uilem esse piscem tradidit an eadem sit cum
alofa, consideret lector. Atherina (quam aristam appellat Theodorus) ē solitariorū ge-
nere (ita nanque interpretatur ἰνιδες) prima in hoc genere parit: fortisq; eius pri-
mum fere omnium apparet. parit arterens aluum arenæ. 5 Chalecus piscis alius à
chaleide est Cyzici frequens, figura terete, αἰ. χάλκιδος: an idem sit, qui G
faber: Chaleida Theodorus ericam interpretatur, nonnunquam & spuriam: quæ in-
ter fusancos pisces numeratur, & qui semel pariunt. Verum eo in loco uidetur exem-
plaria omnia mendosa: nam chalcis gregalis est, non fusaneus: & ter parit. 6 Sardi-
niam habet Columella pisciculum salsamentis idoneum, & à chalcide diuersum: nisi
deprauatus sit codex. Item sardinam Galenus, uel sardenam εἰσαλίω.

De halecula, māna, smaride & boce. Cap. CLXXXIII.

Halecula.

Halecula ri-

nalis.

Alec.

Mains.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

Mana.

T Abentes haleculas incrementi minuti pisces iubet Columella præbe- 1
ri iis, qui in uiuariis seruantur piscibus. Riualet quoque haleculā no- 2
minat inter ea, quæ sunt incrementi parui animalia. Alecem appellant nō-
nulli quam Græci μακρίδα uocāt, & Plinius mānam. Colore mutantur mā-
næ, candidiores hyeme, & fiunt æstate nigriores, id quod maxime suis pin- H
nis & branchiis declarant. Herboris litoribus gaudet māna, & gregalis est.
Omnium piscium fecundissima est, & post brumam parit. utero grauis
melior est. Forma rotundior fœminæ, porrectior mari & latior. Euenit ut
cum fœtu impleri fœmina incipit, maris color in nigriorem, plūsq; ua-
rietatis mutetur, & caro deterrima cibo efficiatur: uocantur à nōnullis per
id tempus τέρηδες, id est hirci. Mānæ succi bonitate gobiones superāt, ut tra-
dit Icelius: sed suauitate inferiores sunt. Capitis mānarum, quæ sale adser-
uantur, sinus, exsuccandi uim habet, nō admodum æcrem: idcōque ad sedis
rimas eo utimur: quidam & ad columellam diu induratum. Hæc Galenus.
Mānarum ex capitibus cinis, inquit Dioscorides, si imponatur, callosas se-
dis

Τέρηδες.

Hircus.

A dis timas abolet: cuius etiam garum putrida oris ulcera, si eo colluantur, si-
 stit. Plinius mænarum muria & capitum cinis, inquit, cum melle sanat stru-
 mas. Anginas mænarum salfarum ex capitibus cinis ex melle illitus abolet.
 Mæna falsæ cum felle taurino illitæ umbilico aluum soluunt. Capitum mæ-
 narum cinis ad rhagades & condylomata utilis. uulgo è mænis iucundissi-
 mus habetur sal: ex eo saltè genere quod è muria salamentorum recoqui-
 tur, iterumque consumpto liquore ad naturam suam redit. Mænidi simi-
 les sunt boces & smarides, ut Pseusippus author est. Est autem smaridis piscis
 litoralis, & litoribus gaudet herbosis. Colorem mutat non aliter atque mæ-
 na: candida enim hyeme, rursus æstate ad nigredinem redit: quod maxime
 suis pinnis & branchiis declarat. Smarida nonnulli *καυὸς κῆρυς, ἢ καυοστύμα* uo-
 carunt. Smatidis caput exustum excrecentes in ulceribus carnes reprimi:
 nomas cohibet, thymos clauosque absumit. eius caro, non secus ac cætera
 falsamenta, scorpionum ictibus canumque rabidorum moribus prodest.
 Verèdorum pustulas discutiunt smarides illitæ. Mulieribus lactis copiam
 faciunt smarides cum prissana sumptæ, uel cum scæniculo decoctæ. Box, ut
 diximus, mænæ & smaridi similis, in dorso quasi pictus, *καὶ ἐξ αὐτοῦ βόξ*, uti A-
 thenæo placet, nominatur: piscis parvus, oculos habens pro corporis ratio-
 ne grandes: adeo ut Aristophanes Bizantius, non *βόξ* aut *βόξ*, sed *βόξ*
 potius appellandum statuerit, ab oculorum scilicet magnitudine, quasi bo-
 uinos habentem oculos. Piscis gregalis est & litoralis, in locis herbidis ui-
 citans. Concoquitur facilius box, atque in corpus digeritur iurulentus, &
 aluum mouet: uerum assus suauior est & tenerior. Sunt & quidam pisces
ἀνὰ κεφαλὰς dictæ, id est mænæ candidæ, quas aliqui *βόξ* appellarunt: alij
 diuersos asserunt.

*Smarides.**καυὸς κῆρυς
καυοστύμα.**Box, βόξ.
Voca, uel boca.**Bocas.
Bodæ.**Leucomen-
des.
Bόξ**Alecula.
Anthracides.**Alex.**Cerros.
Gerros.*

1 Aleculam arbitratr Hermolaus genus, non speciem esse: idemque apud nos si-
 gnificare aleculas, quod anthracidas apud Græcos, id est prunarios aut carbonarios:
 quicunque scilicet in pruna & craticula commode coqui possent: uerum ex Columel-
 la apparet species esse. 2 Alecem appellant nonnulli, &c. Alex Plinio nō piscis, sed
 gari uitium est, scilicet imperfecta nec collata fex. nec sane occurrit locus quispiam a-
 pud ueterem aliquem auiorem, qui plane ostendat alecem aut alec piscis genus esse.
 Horatius in primo Sermone, Ego fecim primus & alec inueni. Nonius
 Marcellus locum hunc citans piscem significare dicit. 3 Quas Græci smaridas ap-
 pellant, miror unde Theodorus cerros interpretetur, inquit Hermolaus. Sunt quidem
 gerres Plinio & Martiali quoque inter uiles pisciculos, sed diuersi à smaridibus, uti ex
 Plinio ipso liquet lib. 32. Martial. lib. 12.
 Fuisse gerres aut inuiles mænæ,
 Odor impudicus uteretur. *καὶ ἡ μὲν γὰρ ἡ μὲν γὰρ ἡ μὲν γὰρ*
 4 *καὶ ἡ μὲν γὰρ* Vocam interpretatur Theodorus. Et certe lectio Pliniana in u-
 tultis codicibus *βοά* habet, non *βόξ*, ut notat Hermolaus. Bocas, inquit Festus, pi-
 scis genus est à *βοά* odō, id est uocem emittendo. *Ἀμφότεροι τὸ βόξ*, id est boces utri-
 que dixit Oppianus: quasi duo sint eorum genera.

De aliis quibusdam piscibus, qui uocales dicuntur.

Cap. C L X X V.

Pisces uocis quidem expertes sunt, ut diximus, sed sonos quosdam stri-
 dorisque mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra, ut chromis, de

Ee

Lyra.

DE DIFFERENTIIS

*Pisces vocales,
ἰχθύες φωνώτες,
φωνήλαι.*

*Porcus,
Ορθογαστήρ.*

*Porcus mari-
nus.
Κάπρος,
Απέρ.
Ἰς, Σὺς.
+ κριμίδης.
Ἰς θαλάσσιος,
Σὺς marinus.*

*De his infra
inter Cybiorū
genera.*

*Γοτρίμιος χοί-
ρος, porcus flu-
uialis.*

*Κάπρος.
Ἰαῖς.
Ἰαῖνα, Hyæna
Σὺς.*

qua supra dictum abunde est: his enim quasi grunitus quidam emitti-
tur. In Clitore amne pisces uocales esse Mnaseus Patrensis author est. Phi-
lostephanus Cyrenensis Callimachi familiaris, in Aorno fluuio pisces esse
tradiit similiter turdis auibus uocales: uocari autem ab accolis *πικαλίες*. Ego
uero, inquit Pausanias, hos pisces cum caperentur uidi: uocem autem audi-
ui nunquam, quanuis uel ad uesperum usque apud fluuium expectassem:
quo maxime tempore uociferare serūt. Appion maximum piscium esse
tradiit porcum, quem Lacedæmonij orthagoriscum uocant: grunire cum
capiatur. Inter uenena sunt piscium porci marini spinæ in dorso, cru-
ciatu magno lae forum. Remedium est limus ex reliquo piscium eorū cor-
pore. *κάπρος*, ut inquit Aristoteles, id est aper, piscis, quem amnis Achelous
gignit, uocalis habitus est: & grunnum habet. Idem fortasse quem *ω*, id
est, suem uocant nonnulli, alij *καρμίδης* uel *καρμίδης*: quanquam *ἰς θαλάσσιον*, id est
sues marini non inepte dicuntur etiam thynni, cum à glandium
marinarum esu pinguiore efficiantur. Circa Lusitaniam nanque, ut refert
Polybius, nascuntur in mari glandes, quibus uescentes thynni mirum in
modum pinguescunt, nō aliter atque porci quadrupes terrestribus glan-
dibus: quocirca non immerito sues aut porci marini dici possunt. Laudan-
tur in hoc pisce maxime, quæ circa uentrem partes sunt: *κατὰ γαστήρα* dicun-
tur & abdomina.

1 In Aorno, &c. In Aroanio Arcadiæ fluuio scribit Pausanias. 2 *κάπρος*, Hic
forſitan eſt, quem Athenæus *παιμύων χοῖρος*, id eſt porcum fluuiatilem uocat: quem e-
tiam ex Ariſtotele uocalem eſſe tradit. Eodem loco habetur *οιφιφρος*, quem & uocalem
eſſe dicie, niſi forſitan menda ſit, & *καπρος* ſcribi debeat. 3 *Ἰαῖς* quoque piſcis eſt,
& *Ἰαῖνα*: ſed an uidem an diuerſi à ſue, dubitat Athenæus. Durique ſues, dixit etiam Oui-
dius in Halieutie. De hyæna ita habet Plinius, Er hyænam piſcem uidi in Oenaria in-
ſula captum, caput exerentem. Hyæna ab Oppiano inter ferocia cete numeratur, quæ
multo ſit immanior quàm hyæna terreſtris.

De thynno, thynnide, pelamide, & huiuſce generis aliis.
Cap. CLXXXVI.

*Thynnus,
Thynnus.
Scarodyla.
Cordyla.
Nijikr.
Auxuma.
Cordyla, uel
cordula.
Pelamis,
Γαλαμῖς.
Limosa.
Lutaria.
Sarda.
Thynnus.
Thynnus.
Pelamis.
Thynnus.
Orcynus.*

Cum annuum exceſſere tempus, thynni uocantur: etenim cum thynne
in Ponto pepererint, prodeunt ex ouo, quas alij ſcarodylas aut cordy-
las uocant: Bizantiꝝ auxidas (Theodorus auxumas) nominant, quia diebus
paucis adoleſcunt. Cordyla, inquit Plinius, pelamis puſilla, cum in Pontum
è Mæotide exit, hoc nomen habet. Hæ Ponto exeunt autumno in mare u-
nà cum thynnis: eodem autem redeunt uerno tempore, iam adeptæ eā ma-
gnitudinem, qua limoſæ aut à luto, pelæonidis, id eſt lutariæ nomen acci-
pian. Sarda quoque uocatur pelamis longa ex oceano ueniens. Limofiſ
thynni proueſtiores ætate anno eſſe putantur uno: & thynni tunc uocan-
tur, uti modo diximus, cum annuum exceſſere tempus. Præ nimia pingue-
dine diſrumpuntur thynni nonnunquam: nec fere pluſquam bienniꝝ poſ-
ſunt uiuere, ut Ariſtoteles author eſt. Pelamis, uti Solſtratus prodidit, etiam
thynnus dicitur, cum ſcilicet ad thynni magnitudinem increuerit: poſtea
uero maior adhuc reddita, orcyꝝnos uocatur. Poſtremo autem cum inge-
tem in

Atem in molem creuerit, cete. Et quidem iam captus est thunnus scne x, inquit Aristoteles, cuius pondus erat ad talenta quindecim: & cauda interuallum ad cubita quinque & palmum: (Plinius, duo cubita, inquit & palmum.) Lewis piscis thunnus est, mari amnisque communis. Differt mas thynnus à femina, eo quod femina pinnula iuncta sub uentre est, quam apha-
 5 rea nuncupant, quæ mari deest. Coeunt thynni mēse Februario post idus: 6 pariunt Iunio ante nonas. & semel anno parit thunna: sed quoniam partē præmature, partem sero producit, hinc fecundificari bis creditur. Edit sua oua condita quasi utriculo, in quo oua exigua multaque consistunt. Incrementum autem partus præcipua sumit celeritate. Pelamides ac thynne in Ponto pariunt, nec usquam alibi ut sentit Aristoteles: ut uero Strabo refert, pa-
 B riant in Mæotide palude. A partu statim oua sua, & prolem deinde paruā adhuc, deuorat thunna. Carne sola uestitur thynnus magna ex parte: quan-
 doque etiam algam tangit, sed & glande quoque pinguescit, ut modo diximus. Thynni omnium maxime gaudet tepore: & ob eam rem arenam & litora adeunt. per summa etiam maris natat, quo tepore potantur. Latent thynni præaltis gurgitibus hyeme, & bruma non uagantur: sed ubicunque deprehensi, usque ad æquinoctium, ibi hybernant. Pinguescunt à latibulo maiorem in modum: sunt quoque magna ex parte suauissimi cum latent. Primadix in cæno se abdunt, cuius rei argumentum est, quod neque eo tē-
 pore, hyemis scilicet, capiuntur: & si capiuntur, dorso feculento pinnisque C oppressis spectantur: uerno autem tempore prodeunt & appropinquat ad terram coeunt parientesque: quo tempore fœtu grauidæ capiuntur, tem-
 pestiuaque tantisper esse putantur: aut uero & hyeme deteriores sunt. simul etiam mares pleni genitali semine (quod *Xipos* appellant) per id tem-
 pus cernuntur, eoque præstant ad usum: fœtu in utero adhuc paruo, difficile capiuntur: adultiore iam, larga captura propter infesti asili stimulum. Circa canis enim exortum agitantur asilo thynni: habent enim per id tem-
 pus ceu uermiculum quem *alsos*, id est asilum uocat, effigie scorpionis, magnitudine aranci. Infestat hoc tanto dolore, ut uel in naues sæpenumero ex-
 liant: id quod facit, ut sit in æstate deterior thunnus. Post aræturum deinde melior est: iam enim eo tempore ab infestantis asili agitatione requiescit. Thynni in Pontum dextra ripa intrant, exeunt læua: id accidere existima-
 D tur, quia dextro oculo plus cernit, (utroque hebetæ natura) læuo hebetius. Est in Euripo Thracij Bosphori, quo Propôtis Euxyno iungitur, in ipsis Eu-
 ropam Asiamque separatis freti angustis, saxum miri candoris à uado ad summa perlucens, iuxta Chalcedonem in latere Asiæ. Huius aspectu repē-
 te territi, semper aduersum Bizantij promontoriū præcipiti petunt agmi-
 ne: itaque omnis captura Bizantij est magna Chalcedonis penuria. Operiū-
 tur autem aquilonis flatum, ut secundo fluctu exeant ex Ponto: nec nisi in-
 trantes Pontum Bizantij capiuntur. Intrant thynni, uti modo diximus, è ma-
 gno mari Pontum uerno tempore gregatim: sed multi tamē in Proponti-
 de æstiuant Pontum non intrant. Thynni nauigia uelis euntia comitantes,
 mira quadam dulcedine per aliquot horarum spatia & passuum milia à gu-

*Aphareus,
ἀφάρης.
ἀΐξ.*

*Idē sentire ui-
detur Plin. lib.
32, ca. 7 de cor-
dylis.*

*Primadix,
ῥεκουδία, id
est pelamides
nostra certe op-
pimione.*

Asilus, ἄσπας.

DE DIFFERENTIIS

bernaculis non separantur, ne tridente quidem in eos sæpius iacto terri- **E**
Pompilus. Quidā eos qui ex thynnis faciant hoc, pompilos uocant. At uero pōpilum
 alium esse piscem sentiunt & Ouidius & Oppianus, atque Athenæus: pelagium
 quidem piscem, & qui pelamidi similis sit, sed diuersus tamen: qui &
Pelamius. circa naues frequenter conspicitur ludibundus, easque ad terram usq; eun- **7**
 tes comitetur. Pelamis, Diphilo auctore, cibus grauis, copiosque alit, con-
 coctu difficilis, urinam ciet: quod si sale maceretur, facilius aluum mouet,
 & extenuandi ui prædita est. Sapore quoque iucundo est, inquit Xenocra-
Sarda. tes, & meliusculum procreat succum: nec facile corrumpitur. Sarda, ut idē
 ait, gustui grata est: ob eam quam in se habet acrimoniam cybio præstan-
Thunnus. tior appetentiam incitat, & aluum mouet. Thunni autem caro, eodē au-
 thore, stomacho aduersa est, aridaque & mali succi: ægre deicitur aluo, sed **F**
 copiosum præstat alimentum: & in summa, grauis cibus est, ut Diphilus
 prodidit. Galenus thynni, inquit, sicuti & grandiores alij pisces, succum gi-
 gnum crassum tenacemque: ac proinde eorū usus senibus inutilis est. Quæ
 autem pelamides uocantur, carnem habēt teneriorem: & succum gignunt
 crassum, qui ad mediocritatem magis tendat. Et, ut paucis dicam, thynno-
 rum caro, qui & ætate & corporis mole sunt minores, non perinde dura est
 atque seniorum maiorumque. Thynni recentioris adipe Attalus ad recen-
 tiora ulcera usus est. Pilothrum est thynni sanguis, fel, iecur, siue recentia
 siue seruata: iecur etiam tritum, mixtæque cedria plumbea pyxide adserua-
 tum. Thunni ad rem fassamentariam senes improbi sunt: quæ autem pe-
 lamides uocantur, iis longe præstantiores sunt: ut quæ laudatissimis fassa- **G**
Cyborum genera. mentis non cedunt. Hæc particulatim consecrē in genera cybiorum dispar- **8**
Cybium, uetera. tiuntur: concisa nanq; pelamis quæ post quadraginta dies à Ponto in Mæo-
 tim reuertitur, cybium uocatur. Cum uero annum excessere tempus, &
 iam primum thynni uocantur, uti diximus: hi membratim cæsi ceruice &
 abdomine commendantur atque elidio, recenti duntaxat: & tum quoque **9**
 graui ructu: cætera parte plenis pulpamentis sale adseruantur. Melandrya
 uocantur cæsis quernis assulis similima: uilissima ex his, quæ caudæ proxi- **10**
 ma, quia pingui carent: probatissima ea quæ faucibus. Hæc Plinius. Xeno-
 crates cæteras thynni partes præter collum & abdomen melandrya uoca-
 uit, quod nigris quercuum radicibus similes sint. Sed quænam recipiant **H**
ειωπιες. discrimina thynnorum partes, quæ sale adseruantur, mox referetur. Thyn-
 ni falsi carnē Dioscorides *δυσήνη* uocari scribit. Hæc si edatur, iis quos ui- **11**
 pera, quæ prester dicitur, momorderit, auxiliatur: oportet autem uinum
 quamplurimum subinde cogantur haurire, indeque euomere. Iis quibus
δυσήνη opus est, id est, qui acrioribus cibis ad uomitionem proritandam
 indigent, accommodatissima est. Canum moribus utiliter imponitur. Pe-
 lamidum fassarum capitum cinis uel cybiorum cum melle ad cōdyloma-
 ta & rhagadas utilis est: sarda priuatim contra presteris morsum prodest.
 Quod cybium uocatur, inquit Galenus, uulneri à cane inflicto non sine
 utilitate imponi prodidēre quidam: & contra draconem marinum ex ace-
 to. Cybia uetera eluta in nouo uase, deinde trita, profunt dentium dolori-
 bus.

A bus. Alium purgant cybia uetera: priuatimque cruditates, pituitas bilē-
que trahunt. Pamphilus melandryn genus thynni grandissimum esse sta-
tuit. In pelamidum maiorū genere apolectus, (uel, ut alij legunt, apolectū)
uocatur pelamidū generis maxima, tritone durior. Orcynus pelamidū
generis maximus neque redit in Maotum similis tritoni, uelustate melior:
uel (ut Diphilus prodidit) orcynus cum magnus est, chelidonix similis est,
quod scilicet ad carnis duritiem attinet. Orcyni, inquit Dorion, ex oceano
per columnas Hercules in nostrum mare permeant: quo fit, ut in Iberico &
Tyrrheno mari capiantur plurimi: circa Gadiram, insulam pinguiissimā,
uti refert Icesius: deinde circa Siciliam: quo uero longius à Gadibus rece-
dunt, eo macilenti magis euadunt. Orcyni carnem tradit Xenocrates sto-
macho ingratam, malique succi, & aridam: abūde nutrire, nec facile per al-
uum excerni. Synodontis maior pelamis appellatur. Triton pelamidū ge-
neris magni, ex eo horarā cybia sunt, quæ duriora solidiorāue sunt, quā
quæ ex pelamide. Chelidonias pelamidi simile præstat alimentū, nisi quod
durior est. Xathias, inquit Diphilus, tenerior est quā orcynus: uirus quo-
que nonnihil olet.

Melandryx
Apolectum.
Apolectum.
Orcynus.

Synodontis.
Triton.
Chelidonias.
Xanthias.

Pelamis.

Sardica salu-
menta.
Ouarā.

Τρυγιάς.
Τρυγιάς.
Τρυγιάς.
Τρυγιάς.

Hippurus.
Equus.

Coryphæna.

Αγρίοι.
Hippus.
Ιππίδον.

Clidium.

Melandryx.

Melandryx.

Κατιμα.

Tritomum.

DE DIFFERENTIIS

*pelamides,
ancora.
Orcyne.*

Synodontis.

Synodontis.

orcyneis, eadem fere narrat Oppianus de maioribus rhynnis: nepe quoddam ex oceano per E
fretum Gaditanum ingrediuntur mare mediterraneum: quo fit, ut plurimi in Iberico
Tyrthenoque mari capiantur: postea uero passim reliquum mare pererrant. Orcy-
norum genera statuere uidetur Oppianus *πελαγίδες & ορκύνες*, qui in altro pelago degunt,
atque ad litora accedunt. Orcyne quoque Aristoteli in altro fixificant. 14 Si quis
ea quæ hoc in loco afferuntur ex Plinio & Arhenço conferat, (mea quidem sententia)
si non idem, at similes certe erunt, parumque inter se differunt, melandrys, apolectus,
orcyneus & xanthias, triton, synodontis & chelidonias. Hermolai coniectura est tri-
tonem eundem esse, quem Græci chelidoniam uocant: apolectum uero, quam cyno-
dontida: Athenæique sensum explicat aliter atque nos reddidimus: hoc scilicet pacto,
Maior pelamis synodontis appellatur, durior quàm chelidonias. Item paulo post, Or-
cynus similis est chelidoniaz cum magnus est: Athenæus uero, in nostris saltem codici-
bus ita habet, *ὅτι ἡ μείζων πελαγίς συνodontίης χαλκίται: ἀπολεκτὴς μὲν τοῖς χελιδονίαις τῇ πελα-
γίδι σκληρότερος*. Et paulo post, *ὅτι ἡ ἰσχυρὴ βορβορώδης καὶ ἡ μείζων πελαγία τοῖς χελιδ-
νίαις καὶ τῇ τῷ σκληρότερον*. In iis uia coniectura utere lector.

De falsamentis.

Cap. CLXXXVII.

*Salsamentum.
Salsura.
Τύριχος, σ.
πύριχος, ὁ.*

Poscere uidetur hic locus, ut de falsuris aliqua dicamus. Salis facultatem
tradunt medici compositam esse: humores etenim corporum excremen-
titios digerit extenuatque: & corpora ipsa in sese cogit atque condensat.
Quæ igitur corpora sua natura sunt sicciora, hæc (uti supra diximus) sale as-
persa redduntur ob nimiam siccitatem cibo inepta: quorum uero caro dura
est & excrementosa, ea ad falsameta erunt idonea. Excrementosa autem uo-
co, quæ succum in sese continent pituitosum undique conspersum: & hic
quidem quo fuerit copiosior crassiorque, eo melior caro, si sale adseruatur,
euadet. Quorum autem mollis admodum fuerit, aut impenſe sicca caro, ex-
crementorumque expert, ut falsiantur inepta sunt. Mollium itaque carniū
piscis (quos *μαλακωδέρευς* uocant) & qui excrementis uacant, ut falsamenta
ex illis fiant, minime sunt idonea. Huius generis sunt, qui saxatiles uocan-
tur atque aselli, qui in puro mari degunt: sed neque mulli, quoddam dura sit eo-
rum caro excrementis uacua, sale inueterantur. At coracini, mylli, pe-
lamides, & præterea sardæ fardinique, & quæ sexitana uocantur falsamen-
ta, atque id genus alia. Ad hæc inter ea quæ in puro mari degunt, quæ *λεπόν*,
id est cetacea uocantur, ut balenæ, delphini & phocæ, cum sale condiuntur,
euadunt meliora: ut quæ carnem habent excrementitiā omnia. Huic ge-
neri proxime accedunt magni thūni, quos melandrias, tritones, chelidoni-
asque uocari diximus: sale namque cum condiuntur, euadunt se ipsis melio-
res. Præstantissima autem omnium, quæ mihi certe experiri licuit, inquit
Galenus, sunt quæ à ueteribus medicis sardica uocantur falsamenta (hodie
sardas uocant), & qui nunc ex Ponto afferuntur mylli. Secundum uero ab
iis locum obtinent coracini, pelamides, & quæ sexitana uocantur. Hæc Ga-
lenus. At Diphilus myllo coracinum in omnibus præfert: ut qui subpinguis
est, bene carnosus, succi non omnino mali: facile & concoquitur, & in cor-
pus digeritur, abundeque nutrit. Quæ cybia dicuntur atque horæ, inter ma-
iora falsamenta præstantissima sunt, ut inter pinguia cordylæ, & quæ *θύνη*
& *θύνη* uocantur. Porro thynnium ait Diphilus ex pelamide maiore fieri:
cybia uero atque horæ (quæ eiusdem sunt generis) ex minore. Et thynnia
quidem

*Sardini.
Sexitana fals-
amenta*

*Sardica falsamen-
ta.
Sarda.
Mylli.
Myli.
Sexitana.
Γύλις.
Νύμφη.
Cybia.
Horæ, ὁρῶν
falsamenta.
salsamentum
thynnium,
thynnium.*

A quidem uetustate euadunt meliora recentibus acrioraque: & præcipue Bizantina. Qui circa Gadiram insulam capiuntur orcyini, pinguisissimi sunt, uti supra ex Icelij autoritate indicauimus. ex iis clidia seorsum cõdiuntur sale, & melandryæ quoque: uerum abdomina ipsa (quæ *κνέμα* uocāt) pinguis, cæteris partibus suauitate præstant, uel eodem authore: & clidia hæc ipsa superat. Diphilus quoque orcyini abdomina, & clidia sapore grata, & tenera prædicat: & quæ *κνέμα* dicuntur, sale adseruatas mediocres esse; quàmquam Xenocrates carnem ipsam orcyini stomacho ingratā esse tradit, maliquè succi atq; aridam. Salsamenta omnia quæcunq; ex sale duriora euadunt, ac ueluti neruosa coriaceaquæ cõcoctu sunt difficilia: at contrā, quæcunque extenuatis digestisque à sale crassioribus lentisque excrementis tenuium redduntur partium, eadem ipsa in cibo crassos ac glutinosos humores extenuant. Quæcunque, inquit Diphilus, è marinis, lacustribus aut fluuiatilibus salsamenta fiunt, parce nutriunt, aluum cient, appetitiam ciborum irritant & sitim faciunt. Sunt & seruatis piscibus medicinæ: salsamentorumque cibus prodest à serpente percussis, & cõtra bestiarum ictus merito subinde hausto, ita ut ad uesperam cibus uomitione reddatur: peculiari-ter à chalcide, ceraсте, & quas sephas uocant, aut elape dipsadæue percussis. Contra scorpiones largius sumi, sed euomi salsamenta prodest, ita ut sitis toleretur. Imponuntur salsamenta & contra morsum canis rabiosi: uel si non sint ferro usq; plage, corporaque clysteribus exinanita, hoc per se sufficit: & contra draconem marinum ex aceto imponitur: idem & cybio profectus. Fistulæ aperiuntur siccanturque salsamentis cum linteolo immisissis: intraque alterum diem callum omnem auferunt: & putrescentia ulcerum, quæque serpunt, emplastri modo subacta & illita. pavis uero profunt salsamenta cocta. Carbunculos uerendorum priuatim salsamēta cocta cū melle restringunt. Salsamentorum cinis fictili uasē combustorum, addita farina marmoris, ad dentium dolores inter remedia est. Aequè prodesse dicuntur omnium salsamentorum spinæ combustæ tritaq; & illita. Intestinis piscium cæterisque, quæ abiicienda essent, sale maceratis, sit liquoris exquisiti genus, quod garon uocauere, ut sit illa putrescentiū sanies. Hoc olim cõficiebatur ex pisce quem Græci garon uocabant: nunc è scombro pisce laudatissimū in finibus Carthaginis: id sociorum appellatur: nec liquor ullus pene præter unguenta maiore in pretio esse cõpit, nobilitatis etiam gentibus. Scombros quidē & Mauritania Beticāque & Carteia ex oceano intrātes capiūt, ad nihil aliud utiles. Garum, & Clazomen, ē & Pompeios & Lepin nobilitauit: uitium huius est alex, imperfecta nec colata fex. Cõpit uero garum & priuatim ex inutiles pisciculus minimōq; confici, apuam nostri, aphyen Græci uocant. Foroiulenses piscem ex quo faciunt, lupum appellant. Sic & alex peruenit ad ostreas, echinos, urticas, cammaros, mulorum iocinera. Garum uehementer calfacit, si Galeno credimus, atque exsiccat: idcõque à nonnullis ad putrida adhibetur ulcera: clysteribus iniicitur ad dysentericos coxædicumque dolores. Sunt qui præcipue cõtra omnia aurium uitia laudent gari excellentis sociorum cyathum in calice nouo lenta pru-

Alia, sed non enomi.

*Garum.
Garum.
Garum pisci.
Garum sociorum.*

Alex.

na decoquere: deinde spuma pennis deterfa, postquā defuerit spumare, tepi- E
dum infundere: si timeant aures, coriandri succo prius mitigandas iidem
præcipiunt. Contra canum morsus prodest garum, maximèque crocodili:
& ulcètibz quæ serpunt, aut sordidis oris quoq; & aurium doloribus mi-
rifice prodest. Et uua medetur garū cochlearibus subditum. Alece scabies
pectoris sanatur infusa per cutem incisam: & contra canis morsus draco-
nisque marini prodest: in linteolis autem conceptis imponitur. Garum,
ut Dioscoridi placet, non ex scombris solum, sed & aliis quoq; piscibus at-
que carnibus conficitur. Hoc alij, ni fallor, *ἄλμυρ*, id est muriam dixere. Mu-
ria, inquit Plinius, siue salugo illa, spissat, mordet, extenuat, liccat. dysen-
tericis utilis est, etiam si nome intestina corripit, ut quæ exulcerata sint sistat:
ischiadiciæque infunditur, ut exulcerationem proritet. sotu quoque apud F
mediterraneos aquæ marinæ uicem pensat. depascencia ulcera sistit. mor-
sis à cane medetur: potissimum autem filurorum ac mænarum muria me-
dici nonnulli utuntur, quæ etiam interdum ad oris ulcera accommodatur.
Hæc obiter indicata sint: modo ad institutum opus reuertamur.

*Garum.**Muria,
ἄλμυρ.**Τριχύρορ.**Τριχύρορ.
Platyrus.**Γλαύσκυμει.
Mylus.**Muria uel
murice.*

1. Salis naturam fusius explicant Dioscorides & Plinius. 2. Siccioris cuiusdam
piscis, & qui externæ pinguedinis egeat, meminit Diocles. *Τριχύρορ* uocat. Et Nume-
nius *ἀλλοπλιον τριχύρορ* dixit. Galcus item ex Philotimo dicit carnem piscem trachu-
rum esse dicere: eundem & *τριχύρορ* à nonnullis uocari prodidit Xenocrates. Nō idem, sed
alius uidetur apud Oppianum platyrus: qui inter eos pisces numeratur, qui apud lito-
ra arenosa uicitant. 3. Sardica salsamenta (opinor) à sarde, quæ dicta est pelamis G
longa, quæ ex oceano ueniat. 4. Mylli (qui & myli) iudè uocantur & gnotidia, & pla-
tistaci: qui enim in hoc genere sunt maximi, *πρὸν κει* dicuntur: qui uero media sunt
ætate, *μύλλοι* & *μύλλοι*: minimi autē *γλαύσκυμ* & *γλαύσκυμ*. Mylus apud Oppianū inter
eos pisces numeratur, qui circa saxa nuda uersantur. 5. Carnē ipsam, &c. Recentem ni-
mirum carnem intellexit Xenocrates: & partes solum illas, forsitan quas Iecchus me-
lādrys, Diphilus collass uocauit. 6. Græci optimū gari genus purant, quod hæma-
tum, hoc est sanguiculum appellant, ex intestinis thynni cum brachiis, sanie ac cruo-
re. Muria non ex intestinis, sed ex thynno ipso fere conficiebatur, Antipolim, Thnriā,
inde uero Dalmatiam nobilitans: (ut inquit Plinius) quanquā muria siue mones Ca-
toni, Palladio, Columellæ, non liquamen ex piscibus, sed salsilaginé salsitiam signifi-
cat. Hæc Hermolaus. 7. Alex neutro duntaxat genere, inquit Hermolaus, sed Pli-
nius alecem ex mullorem iecore dixit.

De scombro, colia & amia, & aliis quibusdam qui sale
adseruantur. Cap. CLXXXVIII.

*Scombrus.
Scomber.
Σκῆμπερος.**Colias,
κελίος.*

H H
ispaniæ cetarias scombri replent, thynn timeris non commētibz: & Mau-
ritania, ut modo diximus, Beticæque & Carteia scombros ex oceano
intrantes capiunt, ad nihil aliud quàm ad garum conficiendum utiles. His
est in aquis sulphureus color, extra qui ceteris. Scombri ita ut thūni coeunt
mense Februario post idus: pariunt Iunio ante nonas. Scombri discedunt à
locis frigidioribus calidioribusque antequam thynni, ut qui imbecilliores
sunt: sæpe tamen flatu austrino uehementius occurfante fit, ut cum colias &
scombris exeant thynni in mare. Scombri minores sunt quàm colie, ut re-
fert Icesius. Coliæ uero magnitudo sardæ æqualis est. colias quasi lineas
quasdam habet depictas, nō in dorso, sed obliquas. Coliæ magna ex parte
non

A non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt æstatem & pariunt: hyemem in Ægeο. Optimus esse in Propontide indicat Aristoteles antequam pariant. capiuntur subeuntes Pontum, exeuntes minus. Verum, ut Diphilus prodidit, principatum obtrinet Amiclanus colias, & ex Hispania sexitanus: minor enim tenuiorue est & suavior. uel, ut Plinius tradit, colias siue parianus siue sexitanus à patria Betica, lacertorum minima genera: ab iis Mæotici. Scombri, ut Icelius author est, meliorem in cibo præbent succum quàm colia, & qui è stomacho breui descendit. Colias succum dat lenitiorem ac mordaciorem quàm scombrus, abundèque nutrit: ut uero Xenocrates author est, & scombrus & colias carnem habent non aliter atque thunni stomacho ingratam, aridam, malique succi, & quæ non facile aluo excernitur, atque copiose nutrit: uerum colia caro ori minus grata est, minusque succi habet. Scombrus sapore est non adeo ingrato, nec facile corripitur. sitim prorit. Circa Parium præstantissimi habentur. Scōbri in aceto putrefacti, excitant uulua stranguatu oppressas. In mari rubro lacertus est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est. Virgatus spectatur: lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguit. ore est hianti, maxilla inferior eminet in superiorem. uirides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Eiusdem item maris sectura est piscis cui nomen phœnix: is nigris lineis, quas cœruleæ interfecant maculæ, distinguitur. Hamia cum thynnus uere in pontum intrant ad dulciora pabula, æstatemque ibi producant. Incrementum hamia singulis diebus intelligitur. os hamia angustum, sicut & mugili. Dentes habet serratos, spissos, præacutos & ualidos, branchias occultas. Fel suo intestino pari processu annexum continet, sæpe etiam replicatum. gregalis est & carniuora: magna etenim ex parte carne uescitur: sed algam etiam tangit nonnunquam. Ad ostia fluuiorum uersatur, & in paludibus maritimis, ubi opia insitit dulcis aquæ. Subit in fluuios, ibique prospere degit, sicuti & mugilis. Hamias etiam in Alopeconneſſo reperies, inquit Aristoteles. Audaces sunt hamia, dentibusque plurimum fidunt: quippe quæ cum sint thynnus imbecilliores, corporeque molliori ac reneloso: intrepide tamen cum alias beluas, tum uel delphinos præsertim solitarios & à suo grege oberrantes cateruatim aggrediuntur uulnerantque. Pugnatuæ, cum beluam uiderint aliquam, colligunt sese: deinde quæ cæteris magnitudine præstant, lustrantes gregem circunvallant. Dentes sunt his ualidi, ut diximus: & iam cum alia beluæ, tum lamia aggressa, uulnera accepisse uisa est. Piscatoris lineam, si forte hamo teneatur, perrodit hamia: escam autem in primis ex ipsa multi pisces expetunt. Philotimus hamia carnem duram esse prodidit: & id quidem rectè factum cõfirmat Galenus: uerum Icelius teneram esse, bonique succi, sed modice nutrire. Autumno & circa uergiliarum occasum optimas esse hamias Archeſtratus author est. Troctæ (inquit Ælianus) dentes habet frequentes & continentes: quibus quicquid incidit, perfringere potest. Hamo captus solus ex piscibus non se hamo retrahit: sed impellit se in ferrum, lineam consumere cupiens. Pi-

Minor, tenuiorue, Aristoteles.
Lacertus.
Scombrus.
Colias.

Parium, uel Parium, forsitan.
Lacertus.

Phœnix.
Hamia, aquila.

Hamiarum pugnam cum delphino legas apud Oppianum.

Troctæ.
An idem sit piscis cū hamia, an cerue similis?

DE DIFFERENTIIS

scatores contra machinantur longas anfas: ille uero quoniam quodammodo ualeat saltu, anfas sepe transilit, ac linea concisa, ad alios pisces reuertitur. Hic etiam sui generis grege coacto, delphinum inuadit: adeoque urgent ij, ut uiuum illum lacerent. Delcanum piscem tradit Euthydemus à Delcone amne nominatum, (in quo & capitur) sale conditum, uentriculo esse gratissimum. Dorion uero eundem piscem à nonnullis *λεπίπτις λεϊσάντις* uocari scribit. Elacatena quoque salsamento idoneus piscis est, cetaceus, id est prægrandis. Et callibios sale conditur. aluum mouet, & attenuantem uim ob-

Delcanus.

λεπίπτις λεϊσάντις
Elacatena.
Callibios.

1 Mauritania, &c. Et Scombraria insula dicta est apud Strabonem à scombris, qui circa eam capiuntur. 2 Sulphureus color qualis sit, explicat ipse Plinius lib. 35. Fulmina & fulgura sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. 3 *Comedian* Theodorus non recte, ut inquit Hermolaus, monedulam uertit. 4 Lineas quasdam habet depictas. *καλιόζευκτος*, ita legitur apud Athenzum, sed aliter legi potest. *καλιόζευκτος* à *βόλ*, καλιόζευκτος καλίας: ut intelligatur βόλ dorso, καλίας in aluo picturas gerere. Hæc Hermolaus. 5 Sexitanus, à Sexi in Betica, ex Strabone, Plinio & aliis fere omnibus: urbem etiam quãdam esse Sexitaniam non longe à Carthagine noua (unde salsamenta nomen traxere) prodit Athenzus ex Strabone. 6 Lacertorum generis meminit Plinius: & à Celso lacertus in re grauissimi alimenti pisces celsatur: ex quo & salsamentum fieri prodidit. Videtur ex Plinio lacertus genus esse, & in his colian esse minimum. Icesius scombrum colia minorem affirmat. Theodorus *λακέρ* lacertum uertit. *σαῦρος* Aristoreli piscis est gregalis: carnem habet duritiæ mollitiæque mediocrem, ut Galenus auctor est. in litoribus cœnosis uiscitat, & in saxorum cauernis. Est & *γενοῖς* piscis similis belonæ & cestræ, auctor Pseusippus. 7 *ἡμίπτερος ἡμίλιος* G. 8 Est & *λεϊσάντις* piscis apud Athenzum: sed an idem, an alius? 9 *ἡλακατάντις*. Festus elacatenem salsamenti genus arbitratr, quod melandryum uocatur. 10 Spectus hic uidetur Athenzi codex.

Monedula.

Salsamita Sexitana.

σαῦρος.

γενοῖς.

λεϊσάντις.

ἡλακατάντις.

Elacatene.

De prægrandibus aliis quibusdam piscibus, quorū nonnullos etiam *κατιδόντες*, id est cetaceos uocant quidā. Cap. CLXXXIX.

xiphias, ἰσιφίης

Cetorum magnitudinem habet xiphias pelagius piscis, raroque litus cadiens. In mari Tyrrheno xiphia nauicularū magnitudinem æquant: quorum, dum natant, tertia fere corporis pars supra mare eminens fertur, ut Strabo auctor est. Rostrum habet mucronatū & rigidum adeo, (ut scribit Oppianus) ut possit durum quauis confringere saxum: & à quo naues perfossæ merguntur in oceano ad locum Mauritaniam, qui Corta uocetur, non procul à Lyxo flumine, ut Trebius Niger auctor est. Rostrum hoc, ut inquit Aristoteles, partem habet inferiorem parua, superiorem magnā, reliquo corpori longitudine æqualē, ossēam: hoc & *ἰσιφίης* uocatur, id est gladius. Piscis edentulus est. branchias habet octonas, easque duplices, fel à icore semotum. Agitantur xiphia asilo circa canis exortum: habent enim per id tempus sub pinna ceu uermiculum, quē *ασίλος*, id est asilum uocant, ut de thynno supra diximus. Infestat hic tāto dolore xiphian, ut interdum in terrā exiliat xiphias, & uel in nauigia sæpenumero incidat. Galeos quoque uocatur xiphias & *θεῖνος*. thynnorum uenatione pinguescit. Verum & alios persequitur pisces galeos, sed pastinacam præcipue. Tomum thurianum aliqui xiphian uocant, inquit Plinius: ut uero Athenæo placet, thurianum

πίσιος.
Gladius.

Galeos, θαλάσιος.
Θεῖμος.
Tomus thurianus.

num

A num uocatur, caniculæ marinæ frustum. In frustra secatur xiphias, carnem habet aridam, concoquitur difficulter: sed plurimum nutrit, sicuti & ceteri grandiores pisces omnes, ut inquit Mnesitheus, qui à quibusdam (quod in frustra secari solcant) *τρυμι* uocantur, ab alijs pelagij: sunt enim id genus omnes concoctu difficiles: qui tamen, si recte conficiantur, plurimum exhibent nutrimenti. In cibû sinapi conditur xiphias: est enim sapore ingrato, uiroso: eius abdomen ceteris partibus præfertur. Marinus grus Corinthiaci maris alumnus ad quindecim pedum magnitudinem crescit. Eius caput & os alitis gruis similitudinem gerit. Squamæ gentilis auis ei similes sunt. Tanto in saliendo robore est, ut tanquam emissum à contento neruo telum feratur. In maximo Caspiæ lacu oxyrynchi ab acumine rostri nûc

τρυμι λέγεται,
Pelagij pisces.
Grus marinus

B pati, magnitudine octo cubitorum procreantur. Eos Caspij captos distrachunt: & muria conditos atque exsiccatos uendunt: simul etiam adipe detracto, farinas ex eis conficiunt, atque exempta ex iis uiscera excoquunt: unde ad permultos usus accommodatum fit glutinum, quod & firmissime adhæret atque conglutinat, ut difficilimè dissoluatur. Oxyrynchus Nili alumnus ex acumine rostri nomen trahens, illius uenerationem & religionem habet: ut piscatores ualde timeant, ne quâdo is piscis apud eos sacer & magna religione præditus capiatur. Oxyrynchus quæ mare rubrum profert, ore est prælongo, oculis ad similitudinem auri fulgentibus. eius dorso signa pallore insignita sunt. Pinnae priores illi nigrae existunt: quæ uero sunt in dorso, albæ, cauda proluxa & uiridis, quam mediam aureola linea intersecat.

Oxyrynchus

C Ichthyocolla appellatur piscis cetaceus, cui glutinosum est coriû idemque nomen glutino eius: quidam uero ex uentre non ex corio fieri dicunt. Laudatur Pontica, candida, minime scabra, carens uenis squamisq;, quæ celerime liquefit. Epiniætidæ rollit: emplastris capitis utilis, & iis quæ ad lepras apponuntur, & tetanorthis, quæ curem faciei erugant & extendunt. Silurus quoque in falfameta uenit, piscis amni ac mari communis, sed maxima ex parte fluuiatilis. In Nilo thynni magnitudinem æquat: quâquam

Ichthyocolla,
Quoniam modo
liquefit ac parari
debet dicitur
Plin. hoc loco.

Silurus.

alibi quoque quàm in Nilo natus. Silurus grassatur, inquit Plinius, ubicumque est, omne animal appetens, equos innatantes sæpe demergens: præcipue in Mæno Germaniæ amne, & in Danubio. Mari extrahitur porculo marino similimus. Et in Boristhene memoratur præcipua magnitudo, nullis ossibus spinisue interstitis, carne prædulci. De siluro ita cecinit Aufonius,

In Mæno, alij
leguntur Rhe-
no, uel in Aeno

Nunc pecus æquorum celebrare magna silure.

Quem uelut Actæo perductum tergora oliuo

Amnicolam delphina reor. Et sequitur,

Talis Atlantico quondam balena profundo

Cum uento motuæ suo telluris ad oras

Pellitur, exclusum fundit mare, magnâque surgunt

Æquora: uicinique timent decrescere montes.

Hic tamen hic nostræ mitis balena Mosellæ

Exitio procul est, magnâque honor additus amni.

Qui silurus à Plinio, glanis ab Aristotele dictus est. Glanis branchias habet GL

DE DIFFERENTIIS

utrinque quaternas, easque duplices, nouissima excepta. fel continet iecori E
annexum. Cum parit, continentem emittit suum foetum, continuoque fi-
lo sibi cohaerente, ut rana. Pariunt glanes grandiores altiore gurgite, qui-
ppe cum nonnulli sex pedum altitudine pariant, minores breuiore contenti
sunt uado: praecipue ad radices salicis aut cuiusuis arboris, atque etiam inter
arundines & algas muscosamue congeriem. Cum cetera foemina in triduo
excludunt, si mas attigit: tardissimum tamen glaneos incrementum ex ouo
est. Quamobrem mas quo in loco plurimus foetus constiterit, perseuerans 7
oua custodit, ne a piscibus occurrentibus absumatur: idque uel ad quadra-
gesimum & quinquagesimum diem facit. donec satis iam aucta soboles se-
tueri a ceteris piscibus ualeat. Deprehenditur saepe a piscatoribus, ubi oua
custodit: dum enim arcet pisciculos quatiendo prosiliendoque, ictum so-
numque mouet. Manet apud oua tam ardente animo, ut cum saepe a piscatori-
bus oua, quae praetis gurgitibus subsidunt, educatur quoad magis fieri po-
test in uadum, ipse tamen eodem studio sequatur: neque desistere usquam
patitur. Et tunc quidem si minor natu sit, minusque usu exercitatus (ut non-
nunquam accidere solet) facile hamo capitur: sed si peritus & hamis assue-
tus est, morsu dencis sui durissimi rumpit hamum & foetum assidue custo- 8
dit: uel ut Plinius refert, qui glanis uocatur auersos mordet hamos, nec de-
uorat, sed esca spoliatur. Cum ceteri pisces omnes mares suis foeminis sint pre-
stantiores, glanis foemina praestat suo mari: damnatur tamen, cum uterum
gerit. Canis exortu potissimu (quod sublimis natet) syderatur glanis: & to-
nitruo sopitur magno. A dracone angue, gurgite parum alto ictus nonnu-
quam interit. Silurus si recens edatur, probe nutrit: & aluum emollit silu- 9
rus e iure: sale uero conditus, minimum suppeditat alimentum. Arteriam ex-
purgat, & uocem adiuuat reces salitue in cibo. Infixa corpori spicula ex-
trahit salici caro trita atque imposita: uel, ut Plinius habet, siluri fluuiatil-
lis carnes impositae siue recentes siue salae, tela corpori inharentia extrahunt.
Muria eius incipientibus dysenteris prodest, si in ea insidentes foueantur:
fluxiones namque ad externas partes euocat. ischiadicis infusa medetur. Vel,
ut tradit Plinius, ischiadicos liberant fassamenta ex siluro infusa, clystere e
uacuata prius aluo. Siluri suffitu, praecipue Africi faciliores partus fieri di-
cuntur. Glanidi qui in Danubio gignitur, similis est piscis latus nomine:
Ex hoc genere, qui in Nilo fluuiio proueniunt, ea magnitudine inueniun- H
tur, ut ducentarum librarum pondus impleant. Piscis est carne & candidis-
sima pariter & laucissima, quocumque appareat modo. Prastantissimum 10
esse in Italia latum circa traiectionem Scyllae, tradidit Arcestratus. An-
taceum piscem grandem (cete Herodotus uocat) in fassamenta praebet Bo-
rithenes fluuius, delphini magnitudine, nullis ossibus spinisue interstitis.
Corio (uti aiunt) adeo aspero tegitur, ut eo perpoliantur hastae. Scorsum
condiuntur sale maxillae & quae circa palatum sunt antaceorum partes, ut
quae aliis partibus suauitate praesent: sicuti ex orcyo quae elidia dicuntur
& melandryae. Antacei in glacie concreti nonnunquam effodiuntur, ut
Strabo auctor est.

Hoc de siluro

Plinius.

Syderatur a
spiculis in-
tra.

Sopitur cap-
tuo.

Silurus.

R. 11.

etui, Ant.

Antaceus.

Antaceus.

In istro quoque;

gigni anta-

ceum prode

AElianus.

DE DIFFERENTIIS

Lubricus, & dubiæ facturus fercula cœnæ
Tempora longarum fers incorrupte morarum:
Præsignis maculis capitis: cui prodiga nutat
Aluus, opimatôque fluens abdomine uenter.

Et quoniam in Mosellanos Ausonij poetæ pisces incidimus, age uero, quæ
de aliis quibusdam fluuiatilibus cecinerit, uideamus,

Capito. Squameus herbas capito interlucet arenas
Viscere præteneris fartim congestus aristas,
Nec duraturus post bina trihoria mensis:
Salar. Purpureis que salar stellatus tergora guttis.
Rhedo. Et nullo spinæ nociturus acumine rhedo.
Barbus. Túque per obliqui fauces uexate satani,
Cum defluxisti samæ melioris in amnem
Liberior, laxos exerceas barbe natatus:
Tu melior peiore aucto: tibi contigit omni
Spirantum ex numero non illaudata senectus.

Lucius. Hic etiam Latio risus prænomine cultor
Stagnorum, querulis uis infestissima ranis,
Lucius obscuras ulua cœnôque lacunas
Obsidet. hic nullo mensarum lectus ad usus
Feruet fumosis olido nitore popinis.

Tinca. Quis non & uirides uolgi solatia tincas
Alburnus. Norit? & alburnos prædam puerilibus hamis?
sario. Téque inter species geminas neutrumque & utrunque,
Qui nec dum salmo, nec iam salar, ambiguusque
Amborum medio sario intercepte sub aucto.

Hæc Ausonius.

Cyprinus. Et fluuiatilis & lacustris cyprinus est, ut Dorian auctor est: qui & cypria-
Cyprianus. num hunc piscem appellauit, sicuti Oppianus cyperium. Gregalis est, squa-
Cyperinus. mosus & carniuor: in arenosis locis uiçtat. Brachias habet utrinque: qua-
ternas, easque duplices nouissima excepta: palatum illi carnosum admo-
dum est & molle, ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur: Cypri-
Plinius, sexies. ni quinquies aut sexies anno partum faciunt. Vada petunt cum parturiunt:
Oppian, quin- ac sæpenumero singulas scæminas, mares tredecim aut quatuordecim se-
quies. quuntur. Mox scæmina oua procedendo emittit, & mutans continue parit: H
quo fit ut dissipari oua necesse sit, uidelicet ea quæ non in materiam incide-
Cyprinus (opi- rint aliquam: sed cyprinus tunc ea custodit, cum congesta repererit. Post
nor) mas. glanim tardissime augentur cyprinorum oua: augentur tamen quæ ma-
res custodiunt ad milij magnitudinem: sopitur quædoque cyprinus toni-
truo magno ut glanis, sed leuius. Inter amnicos pisces, steriles annotantur
Carini. carini & balagri, qui nec ouum nec semen ullum prolificum unquam ha-
Balagri. beant. Balero & tilloni lumbricus canis exortu innascitur, qui debilitat co-
Baleros. gitque ad summam aquam efferri, qua æstu intereunt. Phoxini inter fluuia-
Tillo. tiles pariunt, ut percæ in arüdinetis, in fluuiorû & lacuum paludibus, quas
Phoxinus. *πλοξινίδες* uocant, quæ scilicet prope fluuios aut lacus stagnant. Phoxinus

uero

Auero statim fere ut natus est, & admodū paruus, adhuc oua habet: ut liqui-
do appareat oua illi inesse uel absque coitu. *τίλαρα* fullonem uocant. grega-
lis hic est: & partus tempore petit litora tranquilliora. Sunt in fluuiis pisci-
culi quos *βοίτες* appellant. hi sub faxis stabulantur. Capiuntur autem à non-
nullis saxo percussio sub aqua latent: protinus enim exturbantur, ut qui au-
diant, & caput per strepitum tententur. Piscem thymalum à thymi odo-
re sic nuncupatum Ticius fluuius Italiae procreat. is ad cubiti magnitudi-
nem accedit: lupi & mugilis mediam speciei similitudinēque gerit. Eius
capiti nō qualis ceteris piscibus odor est: sed thymo similem recens colle-
cto odorem reddit. Non alia fere esca quàm culice, illa quae homini nocte
dicque infesta est, capitur: ut qua sola fere delectatur.

1 Capito, &c. Cephalum interpretantur nonnulli capito nem, uerum rectēne an
B secus, nondum certum est. 2 Satio, aliàs fario, 3 Carini & balagni, &c. Ita legit
Theodorus: Graeca autem exemplaria habent, sed mendose, *καρχήνους καὶ βαγίτες*. 4
τίλαρα, &c. *τιμολίς* à Doriōne traditur piscis, è cuius decocto macula omnis sortē uē
cluitur: an idem? 5 *βοίτες*, &c. Cottum uocat hunc Theodorus, nomine fortitan
mutato *ἀπὸ τοῦ καὶ δέν*, qui Numenio apud Athenas, gobia saxatilis est. Ego uero arbi-
tror non esse eundem piscem *καὶ δέν* cum *βοίτες*, *κόψα* eriam sunt apud Athenas lib. 3.

De Niloticis piscibus, & aliis quibusdam ignotis. Cap. CXCI.

Pisces in Nilo Aegypti fluuii plurimi sunt ac diuersi: sed maxime noti
sunt, ut inquit Strabo, Oxyrynchus & Lepidotus (quos cōmuni omniū
consensu Aegyptij deorum loco colebant) Latus, Alabes, Coracinus, *χαίτες*,
Cid est porcus, Pharagorios, qui & Phagrus, Silurus, Thrissa, Mugil, *ἰσχυρίος*,
Dilichnus, Phya, Bos. Addūtur praeerea ab Athenas, *Μαῖρες*, *Μαῖρες*, id est
Torpedo, Simus, Synodontis, Elcorris, Anguilla, Abramis, Typhle, aliūq;
plurimi. His adiciemus quorūdam aquatiliū apud authores posita no-
mina, quorum differentiae insignes aut nullae aut paucae admodū reperiū-
tur, Alopecias. Aethus piscis castitate insignis, qui postea quàm cum pari
suo tanquam cum uxore quadam coniunctus sit, aliā non attingit. Aspar-
gi pisces marini, hyeme conualescunt & latent: uere progrediuntur ad pa-
scua. Basiliscus in faxis nudis uictitat, id est quae sine herba algae iacent,
Bæon, *Βαῖον*. Bogpyrus in scopulis uiuit: Cynodexia, Cynops, uel Cyno-
pus. Claria piscis litoralis, in locis cernosis degens. Etelis & Squamosus est,
D & oua parit. Eginus, gregalis est, Iapes, Liparis, Lamyus: Mendesius pi-
scis (ut uidetur) ad salsamenta idoneus, Marinus, Metys, Mythus, uel My-
stus: *Μύστος*, id est papauer, piscis marinus & gregalis. Ossophagi, aliās opso-
phagi in faxorum cauernis degunt. Phyea, Parus, Phytarus, Rhacinus, Pal-
lus. Scepanus in litoribus degit cernosis: Scepinus, quē Dorian Attagenum
uocauit. Scirris petrosus piscis, circa nuda saxa degens, Taulopias, Turpæ-
na, Thatis, Thessa, Teragus paruus, Vrena piscis, Vua. Vua marina, inquit
Plinius, in uino putrefacta, iis qui inde biberint, tædium uini affert.

1 Lepidotus, &c. Lepidion est: apud Athenas an idem, an alius? 2 Meores, *Μεῖρες*,
&c. In Ponto inueniuntur multi pisces, qui à Mæotide palude nomina sortiti sunt: ue-
rum hic mæotes Niloticus est: qui uti *Ælianus* refert, aduentantem Nilum praesentit,
arque praecurrendo praenuntiat.

*Luna.**Pisces fossiles.**A Theophrasto in lib. de piscib.**Pauones.**Cucumis.
Χαλκίς,
Orchis.*

DEMOSTRATUS piscem quandam formæ pulchritudine eximium dicit appellari lunam, exigua magnitudine, lata figura, colore cyaneo: in dorso pinnas habere molles & leues, eisdemque in natâdo explicare, & ad similitudinem lunæ semicirculum efficere: simul & ipsum cum est plena luna, tum impleri, tum implere. Nempe arbores, si ex his ullum appende-
 ris decreſcente luna, exſiccari atque interire: ac ſi ad plantas admoueris, eas
 marceſcere & euaneſcere. Si iam plena luna in id aquæ, quod in perſoſſis
 puteis reperitur, quis hunc piſcem iniecerit, aquam iugem & perennem fo-
 re: ſin extrema luna, aquam exareſcere. Quod ſi hunc eundem in fontem
 ſcaturiētem conieceris, quo modo diximus de puteo, is ad rationem lunæ,
 modo euaneſcet, modo implebitur. Phyſam Ægyptiū piſcem notionē ha-
 bere ferunt, quando luna augeatur & diminuat, cuiusque iecur cum luna
 pariter decreſcere pariterque augeri: corporisq; habitu modo eſſe opimo,
 modo gracili & tenui. In Fucino tantum lacu piſcis eſt, qui octonis pinnis
 natat. Piſcium genera etiamnum à Theophrasto mira produntur, circa Ba-
 bylonis irrigua decedētib; fluuiis, in cauernis aquas habentibus remane-
 re quosdam: inde exire ad pabula pinnulis gradientes, crebro caudæ motu:
 contrāque uenantes refugere in ſuas cauernas, & iis obuertos ſtare: capita
 eorum ranæ marinæ ſimilia, reliquas partes gobionum: branchias ut
 piſcibus. circa Heracleum, & Toronem, & Lycum amnem eſſe multa.
 In Pōto unum genus eſſe, quod extremas fluminum aquas ſectetur, ca-
 uernāsque ſibi faciat in terra, atque in iis uiuat, etiam reciprocis amnibus
 ſiccato litore: effodi ergo: motu demum corporum uiuere eos approbant.
 Circa Heracleam eandem eodēque Lyco amne decedēte, & circa Tium
 Ponti Mileſiorum coloniam, ouis relictis in limo generari piſces, eisdē-
 que effodi, qui ad pabula petenda palpitent exiguis branchiis. Eadē in Pon-
 ti regione apprehendi in glacie piſcium quosdam, maxime gobiones, non
 niſi patinarum calore uitalem motum fatentes. Idem tradit in Paphlago-
 nia effodi piſces gratiſſimos cibis, terrenos altis ſcrobibus, in iis locis ubi
 nulla reſtagnent aquæ: & uaria horū genera in terra deſoſſos reperiri, im-
 mobilēsque uiuere prodit Ariſtoteles. In Hyphaſide Indiæ flumine piſces
 eſſe narratur, pauones nomine: criſtiſ quibuldam cœruleis, ſquamis uerſi-
 coloribus, cauda aurea, in quancunque uoluerint partem uerſatili. In mari
 quoque piſcis cucumis eſt, in colore & odore cucumeri ſimilis. In Cyzice-
 na chalceus piſcis frequens eſt, orbiculari ſpecie. Qui orchis uocatur, rotū-
 dus eſt & ſine ſquamis, totūſque capite conſtat: durifſimum eſſe piſciū cō-
 ſtat. In mari rubro ſinu Arabico piſcem Leonides Bizātius gigni ait, gobio
 ætatis perfectæ magnitudine nihilo inferiorem, nullos oculos nullūque
 os habentem: more tamen piſcium branchias his innatas eſſe: capitis figu-
 ram, & ſi minus expreſſam, coniectari poſſe, infra imum uentrem formam
 quandam leuiter contractam in ſinum apparere, quæ ſmaragdi colorē red-
 dit: hoc ei oculorum loco & ouis eſſe idem ait. Captus cum primum eſt ex-
 tra aquam, inſatur. Et ſi quis etiam nunc uiuentem in mare uelit reiciere,
 ſupernatat

A supernatat more inflata: uero uescit: quocirca Leonides ait ab affectu phys^{Physalus.} salum appellatum esse. Hunc si quis gustauerit, statim acerrimis doloribus premitur: deinde eius uenter dirumpitur. Miracula quædam dira Ctesias in Armenia scribit esse fontem, ex quo nigros pisces illico mortem asserre ^{Pisces lethales.} in cibis: quod & circa Danubij exortum audiui, inquit Plinius, donec ueniatur ad fontem alueo appositum, ubi finitur id genus piscium. Hoc idem & in Lydia in stagno Nympharum tradunt. In Arcadia ad Phœneum aqua profluit è saxi styx appellata: & esse pisces paruos in ea tradit Theophrastus lethales & ipsos, quod non in alio genere mortiferorum fontium. In Africa feruentis aquæ lacus esse existimatur, in quo pisces & uiuere & natare dicuntur, & ad obiectum cibum assilire: ac si quis in frigidam eos iniicerit, interire. Hactenus de piscibus dixisse abunde est: sequitur ut de cetis præcipiamus.

De cetis.

Cap. CXCIIL

Inter aquatilia peculiaris quædam natura cetaceo generi est, ut delphin^{Cete, cetus, κῆτος.}o, balenæ, & quæcunque alia ex iis fistulam habent: cū & mare accipiāt quemadmodum pisces, pedibusque careant, & cibum in humore capiant: aërem uero spirant ut terrestria, ut quodammodo terrestria sint & aquatilia. Hoc genus neque pilis integitur aliorum more, quæ animal generant, neque pedes habet ullos. Branchias non habent cete, sed fistula iis data à natura est, qua humorem quem unà cum cibo recipiunt, eiicere possent, quemadmodum pisces per branchias emittunt: ea uero prope cerebrum sita est, delphinis quidem à dorso, balenis uero à fronte. Mammæ habent cete in aquatili genere & lac: id quod in delphinis manifeste à nonnullis perspectum est. Delphinus testes habet intus conditos, & qui ad aluum necluntur. Pulmonem habent omnia cetacea atque respirant: ideoque cū dormiunt, edita per summa æquoris fistula dormitant, (quæ etiā spirant) pinas suas mouendo leuiter. Et quidem uisus est delphinus dormire rostro emerso, ac stertere. Fel habent omnia, excepto uno delphino. Nullum ex iis oua habere cernitur, sed statim sætum concipiunt, ex quo redacto in formam animal constat, quemadmodum homo & quadrupes que animal pariunt. Cocundi modus omni cetario generi idē qui piscibus est: stipinis enim ad motus partibus rem peragunt: nec parum multumue temporis, sed mediocre in coitu ipso consumunt: & paulo quàm pisces diutius in coitu morantur. Cetacei, prope omnes, (quemadmodum pisces cartilaginei) tinniores pisces resupinati corripunt: habent enim os subter: unde fit, ut periculum minores pisces facilius possint euadere: alioqui pauci admodum seruantur: quippe cū delphini celeritas atque edendi facultas mira esse uideatur. Beluæ omnes marina, quæ ingenti sunt mole, (exceptis canibus) & tardius se mouent & uisu sunt hebetiore. Duram habent carnem cetacea omnia & excrementosam, præuque succi. Atque recens eorum caro, ni optime concoquatur, crudi succi plurimum in uenis congerit: senibusque cibis omnino inutilis habetur. Quamobrem ipsis sale cōditis fere in cibis

Ee iij

DE DIFFERENTIIS

utimur: ita enim fit, ut alimentum quod ex ipsis in corpus digeritur, & tenuius reddatur, concoctionique & sanguini generando accommodatius. Iuba in iis uoluminibus, quæ scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit cetos sexcentorum pedum longitudinis in flumen Arabiæ intrasse: pinguique eius negotiatores & omnium piscium adipe camelos perungere in eo litu, ut asilos ab his fegerent odore.

1 Prope cerebrum, πῶς τὸ ἰσμάφαιον: ita potius legendum censeo, quàm πῶς, id est ante cerebrum, ex ipso Aristotele de delphino, qui non à fronte, sed à dorso fistulâ gerit: quanquam lib. 4. de part. animalium, & de respirat. habetur non πῶς, sed πῶς τὸ ἰσμάφαιον, id est ante cerebrum.

De delphino & phocæna.

Cap. CXCIIL.

*Delphinus.
Delphin.
Delphiu.*

Mansuetudine, amore, celeritate, forma atque robore, non in hoc tantum cetaceo, sed in omni marino genere, reliqua facile superat delphinus: plurima enim narratur indicia morum placidorum ac mitium, & amoris quoque in pueros. Certum habet uocabulum, inquit Solinus, quo accepto, uocantibus sequuntur: nam proprie Simones nominantur: nomenque Simonis omnes miro modo agnoscunt, maluntque ita appellari. Hominis amicum animal delphinus, obuiam nauigijs uenit: alludit exultans, certat etiam, & quanuis plena præterit uela. Et, ut cecinit Ouidius,

Vndique dant saltus, multaque aspergine rotant.

Emerguntque iterum, redeuntque sub æquora rursus:

Inque chori ludunt speciem, lasciuæque iactant

Corpora: & acceptum patulis mare naribus efflant.

Velocissimum omnium animalium, nō solum marinorum delphinus, sed ocyor uolucres, acrior telos: ac nisi multum infra rostrum os illi foret medio pene in uentre, nullus piscium celeritatem eius euaderet. sed affert moram prouidentia naturæ: quia nisi resupini atque conuersi non corripunt. Certe est delphinus: neque branchias habet ut piscis, neque ouum, sed animal generat, & fistulam ad dorsum gerit. Dorsum illi repandum, rostrum simū. 3 In dorso cultellata inest penna, qua uel crocodilum interimit: uel, ut inquit Solinus, aculeatæ sunt spinæ dorsuales: cum ira subiacet, inhorrescunt: cum animi conquiescunt, quibusdam receptaculis operiuntur.

Falcata illi nouissima cauda est:

Qualia dimidiæ sinuantur cornua lunæ.

Delphinus, inquit Aristoteles, stridet, non mugit, μύζα.

Lingua, contra aquatiliū naturam, libera absolutaque & mobilis est, breuis atque lata, haud differens suillæ. Pro uoce gemitus humano similis: caret enim labris quibus uocis aliquem possit articulum afformare. Audit quidem, sed nullis cauernis quæ uicem præstent aurium. Voces hominū a quilonis flatu celerius haurit: contrā, aulstro spirante, auditus obstruitur. Et cum olfactus quoque nullam partem sensoriam habeant manifestam, tamen sagaciter odorantur delphini. Mammæ habet fœmina & lac, (animal enim concipit ilico & creat, ut modo diximus) quas continet non parte superiore, sed in ima aluo prope genitale: nec modo quadrupedum, papillas conspici

cuas

A cuas habet, sed uelut aluicolas quosdam humoris duos paulo in obliquum porrectos, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum sectantium parentem excipiat: idque iam à nonnullis manifeste perspectum est: neque tamen aliud animal, inquit Plinius, in cursu lambitur. Testes habet mas ultima conditos aluo prælongos, & penem à testiculis ad externa pertendentem, ut bos. Pulmonem habet delphinus & arteriâ: proindeque respirat, & nō nihil uocis, uti modo diximus, potest promouere. & dormiens rostrum fistulâmq; exerit supra mare, ut spiret. Et iam quidem delphinum stertentem etiam nonnulli audire: qua mobrem delphinus retibus apprehensus, breui tempore strangulatur, ut qui spirandi facultatem amiserit: & foris uero diutius uiuere potest mutiens & anhelans modo cæterorum spirantium. Delphinus inter ea, quæ mare excipiunt pulmonemque habent, unus felle priuatus est. Meatus seminarios eodem modo habet delphinus, quo pisces serpentisque. Non spinas ut pisces, sed ossa habet delphinus. Coeunt delphini ad motus supinis partibus, ut pisces: sed eorum coniunctio diuturnior est. Gestatur uterus decem mensibus. Partus ætate fit, nec alit ullo tempore alio: pariunt singulos magna ex parte, interdum tamen & binos. Adolefcit celerius proles delphini: quippe qui annis decem ad summam perueniat magnitudinem. Sola carne uelicitur delphinus. uiuit annis compluribus: cōstitit enim nonnullos uixisse annis uiginti quinque, alios etiam triginta: quod cognitum est præcisâ à piscatoribus cauda: ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis spatium scirent. Delphinus in Ponto magnus non est: quanquam extra ubi aliquantum processeris magni habentur. Abdunt tricenis diebus circa canis ortum, occultanturque incognito modo. Coniugati degunt delphini, *Alias, nec statim.* mares cum fœminis. Solent in terram erumpere incerta de causa: & statim tellure tacta moriuntur, multoque ocyus fistula obturata. Cum male se habere sentiat delphinus, simia marina remedio illi est. Cū delphinis pugnant hamæ. Hominē non expauescit ut alienum: nec tantum hominis amicum animal delphinus, uerum & mulcentur musica, gaudent cātibus tiliarum: ubicunq; symphonia est, gregibus aduentant. Circa Taprobanem autē duo delphinarum genera nasci feruntur: alterum ferum & inexplabili immani *NOVO* dade piscato ribus infestum: alterum natura mansuetum. Delphini trāquillo mari lasciuientes statum præfagiunt, ex qua ueniunt parte: iidem spargentes aquam turbato, tranquillitatem. Delphini & hippocampi cinis ex aqua illitus, lichenas & lepras tollit. exulcerationē sequi debet curatio, quæ perducit ad cicatricem. Quidam delphini iecur in fistili torrēt, donec pinguitudo similitudine olei fluat: ac perungūt. Februm circuitus tollit iecur delphini gustatū ante accessiones. Hydropicis medetur adeps delphini liquatus & cum uino potus: grauitati saporis occurritur tactis naribus unguento, aut odoribus, uel quoquo modo obturatis. Delphini adipe linamēta accensa, excitāt uulnæ strangulatu oppressas. Nascitur in Ponto phocæna delphino similis: sed interest, quod minor phocæna est, dorso ampliore, colore cæruleo. Partus quoque illi delphino similis: & lac habet ut delphi-

DE DIFFERENTIIS

nus: complures uero genus esse delphini opinantur. Delphinorum, inquit E Plinius, similitudinem habent, qui uocantur tursiones. distant & tristitia quidem aspectus: abest enim illa lasciuia: maxime tamen rostris canicularum maleficientia assimilati.

1 De delphini mansuetudine amoréque & affectibus id genus aliis legas apud Aristotelem, Plinium, Ælianū, Solinum & alios. 2 Hominis amicus &c. Delphini φιλῶντι multis exemplis exprimitur à Plinio. 3 Dorsum illi repandum. Ouidius, Corporéque & presso spinæ curuamine flecti Incipit. Et lati cictus sunt. 4 Tursiones. Phocznam Theodorus tursionem interpretatur.

De balena, orca & physetere.

Cap. CXC.V.

Cetus quoque balena est: & fistulam non à dorso, sed à fronte gerit, per quam humorem, quam ore acceperat, reddit: qua & summa aqua innatantes in sublime nimbos efflat. Balenæ musculus quandoque pragraui superciliorum pondere, obrutis eius oculis, infestitia magnitudinem uada prænatans demonstrat, oculorumque uice fungitur. Mammæ habet balena & lac: & mammis nutrit foetus, ut delphinus: & pulmone, n. idèoque & respirat: editaq; per summa æquoris fistula dormit, sicuti & cætera quæ fistulam gerunt: nonnūquam uero etiam desilit in terram, solem passura calentem. Parit balena cum plurimum binos, magnaque ex parte singulos. balenæ coagulo in lethargum uergentibus, ad olfactum utuntur. Balenæ in nostra maria penetrant, inquit Plinius. In Gaditāno oceano nō ante brumam conspici eas tradunt: condi autem ætatis temporibus in quodam sinu placido & capaci, mire gaudentes ibi parere. Hoc scire orcam infestam: his beluæ: cuius imago nulla representatione, inquit Plinius, exprimi possit alia, quàm carnis immensæ dentibus truculentæ. Et Festus, orca, inquit, teretes sunt atque uniformi specie irumpunt ergo in secreta, ac balenarum uitulos & foetas etiamnum grauidas lacerant morfu: incurfuq; seu liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, & pondere suo onerata, tunc quidem & utero graues, pariendū prænis inualidæ, solum auxilium nouere in altū profugere, & se toto defendere oceano. Contrà orca occurrere laborat, seseque opponere, & cautium angustis trucidare, in uada urgere, faxis illidere. Spectantur ea prælia seu mari ipso sibi irato, nullis in sinu uetis: fluctibus uero ad anhelitus ictusq; quantos nulli turbines uoluant. Ingentis magnitudinis orcam à Claudio principe in portū Ostiensis oppugnatam narrat Plinius. Maximum animal in Indico mari pistrix balena est: narrantur enim balenæ quaternū iuge ærum: pistrix ducentū cubitorum. In Gallico oceano maximum animal physeter est, columna inodo se attollens, altiorque nauium uelis, diluuiem quandam eructans, ut nimbofa illa alluuie plerunque deprimat alucos nauigantiū. Physeteres cum flatum efflant, (ut inquit Strabo) apparet longius intuituentibus nebulosæ cuiusdam columnæ similitudo. Tubarum sonitu, multiplici plausu, strepituque id genus ingenti terrentur maxime.

1 Orcam, &c. οὐρανός habet Strabo inter cetaceas: an idē sint eūm orcis, an sit liber mendosus?

Tursio.
Tursio.
Tursio.

Balena.
Φάλκη.
Μησουλός.

Orca.

Balenæ.

Orca.

Balena.
Pistrix.
Physeter.
Cetus.
Pegus.
Physeter.
Φυμτὴρ.

οὐρανός.

A mendosus? 2 Iugerum continet pedes ducentos quadraginta. 3 Pistrix, &c. Pristes Aristoteli & Oppiano cete est: idem forsitan qui pistrix. Et in Vergiliano illo, de Scylla monstro, (-Postrema immmani corpore pistrix.) In quibusdam exemplaribus habetur pristis: apud Oppianum habetur *πῆστις*, sed legendum arbitror *πρίστις*. 4 Phyceteres. *φύκαλοι* ab Oppiano inter cete numeratur: an idē qui *φωκίη*? *Φύκαλοι*.

De aliis quibusdam marinis beluis & monstrosis. Cap. CXCVI.

- 1 S Vnt & in mari beluæ, qui dromonēs uocantur: & qui melāchini, & seræ, materiariæ ferræ similitudinem gerentes. Sunt & effigie insolēti nō nullæ in Gaditano oceano, arbor intantū uastis dispanſa ramis, ut ex ea causa fretum nunquam intrasse credatur. Apparēt & rotæ appellatæ à similitudine, quaternis distinctæ radiis, modiolos earum oculis duobus utrinque claudentibus: adeo longis sunt hirsutæ spinis, ut hæ extra mare emineant. reuersiones in orbem faciunt, unde nomē traxere. Grassatur aries ut latro: & nunc grandium nauium in salo stantium occultatus umbra, si quē nandi uoluntas inuitet, expectat: nūc elato extra aquam capite, piscantiū cymbas speculatur, occultisque adnatans mergit. Sunt & alij piscium forma arietes in beluarum quoque numero. In Santonum litore beluas nōnunquā 2 reciprocan destituit oceanus, inter reliquas elephantos & arietes candore tantum cornibus assimilatis. Circa Corsicum & Sardoū fretum hybernant arietes, atque ex aqua eminentes spectantur: simul & delphini circa eos nant. Mas aries frontem alba uitta redimitam habet, diadematis in formā: at femina quemadmodum gallinacē, quasdam uelut barbæ appendiculas possident, sic ipsa cirros ex imo collo pendētes habet. In Indico mari exeunt in terram pecori similes beluæ, pastæque radices fruticum, remeāt: & quædam equorum, asinorum, taurorum capitibus, quæ depascuntur fata. Leo quoque in his & pāthera, atque hyæna longe ferociore, quā sunt terrestres feræ. Cornuta etiam marina belua attollit cornua è mari sesquipedalia fere, quæ ab his nomen traxit. Panthera in mari rubro nascitur, similis terrestri pantheræ, colore & maculis orbiculatis. Castoridas Oppianus 4 inter cete recēset. uocem hæ querulam mœstāmq; in littore dicuntur edere: quam si forte audierit quispiam, mortem illi breui imminere prænuntiat. Tyberio principi nūtiavit Olyssiponēsiū legatio, ob id missa, uisum auditumque in quodam specu concha canentem tritonē, qua nascitur forma: cui Vergilio autore,

Frōns hominem præfert, in piscem desinit aluus.

Narrat autem Pausanias se tritonem in spectaculis Romanis uidisse, cuius capitis coma, & colore, & quōd discriminarī non potuisset, ranarum palustrium similis uidebatur: reliquum corpus squamis tenuibus inhorrescebat: branchiæ sub aures, nasus humano similis, os amplum, dentes ferini, oculi glauci apparebant: manus habuit & digitos, unguēsque cochlearum testis non dissimiles: cauda eidem infra pectus & aluum, loco pedum 5 erat delphino similiter. Nereidum falsa opinio non est, squamis modo hispidi corpore, etiam qua humanam effigiem habent: nanque harum uua in Olyssiponēsiū spectata litore est: cuius morientis gannitum tristem

Dromones.
Melanithyni.
Serræ.
Arbor.
Rota.

Aries.

Elephantus.
Aries.

Belua marina,
equi, asini,
tauri.

Leo.
Panthera.
Hyæna.
Cornuta.
Castorides.
Triton.

Nereides.

DE DIFFERENTIIS. IIA

accolat audire longe. Et diuo Augusto legatus Gallie complures in litore E
exanimes Nereidas scripsit. In eo quoque, quod circa Taprobanam insulam
mare est, cete existere muliebri facie fertur: isque pro crinibus spinas esse.
Authores habeo, inquit Plinius, in equestri ordine splendentes: uisum ab
his in Gaditano oceano marinum hominem toto corpore absoluta simili-
tudine, ascendere nauigia nocturnis temporibus, statimque degrauari quas
infederat partes, & si diutius permaneat, etiam mergi. De differentiis ani-
malium habentium sanguinem, quas communes, quasue proprias singula
habent genera, dictum iam est.

*Homo mari-
nus.*

*Hunc inter be-
luas marinas
numerat Plin-
ius.*

*Dromas,
Cursor.*

ῥόκκος.

Ovis.

Pescus.

Κεῖφα.

1 Dromonem hunc Plinianum diuersum esse arbitramur à dromade Aristotelico,
quem Theodorus cursorē uocat: & gregalis piscis est: quanquā alio loco uidetur genus
quoddā pisciū significare potius, quam speciem. 2 Arietes. *ῥόκκος* hæc, id est oues F
uel petas (opinor) uocat Oppianus, qui in alto mari in latibulis fere degunt, locū ra-
ro mutantes. Arietis quoque meminit idem Oppianus, *ῥόκκος* uocat. 3 Elephātos
& arietes, &c. Ab his *ῥόκκος* *ῥόκκος*, id est salamentum elephātinum dictum arbi-
tror. 4 Tritonem. Nereidas & hominem quoque marinum, beluas marinas uo-
cat Plinius. 5 Nereidas fingunt poetæ Nerei & Dondis filias, quas hoc modo de-
pinxit Ouidius,

Quarum pars mare uidetur,
Pars in mole sedens uirides siccare capillos,
Pisce uehi quædam: facies non omnibus una:
Non diuersa tamen, qualem decet esse fororum.

DE ANIMALIUM DIFF- G FERENTIIS LIBER IX

Continet animalium exanguium differentias, & pri-
uatim insectorum.

De animalibus exanguibus.

Cap. CXC VII.



*ῥόκκος,
Exanguia.*

*Tria hæc ul-
tima genera, pi-
scium nomine
noscunt Plin.*

Onsummata iam disputatione de toto ani-
malium genere, quod sanguine præditū est,
quæ reliqua nobis pars superest, absoluaui.
Nunc igitur ordinem persequemur eorum, H
quæ sanguine carent: indeque *ῥόκκος*, id est
exanguia dicta sunt: continent enim hæc
non sanguinē, sed humorem alium qui san-
guini proportionē respondeat: qui in hoc a-
nimalium genere sit ultimum corporis ali-
mentum, sicuti sanguis in iis quæ sanguine
prædita sunt. Porro genera in hoc ordine plura sunt: primum genus inse-
ctorum est: secundum eorum quæ *μαλύνια*, id est mollia appellamus: tertium,
quæ crustis tenuibus operiuntur, *μυλινύσκη*, id est crustacea aut crustata di-
cta, ut cancrorum genus & locustarum: quartum, quæ silicea testa conclu-
sa

- A sa muniuntur, *ἐκ τῆς αἵμα* dicuntur: quale genus concharum & ostrearum est. Cum animalia quæque sanguinea partes tum interiores, tum exteriores suis quasque appellatas nominibus habeant, genus quod sanguine caret, pluribus uacat: iam enim uiscera quæ cuique sanguineo insunt omnia, nullum exangue quod habeat nouimus. Partes tamen ad uictum pertinentes omnia necessario habent, quanquam uarie, propter loca quibus cibum recipiant: communes enim omni animalium generi partes sunt, os, ueter, intestinum. Caput nonnullis indiscretum est, ut cancris & iis quæ mollia dicuntur: oculos habent maxima ex parte, exceptis testatis, omnia: linguam quoque & dentes, sed uarie, ut in unoquoque genere explicabimus. Horum etiam genus omne, quæ quidem pedibus fulciuntur, multipes est, nec ullum
- B fere quadrupes habetur: & cruscule omnia, exceptis extremis, à latere affiguntur: & partim sursum uersus flexum habent, partim uero retrorsum subleuata subtrorsum uergunt: medij namque pedes subinde ambigui sunt, (quod Græci *ποδὸς ἄρῃ* dicunt) atque amplius in latus flectuntur. At uero tum priora crura tum posteriora retro flectunt. Omnium uero motus per diametrum agitur, quomodo etiam subsistere solent. Neque sanguine (ut modo diximus) neque omnem uiscerum naturam ullum ex iis obtinet: nihil etiam eorum, quorum gratia uiscera habet animalia sanguine prædita, datum eiusmodi animalibus est: non enim uenas hæc habent, non uescicæ, non usum spirandi: sed tamē unum quod cordi proportionetur, id habeant necesse est. Hoc in mollibus quidē & crustatis ea pars est, quæ à nonnullis *μύτη* *Mutis*.
- C tise appellatur: in testatis minus quidem pater, attamen in medio semper querendum hoc principium est: insectis uero inter caput & uentris alueum est. Sanguis etiam quanquam iis deest, quod sanguinis tamen proportionale est: quodque eandem fere in genere exangui obtinet uim, quam sanguis in compote illo sanguinis, habet. Nullum ex iis quæ sanguine carent uel adipem habet uel seuum: quandoquidem sanguis iis deest. Osse carent exanguia omnia, sed neque spinam habent ut pisces: aliud tamē quod proportionale ossium est, & quod sua duritie molliorem corporis partem, hoc est, carnem seruare possit, habent: uerum hoc præsidium aliis intus est, aliis foris: nam quæ crusta operiuntur, ut cancri genusque omne locustarum, & quæ testata dicuntur, ut ostrea, his omnibus caro intus: terrenum autem illud quod contineat & conseruet, foris est. At uero animalia insecta & mollia contra quam hæc, & modo inter se opposito constant: nihil enim ossis, nihil terreni habere discretum uidentur, quod dignum effatu sit: sed mollia fere tota, carnosæ & tactui cedentia sunt, naturam inter neruum & carnem obtinentia: mollis enim ut caro est, sed intendi potest ut neruus. Habent etiam intus quod piscium spinis proportionetur, ut sepia: quod sepium uocant: lolligines quod gladiolus: at polypi nihil eiusmodi habent. Insecta contra quam hæc constant, ut modo diximus: quippe quæ nihil habet duri aut mollis discretum: sed dura toto corpore sunt, duritie tali, ut osse carnosiora, carne magis ossea terrenaque magis constent. Quæ sanguine uacant, animalibus non idem membrorum ad generationem pertinetium modus:

sed tum inter seipsa, tum etiam cum sanguineis dissident. Et plurima quidem coire aptum est: testacea uero an ulla coeant, incertum est. meatus autem sicci excrementi atque coitus omnibus quæ oua pariunt, idem ut in reliquis ouiparis habetur. Quin & interior ille meatus idem excrementi & uulvæ est, tum in mollibus, tum etiam crustaceis: exanguium enim quædam ita sexum habent utrunque, marem scilicet & feminam, ut sobolem eiusdem generis procreare possint: alia procreant quidem, sed non sui generis prolem: ut quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed per se uel in animalibus, uel in terra, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus, uel excrementis creantur: eademque maris ac femine sexu distincta sunt: coitibus gignitur quidem aliquid, sed ex quo nihil amplius gigni possit: uerbi gratia, coitu pediculorum, lendes dictæ procreantur: Pulicium genus uermiculorum oui speciem referens: ex quibus nec ea quæ generarint, proueniunt: nec aliud ullum animal, sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Quod autem in uniuersum dixerim, eorum alijs toto genere sexus uterque est, ut mollibus, ut crustatis: alijs maxima ex parte, ut generi insectorum. Eorum autem ipsorum quæ ex coitu cognatorum animalium gignuntur, ipsa quoque sibi cognata progenerant. At uero quæ non ex coitu, sed putri materia oriuntur, ea generant quidem, sed genus diuersum: quodque prodiit nec mas est nec femina, talia sunt nonnulla in genere insectorum. In exanguium genere, in iis quæ ex uermibus gignuntur contra euenit, quam quæ ex ouo, ut scilicet pars inferior maior inter initia sit dum generantur: oculi & caput postea augeantur. Quæ sanguine carent ex aquatilibus, nec naturalia calida sunt, ea nasci in lacu non possunt: minus etiam in falsis aquis quæ non sunt potulentiores, gignuntur, ut testata, ut mollia, ut crustata: sed stagnis marinis & iuxta amnium ostia gigni solent. Quod uero ad sensus attinet: quæ mollia sunt, & quæ crusta operiuntur, atque etiam insecta sensibus prædita esse omnibus constat: nam & uisu & olfactu & gustu: procul enim quandoque sentiunt, & odore escarum partim allectata capiuntur, partim uero odorem quorundam suffitu fugiunt, ut insecta quædam. Gustus etiam similis ratio est: interdum enim cibum persequuntur diuersum: nec eisdem saporibus omnia delectantur. Tactu uero sentire, (quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est: quæ autem siliceo tegmine operiuntur, olfactum gustumque habere constat, argumento escarum. De uisu & auditu, quanquam nihil certi manifestique habemus, quibusdam tamen hos sensus inesse apparet: unguis enim ad strepitum se subtrahere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admoueri. Pectines quoque admoto digito dehiscunt, mox comprimunt se ut cernentes: echini autem & testæ atque glandes olfactum minime habere uidentur. Et generatim quidē de exanguibus animalibus satis dictum est.

1 Minus etiam, &c. Ita Theodorus οὐκ ἔστιν ἀλμυρὸν ἐν τοῖς περριμα-θησὶν, ἀλλ' ἔστιν, πρὸ τοῦ ἰσχυρὰν εἶναι, &c. Vetus interpretis ita habet: neque erit aliquod animal in quo uincit salitudo in aqua dulci, nisi pauca, sicut duræ testæ, &c.

A De infectis. Cap. CXCVIII.

Est inter exanguia insectorum genus amplissimū, ut quod plures quam alia complectitur species. Insecta uoco, quæ (ut nomen ipsum declarat) incisuras parte sui uel supina uel prona, uel etiam utraque habent: nec osseum quicquam discretum aut carneum, sed quiddam inter hæc ipsa medium continent: quippe quæ corpore pariter intus forisque duro consistunt. Hoc genus multas & uarias complectitur species, ut modo diximus, quarum nonnullis quanuis cognatis, nomen nullum commune est inditum, cuiusmodi sunt apes, & reliqua similis formæ insecta: crabrones scilicet & uespæ eiusdemque generis alia quædam: item quibus pennæ uagina inclusa continentur, (καλυπτήσπιν uocant) ut galeuca, carabus, cantharis, & reliqua generis eiusdem. Sunt item alia ex his pennata, ut apes: alia pennis carent, sed pedibus gradiuntur, ut centipeda: alia utroque modo, ut formicæ: aliqua pennis & pedibus carētia, ut uermes terrestres. Omnium autē treis illas partes haberi constat, caput, uentris alucum, & quod inter hæc sitū est, quale in cæteris pectus dorsūque habetur: unum id quod interiacet magna ex parte est: quæ tamen sunt longa & multipeda, iis fere totidem sunt quæ interiacent, quorū incisuræ: quæ nunc ceruicum loco, nunc pectorum atque alui præcincta separant membra tenui modo fistula coherētia: aliquibus uero non tota incisura eas ambiente rugas, sed in aluo, uti diximus, aut superne tantum, implicatis flexilibus uertebreis. Oculi duri in omnibus fere patent, sed nullum ex his palpebrā habet. Ex cæteris uero partibus sensoris nulla manifesta est, præterquam lingua: olfactus tamen sensum ea habere perspicuum est. cibum nanque sibi peculiarem uel eminus odore sentiunt, ut apes & culices quas κίμεις uocant, mel. Sentiunt autē præcincti ipso (ὀσείσμεα uocant) odores: & natiuo quodam sui corporis spiritu, qui à natura insitus est, non aduentitius. Linguam habent, qua & gustant & cibum attrahunt: hæc in nonnullis mollis infirmaque est, aliis dura & ualida: omnia enim quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma gerunt. Nec dentes habēt quibus iuncta ea est, exceptis quibusdam paucis: nam & muscæ ea pertingentes cruorem mouent: & culices καίοντες dicti eodem acrius pungunt. Dentes autem quædam insecta habent, quanquam alienos, neque aliorum animalium dentibus similes, ut apum muscarūmq; genus: quædam non habent, eorum scilicet quæ cibo utuntur humido. Insectorum enim complura non uictus tantum, sed armorum gratia dentes possident. Quibus igitur non in ore est aculeus, hæc dentes habent, cibi scilicet aut conficiendi aut capiendi adinouendique gratia, ut formicæ, & id genus alia. Ad hæc antennæ, id est, cornicula ignaua nonnullis ante oculos prætenduntur, ut papilionibus & carabo: quæ autem in hoc genere, uolucrum fortuantur naturam, iis præter cætera membra, pennæ quædam membræ siccæ annexæ sunt, quibus uolant, quæ neque fissæ sunt neque caulem habent ueluti auium pennæ. Sunt autem aliis binæ, ut muscis, aliis quaternæ, utroque scilicet latere binæ, ut apibus. Quaternas gerunt, quæ aut grandiora sunt, aut aculeo in aluo armantur: quæ scilicet pabuli causa necessæ

Insecta,
Εἰσέμμεα.Vētris alucum
ἡ πῶδι τῶν
κεντρίων κίμεις.κίμεις
καίοντες
κεντρίωνAntenna.
Cornicula
ignaua.
Κόρνια

DE DIFFERENTIIS

habeant euagari, quæ & corpulentiam habent leuiorem, ut apes, & reliqua E
generis eiusdem. Binas uero habent quæ aut minora sunt, aut aculeum in
priori parte gerunt, ex iis scilicet quæ pabuli causa uagantur, ut musca, ta-
banus, culex: quæ autem parua sunt & uitam stabilem agunt, multis quidẽ
fulciuntur pennis ut apes, sed crusta pennas obtektas gerunt, uelut melo-
lontha, & cætera id genus insecta, scilicet ut pennarũ uires integras tuean-
tur. Ex uolucris itaque ipsi alia membranas ipsas quibus uolant, crusta
(quam ἰλυσον uocant Græci) superueniente quali uagina inclusas gerunt:
unde & κελεύπινες, id est uaginipennes dicuntur, ut scarabeus: alia detectas
habent, αἰδουσαι dicta, ut apes. uaginipennis illius ordinis nullum est, quod
aculeum habet: sed neque ulli aculeus in aluo cui pennæ binæ. Geritur ete-
nim aculeus aliis parte priore, aliis posteriore: aut enim ore aut aluo extre- F
ma aculeos habent pleraque insectorum: & uel intus conditos, ut apes &
uespæ, uel extra prominentes, ut scorpio: uropigium caudamue non habet
fere (præter unum scorpionem inquit Plinius) idque in causa est quod quæ
uolucres sunt, tanquam nauigium temone priuatum in uolatu agitentur,
& quocunque fors tulerit, impingant. Multipeda sunt omnia, quæ saltem
pedibus fulciuntur: uarie tamen pedum numerum sortiuntur: quæ enim cor-
pore sunt longiore & plures habent incisuras, ea numero præcipue superat,
ut iulorum genus: quibus autem pedes pauciores, hæc uolucres fere sunt, ut
pedum inopia adiumento pennarum compensetur. Pedes priores nonnul-
la ex iis longiores habent, quibus abstergant oculis incidentem molestiam
atque arceant: quod & muscas facere uidemus & apes, & reliqua generis G
eiusdem, quæ scilicet oculos habent duriores. Posteriores etiã mediis lon-
giores, ut ambulent melius, & attollantur facilius de terra cum uel auolare
uel salire libet: quæ nanque saliant, hæc uel crura posteriora habent maio-
ra, uel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulciuntur retro cur-
uatis, ut crura quadrupedum. Atque iis omnibus pedes seni, iis etiam quo-
rum nixu saliant connumeratis. Quæ hunc numerum pedum excessere, ut
plerique uermes, non infra duodenos habent: aliqua uero & centenos: nu-
merus quidem impar nulli est. Partes corporis pronæ in iis omnibus disse-
runt à supinis, sicut uel in cæteris animantibus est: cute omnia circumdantur,
sed admodum tenui. Partes insectorum exteriores has esse, atque in hunc
modum se habere constat.

ἰλυσον.
κελεύπινες,
Vaginipennes.
Αἰδουσαι.
Aculeus,
κλέυπινες.

Μαῖορα, uel
longiora uertit
Theodorus.

Γενναῖα, ἰλὺ-
πινες.

I Quæ in hoc genere uoluerum sortiuntur naturam, πῶς dicuntur, & ἰλὺ πινες
nonnunquam Aristoteli.

De partibus insectorum interioribus.

Cap. CXCIX.

QUod autem pro carne in his habetur, id nec testæ naturam imitatur
(ἰσχυρὰς dicunt) neque illi simile est, quod in testaceis genus carnis
continetur: sed mediam quandã inter hæc refert naturam: nihil
enim habent duri aut mollis discretum, uti diximus, sed dura toto corpore
sunt duritie tali, ut ossæ carnosiores, carne magis ossæ terrenæque magis cõ-
sistent. Quamobrem his non spinam, non os, non aliquid sepio simile, non
testam

ἰσχυρὰς
ἰσχυρὰς
ἰσχυρὰς

A testam ambientem, neque terrenum aliquod durum, quod iis proportionē respondeat, natura dedit: ipsum enim corpus se sua duritia tueri potest & seruare, nec est quod aliunde muniri desideret. Plinius hæc ita retulit, Insecta non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pingua, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam marina, nec quæ iure dicatur cutis, sed mediæ cuiusdam inter hæc omnia naturæ corpus, arcti simile, nervo mollius, in reliquis partibus siccius uerius quàm durius. Et hoc solum his est, nec præterea aliud: nihil intus, nisi admodum paucis, intestinum implicatum. Hæc Plinius. Partes autem quæ ad cibum administrant, non pari ratione datæ omnibus sunt: alia enim linguam intra os continent, ut formicæ: alia foris gerunt uelut promuscidem fungosam & cauam, ut ea simul & gustare & cibum trahere possint. Patet hoc in muscârũ

B genere & apum & omnium generis eiusdem: necnō asili & tabani eodem spectant: atque iis quidē lingua, siue promuscis pro aculeo habetur: omnia namque quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma gerunt. Linguam hanc in quibusdam excipit intestinum rectum simplex ad ostium usque extremēti porrectum: in quibusdam hoc retortum in anfractum est. Sunt etiam quæ uentrem ori adiunctum, intestinumque à uentre reuolutum habeant, ut quæ cum edatiora maioræque sint, conceptaculum cibi obtineant copiosioris. Viscus nullum in his, nullum pingue, sicut neque in cæteris quæ sanguine carent. Pars uero illa quæ cordi proportionē respondet, inter caput & alueum est: quæ etiam magna ex parte simplex est, tamē in nonnullis multiplex est, ut iulis & similibus prælongis: quo fit ut præcisa uiuere possint. Fæminis in hoc genere membrum quod pro uulua habetur, fissum iuxta intestina positum est, in quo fetus generatur. Patet hoc in locustis & reliquis quorum magnitudo aliqua est, & natura coitum recipiat: maxima enim pars generis insecti perexigua est: ideoque & eorum uteri incerti ignotiue propter corporis exiguitatem. Fæminæ inter ea quæ coeunt insecta, maxima ex parte maiores suis maribus euadunt, ut Phalangia.

1 Præcisa, &c. Insecti diuisi, inquit Aristoteles, uiuit cum pectore tum caput tum alueus: & sine eo caput auulsum uiuere non potest.

De insectorum generatione & interitu.

Cap. CC.

Procreantur insecta quædam per coitum & ex animalibus generis eiusdem, ut phalangia & aranei, ex phalangiis & araneis: ut bruci, locustæ, cicadæ. Sunt autem quæ coeunt quidem & generant, quædam etiam animal, uerum non sui generis animal, sed uermiculos tantum, ut muscæ & genera papilionum: neque eadem hæc ex animalibus procreantur, sed ex putrescente humido aut sicco: ut pulices, muscæ, cætharides. Quædam nec ex animalibus nascuntur neque coeunt: ut culices & uermiculi nonnulli, & plura eiusmodi genera, sed sponte proueniunt. Horum uero alia ex rore qui in frondibus est, uidelicet uerno tempore, ut natura fert, sæpe tamen & hyberno quoties tranquillum australeque tempus diutius constitit. Item alia ex cæno aut fimo putrescente oriuntur: alia in lignis aut stirpium aut cæsis:

DE DIFFERENTIIS

alia in animalium pilis, alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc in- E
tra animantem contentis, ut quæ lumbrici appellantur. quinetiâ in iis quæ
putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nouimus,
ut culicum genus quoddam ex fece aceti, & uermes in niue uetustiore: om-
nibus autem prope dixerim, quæ sponte procreantur, uel siccis humescē-
tibus, uel humidis sicciscentibus nascuntur. Insecta a uersa coeunt, deinde
id quod minus est superuenit maius, hoc est, mas fœminam (inter ea enim
quæ coeunt insecta, fœminæ maxima ex parte maiores suis maribus eua-
dunt, uti modo diximus) nec mas in fœminam genitale ullum inferere mē-
brum, more animalium cæterorum uidetur, sed fœminam sursum in ma-
rem meatum quandam reflectere conspectum in pluribus est, qui in non-
nullis maior quàm proportionē totius corporis esse uidetur, cum ipsa par- F
ua admodum sit: sed sunt etiam in quibus minor existit. Planum hoc fuerit
si muscas coitu uenero copulatas diuiseris. Tardo etiam quæ coiuerint se-
iunguntur digressu: diu nanque copulatio eorum durat, quod in iis quæ in
nostro conspectu uersantur facile patet: uerbi causa, in muscis & scarabeis,
phalangiis & si quid eius generis coire solet. Insecta hyberno tempore co-
eunt, & serenis austrinisque diebus nascuntur ea quæ se abdere non solent
ut muscæ, formicæ: breui à coitu pariunt maxima sui parte quæ solēt coire.
uermem autem omnia faciūt, excepto genere quodam papilionum, quod
durum quiddā simile cartamo, id est cnicī semini producit, sed intus flui-
dum. E quibusdam qui ex coitu prognati sunt uermibus, neque ea quæ ge-
nerarint proueniūt animalia, sed nec aliud ullum animal: sed id quod sunt G
sordes tantum persistūt, ut pulicum & pediculorum fœtus: è uermibus ue-
ro ipsis ex quibus gignitur animal, non parte aliqua sicut ex ouis, animal
creatur, sed totus uermis accrescit, & particulatim discretus formatur in
speciem destinati animalis. Eadem uero gignēdi ratio omnium est quæ ex
uermibus ortum habent, siue ex coitu animalium uermes, siue sine coitu
prodiere. uerbi gratia: nascuntur papilioes ex erucis. Erucæ ex uirentibus
foliis, maximèque ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio:
mox uermiculi inde contrahuntur: aucti deinde intra triduum, erucę par-
uæ afformantur: postea uero auctæ motu cessant, suæque forma immutan-
tur, appellantur que tãtis per chrysalides, quasi aurelias dixeris, & duro in-
rectæ putamine sunt: ad tactum autem immobiles araneosis quibusdā ob-
ductę (quę etenim ex erucarum numero è uermibus gignuntur, aranea in-
uolutæ magna ex parte principio exeunt) nō os, nō aliud ex membris quod
conspicuum sit, possident. Vermium uero ipsorum alij hoc intra se habent
unde incrementum ipsis nutriendis accedat, ut uermes, apum & uespārū:
alij de foris capiunt, ut erucæ & cæterorum nonnulli uermium. Itaque pri-
mum dū erucæ sunt, cibo alitur atque excrementum emittunt: at uero cum
in aurelias dictas transierint, nihil uel gustant uel excernunt. Longo post
tempore, putamine obrupto euolant inde animalia pennigera, quos papi-
liones uocamus. Omne autem hoc uermiculi genus, ubi suæ magnitudi-
nis finem receperit, cum scilicet aurelia appellatur, quasi ouum efficitur, &
oui

*De quibusdam
Aurelia.*

Papilio.

Aoui obtinet facultatem: indurefcit enim putamen eorum, & tantisper immota redduntur: quod etiam in uermiculis apum & uesprium nō fecus atque in crucis apertum est: & in cæteris quoque omnibus quæ non coitu generantur, uel in lanis uel aliis huiusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post uermis naturam, motu cessant, & putamine obarescunt: mox rupto putamine exit ueluti ex ouo animal, tertia mutatione finem accipiens generationis, idque pennatum magna ex parte est: colorem uero à sua eruca trahunt quæcunque ex erucis orta sunt. Hæc eadem gignendi ratio (ut dixi) cæterorum etiam est quæ ex uermibus consistunt, ut apum, uesprium & crabronū, scarabeorum atque aliorum id genus omnium. Eorum quæ ex uermibus gignuntur contrā quā eorum quæ ex ouis, pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augentur. Tempus generationis insectorum à principio ad finē usq; maximæ fere parti septenariis ternis describitur aut quaternis. Culicum & uermiformis generis parti plurimæ, ter septeni dies attributi sunt: iis uero quæ sui generis animal procreant quater septeni magna ex parte: septem ex iis ab initu, concretio uermis & consummatio uendicat sibi: reliquis tribus septenis incubant atque excludunt, ea scilicet quæ suo procreant sortu ut araneus, aut id genus aliud: mutationis uero & transitus in figuras alias, trinis aut quadrinis diebus, parti maximæ peraguntur, sicuti in morbis quoque dies decretorius euenit. Talis insectorum generatio est. Pereunt striatis contortisque membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur, quæ pennata ex iis sunt, pen-
Cnis etiam contractis autumno fere moriuntur: tabani quidem uel aqua intercute oculorum cæci intereunt.

De uictu insectorum, uoce, ualitudineque & aliis quibusdam affectibus.

Cap. CCI.

Insecta animalia quibus dentes omniuora sunt: quibus autem lingua tantum, humore undique eliquando sua lingua uescuntur: quorū alia etiam omniuora sunt, quibus scilicet gustus omnium saporum est, ut muscæ: alia sanguiuora, ut tabani, asili: alia succis plantarum & fructuum uiuunt. Apis una nullis putidis assidet, nec utitur alio cibo quā dulci. Formicæ nihil uenantur, sed ab aliis iam parata colligunt. Aranei nihil conficiunt neque recondunt, sed cibum solo uenatu sibi acquirunt. Apes nihil uenantur, sed ipse sibi cibaria faciunt atque recondunt: mel enim cibus earum est. Insecta humorem, non potus, sed cibi gratia assument. Omne insectorum genus minimo alimento contentum est, & prope sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate quā frigiditate, uti Aristoteli placet. Insectis animalibus neque uocis, neque locutionis ulla facultas, sed sonus tantū iis spiritu interiore mouetur, non exteriore: nullum enim ex iis spirat: omnia uero in eo genere membrana septo cincturæ: qua incisura est subdita, sonant attritu spiritus interioris. Insecta pene omnia hyeme conduntur, præter ea quæ uitam in domiciliis cum hominibus agant: quæque prius intereant quā annum tempus excedant. Latent hæc hyeme, alia diutius, alia quādiu al-

DE DIFFERENTIIS

gor uehemens est, ut apes. Conduntur autem quæque locis apricis abdita, E & ubi sibi cubile constituere tutius solent. Senectutem etiam exuunt insecta quædam, ut silpha, & ea quorum pennæ uagina continentur, ut Scarabæi. Et omnia quidem ubi iam factum est quod gigni debuerit, exuunt, ut iam dictum est. Nam ut partui ouiparo cortex, sic uermiculariæ proli operculum circumrumpitur, æque & apibus & locustis & aliis nonnullis. Insectorum maxima pars eo tempore ualet quo gigni solet, uidelicet cum annus humidus & tepidus est. Intereunt omnia insecta tacta ex oleo: sed celerime si capite illito exponantur soli. Conglomerantur ex iis nonnulla ut sese tuto inflexu seruare possint: quæcunque scilicet prolixo corpore sunt. Quæ autem glomerari nequeant, contrahunt se in incisuras, quod patet cum cinguntur, uelut ea quæ canthari uocantur: ubi enim metuerint, motu cessant, F totoque corpore indurescunt.

De insectorum generibus, quæ fauos sibi extruant, ut de apibus,
atque id genus aliis. Cap. CCII.

Insectorum genus quoddam est nomine adhuc uacans quo uno comprehendatur, sed formam suarum partium cognatam omnium referens, uidelicet ea quæ fauos faciunt, ut apes & reliqua similis formæ insecta: quorum genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum: fuci qui inter apes degunt, uespæ, crabrones, & teuthredones: solitaria uerò reliqua tria, sirenis maior, sirenis minor, & quem bombylium uocant. Sed inter insecta omnia principatus apibus, & iure præcipua admiratio, solis G

Apis.
μέλισσα.

Apium genera.

Ducum genera.

Matres apum.
ματρίδες μέλισσων.

Reges apum.

ex eo genere hominum causa genitis, inquit Plinius. Mella contrahunt fucus cumque dulcissimum ac saluberrimum, fauos confingunt & ceras, reimpulbicam habent: concilia priuatim, ac duces gregatim: & quod maxime mirum sit, mores habent. Genera apum plura: optimum, quæ breues, uariæ, & in rotunditate compactiles sunt: secundum, quæ longæ & crabronibus uespisue similes: tertium, qui *φύσις*, id est fur nuncupatur: quartum, fucus: (nam & hæc inter apes numerantur.) Duo item principum regumue genera: alterum rufum fuluūque, (*κίβητις* Græci uocant) quod præstantius est, alterum nigrum magisque uarium. Duplo amplius hoc genus ape utili: & pars à præcincto inferior longitudine proportionem habet sesquialteram: uocanturque à nonnullis matres apum, utpote originis authores. Aculeum FI

apes possident, fuci eo carent, reges ducisque habent, sed non utuntur: quocirca eos carere aculeo nonnulli existimant. Hæc Aristoteles. Tria ducum genera fecere quidam, ut refert M. Varro, nigrum, rubrum & uarium. Menecrates duo statuit, nigrum & uarium: melior nigro uarius, ita ut expediat mellario cum duo sint eadem aluo, interficere nigrum, quem scit cum altero rege esse seditiosum, & corrumpere aluum. Sunt reges apum, ut Columella prodidit, maiores paulo & oblongi magis quam ceteræ apes, rectoribus cruribus, sed minus aniplis, pinnis pulchri coloris, & nitidi leuissimæ, ac sine pilo, sine spiculo, nisi quis forte pleniorē quasi capillum quē in uentre gerunt, aculeum putet, quo & ipso tamen ad nocendum non utuntur

A utuntur: quidam etiam infusci atque hirsuti repetiuntur, quorum pro habitu damnabis ingenium,

Nanque duæ regum facies, duo corpora, plenis

Alter erit maculis auro squalentibus ardens,

Et rutilis clarus squamis, insignis & ore.

Atque hic maxime probatur, qui est melior: nam deterior sordido sputo similis tam sœdus est,

-quàm puluere ab alto

Cum uenit, & sicco tetram spuit ore uiator. Et,

-Ille horridus alter

Desidia, latâmq; trahens inglorius aluum.

Regibus omaibus, inquit Plinius, forma semper egregia, & duplo quàm ceteris maior: pennæ breuiiores, crura recta, ingressus celsior: in fronte macula quodam diademate candicans: multum etiam nitore à uulgo defferunt.

Mira plebei circa eum obediētia: cum procedit, unâ est totum examen: circaque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur: & se quæque proximam cupit esse, & in officio conspici gaudet. Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit similis exhortanti, solus immunis. Procedit foras non nisi migraturo examine. Non unus in quoque examine dux tantummodo est, sed plures, ut Aristoteles author est: peritque examen, si duces uel non satis habeantur, uel plures quàm satis: distrahunt enim examen. Plinius uero, Reges, inquit, plures inchoāt ut ne desint: postea ex his soboles cum adulta esse cœpit, concordii suffragio tetertimos necant, ne distrahant agmina. Reges nunquam prodeunt solas, uel, ut pascantur, uel alia causa, nisi uniuerſa cum plebe, ut cum migratur: tunc enim reliquæ omnes circa ipsum glomerantur, uti modo diximus. Et ubicunque ille confedit, ibi cunctarum castra sunt. Et si cum pergunt, rex ipse forte aberrat, omnes inquirere odoratuque sagaci persequi ducem donec inueniāt, accepimus: gestari etiam eum à plebe, cum uolare non potest: & si perierit, omnes interire: uel si aliquandiu manserint, fauos quidē conficere, sed mel nullum: nec fieri posse, quin breui omnes pereant. Semp̄rque duce prehenso totum tenetur agmen, amisso dilabitur, migrantque ad alios. Esse utique sine rege non possunt: inuita autem interimunt eos cum plures fuere. Fuci magnitudine duces æmulantur, inquit Aristoteles: quod si aculeum quodque habent, duces utique essent: & Columella, Fucus, inquit, genus est ampliotis incrementi similitimum apis. Plinius quoque, Maiores sunt apibus fuci, & sine aculeo, uelut imperfectæ apes. Quamobrem cum ea sint magnitudine, alueis aliqua intertexunt nonnulli, quo apes subire possint: fuci autem ut grandiores nequeant. Manent fuci magna temporis parte in alueis: (neque enim hoc genus nisi uere conspiciatur:) cūmq; exeunt, efferrunt sese fusim in sublime gyroque uolitant, & quasi exercitium faciunt: quod ubi satis iam fecerint, redeunt domum & epulis petſuuntur. Gigni fucos seorsum dicitur, si dux uiuit: sed si obiit, in apum loculamentis oriri ex ipsis apibus, atque hos fieri animosiores: quocirca aculeatos uocari, quantum aculeo careant: animo nanque ferendi, non potestate hoc meruerunt.

*Alia, deter-
mos.*

*Fessum, inquit
Plinius, hume-
ris subleuant:
uoludius fatiga-
rū ex toto por-
tant.*

Fucus, xxq. 12.

*Aculeatos,
xxq. 12.*

DE DIFFERENTIIS

Fuci, inquit Aristoteles, nullum est inter apes munus, sed, ut ait Vergilius, E ignauum fucus pecus & immune, sine industria fauis assidens: nam neque alimenta congerit, & ab aliis inuenta consumit: uerum si pauci adsunt fuci, nonnihil præstant commodi: reddunt enim apes in opere sollicitiores. Sunt tamen qui fucos & per se fingere fauos eodem in aluco, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant: uerum mellificandi nullam habere facultatem: sed uesci tum eos, tum eorum pullos melle quod apes fecerint. Hæc fere Aristoteles: ueruntamen, ut Columella author est, ad procreationem sobolis cōferre aliquid hi fuci uidentur: insidentes seminibus, quibus apes figurantur. Itaque ad fouendam & educandam nouā prolem, familiarius admittuntur: exclusis deinde pullis extra tecta proturbantur. Et Plinius, Sunt autem fuci, inquit, sine aculeo imperfectæ apes, nouissimæque à fessis & iam emeritis inchoatæ, serotinus sortus, & quasi seruitia uerarum apum. Quamobrem imperant iis, primosque in opera expellunt, tardanteis sine clementia puniunt: neque in opere tantum, sed in fœtu quoque adiuuant eas, multum ad calorem conferente turba: certe quo maior fuerit multitudo, eò maior fiet examinum prouentus. Cum mella cœperint maturefcere, abigunt eos, multæ singulos aggressæ trucidant. Et si prouentus desperatur, tunc & fucos abigunt. Proprium furibus genus est

¶ Et, fur.

Fur, inquit Varro, qui uocatur ab aliis fucus, lato uertre.

Apes.

si aliqui existimauere, inter apes grandissimis, sed nigris, aluoque quàm apibus utilis ampliore, ita appellatis, quia furtim deuorent mella. Furis sicuti & fuci nullum est in apum opere munus, sed cæteris quibuscum uiuunt, iniuriam faciunt: nam fur ipse si quādo in alienos fauos surripere ingressum potuerit, adeo in satietatem repletur ut nequeat auolare, sed ante alucum uoluetetur. Itaque non impune semper hæc faciunt: nam deprehensi interdum à bonis apibus occiduntur, sicuti & fuci. Apes unicolores magis sunt quàm crabrones aut uespæ. Optimæ breues uariæque & in rotunditatem compactiles: deteriores longæ, crabronibus uespisue similes: etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Minores illæ officiosiores maioribus sunt: pennæ his detritæ, color nigricans, & quasi combustæ essent. At maiores nitidæ uenustæque sunt more otiosarum mulierum. Peripateticæ sectæ cōditor Aristoteles in iis libris quos de animalibus conscripsit, apum siue examinum genera complura demonstrat: earumque alias uastas sed glomerosas, eademque nigras & hirsutas alas habentes: alias minores quidem, sed æque rotundas & infusci coloris, horridique pili: alias magis exiguas, nec tam rotundas, sed obesas tamē & latas, coloris meliusculi: nonnullas minimas gracilesque & acuti alucei, ex aureolo uarias atque leues. Eiusque auctoritatem sequens Vergilius, maxime probat paruulas, oblongas, leues, nitidas,

Ardentes auro, & paribus lita corpora guttis,

moribus etiam placidis: nam quanto grandior apis, atque etiam rotundior, tanto peior: si uero & senior, maxime pessima est. Hæc Columella. Differunt inter se apes parentibus natæ urbanis, & quæ rustico montanoque uictu educatis prodierint: sunt enim syluestres horridiores aspectu, & iracundiores & minores, sed opere ac labore præstantiores. In Ponto sunt quædā albæ,

A alba, quæ bis in mense mella faciunt. Apud Themisciram circa Thermoodontem amnem apes tam in terra quàm in alveis faciunt fauos, qui parû admodum ceræ contineant, & mel crassius reddant. Fauus ipse levis atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis tēporibus tantû construunt: copia enim in eo tractu est hederæ, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiant. Ad Amysum urbem conuehitur à locis superioribus mel cādīdum, *Mel candidū.* crassūque maiorem in modum, quod apes faciūt in arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt, in quibus mel est, uermis nullus: uerum nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt.

1 Nanque duæ, &c. Ex Vergilio hæc: quanquam uidetur hic Columella nonnullas notas attribuerē regibus apum, quas Vergilius apibus ipsis. 2 Quasi combustæ, Theodorus dorsum repandum legi: sed nos hunc locum ita reddidimus tum ex Græca lectione, tum ex ueteri interprete consentientibus.

Ratio operis & uita apum.

Cap. CCIII.

Sed perquam uaria in earum operatione & uita, ratio est: apes enim fere cum alucum receperint mundum, primum fauos cōstruunt, ceram fungunt, hoc est, domos cellasque faciunt: deinde sobolem, postea mella. Primum itaque construere incipiunt fauos, deferētes ex floribus, atque etiam ex arboribus lachrymas, salice & ulmo, & aliis quæ glutinum pariunt. His-
C que pauimentum & alucum ipsum intus totum, ut quodā tectorio illinūt, *κελευς, uel κελύφος.* ne bestiolæ nocuæ subeāt. Vocant hoc opus apiarij κελύφος, id est tectorium: aditus etiam si ampliores sint quàm pro fabricæ ratione, obstruentes coar-
2 ctant. Fauos deinde effingunt multi cauatos è cera: primum in quibus ipsæ gignantur: deinde in quibus reges dicti & fuci (quanquam sunt qui fucos, ut dictum est: & per se fingere fauos in eodē alueo, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant) suos certe semper componūt apes: sed regum cum sætus largior est, fucorum autem cum copia mellis speratur. Fauos regum suis similes faciunt, qui parui sunt: fucorum autem minores quàm suos: & quandoque finguntur lecorum per se faui fucorum: sed magna ex parte inter fauos apum inserūtur. In fauis cellæ omnes (quæ & loculamenta dixeris & loculos) tam mellariæ quàm sobolaria: gemino sunt ostio: uno enim eodēque intersepto, & basi duæ sibi iunguntur cellæ modo poculi gemini, altera intus, altera foris. Sūtq; loculi ipsi fucorū ampliores. Cellam facit apis ex angulis totidem, quot habet ipsa pedes (quot geometræ κελύφος fieri in orbe rotundo ostendunt) ut plurimum loci includat. Cellæ quæ parietibus principisue fauorū proximæ sunt, arctiores & melle uacuæ gemino aut triplici uersu: pleniores autem sunt faui, quibus plus ceræ obducitur. Ad ostium ipsum aluei, prima aditus pars illita est ex mitye, *μίτυς.* quod uelut excrementum purgamentūue ceræ est, bene nigrum acrisque *Commofus.* odoris: medetur hoc plagis, & huiusmodi suppurationibus. Proximū ab eo tectoreū crustaue pissocerus: leuius hoc quàm mitys, minúsque medica- *Πισσοκέρως.* mentosum. Hęc Aristoteles. Plinius uero, sores, inquit, latiores circūstruūt. *Piscatus ceram*

*Mityx.**Pissoceros.**Propolis.**Mityx.*

Prima fundamenta operis mityn uocant periti: secunda pissoceron, tertia E propolin inter coria cerasque, magni ad medicamina usus: mityx crusta est 4 prima saporis amari: pissoceros super eam uenit picantium modo ceu dilu 5 tior, ceræ initium plerunque è mitori gummi: propolis crassioris iam ma- teriæ additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabilimentum qua omnes frigoris aut iniuriæ aditus obstruuntur, odore etiamnum graui, ut qua plerique pro galbano utantur. Propolin uocant, inquit Varro, è quo 6 faciunt ad foramen introitus prorectum in aluum maxime æstate: quam rem etiam carius in sacra uia quàm mel uenit. De propoli Dioscorides hæc prodidit, In alucorum soribus inuenitur propolis, sua natura ceræ aspectu 7 similis. Eligenda est flaua, odorata, & styracem referens, in uehementi ari- F ditate mollis, & mastiches in modum ductilis. Fauos itaque primum in- tus, ut dictum iam est, conficiunt apes: mox collocant sortum ore emitten- tes suo, uti iis placet qui censent aliunde prolis primordia conuehi (de ge- neratione nanque earum uaria sententia est.) Deinde cibi causa mellifi- cant, ore euomentes in cellas: mel enim apibus tum æstate tum hyeme in cibo est: sed præter hoc conuehunt reconduntque alterum quoque ciba- rij genus, cui durities ceræ proxima, quòd Sandaracan nonnulli appel- 8 lant: alij Erithacen, alij Cerinthum. Hic erir apum, dum operantur, cibus, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, & ipse amari so- poris, ut Plinius docuit. Gignitur autem rore uerno, & arborum succo G gummi modo: Africi minor, Austri flatu nigrior, Aquilonibus melior & rubens. Erithacen uocant, inquit Varro, quos fauos extremos inter se con- glutinant: quod est aliud melius propoli, itaque in hoc uim esse illiciendi. Quocirca examen ubi uolunt considerare, eum ramum aliàmue quam rem oblinunt hoc, admisto apiastro. Cerinthum Aristoteles melle quidem de- teriorem esse scribit, at dulcedine prope ficus. Congerunt hoc apes suis cru- ribus, ut & ceram. Carnem nullius animalis tangunt apes, nec opsoniū ap- petunt: mortuis ne floribus quidem, non modo corporibus insidunt. Apis insectorū una nullis putidis assidet: nec utitur alio cibo quàm dulci: aquā etiam libentissime haurit, qua sinceri clarissimæ fontes scaturiunt. Gau- dere plausu atque sonitu apes uidentur, quapropter tinnitu aris aut fictilis conuocari eas in alueum aiunt: quamquam incertum est an audiant: & uo- H luptatene, an formidine ita faciant. Hyeme conduntur, adeo ut nec cibum sibi appositum gustare uideantur. Et si qua erepserit, ieiuna spectatur uetere transluciente, nullòque penitus contento quod manifestum sit. Cōduntur à Vergiliarum occasu usque ad uer inquit Aristoteles: Plinius autem, latèb ultra exortum, ait, adeo nō ad ueris initium, nec ut quisque in Italia de al- uois existimat: ante fabas florentes non exeunt ad opera & labores. Colu- mella, post confectam, inquit, brumam diebus fere quadraginta, quicquid est repositi mellis (nisi liberalius à curatore relictum sit) consumunt apes: & sæpe etiam uacuat ceris usq; in ortū Arcturi, qui est ab idibus Februa- riis, ieiuna: fauis accubantes torpent more serpentū, & quiesce sua spiritum conferuant.

*Ἐρυθράκη.**Erithace.**Ἐρυθρὰ, uel**ἰριόκη.**Cerinthus.**Κέρυς, uel**Erithace.**Cerinthus.*

- A conseruant. Post hoc tēpus cum diei permittit hilaritas, procedere audent in pascua: nam ab æquinoctio uerno sine cunctatione iam passim uagātur, & idoneos ad scētum decerpunt flores atque intra tecta comportant. Duo-dequinquagesimo die ab æquinoctio uerno, cum sit uergiliarum exortus, circa v. idus Maij incipiunt examina uiribus & numero augeri. Singulis deinde muneribus se distribuunt apes, ut aliæ ex floribus conuehant: aliæ mel, aliæ crichacen, aliæ extruant & poliant fauos: aliæ aquam importēt ad cellas, & cum melle temperent. Gerulæ secundos status captant: iuxta uero terram uolant in aduerso statu uepribus hebetato. Nullum his tempus certum consuetūque est quo operari incipiant: sed si rebus abundant necessarii, benèque degunt, æltius potissimum tempore opus aggrediuntur,
- B & quandiu ferenum sit assidue operantur: nullusque cum per cælū licuit, otio perit dies. Socias quoque otiosas & desidēs ac minus parcas pellere, in more apibus est. Apum seniores intus operantur: hirtioresque moræ domesticæ ratione sunt: adolescentes foris negotium exerceant, & ea quæ res exigit portant, leuiorēque sunt, labore hirtutē detrita. Præfagiuntque apes & hyemem & imbres: cuius rei indicium est, quod non uolant: sed sereno adhuc, in alueo uolutātur: quo apiarij hyemem expectant. Tempore matutino omnes silent, donec una gemino aut triplici bombo excitet omnes: tum uniuersæ ad opus prouolant. Cūque redierint, primum item tumultuant, paulatimque minus subinde strepunt, dum una circūuolitando susurret, quasi dormiendū præcipiat: tum repente omnes conticescunt. Dignoscitur examen ualere susurri frequentia, & exundi ingrediendique agilitate: hilaritate præterea & nitore sanitas æstimatur. Cum migrandum est, uox solitaria & peculiaris quædam aliquot ante diebus intus mittitur: & biduo aut triduo paucē circa alucum uolant. Ab exortu autem uergiliarum ad solstitium, quod sit ultimo mense Iunio, ut tradit Columella, fere examinātur alui: quo tempore uehementius custodiri debēt, ne nouæ soboles diffugiant. Vita apum anni sex: nonnullæ etiam septem possunt complere. Quod si examē nouem aut decem annos durauerit, prospere ætū esse existimatur. Effrunt foras uita in alueo defunctos: & cætera mundissimum omnium hoc animal est. Amoliūtur omnia è medio, nullæque inter opera spurciæ iacent. quin & excrementa operantiū intus, ne longius recedant, unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Sæpenumero & cum alui necessitas est, auolāt: & in secessu reddunt excrementum, quoniam male oleat. Oderūt autē non solum fædos odores, sed etiam unguentorū delicias: ex quo fit ut homines his delibutos percutiāt.

1 *κρίνας*: an *κρίνας* potius: Melliginem, ni fallor, hoc uocat Plinius. 2 Fauos *Melliga*, deinde, &c. Fauor, inquit Varro, est quæ fingunt multi cauatū è cera. 3 Cellā facit apis. Plinius, Hæ, inquit, cellarum minime, sed ipsi (fuci scilicet) maiores apibus. An fortasse fauos intelligit, non loculamēta ipsa? 4 Myrin, aliās, commosin, atque ita uettit Theodorus pro mirye, inter coria cetrāsque, id est, inter priores illas, crustas & fauos. 5 Prima, aliās, nigra. uaria hic notatur lectio pliniana. Populi, inquit Plinius, ferunt in folijs guttam, ex qua apes propolim faciūt. 6 Propolim uocat. Videtur Varro hoc nomine duplicia illa Aristotelis, aut triplicia Plinij fundamenta cō-

DE DIFFERENTIIS

plecti. Hæc Claymond. 7 *quoniam uisus est*, id est (ut equidem arbitror) substantia ce-
 ræ simili, uel aspectu similis ceræ. 8 *et dicitur, in dicitur* quandoque uocatur, nisi men-
 dosa sunt Aristotelica exemplaria.

De generatione apum.

Cap. CCIII.

DE generatione apum uaria sententia est: magnæque inter eruditos & subtilis quæstio fuit: alij enim eas parere & coire negant: (apum enim coitus uisus est nunquam) sed ex floribus quibusdam deportare fœturam existimant. Sūt qui fucorum quidem fœturam comportari è floribus illis arbitrentur, sed apum generi ortum præstari à ducibus hoc argumēto referunt, quod fucorum fœtus editur etiam sine duce, apum nunquam. Aliqui per coitum agi opinantur, maresque esse fucos, fœminas uero apes esse contendunt: alij contrà, apes mares esse, fucos fœminas opinantur. In tanta rei huiusce ambiguitate, cum non satis adhuc explorata, quæ in earū generatione eueniant, habeamus, rationi interim fides adhibenda est: præsertim cum quæ afferuntur, conueniant cum iis quæ sensu percipiuntur. Duces uel absque coitu generant & seipfos & apes: apes deinde fucos procreant, ipsi uero fuci nihil insuper generant: sed in ternario numero finem generatio recipit. Et cum ceteræ in concavis imisque fauorum proueniant, duces subter ad fauum pendentes oriuntur. Fiunt autem schadones optimæ (sobolem dico) cum mellificatur: fœtu posito, apes incubant auium more. Fœtus apum & fucorum, ex quo uermiculi fiunt qui in apes fucosque trans-
 eunt, candidus est: primordium regum colore cernitur fuluo, corpulentia mellis crassioris, magnitudine ilico proxima suæ futuræ soboli: nec primū ex eo uermiculus gignitur, sed statim apis, ut aiunt. Vermiculus dum parvus est, iacet in fauo obliquus: post deinde, sua ipse facultate se erigit, cibūque capit, & fauo ita adhæret, ut retineri uideatur. Schadonibus dum membrana inuoluuntur, & pedes & alæ innascuntur: atque sub ea specie, cum scilicet formæ liniamenta receperint, nymphæ appellantur: iam neque cibum præterea capiunt, neque ullum alui reddunt excrementum: sed coerciti & contracti quiescunt, nec ullo pacto se mouēt, usque dum species desinata perficiatur. Et cum iam ad finem generationis uenerunt, rupta qua cinguntur membrana, euolant. Peragitur autem fœtus intra x l v diem: non apum tantum, sed & crabronū & uespærum fœtus cum iam formæ liniamenta cœperint, eodem modo nymphæ dicuntur. Stercus quandiu sit, uermis emitit: postmodum non nisi perfectæ, (ut modo dixi) prodierint. Nouellæ istæ tertio quam prodierint die, statim negotium ineunt, si cibus suppetat. Humido uere melior fœtus, ut sicco mel copiosius.

Schadon.

*Rex statim mel-
 lei coloris, in-
 quis Plinius:
 Statim penni-
 ger, Plinius.*

Nympha.

Nympha.

1 Varia sententia est, &c. Ambiguitatem hanc quæstionemque pluribus uerbis explicat Aristot. lib. 3 de generat. animalium, 2 Sunt qui fucorū, &c. Plinius, Sunt qui apes in totum amissas reparari purent, uentribus bubulis recentibus cum fimo obrutis: Vergilius, iuuenecorum corpore exanimato: sicut equorum uespas atque crabrones, sicut asinorum scarabæcos.

A De morbis apum, & iis quæ aliàs inimica sunt apibus.

Cap. CCV.

Pereunt apes tum aliis casibus, tum uero cum multi principes orti partē quisque secum quod libuit, abducant: nascuntur aliquando in extremis fauis apes grandiores, quæ cæteras fugant, cæstrus uocatur hoc malum, ab eo quod exagitet, neque patiatur examina conuiuiscere. Quin & morbos suapte natura sentiunt: index eorum tristitia torpēs, sicuti hilaritate & nitore sanitas æstimatur, ut modo diximus: ægrotant potissimum cum sylua flores æruginosos tulerit, atque etiam temporibus ficcis. Aliud morbi genus quasi otium quoddam & ueternitas apum incidit, cum fædo aluei odore. Vitiari fauos aiunt ex aranea, nisi suis fauis iucubent apes & concoquant quoddam si ita se cōtinere potuerint, ut incubitu perseverent, efficietur aranea illis ueluti alimentum: si minus, pereunt toti faui. Gignuntur in iis quæ uittantur uermiculi, qui mox pennis subnatis euolant. Apibus etiam bestiolæ quædam in alueis innascuntur, quæ fauis officiant: ut uermiculus, quæm alij clerum, alij pyrautam uocant: hic ueluti araneam facit in fauo. Nascuntur hi in pauimento, è quibus crescentibus, uelut aranea aluco toti obducitur, & faui carie pereunt. Obest & alia quædam bestiola similis hepiolo, qui lucernarum luminibus aduolat. Hæc lanuginosum quiddam parit, nec aculeo ab apibus stimulat, sed tantum fumo abigitur. Erucæ quoque nascuntur in alueis teredines dictæ, quas apes non insectantur. Papilio etiam ignauus, inquit Plinius, & inhonoratus luminibus accēsis aduolans, pestifer: nec uno modo. nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa; quibus teredines gignuntur. Et Columella, Papiliones enecentur, inquit, qui plerumque inter aluos morantes, apibus exitio sunt: nam & ceras erodunt, & stercore suo uermes progenerant, quos aluorum tineas appellamus. Inter caniculæ & arcturi exortum cauendum erit, ne apes intercipientur uolentia crabronum, qui ante aluearia plerumque obfidiantur prodeuntibus. Cum eximuntur inella, apes abigi fumo utilissimum, ne irascantur, aut ipsæ auidæ uorent.

Ogrynæ.

Sanitatis aut morborum in apibus signa explicat Varro luculenter.

Clerus, κλέρος Pyrauta, πυραυτά, Hapiolus.

Teredines, τεριδίνες

Teredines.

Tineæ. Et Vergil. lib. 4 Georg. tineæ uocantur

Ant.

D Quæm alij clerum, &c. De clerō ita habetur apud Plinium, Est in fauis quibusdam qui uocatur clerus amaræ duritiæ ceræ, cum scetum inde non eduxere morbo aut ignauia, aut infecunditate naturali, hic est abortus apum: iterum, Sunt & operis morbi cum fauos non expleant, cleron uocant. Verum aliter utrunque locū legit Clai mundus ex uetustis exemplaribus consentientibus: in priore loco, elauum: in posteriore, clarum, non clerum.

De melle.

Cap. CCVI.

Ex floribus ceras fieri prodidere Aristoteles atque Celsus, ex matutino tore mella. Quæ ubi collegere apes, ore euomunt in cellas: & melle, uo altero uel ad summum die cellas replent: omnino ante uergiliarum exortum, mel non fit. Crascescit autem mel, concoctum iam tempore. initio enim ut aqua dilutum est, & primis diebus sine crassitudine cernitur, & feruet ut mustum seque purgat: quod si exemptum eo tempore sit, crassitu

Mel, μέλι.

una habet.

mutat.

Hh

dine caret: tum uicesimo maxime die spissatur, mox obducitur tenui membrana, quæ feruoris ipsius spuma concrefcit. Indicium perfectionis in sapore potissimum est. dulcius enim quod crassius. Porro inuenitur in plantarum foliis floribusque, quod neque succus eorum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem sit naturæ cum rore. Non tamé assidue hoc nec copiose, ut ille, prouenit: sed maxime syderum ortu, præcipuèque in ipso syrio explendefcente fit: nec omnino prius uergiliarum exortu (ut diximus) sublu-
canis temporibus. Itaque tum prima aurora, folia arborum melle rosida inueniuntur: ac si qui matutino sub diuo fuere, unctas liquore uestes, capil-
lûmque concretum sentiunt. E fronde ac pabulis potus hic liquor, & in uter-
culos congestus apum: (ore enim uomunt, ut diximus) ad hæc succo flo-
rum corruptus, & alucis maceratus, totiesque mutatus, magnam tamen ca-
lestis naturæ uoluptatem affert. De apibus, inquit Seneca, non satis con-
stat, utrum succum ex floribus ducant, qui protinus mel sit: an quæ colle-
gerunt in hunc saporem mixtura quadâ & proprietate spiritus sui mutent.
ut quibusdam enim placet, non faciendi mellis scientia illis est, sed colligendi.
Hoc uero nobis constat, materiam ex qua mel gignitur, eiusdem cum ro-
re generis esse: uidetur aurem ex plantis è quibus colligitur, non nihil ad ei-
us probitatem uitiumue accedere: tâto quoque meliorè qualitatem cape-
re mel, quanto iucundior sit materia cera confecta. In quodam Ponti tra-
ctu, & in Sardinia, ubi ex absinthio apes mel colligunt, amarum gignitur.
Tantumque pabulum refert, ut quibusdam in locis mella quoque uenena-
ta fiant. Heracleæ in Ponto, quibusdam annis, perniciosissima existit: nec
dixere authores è quibus floribus ea fierent. Nos trademus, inquit Plinius,
quæ comperimus. Herba est ab exitio & iumentorum quidem, sed præci-
pue caprarum appellata. Ægolethron: huius flores concipiunt noxium ui-
rus aquoso uere marcescentes: ita fit, ut non omnibus annis sentiat hoc
malum. Aliud genus in eodem Ponto, gente Samnorum mellis, quod ab
infantia quam gignit mænomenon uocant: id existimatur contrahi flore
rhododendri, quo scatent syluæ. Et in Perside, & in Mauritanie Cæsari-
ensis Getulia, contermina Massesulis uenenati faui gignuntur. Præstantissi-
mum gignitur mel, ubi thymi copia est, aliarumque tum herbarum tum fru-
ticum, quæ natura calida siccæque constent. Quod ex huiusce generis colli-
gitur plantis, tenuioribus partibus constat: quo fit, ut & facile in bilem uer-
tatur, in calidis saltem corporibus, & acrimoniæ quiddam in se habeat, quæ
aluuum citet. Summa quidem bonitatis, natione constat optimum hybleum
ex Sicilia, Thasium aut certe Atticum: mox quod è Cycladibus affertur &
Isthmo. Mel quoque & in aliis regionibus optimum conficitur: sed quod,
cum ab incolis ob eius exiguitatem absumatur totum, in alia loca non per-
fertur: eoque fit, ut minus celebre scriptoribus habeatur. In quocunque ta-
men tractu terna sunt mellis genera: uernum, ex floribus constructo fauo,
quod ideo uocatur anthinum. Alterum genus est mellis æstiu, quod ideo
uocatur horæum à tempeluitate præcipua ipso syrio explendefcente, post
solstitium diebus triginta fere: nam ab exortu syderis cuiuscunque, sed no-
bilibium

*Mænomenon
mel,*

Mel anthinû.

Horæum mel.

A bilium maxime, aut cælestis arcus si nō sequantur imbres, sed ros tepescat solis radiis, medicamenta non mella gignuntur, oculis, ulceribus, internis-que uisceribus, dona cælestia. Quod si seruetur hoc syrio oriente, casūque congruat in eundem diem, (ut sepe) Veneris aut Iouis Mercuriū exortus: non alia suauitas uis-que mortalium malis à morte uocandis, quàm diuini nectaris fiat. Tertium genus mellis minime probatum, syluestre, quod ericeum uocant: conuehitur post primos autumnii imbres, cum erica sola floret in syluis, ob id arenoso simile. Gignitur id maxime arcturi exortu, à pridie idus Sepembris. Hæc Plinius. Varro quoque, Eximendorum, inquit, fauorum primum tempus esse putant, uergiliarum exortum. Secundum æstate exacta antequam totus exoriat arcturus. Tertium post uergiliarum occasum. Præstantissimum, ut ait Dioscorides, uernum, deinde æstiuum: hybernū uero deterrimum est: ut quod iusto crassius est. Aristoteles uero mellis cōficiendi duo tempora prodit, uer atque autumnum.

3 Sed uernum, inquit, suauius, candidius & omnino præstantius autumnali est. Rufum deformius faui uicio redditur: quippe quod perinde ut uinum à uase uicietur: probatur mel, cui est color aureus. Quod autem albicat, nō sincero thymo confectum est: sed id oculis atque ulceribus cōmodius applicatur. Mellis natura, inquit Galenus, acrimoniam dulcedini cōiunctam habet: ut præstātissimum id iudicetur, quod notis hisce duabus insigne sit. Colligitur enim & mel tum ex plantis aliis, tum etiam ex Cytiso, quod dulcedine uel cum Attico certet, aut etiam superet, acrimonia tamen careat, statimque gustates auertat: atque si paulo liberalius capiatur, nauseam cōcit: præcipua igitur bonitatis argumenta hinc sumuntur. Sequēs probatio à colore, substantia & odore. Quod enim colore fuluo est, & odore suauis, tum purum adeo ut totum pelluceat, ac gustanti subacre, tum substantia nec plane crassa nec liquida: præterea tam sibi cohærens, ut si digito attollatur, continuum sibi nec intercisum ad humum defluat longissima quasi linea sibi continuatum, id omnium est optimum. Si uero abrupitur, nec demissum ad terram usque continuitatē seruat, id crassius iusto est, aut tenuius, aut partes habet non usquequaque similes: deprehendas autem id si diligentius inspicias, aut crassitudines aut humiditates habere innatantem, quæ nec inter se sint similes, nec etiam toti. Itaque ad ceræ naturā propius

D accedat mel quod & crassius est, & cui tales quædam partes innatant crassiores. Excrementosum uero ac perfici concoquique difficilius, tum quod totum humidum est, tum in quo multæ in partibus sparsæ apparēt humoris guttæ. Porro in quo uel ceræ qualitas uel propolis, uel id genus alia gustu deprehēditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit. Quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei insignem in se continere qualitatē debet. Quocirca quod thymum plane redolet, non probo, inquit Galenus: quanquam non ignoro à quibusdam id laudari: eoque fieri ut nonnulli uēditores incisa thyma post illi iniiciant, quo id redoleat, uideaturq; optimū. Ipse tamen quod tam improbe thymum olet, non laudo: multoque minus si iniectum thymum sit: quod tamen exiguam quandam qualitatem odo-

Mel syluestre?
Mel ericeum.

Mellis optimi nota.

DE DIFFERENTIIS

re gustuue præfert, id nō uitupero. Malum item mel iudicatur, quod inter E
coquendum multam egerit spumam: quo etiā diutius coqui debet: opti-
mum uero, ut breuissimo tempore coquitur, ita minimū spumæ euomit.
Non omnibus similiter hominibus, æqualis ex melle gignitur bilis copia:
siquidem qui iam in flore sunt, potissimū si calidiore natura sint, ac uitam
degant laboriosam, in iis totum mel uertitur in flauam bilem: senibus uero
& quibuscunque pituitosam naturam habentibus, admodum est accom-
modum: utpote quibus non in bilem, sed in sanguinem conuertatur. Postu-
lat nāque quò in sanguinis naturam mutetur, naturam hominis frigidam,
ætatemque frigidam: sicuti in iis qui calida natura sunt, & ætate florētibus
prompte in bilem uertitur: nō ab re igitur censuit Hippocrates mel bilio-
lis naturis non esse ex usu, ut pote qui calidiore sint temperie. Ad eundem F
modum morbis quoque quos amara excitaui bilis, mel inimicum esse, nō
solum Hippocrates, sed etiam omnes medici affirmant: sicuti & iis qui ex
pituita nascuntur amicum: unòque uerbo, calidis quidem corporibus, siue
ea naturæ ratione, siue morbi, siue ætatis, siue temporis anni, siue regionis,
siue conditionis uitæ talia sint, bili generandæ causam præbere. Abstinē-
dum itaque quoad fieri potest in hæcicis febribus à melle est (atque idcir-
co etiam à mulsâ) quippe protinus uertitur in bilem, & sicciore acriorisq;
caloris febres reddit. Aliàs uero, ubi uenter siccus frigidusque sit, dandum
uberius unà cum lacte mel est, sed detracta prius spuma, quo & minus sit
excrementosum, & magis nutriat. Quinetiam mel ipsum despumatū per-
coctumue per se, optimum nutrimentū frigido uentriculo est, ita ut calido G
aduersissimum: adeo ut nihil frigido corpori melle potius expetere, neque
ad calidum magis respuere oporteat. Ergo plurimum huic affectui, uentri-
culo inquam frigido, pro nutrimento mel optimum est: sed quod prius su-
per prunas ex quercu uiteue ad summum candētes, aut ligna omnino ari-
da (quæ etiam acapua Græci uocant) fuerit decoctum, & accurate despu-
matum: quod ipsum tamen (quod omnium dulcissimum est) si plurimum
percoquere uelis, ex dulcissimo reddideris amarissimum: coctione nanque
amarelcit mel, sicuti & uetustate: nā inueteratum mel amarius redditur.
Proinde quod bimum est uetustiori præfertur, sicuti & recētiori. Exsiccat
mel calfacitque secundo ordine: insignem habet abstergendi uim, aluum
ciet, ora uenarum aperit, in sordida ulcera sinúsque utiliter infunditur. Co H
Quin minus acre mordaxque efficitur: minus aluum mouet, carnem glu-
tinat. Et mellis præterea natura talis est, ut putrescere corpora nō sinat: fau-
cibus, tonsillis, anginis, omnibúsque oris desideriiis, collutū gargarizatū
ue utilissimum. Iam uero peripneumonicis, pleureticis, decoctum: auxilia-
tur tussi, urinam ciet, à serpente percussis medetur: & contra uenena fungo-
rum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. Crudum tamen
aluum inflat, tussim laceffit, fastidium creat: quamobrem despumati usus
aptior est. Mel auribus instillatum, cum rosaceo, ut inquit Plinius, ut uero
Dioscorides cum fossili sale trito, aurium sonitui & dolori prodest. Lendes
& sæda capitis animalia necat: & oculis per se inutile aliqui arbitrantur:
rursus

Mel despumatum.

Quomodo coqui debeat mel docet Galenus lib. 4. de sanitæ tuenda.

A rursus quidā angulos exulceratos melle tangi suadent. Diximus mellis uenati genera: contra quod utuntur melle in quo apes sint mortuæ. Idē potum in uino remedio est uitiorū, quæ cibo piscium gignuntur. Mel item utilissimum oculis & auribus, in quo sunt apes mortuæ. Est in iis quæ circa Hircaniam sunt regionibus bestiola quædam uolucris (anthredonē appellant) ape paulo minor, cætera multum similis, quæ in montanis plurimum uiſcitatur, floribusque omnis generis alitur. In cauis autem saxiſ, aut arborū latebris fauos sibi conſtruit, succūque nobilissimum ibi cogit: qui dulcedine melli nostro haud multum cedat.

Anthredon.

1 Aliarūque tum herbarum tum fructuum, &c. Quæ herbæ, qui fructus, quæque arbores in apiariis conserendæ sint, ut mel fiat quā probatissimum, docet rei rusticæ scriptores, ac in primis Palladius. 2 Optimum hybleum, &c. Plinius: Atticæ regionis hic, & Siculæ, Hymetto, & Hyblæ ab locis, mox Calydne. Mel eorsicū, inquit Plinius, asperissimum habetur. 3 Aliter lib. 5 histor. animalium habetur: melius mel autumnale est, nisi forte mendosa sint exemplaria.

De cerâ & propoli.

Cap. CCVII.

M Ellis naturæ adnexa cerâ est. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua. Omnis cerâ mollit, calfacit, modicèque explet corpora, recens melior. Ut uero Galenus docet, mediam habet temperaturā calfacientium, refrigerantium, humectantium & exsiccantium: estque aliorū medicaminum calidorum frigidorumque ueluti materia: crassiorum est pattium, atque emplastica, foris que imposita concoquendi uim habet exiguā quandam atque imbecillē & calidam. Et ut Paulus tradit, uim habet abstergendī. Datur in forbitione dysentericis: fauīque ipsi in pulſe alicæ prius tostæ. Aduersatur lactis naturæ: ac milij magnitudine x. grana ceræ hausta lac in nutricibus non patiuntur coagulari, uti tradit Dioscorides: ut uero Plinius, non patiuntur coagulari lac in stomacho. Cerâ optima (Dioscoridi) est subſulua, subpinguis, odorata, & halitum quandam melleum referens & puræ natione Pōtica aut Cretica. Secunda bonitas candida, & quæ sua natura pinguis est. Hæc Dioscorides. Plinio uero authore, optima est quæ punica uocatur, & medicinis utilissima: proxima quæ ſulua, odorisquæ mellei pura, nationeque Pontica: deinde Cretica (plurimū enim ex propoli habet) post has Corſica: quoniam ex buxo fit, & habere aliquantum uim medicaminis. D putatur. Nigrescit cerâ addito chartarum cinere: sicut anchusa admixta rubet: uariosque in colores pigmentis trahitur, ad reddendas similitudines & innumeros mortalium usus. De propoli diximus in natura apum: calfacit secundo ordine, aut inchoante tertio, leuiter abstergit, euocat aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit. In ueteri tussi suffita iuuat, lichenas adnota tollit, dura concoquit, dolores neruorum mulcet, ulceraque desperata cicatrice includit. Deligenda propolis, uti modo diximus, flaua, odorata, styracem referens, & in uehementi ariditate mollis ac quæ mastiches in morem ductilis sit.

Cerâ, xxiij. Quomodo fiat ex faui cerâ, docet Plinius lib. 11.

Propolis.

1 Candida, &c. Hæc. Cerâ candida quomodo fieri debeat, docet Dioscorides: & quomodo Pontica, Plinius.

DE DIFFERENTIIS

De uespis, crabronibus & tenthredone. Cap. CCVIII. E

Vespa, apus.
Crabrones.
As, Spilargus.
Cognatorum apibus animalium, ut uesparū crabronūque, quod ad generationem pertinet, similis quodāmodo ratio est: generatione uero coeundo inter se funguntur matrices: uisus est enim sæpe eorum coitus. Crabrones & uespæ si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituunt, crabrones in sublimi, uespæ in cauernis: sed si habeant ducē, sub terra nidificant. Cellis saxangulis fauos extruunt omnes, ut apes: nō ex cera, sed ex materia corticea quadā & areneosa, longe tamen magis politus fauus crabronum quam uesparum est. Non in omnibus cellis simul inest & æquabilis fœtus, sed inæqualis & barbarus (inquit Plinius) & in aliis iam grandiusculus, ut uel queat uolare, aliis in nympha est, aliis adhuc in uermiculo. Excrementum uermiculis tantum, ut & in apum genere est: & manet fœtus immobilis cum in nympha est, & mēbrana uelatur: apes unicolores sunt magis quā crabrones & uespæ. Porro uesparum duo sunt genera, alterum ferum, alterum placidius. Ferum illud genus rarū est, nascens in montibus, & pariens non sub terra, sed in quercu, grādus, porrectius, nigrius, uarium etiā aculeatūque est: aculeo enim maiore quā ex portione sui corporis spiculatur. Viuit hoc genus toto anno: & quidē tēpore hyberno, quercu celsa euolare spectatur. Exigit hyemem in latebra, & semper in materie arboribꝫ uersatur. Sunt eius aliæ matrices, aliæ operariæ, ut & in altero genere quod placidius est. Sunt enim huius quoque duo genera: alterum duces, quas matrices appellant, alterum operariæ, maiores mitiorēsq; duces sunt. Ætas operariarum annum non cōplet, sed omnes hyeme inualecente moriuntur: quod ea re constat, quia hyeme incipiente stupefcāt: bruma autem nullæ omnino appareāt: duces uero qui matrices uocantur, tota hyeme uisuntur, atque sub terra latitant. Plerique enim cum per hyemem ararēt aut foderent, matrices uiderunt, operarias nemo. Est autem matrix latior, ponderosior, crassior & maior quā uespa: uolatūque haud plurimum ualet: præ pondere enim sui corporis, uolare longius nequit: quo fit, ut semper in uesparijs sedeant effingentes fauos, & munere fungentes cellario. Insunt porro matrices nuncupatæ in uespariis plurimis: sed aculeatæ sint, necne ambigitur. Videntur tamen & ipsæ, ut apum duces, gerere quidē aculeum, sed non extringere aut ferire. Vesparum autem aliæ carent aculeo, ut fuci, aliæ habent: minores imbecilliorēsq; sunt quæ carent, neque se uindicāt repugnātue. Contrā, quæ habent maiores, robustæ atque pugnaces, quas nonnulli mares appellant: fœminas uero eas quæ carēt. Pleraq; ex iis quæ aculeum gerunt, amittere eum putantur hyeme instante: sed nobis hætenus uidere non contigit. Si uespam ex pedibus cōperis, bombilarēque si ueris, aduolant quæ aculeo carent: quod non faciunt quæ aculeatæ sunt. Itaque argumento quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ fœminæ. Et ferarum nonnullę coire uisæ sunt: & alteram gerere aculeum cōstitit: sed de altera incertum est. Et ex cæteris quoque coire nonnullæ uisæ sunt: sed an ambæ aculeo careant, an habeant: uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Sed fœtus tamen non partu provenire uidetur:

- A detur: statim enim auctior quàm partus uespæ patiatur, existit. Vespæ tem-
poribus siccis, locisque asperis potius oriuntur: ortus sub terra agitur, uti di-
ximus. Est autem ortus uesparum talis. Duce: ubi locum sibi sub terra op-
portunum delegerunt, fauos ineunte æstate confingunt: & uespeta siue cel-
lulas paruas (*σπηλαιῶν*, uocant Græci) constituunt quaternis foriculis aut pro-
pe, in quibus uespæ, non matrices nascuntur: quæ cum increuerint, rursus
altera ampliora effingunt: quorum item proles cum creuerit, alia faciunt:
ita ut postremo autumno plurima amplissimæque uespeta condita habeantur:
in quibus dux, quæ matrix uocata est, non insuper uespas, sed matrices
iam procreat, quæ quidem superne per summa uespæ utermiū specie mul-
to grandiorum gignuntur in cellulis cōtinuatis quatuor numero, aut pau-
lo pluribus: alioqui increscendi ratio ducibus, eadem quæ uespis est. Cate-
rum utrū duces anni superioris, nouellis iam procreatis ducibus, intereant
unā cum uespis nouellis, idque simili modo semper eueniat, an amplius e-
tiam temporis possint uiuere, nondum exploratum est. Fingunt suos fauos
ex congerie terræque incipientes ab uno scilicet primordio, quasi ab radice
unumquenque fauum conficiunt. Cibum autem & ex floribus quibusdam
& ex fructibus petunt, sed quamplurimum ex carne: uespæ serpentes audi-
de uescuntur, inquit Plinius, quo alimēto mortiferos ictus faciunt. Matrices
ætate procedente apud ulmos colligunt lentam quandam & gummo-
sam materiam. Sunt uespæ quædam ichneumones nūcupatæ, quæ mino-
res quàm cæteræ sunt: phalangia uenantur & perimunt, (unum genus ara-
neorum hoc est) & in nidos suos ferunt in parietinas aut aliquid tale fora-
mine peruium: deinde illinunt luto, atque ex iis incubando suū genus pro-
creant. Talis uesparum ratio est. Crabrones quoque magis uario colore
sunt, quàm apes. Cum in genere apum careant aculeo & fuci & reges, atque
etiam uesparum nonnullæ inaculeatæ sint, ut ante dixi, crabrones omnes
aculeo armantur: sed de eorum duce considerandum accuratius est, an acu-
leum habeat: duces enim more apum uesparumque crabrones habent, qui
proportione ad crabrones, maiores quàm uesparum ad uespas, & apum ad
apes sunt. Degunt hi quoque intus, ut uesparum duces: sed duces non plu-
res uno in singulis eorum alueariis oriuntur. Faciunt sibi alueum sub terra
crabrones, terra egesta formicarum more: examinis enim emissio, ut apū,
nulla eorum aut uesparum fieri solet: sed qui subinde oriantur nouelli, ibi-
dem manent: & alueum terra egesta, faciunt ampliorem. Amplificant ma-
iorem in modum fauos, & iam ex ualentiore quodam examine qualli tres
aut quatuor fauorum pleni excepti sunt. In cellis crabronum paululū mel-
lis, quantum gutta è regione proli paratur. Sed si qui crabrones suo alueo
aberrarint, colligunt se in aliquam arborem, fauosque ibi conficiunt in subli-
mi, qui uel sæpe conspicui apparent, in quibus unum procreant ducem: qui
cum adoleuerit, agmen abducit, & secum in alueo collocat. Crabronū syl-
uestres, inquit Plinius, in arborum cauernis degunt: hyeme ut cætera inse-
cta conduntur. Vita bimatum non trāsīt, ictus eorum haud temere sine fe-
bre est: authores sunt ter nouenis punctis interfici hominem. De coitu cra-

*Vespeta,
Σπηλαιῶν.*

*Ex σπηλαῖ
καὶ γὰρ.*

*Alias, serpente,
Matrices.*

*Ichneumo me-
ssa.*

*Crabrones
καὶ σφίρα.*

DE DIFFERENTIIS

brorum, nihil adhuc exploratum habeo, nec unde fortificet. Generationis E
uero ratio quodammodo similis atque in apibus est, ut modo diximus. Ci
bum crabrones non ex floribus colligunt, ut apes, sed carne magna ex par
te uiuunt: unde fit, ut uersari uel in stercore sæpe soleant. Venantur etiam
muscas maiusculas, quas ubi ceperint, abscisso capite, reliquum corpus ge
stantes auolant: sed potum etiam dulce appetunt. Et inrer caniculæ & ar
cturi exortum crabrones ante alucaria plerunque apibus obsidianrur pro
deuntibus. Nec uero cibum ritu apum sibi recondunt: sed ieiuni latent per
hyemem, quo tempore plurimi moriuntur: an etiam omnes, nondum cer
tum est. Tenthredo non ab similibus crabronibus est, sed uaria, & latitudine
similis apibus: gregalis est. Cupediosa hæc est, & ad culinam & pisces, & hu
iusmodi delicias, singularis hæc aduolat. forum sub terra edit, ut uespæ, in
fauis. amplum huius quoque tenthredenarium est, & lōge amplius quàm
uespæ arque porrectius. Et hæc quidem gregalia sunt.

Plinius hæc,
non crabroni
bus sed uespæ
attribuit.

Tenthredo,
παραπύρις.

Pseudosphæce.
ἡ ψευδοσφαιρα
Vespa annua.

γυμνοσφαιρα.
Teredo.
Arthredo, uel
Anthredo.

1 Plinius ita habet, Vespæ in sublimi è luto nidos faciūt, & in iis ceras: crabrones
in cæuernis ac sub terra, nisi forte codices sint mendosi, uel Plinij uel Aristot., ut infrà
uideas, in crabronibus. 2 Vespæ, inquit Varro, uocatur quæ similitudinem habet
apis, neque socia est operi, & nocere solet morsu, quam apes a se fecerunt, secundum
genus apum fortissimè intellexit. 3 Pseudosphæcen uocant, inquit Plinius, uespam
quæ singulatis uolitat. 4 ἡ ψευδοσφαιρα, hinc ab Aristotele, ni fallor, dicta est, id est
uespæ annua. 5 Duces. Nec uesparum nec crabronum generi reges sunt, inquit Pl
nius. 6 Incunte æstate, ἀδύρνηται ἡ κηρὶς, Theodorus opere æstiuo dixit. 7 οἱ
παραπύρις ἢ ἡ γυμνοσφαιρα, id est quaternis foriculis fere. 8 Crabronum syluestres,
&c. idem fortasse cū iis quos Aristoteles suo alueo aberrasse scripsit. 9 Tenthre
do, &c. Teredo, uertit Theodorus, παραπύρις ἄλγος dixit Nicæder in theriac. Hermo
laus arthredonas uel anthredonas potius uocari censet, non παραπύρις, quemadmo
dum corrupte legi dicit apud Aristotelem. De anthredone suprà diximus, sed an idem
sit cum tenthredone nondum constat.

De sirene, bombylio, & bombycio.

Cap. CCIX.

Sirene, σείρις.

Bombylius.
Βομβύλιος.

Apud ipsam
terram, ἡ δὲ γῆ,
non super
ipsam terram.
Bombyx.
Βομβύξ.
Bōbyx. Plin.
Βομβύκιος.

Ex eorum autem genere quæ fauos sibi faciūt, est sirenis uterque: minor,
qui fuscus totus est: & maior, niger & uariis: uerum minime gregales
sunt, sed solitarij. Minime gregalis & bombylius est ut apis & uespæ, sed so
litarium ut sirenis uterque: uerum inter hæc, maximus hic est. Sub saxis a
pud ipsam terram fortificat. Bombylij binis aut paulo pluribus cellulis: H
mellis etiam prauis cuiusdam inchoatio in his reperitur. Bembycem uocat
Nicander, aculeo ferit ut uespæ, & corpore nigro est. Aliud inter hæc genus
est bombycum, in Assyria proueniens magis quàm supradicta. Nonnullæ
ex bombycum genere (βομβύκιον uocat Aristoteles) nidos in acutum excun
tes è luto fingunt, salis speciem applicatos lapidi, aut alicui tali, tam crassos du
rosque ut spiculis perforari uix possint. Pariunt in his & uermiculos produ
cunt candidos membrana obuolutos nigra: scorsumque à membrana, cerā
in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quàm cera apum. Ita Aristoteles.
In iis nidis, inquit Plinius, & ceras largius quàm apes faciunt: deinde ma
iorem uermiculum.

A 1 Gregalis & bombylius, &c. Theodorus bōbycen uocat. 2 *ἄσπερ οἱ ἄλγε*: quod *Bombyx*. Plinius, falis specie, dixit Theodorus, quasi uitro illitos reddidit *ἄσπερ ἡ γὰρ*. 3 Pariunt in his & uermiculos producūt, &c. Et alia horū origo, inquit Plinius, & grandiore uermiculo gemina protēdens sui generis cornua eruca fit: deinde quod uocatur bōbylis (uel bōbylius) ex ea neceydalus, & hoc in sex mensibus. Bombyces telas arancorū modo texunt, ad uestem luxūmque feminarum, quæ bombycina appellatur. Hæc Plinius ex Aristotele fecit: sed mea certe sententia, bombycum hoc genus, quorum aliam esse originem à priore, dicit Plinius, non ex hoc genere uolucrum insectorum est, quæ fauos sibi faciant: sed ex erucarum potius genere, (de quibus infra dicemus) uel saltem *ἡ γὰρ ἡ δὲ*, quæ ex crucis sunt.

Bombylis.
Bombylius.
Necydalus.

De formicis & scorpionibus.

Cap. CCX.

B Vere & formicæ, ut apes, laborem communicant: Et sepeliuntur inter seu uiuentium solæ præter hominem. Et ciuile animal formica est: nuli tamen imperio subditum. Dentes habent formicæ, & aculeum gerunt, non in ore, sed parte posteriore. Formicarum negotia omnibus in prōptu habentur: utque eadem semita semper ambulant, & cibaria recondunt uel in annum, & cellas promptuarias faciunt, nec interdiu solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exercent, interlunio quiescunt, nemo est qui nō uideat. Gerunt onera morſu: maiora auersæ postremis pedibus moliūtur, humeris obnixæ. Silices itinere earū attritos uidemus, & in opere semitam factam: segniter & contra industriam suam formicæ absconditæ, uel concursantes, aut oua progerentes pluuiam præſagiunt. coeunt formicæ atque ex animalibus sui generis oriuntur: coeunt autem hyberno tempore. Vermiculum pariunt nulli annexum, qui accrescens ex minutulo & rotundo, longiusculus fit, formamque accipit debitam. ortus eorum ueruo tempore agitur. Formicæ origani sulphurisque puluisculo inſperſo relinquunt cauernas, aliōque migrant. Et contra formicas non minimum hortorum exitium si non sint rigui, remedium monstratur limo marino aut cinere obturatis earum foraminibus: sed efficacissime heliotropio herba necantur. Quidam & aquam diluto latere crudo inimicam eis putant. Est autem formicarum pars pennata, pars uero impennis. Non sunt in Sicilia pennatæ, inquit Plinius: Aristoteles uero, in Sicilia non sunt hippomyrmeces. Inuenio & formicas herculaneas appellatas: quibus tritis adiecto sale exiguo, pſora, lepra, & lentigo sanentur. Formicæ quinque potæ contra omnium phalangiorum morſus auxiliantur. Utuntur & per se ouis formicarum ad aurium grauitatem: nanque & huic animali est medicina: conſtatque urſos agros hoc cibo ſanari. Ne sint malæ hirsutæ, formicarum oua pueris inſtricata præſtant. Est formicarum genus uenentum, non eas nouere in Italia: Solifugas Cicero appellat, ſalpugas betica. Animal est perexiguū (ut Solinus refert) aranei ſpecie, in Sardinia, in metallis argentariis plurima: occultum reptat, & per imprudentiam ſuperſedentibus, peſtem facit: ſolifuga dicta quod diem fugiat. Sardinia eſt quidē abſque ſerpentibus: ſed quod aliis locis ſerpens eſt, hoc ſolifuga ſardois agris. Telephus Cretenſis mortiferum genus quoddam formicarum eſſe dicit, quæ ſæritæ quincupantur: eodem nomine ueſpas quædam appellantur. Le-

Formica.
myrmex.

ἡππομύρμηκες.

Herculaneæ formica.

Solifuga.
Salpuga.

Laerte.

Solifugæ seu le-
guminibus.

κνίς, uel
κνίς.

κνιπλόγος.
κνιπλόγος.

Serpium,
τρίφθον.

Scorpius.
Scorpio.

Σκρπίος.
Scorpius ter-

restis.
Σκρπίος χεί-

μαί.
Scorpionum

genera.

Limbo pallidó
νε κνίς.

κνίς.

κνίς.

Melichloron.

guminibus innascuntur bestiolarum ueneratarum, quæ manus pungunt, & pericu- E
lum uitæ afferunt, solifugarum generis. Aduersus has omnia eadē meden-
tur, quæ contra araneos & phalangia demonstrantur. Formicarum paruorum 4
generis sunt quæ *κνίς* aut *κνίς* uocantur. Mel appetunt ut apes, quod uel
ē longinquo olfaciunt. Galenus nō formicas, sed uermiculos *κνίς* uocat,
qui uicibus incunte uere innascuntur, cum germinare uites incipiunt: eā-
rumque germina (quos oculos uocant) depascuntur: quamobrem agrico-
læ, ut hos interimant, oculorum radices inungunt ampelicide uocata ter-
ra. A cnipe scnipæ uicula quædam *κνιπλόγος* aut *κνιπλόγος* dicitur. Ser-
phum quoque uocant animalculum formicæ specie, quo & uescuntur auic-
ulæ. Aculeum habent apes uespæque intus conditæ: at scorpius extra pro- F
minentem gerit: & in cauda unus inter insecta longo armatur aculeo: is
chelas habet, id est brachia bifulcis dentata forcipibus. Sēpet cauda in ictu
est, nullōque momento meditari cessat, nequādo desit occasione: fetit obli-
quo ictu & inflexu. Aculeus illi perforatus est, quæ uenenū effunditur: quodd
si forte hominis saliuā imbuatur, hebetescit redditurque inualidū. Venenū
ab iis candidum fundi, Appollo dorus author est, in nouem genera descri-
ptis per colores maxime superuacuos. quoniam nō est scire quos minime
exitiales prædixerit: Geminos quibusdā aculeos esse, marēsque sæuissimos:
intelligi autem gracilitate & lōgitudine. Maculas item habet scorpio mas
in uentre chelisque & aculeo. Mas uenenū habet infestius: scēmina mitius. 6
Nicanter octo describit genera: Primum albicat, & minime est letale. Se- G
cundum ore rufescente: ex cuius ictu uehemens sequitur ardor & sitis in-
tollerabilis. Tertium nigrescit: cuius ictus inconstantem efficit mēbrorum
motum, & risum uanum inducit, qualis solet esse stultorum. Quartum co-
lore est ad uiride inclinante. Hic simul ac quempiam percusserit, frigus at-
que horror inuadunt, adeo ut uel in calidissimo tempore, grandine se obrui
percussus existimet. Plura habet hoc genus caudæ internodia, septena scilicet. Quintum liuido pallidōue colore est, amplo uentre distentoque: herba
nāq; uescitur & inexplēbilis est: qui ab hoc percussus fuerit, illi bubo intu-
melcit. Sextum marino cancro litorali simile est: septimum paguro: chelas
quoq; habet grādiore, ut pagurus, gigniturq; hoc genus ex paguris, in sic-
co cauernā aliquā ingressis: quibus in locis si forte moriantur, gignitur in-
de huius generis scorpiones: uel ut elegātissime de hac re cecinit Ouidius, H
Concaua litoreo si demas brachia cancro,
Cætera supponas terræ: de parte sepulta
Scorpius exibat, caudāque minabatur unca.

Octauum genus melichloron est, à collore melleo dictum: summæ caudæ
nodus in hoc genere niger est: alas habet locustæ similes, obliquus huic in-
cessus: hominibus infestissimum est. Constat, inquit Plinius, eos quibus se-
ptena caudæ internodia, sæuiores esse: pluribus enim sēta sunt. Venerunt
omnibus medio die, cum incandueret solis ardoribus: itēque cum sitiant,
inexplēbiles potu. Pestis importuna, & quæ graui supplicio, lēta per triduū
morte cōficit: uirginibus letali semper ictu, & scēminis fere in totum: uiris
autem

Autem in matutino exeuntes cauis, priusquam aliquo fortuito ictu egerant uenenum. Proprium scorpionum, quod manus palmam non feriunt, nec nisi pilos attingere. Scorpiones in totum nulli animalium nocere putant, quibus non sit sanguis. Vermiculos ouorum specie pariunt & incubant: mox ut prolem perfecerunt, pelluntur ab ea ipsa, sicut & araneis accidit, & interrimuntur a suis liberis, magno quidem numero. Sæpius enim undenos pariunt. Quidam & ab ipsis fortum deuorari arbitrantur: unum modo relinquit qui solertissimum, & qui se ipsius matris clunibus inponendo, tutus & à cauda & à morfu, loco fiat. Hunc esse reliquorum ultorē, qui postremo genitores conficiat superne. Hoc malum Africæ uolucres etiam Austri faciunt, pendentibus brachia ut remigia subleuant. Apollodorus plane quibusdā inesse pennas tradit: quod & Nicandrum confirmare modo diximus. Et Pausanias quoque refert nonnullis in locis scorpiones alas habere, quales sunt locustis. In India apud Prasios, pennatos, magnitudine insignes, prodidit Megasthenes. In Africa quoque & pennati sunt, & alij impēnes, septenis in cauda internodiis. Sæpe Psylli in Italiam hos quoque importare conati sunt: sed uiuere intra Siculi cæli regiones non potuerunt: uisuntur tamen aliquādo in Italia, sed innocui, multisque aliis in locis, ut circa Pharum in Ægypto. Terra uiuunt scorpiones: in Altemio Cariæ monte Aristoteles tradit à scorpionibus hospites non ledi, indigenas interimi. Scorpionibus cōtrarius maxime inuicem stellio traditur, ut uisu quoque pauore iis afferat: & scorpionum tritum stellionum ueneno aduersatur: scorpionem tritum & impositum, suæ plagæ mederi tradunt. Ad eadem quoque estur assatus: aut bibitur in meri cyathis duobus. Conuenire etiam aiunt iis quos uipera momorderit: & homini icto à scorpione, putatur esse remedio ipsorum cinis potus in uino, aut oleo mersus. Cinerem scorpionum in pane sumi iubent ad calculos pellendos: uel si quis cum locusta edit.

An scorpiones pennatos intellexerit hoc in loco Plinius, an impennes

1 *solipugas*, id est, formicæ quæ equites appellantur. Theodorus. **2** Nonere in Italia, &c. Alias, non fere in Italia. **3** Solifugas, &c. Alias, solipugas. Solifuga dicta, quoddam diem fugiat. Solinus. Salpygam uocat Lucanus. Solpugam Plinius: eadem opinor, intelligit. **4** Quæ uisus aut uisus, &c. Culices muliones uocat hos Theodorus, & nonnunquam culices. **5** Unus inter insecta, &c. Plinius: Insectorum solus scorpio brachia habet, & in cauda spiculum. **6** Sunt qui duo prima genera unum faciant: ut sit unum genus quod colore sit candidiore, nisi quod os illi rufescat. **D** cuius ictus sitim efficiat intolerabilem ardoremque, quod tamen minime letale sit.

De araneis & phalangiis. Cap. CCXI.

Arancorum his non absurde iungatur natura. Plura autem horum sunt genera: omnibus internodia terna in cruribus, Estque caput minimum, toto quoque corpore paruo est. In latere exiles digiti pro cruribus hærent, Cætera uenter habet, de quo tamen illa remittit Stamina. Phalangia ex iis appellantur, quorum noxij morfus. Phalangium uero mordax in duo distinguitur genera: alterum simile iis quos lupos appellant, est paruum, uarium, acuminatum, assultum ingrediens, &c. id est pullex nuncupatum

Araneus. Aegirus. Aranea.

Phalangium. Phalangium. Phalangium. Pullex.

cupatum. Alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus longis, tardum E
& lente ambulans, nec uiribus ualens, neque saliens. Reliqua præter hæc ge
& nera, partim nullum, partim certe exilem inferunt morsum. Aliud aranei
genus est, quod lyci, id est lupi nomen accepit, & horum minimi non texunt:
quod uero maius est, asperam prauamque telam apud terram aut sepes or-
ditur, cauernarum exigua uestibula præpandens, & telarum primordiis in-
tus positis obseruat, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accur-
rit ut capiat. Quod autem in hoc genere uarium est, paruam uilemque te-
lam sub arboribus facit. Tertium arancorum genus, quod sapientissimum
lautissimumque est, & erudita operatione conspicuum, texit primum fila
quoquo uersus distendens in orbem, & stamina ducit, initio à medio acce-
pto: nec certe inscite medium ipsum accipit: deinde subtegmina insert te-
xistque stipans. Cubile uero & capturæ repositorium alibi sibi constituit, ue-
nationem in medio sui operis obseruando. cum enim bestiola eò inciderit,
motu medij excitus accurrit, deuincitque primum obuoluens araneis, dum
defatiget infirmamque faciat: tum tollit ac deferre: & si forte fame tenetur,
exugit (araneis enim exugere succum mos est.) Et hæc quidē fruitio eius est:
sin minus, recondito quod cepit in repositorio, repetit uenandi negotiū:
sed prius confarcito quod per uenatum lacescitū est. Si quid uero inter me-
dium & extrema inciderit, primum ipse in mediū currit: inde ad id quod
inciderit, uelut à stato initio properat. Si quis telam lacerarit, texere iterū
incipit oriente sole aut occidente. quoniam bestiolæ temporibus his potis-
simum offendant. Araneorum istorum lautiorum duo sunt genera, alterū G
minus, alterum maius. Quod igitur longioribus est cruribus, pendens sub-
tus obseruat, ne bestiolæ præformidine sibi caueant, sed incaute incidant in
partem superiorem: non enim facile occultari potest, propter sui corporis
magnitudinem. At alterum, quod moderatius est, superne obseruat latens
in quodam exiguo suæ telæ foramine. Fæmina, ut opinatur quidam, & te-
xit & uenatur: mas comes fruendi, non laborandi est. At alij fæminam
putant esse qui texit, marem qui uenatur, ita paria merita. Coniugio ara-
nei conueniunt cruribus, sed auersis clunibus. Phalangis quæ texunt coit-
us agitur hoc modo: cum fæmina deductam araneam traxerit, mas ean-
dem mutuo trahit: quod ubi sæpius fecerint, cocunt, & auersi clunibus co-
pulantur: nam propter aluum orbiculatam, modus hic coniungendi iis cō-
gruit. Pariunt aranei uermiculos primum paruos ouis similes, propter fi-
guræ scilicet orbiculatam speciem: nam & rotundi iam inde à primo ortu
proueniunt: cum pepererint, incubant, & triduo peragunt. Pariunt omnes
in tela, sed alij in subtili & parua: alij in crassiore: & alij penitus in specu or-
biculato: alij ita ut fœtū aliquatenus tela obducta sit. Præter araneos in tela
pariunt, & incubant eadem in tela atque uiuificant. Phalagia in retē quod
crassum confecerint, pariunt, atque incubant in magno numero. Cumq; ipsa
proles increuerit, matrem amplexa interficit & eiicit: sæpe etiā & patrem
si cepit: adiuuat enim fæminam incubatu. Pariunt autem & trecentos.
Cæteris lautioribus illis partus minoris numeri est. Aranei iusta sibi reci-
piunt

Συρμα, λύκος.
ὄλκος.

Αἰῶς, τραχὺς
pro asperam,
παχὺ.

Arane' lautius.

Præter araneos
αὐτῶν
αὐτῶν

Præter araneos
αὐτῶν
αὐτῶν
Phalangia.

αὐτῶν

in tela

Apiunt incrementa diebus quater septenis, à paruo sui ortus initio ad finem.

Aranei non statim cum editi sunt, fila mittunt: neque intrinsecus tanquam excrementū, ut Democritus ait, sed extrinsecus de suo corpore ueluti corticem, more eorū quæ suis uillis iaculatur, ut histricis. Maiora etiā animalia inuadit irretitque nonnunquā suis filis. Nāque & lacertarū catulos paruos aggressus circūdat os & filis obducit, donec cohibeat: mox accedens, morsum defigit. Librat & araneus se filo in caput serpentis porrectæ sub umbra arboris suæ, tantāque ui morsu cerebrum apprehēdit, ut stridens subinde ad uertigine rotata, ne filum quidē desuper pendens rūpere, adeo non fugere queat, nec finis ante mortē est. Sunt & ex araneis auguria: quippe incremento amnium futuro telas suas altius tollunt. Iidem sereno nō texunt, nubilo

Btextunt: idēq; multæ araneæ imbrium signa sunt. Ruinis quoq; imminētibus aranei cum telis primi cadūt. Est quoddam aranei genus, ut author est Dioscorides, quod candidā, tenuem densāq; telā nectit: hunc in alura ligatum & brachio adalligatū, quartanis circuitibus mederi narrāt decoctū ex rosaceo & infusum, aurium doloribus auxiliari. Et aranei genus quoddā est, cuius morsum continēs dolor in mediis illis comitatur: unde & rubor, & urinæ emittendæ difficultas sequitur: quandoque uero & suffocatio. Est araneus quidam marinus, æque pestiferum animal atq; lepus marinus, spinæ in dorso aculeo noxius. Araneus quem illi alij lupum uocant, (inquit Dioscorides) subactus & linteo illitus, frontique & temporibus impositus

8 tertianos circuitus per sanat. Tela eius sanguinē sistit imposita, & à uulneribus quæ in summa cute consistunt, inflammationes arceat. Fracto capiti, Plinius ait, aranei tela ex oleo & aceto imposita, non nisi uulnere sanato abscedit: hæc & uulneribus constrictatum sanguinem sistit. Aranei muscarij telæ, & præcipue spelunca ipsa imposita fronti ad duo tempora mirabiliter epiphoras mederi dicuntur. Albugines quoque dicitur tollere inunctione araneus candidus, longissimis ac tenuissimis pedibus, contritus in oleo utere. Sed is etiam cui crassissimum textum est in cōtignationibus fere, adalligatus panno, epiphoras sanare traditur. Linguae ulcera & labrorum sanant araneorum telæ candidæ, & quæ in trabibus parue texuntur. Araneus qui filum deducit ex alto, tritus atque admotus inhibet muliebres purgationes.

9 Aranei in oleo putrefacti contra omnium phalangiorum morsus auxiliantur. Phalangium est Italiæ ignotum, inquit Plinius, plurium generum: unum simile formicæ, sed multo maius, rufo capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercurrentibus respersum guttis: acerbior huius quàm uestra ictus: uiuit maxime circa furnos & molas. In remedio est si quis eiusdem generis alterum percussio ostendat: & ad hoc seruantur cum mortui inueniuntur. Eque phalangion Græci uocant inter genera araneorum, sed distinguunt lupi nomine: uel, ut Nicandro placet, agrestes uocantur alius, lyco araneo, qui muscas uenatur similis: imbellem plagam infert, & quæ dolores sit expers. Tertium genus eodem phalangij nomine, araneus lanuginosus, grandissimo capite: quo dissecto, inueniri dicuntur intus uermiculi duo, adalligatque mulieribus ceruina pelle ante sobolis ortum, præstāt ne

DE DIFFERENTIIS

Rhagion. concipiant, ut Cæcilius in commentariis reliquit: tuis ea annua est. Vocatur & rhagion acino nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus brevissimis 11
 & rhagion acino nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus brevissimis 11
 tanquam imperfectis, incessu tamen uelocissimo. Dolor à morfu eius, qua- 12
 lis à scorpione, urina similis araneis textis. Idem erat alterion, nisi distin- 13
 gueretur uirgulis albis. Huius morfu genua labefactantur: sopor hominem
 corripit pariter & horror. Peior utroque est cæruleus lanugine nigra hir-
 sutus, caliginem cõcitans, & uomitus araneosus, etiamnum deterior, à cra-
 brone penna tatum differens: hic & ad maciem perducit. Tetragnathij duo 14
 genera habentur: peior, medium caput distinguente linea alba, & traluerfa
 altera. Hic oris tumorem facit. At cinereus posteriore parte candidas, len-
 tior: minime autem noxius, eodem colore, qui telas muscis in parietibus la-
 tissime pandit. Vti uero Aëtius tradit tetragnatus phalāgij species est, cor- 15
 pore latiore & subalbido, pedibus scabris: duo illi in capite prominent tu-
 bercula, alterum rectum, alterum latum, ut uideatur quidem ora habere 16
 duo, & maxillas quatuor. Locus ab hoc percussus subalbicans est, & uehe-
 mens in eo dolor: mēbrum uero ipsum ad articulos usque gracilescit. Cor-
 pus denique totum, ex alimento nullum sentit commodum: & post adeptā
 quoque sanitatem, immodicæ infestant hominem uigiliæ. Dyssideri uocāt
 alij, alij sphecium, phalangij genus uehementer rufum, uespæ simile: huius
 morfus tumorem excitat, genua labefactat, nonnunquam & tremorem af-
 ferens, quandoque & mortem. Inueniuntur messis tempore in legumini-
 bus, cum manibus colliguntur, phalangia quædam parua, specie canthari-
 di similia, colore flammeo. Ab huius morfu excitantur pustulæ, quas Græci
 φλυκταίνες uocant: mens perturbatur: linguaque incondita profert, & ocu- 17
 li subuertuntur. Nascitur phalāgius in eruo, inquit Plinius, bestiola aranei
 generis, si hyems aquosa sit. Inuenitur & in Perleæ arbore phalangium, cui 18
 nomen cranocolaptes. In Perleæ arboris frondibus (inquit Nicander) gi-
 gnitur animalculum, phalenæ papilionis specie, capite semper nutabundo,
 & uentre graui, spiculum in summo collo gestat. Hoc si quem percusserit,
 non longo post tempore certa sequitur mors. De phalangiis uero ita pro-
 didit Aëtius, Plura quidem sunt phalāgiorum genera: sed quæ fere ab aliis
 qui theriaca scripsere traduntur, sex numero existūt: rhagion scilicet myr-
 mecium, lycos lupusue, cranocolaptes, sclerocephalus, & scolecium. Quod
 rhagion uocatur, figura est rotunda, colore nigro, uua nigra acino similis, 19
 unde & nomen accepit rhagiū: pedes habet utrinque brevissimos, & os sub
 medio uentre. Qui uero lupus appellatur, intrer araneorū telas inuenitur,
 ubi muscas uenari solet, quibus pascitur. Corpus illi latum & rotundum:
 quæ circa collum partes sunt, incisuram habent, & circa os tubercula tria
 enascuntur. Myrmecion prægrandi formicæ similitimum est: colore fuligi-
 noso atrouæ. Huius corpori inserta sunt quasi astra, maxime uero circa dor-
 sum. Cranocolaptes oblongus & colore uiridante, aculeum in collo gestat:
 quod si in quem inciderit, ferit eas maxime quæ circa caput sunt partes.
 Sclerocephalus caput habet, saxi duritie, & totius corporis lineamenta ani-
 malculis illis quæ lucernas circunuolant similia. Scolecium longiusculum 20
 est,

A est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, uariiegatum. Phalangio-
rum species è quibus periculum præcauere expedit, hæc sunt. Quæ autem eo-
rum morsum sequuntur accidentia, communia sunt excessu defectuq; dif-
19 crepantia. Morsus tenuis est, & qui conspici uix queat: tumor cum liuore,
nonnullis & cum rubore: frigus circa genua lumbosque & scapulas nonnū
quam & totius corporis grauitas. Hæc Aëtius.

1. Acuminatum, &c. ὀξύ, τὸ ἀκμίν. Theodorus, acutum, falax, sed mea quidem sen-
tentia, rectius atque apertius Plinius acuminatum assuldmque ingrediens, reddidit.
2. Varium est, &c. Vetus Aristotelis interpres ita habet: Et inuenitur genus ma-
culatum in uere sub arboribus. Hoc, ut arbitror, genus ataneæ pratense uocat Aristoteles.
3. Ataneæ isti lautiores & stigosiores in uitz munibus ingeniosiores sunt, inquit
Aristoteles. 4. Texit primum, &c. Plinius hæc ita explicat: Texere à medio incipit,
B circinato orbe subtegmina adnectens, maculâque paribus semper interuallis, sed sub-
inde crescentibus ex angusto dilatans, indissolubili nodo implicat. Latitudo telæ sæpe
inter duas arbores cum exercet artem & discit texere. Longitudo fili à culmine, ac rur-
sus à terra per illud ipsum uelut reciprocatio, subitque pariet ac fila deducit: cum ue-
ro captura incidit, licet extrema hæreat plaga, semper in medium currit, ex quo sic ma-
xime totum cōcutiendo implicet. 5. Araneorum istorum lautiorum, &c. Araneo-
rum lautiorum & telam spissiore texentium: ita reddidit Theodorus ex Græca le-
ctione, (πυκνὰ) uetus autem interpres, quæ textunt textura debili. 6. In specu or-
biculari, &c. ἐν κύπτῃ, Theodorus in sinu orbiculari. 7. Plinius hæc ita red-
didit, Pariunt oua in telas expansa, qui saliant atque ita emittunt: Phalangius tan-
tum in ipso incubat, magno numero. 8. Tela eius sanguinem, &c. Hoc Ga-
lenus attribui scribit araneorum telis in genere. 9. Phalangiorum, &c. De his
C phalangiorum generibus, uide Hermolaum in Corollar. 10. Aliter ista expressit et-
iam Plinius ipse. Myrmecion formicæ similis capite, aluo nigra, guttis albis distin-
guentibus, uel parum dolores torquet. 11. Rhagion, &c. ῥάγις à Nicandro (opinor)
uocat. 12. Dolor à morsu, &c. Signa morsus huius leges apud Nicandrum. 13. ῥάγις.
Asterion, &c. Alij legunt apud Plinium asterion uel asortion. 14. Hunc locū Her-
molauis aliter distinguit, ut intelligatur hoc septimum genus esse, & aliud à cœruleo
à crabrone penna tantum differtens, deterius etiam num cœruleo, ut quod macie confi-
ciat se percussos. 15. Tetragnathum, &c. Tetragnathum Hermolaus ex Aëtio:
ita nobis descripsit, modice lato & subalbo corpore, pedibus asperis, duabus incisuris
in capite, recta una, per obliquū altera, ut quaternas buccas habere uideatur, unde no-
men. In Æthiopia (inquit) tam frequentes, ut regionem in ea quandam prope Sillos
Acridophagosque deserui coegerint. 16. Cranocolaptes, &c. κεφαλολαπῆς etiam à
quibusdam appellatur. 17. Corpus, aliàs os, σῆμα, rotundū, περικάρπιον: uide an men-
dosa sint hoc loco Aëtij exemplaria. 18. Aliter fortasse, lineas habet toto corpore,
D similes animalculis, &c. ut legatur, non ὡς χερμίδας, sed potius ὡς χερμίδας. 19.
Alia quoque præter hæc signa uideas apud Dioscoridem lib. 8, & Paulum & ipsum
Aëtium.

De scolopendra & aliis quæ multipedæ dicuntur.

Cap. CCXII.

- Scolopendra item morsu perniciofa est, quam & ophioctenam uocant,
1 & centipedam: & alij sepa, ex iulorū genere. Iulum autem uoco infe-
cti genus prælongum & multipes, illam habens partem non simplicē sed
multiplicem, quæ est inter caput & aluum, in qua coniunctur quod cordi
proportionale est: quo fit, ut præcisum hoc genus uiuere possit. Millepedæ,
2 quas & centipedas & multipedas alij uocant, duorum generum. Animal

Alia, tractu- est millepeda, inquit Plinius, è uermibus terræ pilosum, multis pedibus ar- E
que. cuatim repens tactūque contrahens se: oniscum Græci uocant, alij tilon. Il-
Oniscus. lam autem quæ non arcuatur, sepa Græci uocant, alij centipedem, alij mil-
Tilos. lepeda: alij scolopendram, minorem perniciosamque, oblongam, pedibus
Seps. multis atq; pilosis, & qui ex utraque corporis parte in ingressu, remorū in-
Centipes. star mouentur, pecori præcipue nociuam. Viuit scolopendra uel in plures
Millepes. partes dissecta: & si pars aliqua à reliquo corpore abscindatur, in utrunque
Scolopendra. se mouet extremum: nam & caput uersus ingreditur & in caudam, ideoq;

*Ἀμφοτέρως
 ἀπολεπίσθαι
 Nicand.*

*Scolopendra
 marina.*

à nonnullis existimatur biceps esse. Huius morsum tumor insequitur, & putrescit locus atque in ambitu liuescit: fitque postea ulcus, quod à loco i-
 pso exorditur, quod & permolestum est, nec facile curatur. Scolopendra ci-
 micibus aduersatur suffitūque necat. Scolopendram terrestrem salua dif- F
 rumpi ferunt. Sunt & scolopendræ marinæ terrestribus similes, magnitu-
 dine æquales aut paulo minores, colore rubetiores, numero pedum copio-
 siores, & crurum tenuitate graciliores: nasci locis saxosis solent, & modo
 serpentum, non magna altitudine gurgitum. Hæc ubi hamum deuorari,
 euerit foras partes internas, donec hamum eiciat: tum recipit intro, ac ua-
 let eadem qua ante sanitate. Appetitus his quoque nidorulæcorum, ut ter-
 restribus est. uenenosa & hæc est. Mordet autem non ore, sed tactu totius
 corporis, ut quæ urticæ uocantur. Et uti cecinit Oppianus,

-Si quis modo cominus illum

Attigerit, feruet scæda prurigne corpus,

Qualem urtica facit cognomine dicta doloris.

*Millepeda.
 Centipeda.
 Oniscus.
 Tilos.
 Millepeda.*

Oleo in quo scolopendra marina sit cocta, nonnulli ne pili euulsi renascan- G
 tur, usi sunt. Verum alij cetaceum genus quoddam esse scolopendram ma-
 rinam arbitrantur, aspectu horrendum, eamque spectari eminentem è ma-
 ri, & marium pilos magna excelitate apparere: eius caudam similiter atq;
 locustæ latam perspicere. reliquūque corpus conferri posse cum uirime iu-
 stæ magnitudinis, atque permultis pedibus utrinque ordine tanquam ex
 scalmis appensis per summum mare natare. Millepeda centipedæque, quam
 modo & oniscum uocari diximus, & tilon, efficaciter sanat auriū dolores,
 inquit Plinius, in cortice punici mali decocta & porri succo, addunt & ro-
 faceum, & in alteram aurem infundunt. Millepedam oniscum bibisse pro-
 dest urinæ. Medentur suspiriosis multipedæ, ita ut ter septenæ in Attico H
 melle diluantur, & per arundinem bibantur: omne enim uas carum nigre-
 scit contactu. Quidam torrent ex his sextarium in patina donec candidæ
 fiant, tunc mel immiscent: alij centipedam necant, & ex aqua calida dari iu-
 bent. Onisci, qui & oni dicuntur, (uti prodidere Dioscorides & Galenus) 4
 sub aquariis uasis reperti, animalcula sunt multis pedibus nitentia, quæ cō-
 tacta manu contrahuntur in orbem, fiuntq; ubi se contraxerint, fabis escu-
 lentis non dissimiles, ac proinde à nonnullis *χίμας*, id est fabæ uocati, colore
 fusco. Hi ex uino poti, inquit Dioscorides, urinæ difficultati, quæ disuria
 dicitur, & regio morbo auxiliantur: cum melle anginis illinuntur. Triti &
 in malicorio unā cum rosacco calfacti in aurium doloribus utiliter instil-
 lantur.

*ὄνις, ὄνισκος.
 Ἀσπίς.*

*κίμας, faba.
 Colore fusco,
 φαειν.*

Alantur. Hæc Dioscorides. Et Galenus, quidam his usi sunt, inquit, ad aurium dolores, in oleo coctis.

1 Iulus uermis est multipes: mille nanque pedibus utitur, ut scolopendra. Quidam & ipsas scolopendras iulos uocant. Hæc Theop. 2 Animal est, &c. Iuloo hanc speciem (ut opinor) uocauit Nicander in Theriac. interpretis uero *μυρίποδα* appellat. 3 Paulo minoris. Suspectus mihi certe uidetur hic Aristotelis locus: uetus interpretis habet, quod est in mari, est miuus agreste. 4 *ὄνι πλύνει* forsitan Aristoteli, ao prior *ὄνι πλύνει* multipeda?

De iis quæ promuscidem & ueluti aculeum in ore gerunt: ut, de muscis & culicibus. Cap. CCXII.

Linguae siue promuscidem habent muscæ, qua uel cruorem ex animalium corpore extrahant: qua & gustum habent omnium saporum, & omniuoræ sunt: hæc euidentis fistula est. Cocunt quidem ut & alia insecta & generant muscæ, uerum non animal sui generis, sed uermiculorum: & muscæ ubi pecorum ulceribus infederunt, uermes creant, inquit Columella. Neque ab animalibus ipsi generantur, sed ex uermiculis ex forde humida aut sicca putrescente genitis. Principium autem ipsorum uermiculorum exiguum est, atque ex immobili quasi hærens adhuc, moueri incipit: mox uermiculus immobilis redditur: qui cum postea motus est, rursus immobilis fit: demumque generatur musca, quæ flatus aut solis beneficio moueatur. Nullum animal minus docile existimatur minoris uel intellectus quàm musca. Mons est Carina in Creta, 1 x milliū passuū ambitu, intra quod spatium muscæ non reperiuntur: natumque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamenti eligitur. Alopecias replent muscarum capita recentia, prius folio ficulneo asperatas: alij sanguine muscarum utuntur, alij decem diebus cinerem earum illinunt cum cinere chartæ uel nucum, ita ut sit tertia pars è muscis: alij lacte mulierum cum brassicæ cinere muscarum subigunt, quidam mel tantum. Apud Macedonas circa fluuium Alstrum, qui inter Beroeam & Thessalonicensem medius fluit, uolitat muscarum genus, quas, cum ad summam aquam accesserint, pisces quidam qui in eo flumine gignuntur, uariis distincti coloribus, arripiunt atque deuorant, indeque uictum sibi comparant. Has equiseles uocant indigenæ: quæ uulgarium harum quæ ubique reperiuntur muscarum, quod ad formam datinet, nihil simile habent. Nec apum uesparum uel similitudinem gerunt: harum tamen cuiusque aliquid referunt, uesparum colorem reddunt, magnitudine apibus æquales: & similiter atque apes bombitatione strepunt: atque in audacia quiddam simile cæterarum muscarum habent. Et culicibus lingua fistulosa est & ad suctum, & aculei loco ad pungendum. Corpus his minimum, alius fere iciuna, crura prælonga, & uox pro corporis ratione maxima, animalculum sanguinis & potissimum humani auidissimum. Infestant culices hortos, inquit Plinius, riguos, præcipue si sunt arbusculæ aliquæ. Hi galbano accenso fugantur: culicum uaria sunt genera. In culicum genere, muliones non amplius quàm uno die uiuere feruntur. Apes impugnant (ut scribit Plinius) è culicum genere muliones. Apes quoque exa-

DE DIFFERENTIIS

- Oestrus*, *οἰστρος*. gitanē testri, uti suprà diximus: sed fœtus apum hic est amplioris magnitudinis q̃ sint cæterarum. Sunt & cæstri quibus lingua siue promulcis pro a-1
culeo est, qua sanguinem exugunt, & tergora etiam quadrupedum penetrant, sicuti & tabani, siue asilos dici placet, promulcide siue lingua ipsa adacta, cutem hominum. Oestrum nonnulli etiam asilum interpretantur teste uel Vergilio. - Cui nomen asilo
Romanum est, cæstrum Graij uertere uocantes,
Asper acerba sonans, quo tota exterrita syluis
Diffugiunt armenta, furit mugitibus æther
Concussus. Tabani ex uermiculis quibusdam impenni-
Tabanus. bus ex arbore lignœ natis procreantur: cæstri è latiusculis quibusdam be-
Oestrum. stiolis quæ in fluuiis super aquam currunt, enascuntur. Quamobrem ma- F
gna cæstrorum cōpia provenit circa aquas, ubi id genus bestiolarū est. Itaq;
ἔμπίς. primum in humore uiuit bestiola, quæ *ἔμπίς* uocatur: deinde forma immu- 2
tata foris uiram agere incipit. ex iis enim cæstri proueniunt, quorum gene-
Ἀσκαρίδης. rario ita habet: ex ascaridis generantur empides. Porro ascarides fere in pu 3
Ascarides. reorum limo, & ubicunque se aqua colligit, rerū tena subsistente cōcretionē
Ascarida. oriuntur. Fit ut principio sex ipsa putrescens colorem candicantem trahat,
mox nigricantem: postremo cruentum. Talis cū fuerit, minutissima quæ-
dam & rubra prodeunt, quæ ad tempus hærentes suæ origini mouentur:
deinde absoluuntur, itaque feruntur per aquam quæ ascarides nuncupantur:
tum paucis post diebus erigunt se super aqua duræ atque immobiles.
Mox disrumpo putamine empis emergit ac supra insidet, donec uel sole uel G
flatu moueatur, deinde uolat. Copiosius autem ac celerius fiunt ascarides
in aquis, quarum sedjmentum uarium ac promiscuū sit, quale in agro Me-
garico & in operis soler misceri. putrescit enim hoc facilius. Et autumnō
quoque uberius generantur: minus enim humoris esse tunc accidit. Hæc
de empide Aristoteles. Alij uero empida animalculum esse produnt, in 4
quis aut circa aquas natum conopi simile, sed maius, alba linea mediū cor-
pus cingente. Conopes (culicum genus) ex uermiculis qui in fece aceti gi 5
gnuntur, originem trahunt. Hi ad dulcia non accedūt, sed acida petunt: lin-
gua sua acriter pungunt. Conopas quoque nonnullos ex igne generari fe-
runt: ex flamma scilicet & scintillis, quemadmodum uermes in niue. Fica-
Culex ficarius. rios culices caprificus generat suis pomis: fit primum uermiculus, mox ru- H
ἴδω. pra cute euolat: mutataq; sede petit ficus immaturas: quibus sese insinuans,
facit ne decidant: quamobrem agricolæ appendere ficis caprificus, & iuxta
eandem caprificos serere assolent. Sunt & quædam culicum genera aliqui-
bus fructibus molesta, ut glandibus, fico, qui uidentur ex humore nasci, tūc
dulci subdito corticibus.
- Culex palustris*. 1 *οἰστρος* μὴ ἔστιν ὁ αἰσχροκελὴς, inquit Suid. *ἡ γὰρ ἡμῶν ἐστὶν ὁ βοῦς ἔμπίς*
Culex mulio. *εἰς ὁ αἰσχροκελὴς*. 2 Quæ *ἔμπίς* uocatur. *ἔμπίς* δὲ Theodorus modo culicem palustrem
κρίψ. uocat, modo culicem mulionem, quanquam & *ἔμπίς* quoque culicem mulionem uer-
Tipula. tit, nonnunquam culicem: unde cnipologos auis dicta ab eo culicilega est, ut suprà di-
ctum est. 3 Ex ascaridis. Ascaridas, tipulas uertit Theodorus. 4 Empida, &c.
ἔμπίς

A *μυρμιδωνες* *ἰσχυρῶς* dixit Aristophanes in aubibus, *ἰσχυρῶς* & in *μυρμιδωνες*, sonoras esse empidas ait. § Qui in fece, &c. Theodorus modo culicem uinarium uertit, mo- *Culex uinarius*.
do culicem. Plinius: Culices acida petunt, ad dulcia non aduolant, dixit: & genera cu- *Culex*.
licum accensens natura gignit.

De cicadis.

Cap. CCXIII.

C Cicada ex omni animalium genere una, ore caret: uerum membrum *Cicada*.
+ quoddam quod usum tum oris tum linguæ præstet in pectore consti- *τίμη*.
tutum aptissime habet, quo ueluti radice, cibū ex humoribus trahat. Pro-
lixum hoc compactum, indiuisumque gerit, simile ei quod linguæ spe-
ciem refert in iis quibus aculeus in ore est: eoque ipso rorem haurit, ali-
mentum unum & peculiare. Oculos Nigidius cicadis inesse negat: uerum
oculos habent, inquit Aristoteles, sed hebetes: & si quis digitum contrahēs
B ac remittens subinde appropinquet, magis sustinent quàm si ilico extēdat.
Et quidem transire in digitum alliciuntur: quod enim oculis hebetes sunt,
quali frons aliqua moueatur, digitum ita admotum confidunt. Penna-
rum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior. Isdēque solis nul-
lum ad excrementa corporis foramen: neque enim excrementum cicadis
ullum in aluo reperitur. Nam cum omnia insecta minimo alimento con-
tenta sint, omnium maxime cicadarum genus ieiunum est. Excitatæ cum
subuolant, quendam reddunt humorem modo aquæ: quamobrem rustici
eas mingere, & excremento non carere, rorēque ali assueuerant. Nasci non
possunt cicadæ ubi arbores defunt: loca etiam frigida aspernantur. Est que-
dam & in iis locorum differentia: in Milesia regione paucis sunt locis: sed
C in Cephalenia amnis quidam penuriam earum & copiam dirimit, cuius ei-
tra altitum latus est cicadarum copia, ultra alterum nullæ. In Rhegino a-
gro silent omnes, ultra flumen in Locris canunt. Procreantur cicadæ ex ani-
malibus sui generis: & coeunt tam maiores quàm minores supinis admo-
tis partibus: māsque inserit in fœminam, non sicut & cætera insecta agunt.
Genitale fœmina habet rescissum, quo recipit id quod à mare iniicitur. pa-
riunt in aruis cessantibus, terram excauantes parte sui posteriore quam a-
cutam habent. Quinetiam in arundinibus, quo adminiculo uites eriguntur,
nidum fœturæ excauant, & in caulibus squillæ interdum pariunt: proue-
niunt large copia imbrum. Crescit primo in terra uermiculus, deinde fit
D ex eo quæ tettigometra uocatur, (quo tempore suauissime sunt ante quàm
eortex rumpatur) postmodum circa solstitia noctu exeunt cicadæ ex ma-
trice illa cicada, quam modo tettigometram dixi, nigræ protinus & du-
riusculæ & maiusculæ. Vbi uero eruperunt, oleis aut arundinibus insidunt:
& cum rupto operculo exeunt, parum quiddam in eo relinquūt humoris:
nec multo post uolant & incipiunt canere. Mares sunt in utroque genere,
(tam scilicet maiorum quàm minorum) qui canunt, fœminæ quæ silent. *Cicadarum*.
Cicadarum genera uaria sunt, quæ magnitudine & paruitate differunt: & *genera*.
præterea quod aliis incisura est sub septo præcinctiue, membranamque in *Tettigonia*.
aperto gerunt, qua sonus editur, ut iis quas achetas appellant: aliæ non ita *Tettigonia*.
habent, ut quæ tettigonia, id est cicadastæ uocantur. neque enim ita diui- *Cicadastre*.

*Cicada muta.**Acheta.**Acheta.**Tettigonia.**Cicada muta.**Cicada furcu-**laria.**Cicada frumē-**taria.**Cicada auena-**ria.**Cicada mari-**na.**Arguta cic-**ada.**Locusta.**Acreis.**Spina caulem**vocat Plinius.**Plinius.**Plinius.**Plinius.**Plinius.**Plinius.*

sum illis corpus est, neque membranam habet adeo manifestam. Sunt ita- E
que cicadarum duo genera: alie minores quæ primæ proveniunt, quæque
sunt mutæ, & novissima pereunt: sunt autem multæ: alie maiores, quæ ca-
nunt, præcinctu diuiduæ, ut modo diximus, siue minores, siue maiores sunt.
Quæ autem non canunt, indiuiduæ constant. Vocant nonnulli grandiores
illas & canētes, achetas: minores tettigonia, id est cicadas mutas. Sed canē- 3
re uel in hoc secundo genere possunt paululum quæ præcinctæ prodierint, 4
sed priores illæ magis canoræ sunt. Mares cātant in utroque genere, fœmi-
næ silent, uti modo diximus. Quidam duo alia genera faciunt earum: fur-
culariam, quæ sit grandior: frumentariam quam alij auenariā uocant: ap-
paret enim simul cum frumentis arefcētibus. Gentes uescuntur iis ad oriē- F
tem, etiam Parthi opibus abundantibus: ante coitū mares præferunt, à coi-
tu fœminas: quippe quæ oua candida gustu habeāt grata. Cicadas dant nō- 5
nulli iis qui colico dolore afficiuntur, cum paribus numero granis piperis,
tribus scilicet aut quinque aut septem. Cicadæ, inquit Dioscorides, si assæt 6
edantur, uescit doloribus auxiliantur. Est & cercope animal cicadæ simi- 7
le, ut Pseusippus author est. Est etiam cicadarum genus marinum, quarum
maxima parui carabi speciē habet: uerūtamen cornua nō similiter atq; ille
magna, nec aculeos habet. Pinnæ ipsius exiguæ, terrenarū alis similes sunt.

1 Plinius: Pro eo quiddam aculeatum linguis simile, & hoc in pectore, quo rorem
lambat. 2 Quam acutam habent. Theod. asperitate præcuta quam parte habent
posteriore. Ex Plinio forsitan. Plinius: Asperitas præcuta in dorso qua excauant fœ- G
turæ locū in terra. 3 Achetas: Theod. argutas uertit. 4 Aperius atq; magis ex-
plicate ita legeretur apud Arist. mea quidē sentētia, τὰς ποτὶς ἀντὶ τῆς
αἰματὸς ἀντὶ τῆς αἰματὸς. 5 Quæ oua candida, &c. Plin. Ovis corū corruptis quæ sunt can-
dida: 6 Si assæt edātur, &c. Cicadas in patellis tostas edisse, prodest uescit dolori-
bus, inquit Plin. 7 Cicadæ simile, &c. οὐκ ἔστιν (inquit Athenæus) καὶ φυτόν τι
ubi fortasse legendum erat καὶ φυτόν τι.

De locustis.

Cap. CCXV.

Cum insectorum maxima pars perexigua sit, locustæ magnitudinem
Caliquam habent effatu dignam. Crura habent parte posteriore ad gu-
bernaculorum effigiem condita, & mediis lōgiora, quibus saliant pulicum 1
more. Oculos Nigidius nullos locustis inesse dicit. Ventrem intus habent
& intestinum replicatum. Maribus fœminæ maiores sunt, quarum caudæ H
adnascitur cauliculus, quo in terra fixo pariūt: eo mares uacant. Procreantur
locustæ ex animalibus sui generis: & coeunt eodem modo quo cætera 2
insecta quæ coeunt, mare scilicet fœminā superueniente, & in eam fœmi-
næ ultimo caudæ reflexo, tardōque digressu. Pariunt fœminæ in terra fixo
cauliculo illo qui caudæ adnascitur: ac uniuersim, & loco eodem fœtū de-
ponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur: hinc uermiculi speciem oui geren-
tes oriuntur: qui terreno quodam prætenui tanquā membranula ambiun-
tur: qua dissecta, emergunt locustæ ac euolant. Tam mollis fœtura hæc est,
ut ad tactum leuissimum cōteratur: non summæ telluri partus committi-
tur, sed paulo altius: durātque hyeme sub terra. Hic concoctione peracta,
subsequenti

- A** subsequenti anno exitu ueris, exeunt ex illo terreno amiculo parua locustæ & nigrantes, ac sine cruribus pennisque reptantes: deinde maiores statim efficiuntur. Pariunt exitu æstatis, & statim à partu moriuntur, uentriculis circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Tam friuola ratione morientes, serpentem cum libuit necant singula, faucibus eius apprehensis mordicus. Vernis aquis intereunt oua, in sicco uere magnus prouentus: alij duplicem earum fœtum, geminumque exitum tradunt, uergiliarum exortu parere: deinde ad canis ortum obire, & aliàs renasci quidam arcturi occasu renasci. Est & aliud earum obitus: gregatim sublata uento, in maria aut stagna decidunt: lōginqua quoque maria ab iis transiri feruntur, continuata plurium dierum profectione. Nanque & grandiores cernuntur, & tanto uolant pennarum stridore, ut aliæ alites credantur, *Pariunt autem tempore æstatis.*
- B** solēque obumbrent. Italiam ex Africa magna cohorte infestant, omnia morsu erodentes, & fores quoque tectorum. Locis montanis aut tenuibus locustæ non fiunt, sed planis rimosisque: pariunt enim in riuus sua oua. In India ternum pedum longitudinis esse traduntur, cruribus & fœmoribus ferratum usum præbentes cum inaruerint. Locustæ suis gubernaculis atterentes sonant, inquit Aristoteles: uerum Plinio uox earum proficisci ab occipitio uidetur. Eo in loco in commissura scapularum habere quasi dentes existimantur: eosque inter se terendo stridorem edere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicadæ circa solstitium. Pars quædam Æthiopum locustis tantum uiuit fumo & sale duratis in annua alimenta, atque ob eam rem acridophagi nomen habent. urinæ angustis quas disurias uocant & stranguriæ, maxime mulierum, suffitu prosunt locustæ. Est quoddam genus locustæ, asiracus aut axirachus dicitur, aut *asiracum. Axirachus. Ovis, asellus.* id est asellus, sine alis, crassioribus cruribus: recens hic & exsiccatum contra scorpionis morsus magnopere iuuabit si ex uino bibatur. Hac in frequenti ciuitate utuntur Afri, qui Leptin incolunt: In locustarum genere censentur attelabos, siue brucus, attacæ, ophiomachus, mastace, moluris, & parnops. Attelabi (ut Aristoteles prodidit) pariunt in aruis cessantibus, quo modo & cicadæ. Pariunt autem, & cum pepererint moriuntur, pari modo atque locustæ. Intereunt oua eorum aquis autumnalibus cum nimis inceserint: at sicco autumno largior prouentus attelaborum est, quoniam minus oua intereant. Est autem attelabos locustarum minima sine pennis. Est animal, inquit Plinius, locustæ simile sine pennis, quod tryxalis græce uocatur, Latinum nomen nō habet, ut aliqui arbitrantur authores: nec pauciores hoc esse quod gryllus uocatur. Ex his uiginti torreri iubent, ac bibi è mulsa contra orthopnoeas, sanguinemque expuentibus. Tryxalidum cinis illitus cum melle, purgationes mulierum adiuuat. Margines quoque ulcerum durorum aufert cum melle. Magnam autoritatē gryllo perhibet Nigidius, maiorem magi, quoniam retro ambulet terramque terebret, & stridat noctibus. Venantur enim formica circumligata capillo in cauernam eius coniecta, efflato prius puluere ne sese condar, & ita formicæ complexu extrahitur. Auribus prodest gryllus cum sua terra effossus & illitus. Lenit

& tonfillas gryllus infricatus: aut si quis manibus quibus cum contriuerit, E tonfillas attingat.

1 Crassioribus cruribus, *μαλακικωλος*, id est, *πρὸς λόγῳ* cruribus, ut uertit Ruellius. Hunc Paulus apteron uocauit, quia pennis careat. Hermolaus. 2 In locustarum genere, &c. In Leuitica lege, in iis quæ crura habent ad saltum idonea, numeraturum Brucos & quæ illi similia sunt: attaces, & quæ illi similia sunt: *ophiomachus*, & quæ illi similia: locusta, & quæ illi similia. Locustarum speciem illam, quam non appellant, etiam brucum uocari putant, uti refert Hermolaus, rodentem fava. Et attaceu in sacris literis appellatam, Nicander mastacen appellat pro bruceo, Aristoteles attelabon. Cuius rarebus in Ambracia locustas omnes mastacas dici uoluit, ut molurini, quæ frumenta depopulatur. Molurides in pratis uicitant, ut uidetur ex Nicandro, locustis similes. Ionia locustas à numero pennarum tetrapelyridas nominat: alij cornopas & parnopas aut pornopas: unde cognomen Herculi & Apollini quoque in Æolia, quod locustas abigar, *καριπιδόν*. Hæc Hermolaus fere. Parnopius Apollo ab Atheniensibus dictus est, (ut scribit Pausanias) quiddam parnopas eorum agro infestas propulsauerit. Iones (ut Hesichius auctor est) brucum locustæ speciem dicere, Cyprij locustam uiridē, brucum uocarunt, Tarentini attelabon: alij *καρυνηνία μοιρην*. Est autē attelabos locustæ parua. Hæc Hesichius. Parnops locustæ species est, ut scribit Aristophanis interpres, quæ se manu facile tractandum præbet. Marcellus Vergilius de locustis ita prodit, Variat admirabili artificio locustas natura: quis enim tot primum in eodē corpore colores facile descriperis? quis tam diuersas corporum formas? quis ingressus, saltus, uolatus earum? Sunt enim quæ uirides, quæ nigre, quæ liuentes, quæ aliqua parte hunc aliqua illum colorem ostendant. Sunt quæ uolantes tantum, latentem autem colorem aliquem proferant. Sunt quæ simplicibus, quæ pluribus alis uolent: quæ alis carentes saltent: quæ utroque hoc motu priuatē ingrediantur tantum. Sunt quæ longioribus, quæ brevioribus cruribus sint: & in his pluribus brevioribusque, & paucioribus longioribusque internodiis. Sunt quæ canant, quæ mutæ sint: quæ per diem, quæ in tenebris tantum audiantur. Sunt quæ nihil homini in re rustica uoceant, innocentēque à pueris se capi patiantur. Sunt contra quæ pestem & calamitatem factorum omnium totis regionibus afferant: utque plura sunt in natura genera, sic etiam pene infinita ueteribus earum nomina fuerunt. Hæc Marcellus.

De uaginipennibus, quæ Græci *καυλίπτερες* uocant.

Cap. CCXVI.

E Volucris insectis quædam membranas ipsas quibus uolant, crusta superueniente quasi uagina, tutelæ gratia inclusas gerunt, unde *καυλίπτερες* dicuntur, quasi uaginipennia dixeris. Horum tenuior fragiliorque: pen na: his negatus aculeus est. hæc & senectutem exuere solent. In iis scarabeus est, cuius plura sunt genera. uolitant enim alij magno cum murmure aut mugitu: alij focos & prata crebris foraminibus excauant, nocturno strido re uocales. Quoddam rursus eorum genus, qui è fimo ingenteis pilas auer si pedibus uolitant: paruósque in iis cōtra rigorem hyemis uermiculos for tuis sui nidulantur. Hæc Plinius. Propter hunc scarabeum qui pilulas uoluit, Ægypti magna pars scarabeos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligit Solis operū similitudinē hinc animali esse ad excu sandos gentis suæ ritus. Scarabei, inquit Theophrastus, rofarum odore necantur, Græci cantharum uocāt. Canthari, inquit Aristoteles, in fimo, quæ uolunt, conduntur per hyemem, paruósque uermiculos pariūt, ex quibus ipsi procreantur. ubi metuerint, hi motu cessant, totoque corpore indure scunt

Apteros.

Tetrapelyrides.

Cornops.

Parnops.

Pornops.

μαλακικωλος

καριπιδόν

καρυνηνία μοιρην

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

καυλίπτερες

- A** scunt sese contrahentes: id quod patet maxime cum tanguntur. Melolonthæ (quas scarabeos uirides & galerucas uocant nonnulli) uermibus fimo bouis aut iumentis creatis gignuntur: & inter uolandum sonitū edunt. Scarabei uiridis natura, inquit Plinius, contruētium uisum exacuit: itaque gemmarum sculptores conuictu eorum acquiescunt. Carabo (quem Theodorus modo taurum uocat, modo fullonem) antennæ ante oculos præteduntur, ut papilioni. Gignitur hic ex uermibus qui in lignis aridis nascuntur. Et primum quidem uermes ipsi immobiles hunt: mox disrupto putamine catibus exit, aliorum more qui ex uermibus gignuntur. Tauri uocatur scarabei terrestres, inquit Plinius, ricino similes: nomen cornicula dedere: alij pediculos terræ uocant. Ab iis terram egestam illinunt strumis & similibus uitis, & podagris, triduo non abluunt: prodèstque hæc medicina in annum. Fullo scarabeus uocatur albis guttis. In quodam genere scarabeorum grandi, cornua prælonga, bisulcis dentata forcipibus, in cacumine cum libuit coeuntibus. Infantum remediis etiam ex ceruice suspenduntur. Lucanos uocat hos Nigidius. Scarabeorum cornua denticula adalligata, ad infantium urinam cohibendam, amuleti naturam obtinent. Fodiunt rutili & prægrandes scarabei tellurem aridam, fauósque paruæ & fistulosæ modo spongiæ medicato melle fingunt. Eriphiam herbam multi prodidere: scarabeum hæc in auena habet sursum deorsum decurrentem cum sono hœdi, unde & nomen accepit. Et è leguminum uermiculis nascuntur animalia pennata. Est & cantharis dictus scarabeus paruus frumenta erodens. Coeunt quidem cantharides & generant, uerum non sui generis animal, sed uermiculos tantum: neque ex animalibus procreatur, sed ex putrescente humido aut sicco. nascuntur enim ex uermiculo in spongia cynorhodi cynanthésue, id est, sentis caninæ, quæ sit in caule: ex crucis item fici, piri, pini, fraxini & rosæ. Fiunt enim in his omnibus uermes, sed fecundissime in fraxino: in alba tosa minus efficaces. Ad medicamenta cæteris præstant è tritico collectæ. Potentissimæ inter omnes uariæ luteis lineis, quas in penis transuersas habent, oblongo corpore crassæ, ac blattarū modo pingues: præsertim si super acetum per linteolum uaporentur. Inertiores minutæ, latæ, pilosæ: inutilissimæ uero unius coloris macræque: uis earum adurere corpus, & crustas obducere: uel, ut Dioscoridi placet, erodere exulceratæque.
- D** & calorem incitare: qua de causa admiscuntur medicamentis quæ lepras terasque lichenas, & cancri naturam habentia sanant. Ad ungues itaque psorodeis cum ceratis aut emplastris idoneis impositæ, ita illos auferunt ut toti cadant. Admiscuntur quoque iis quæ clauos auferunt: aliqui alopecias cantharide trita illinunt cum pice liquida, nitro præparata cute. caustica uis earum, cauendū inque ne exulceret alte. Postea ad ulcera illa facta, capita murium, & fel murium & simum cum elleboro & pipere illini iubent. Cantharides mixta calce pauos scalpelli uice auferunt: nonnulli paululū quiddam earum iniicere solent in medicamenta, quæ urinam cient: uetum in iis magna quæstio, quoniam ipsæ uenena sunt potæ, uesicæ cum cruciatu perpetuo. Cossinum equitem Romanum amicitia Neronis principis no-

μαλακίαι. Sc.
Scarabeum uiridis.
Galeruca.

Carabus,
ad leg. Cos.
Taurum.
Fullo.

Taurum.
Pediculus terrestris.

Fullo.

Lucanus.

Scarabeus rutilus.

Scarabeus in eriphia herba.

Cantharis.

Quæ è frumento colliguntur, inquit Dioscorides.
Multrum pingues, inquit Plinius.

tum, cum is lichene correptus esset, uocatus ex Ægypto medicus ad hanc E
 ualitudinem eius à Cæsare, cum cantharidum potum præparare uoluisset,
 interemit: uerum illitas prodesse non dubium est, cum succo taminæ uux
 & seuo ouis uel capræ. Ipsarum cantharidum uenenum in qua parte sit, nō
 constat inter authores: alij in pedibus & capite existimant esse, alij negant.
 Conuenit tamen pennas earum auxiliari in quacūque parte sit uenenum,
 quibus demptis lethale est. Hæc Plinius. In medicamenta quæ urinā cieāt,
 nonnulli solas alas cum pedibus iniiciunt, quæ alexiteria esse dicunt iis qui
 corpora ipsarum cantharidum ebiberint: alij contra. At nos, inquit Gale-
 nus, totas cantharidas iniicere solemus. Menses ciunt & urinā: ideo & Hip-
 pocrates hydropicis dabat: ita Plinius. ut uero Dioscorides, Menses ciunt F
 pessariis emollientibus additæ. Aliquæ cantharidas antidotis impositas hy-
 dropicis auxiliari prodiderūt, ut quæ urinam moueant. Olfactu picem li-
 quidam referunt: gustu cedrum, ut Nicæder prodidit. Easdem uires habet
 & buprestis, animal cantharidi simile: uel, ut Dioscoridi placet, è canthari-
 dum genere buprestis est: animal rarum in Italia, similitudinē scarabeo lon-
 gipedi, ut Plinius tradit. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nōnē
 inuenit: deuoratūque tacto felle, ita inflammāt ut rumpār. Hæc cum hir-
 cino seuo lichenas illita ex facie tollit sinectica uci. Reponuntur eodem mo-
 do buprestes quo cantharides. Eadem quoque uis quæ cātharidi, & pityo-
 campis est, erucis scilicet in picea nascentibus. Pinorum quoque erucas pi-
 tyocampas uocant: è quibus uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis G
 euolant, quemadmodū & in ficu & cynorhodo siue camina sente, cantha-
 ridum genus, uti modo diximus. Pityocampæ in oleo coquuntur, quo utun- 4
 tur nonnulli, ut ne pili renascantur euulsi. Hippocampus marinum ani-
 mal est exiguum, cuius cremati cinis cum pice liquida aut axungia seu a-
 maracino unguento illitus, alopecias replere fertur: uisūque habere dige-
 rentem pariter & extenuatē. Leporis marini ueneficiū restringunt poti-
 hippocampi: lateris dolores leniunt hippocampi tosti sumpti: & urinæ in-
 continentiam quoque hippocampi tosti, & in cibo sapius sumpti emen-
 dant. Alopecias replet hippocampinus cinis, nitro & adipe suillo mixtus,
 aut syncerus ex aceto. Lichenas & lepras tollit hippocampi & delphini ci-
 nis ex aqua illitus. Hippocampi necantur in rosaceo, ut perungantur ægri
 frigidis febribus: & ipsi adalligantur ægris.

Buprestis.
Novaprasus.
Scarabeus lon-
gipes.

Pityocampe.

Hippocampus.

Scarabeus pi-
lularius.
Coprion.
Lucanus.

1 Cantharum uocant. Scarabeum pilularium uertit Theodorus, coprion ab Hip-
 pocrate uocatur. 2 Nomen cornicula dedere. Scarabeum quendam dicit esse Pl-
 nius, cui sunt cornicula reflexa: an hunc forsitan intelligat, an illum qui Lucanus uo-
 cat, an alium quempiam? 3 Si super acetum, &c. Quoniam modo ita parentur
 cantharides, docent Dioscorides, Plinius & Galenus. 4 Hippocampus, &c. Nar-
 rantur à Plinio Nereides à scopis in marmore sculptæ, supra delphinos & ceteræ hip-
 pocampus sedentes, ut uideatur forsitan hippocampus grandius esse animal. 5 Pori
 hippocampi, &c. Hippocampi quomodo sint ueneni: & iterum quomodo saluta-
 res, ad eandem rabidi morsum, legas apud Aelianum. lib. ii.

A De erucis, & quæ ex iis gignuntur, ut papilionum generibus, & de pennatis quibusdam aliis quæ ex uermibus gignuntur.

Cap. CCXVII.

ERUCÆ, dirum uel ipsis arboribus animal: eroduntque aliæ frödem, aliæ *Erucæ.*
 florem: ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc ma- *Κέρκρη.*
 lum tepore humido & lento: atque in primis ex rore. Insidet hic uirentibus *Alias, tem-*
 foliis maximæ brassicæ, raphanise, ut Plinius tradit. Primum minus quid *poræ.*
 milio consistit in folio spissatum sole. Mox uermiculi inde contrahuntur &
 accrescunt: deinde intra triduū erucæ paruæ afformantur: quæ auctæ mo- *Χρυσαλίδες.*
 tu cessant, suæque forma immutantur, appellanturque tantisper chrysal- *Aurelia.*
 lides, quasi aurelias dixeris, duro insectæ putamine, ad tactum mobiles, a
 B raneolis quibusdam inuolutæ: non os, non aliud ex membris quod conspi-
 cum sit, possident. Longo post tempore, putamine obrupto, euolant inde
 animalia pënata, quas *Ψύλλες*, id est papiliones uocamus. Itaque primū dum
 erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt: at uero cū in chry- *Ψύλλος.*
 salidas dictas transierint, nihil uel gustant uel excernunt. Erucas Ouidius *Papilio.*
 tineas agrestes uocauit, *Erucæ.*
Tineæ agrestes

Quæque solent canis frondes intexere filis

Agrestes tineæ, res obseruata colonis

Ferali mutant cum papilione figuram.

Papiliones antemnas ante oculos prætensas habent: papiliones & quæcun- *Papilio.*
 que ex erucis orta, sibi colorem à sua eruca trahunt. Sunt & erucæ quæ un-
 C den ingressu: parte enim innitentes priore, contrahunt sese adducentes po- *Πωλία, τὸ*
 steriorem, arcuatimque incedunt: ex iis generantur quæ uocantur *Αΐς.*
Ψύλλα, id est acie & superæ. In brassicæ caule gignuntur uermiculi quidam: *Ψύλλα.*
 ex quibus immutatis orfodacnæ creantur quas mordellas appellem. Erucas *Supera.*
 è tithymalo nascentes, aculeatas esse prodidit Hippocrates. Erucis quæ in *Orfodacnæ.*
 oleribus nascuntur cum oleo peruncti à uenenatis bestiis feriri negantur. *Mordella.*
 Papilionē qui luminibus accēsis aduolitat, Nicander phalēnam uocat: alas *Erucæ tithy-*
 1 habet mēbranosas, siccas, & quæ tangenti ueluti cinere aspersæ appareant. *mali.*
 Hæc & p̄fora nuncupatur, & à posterioribus *Erucæ olerū.*
Φαλῆνα.
Τόρεξ.
Καυθολαοβί-
ος.
Ηέρσιον,
Ηπιδόλ,
Ephemerum.

D contrarium est iecur aduolans, inter mala medicamenta numeratur: huic
 contrarium est iecur caprinum. Hippānis fluuius apud Cimeriū Bospho-
 rum, sub solstitio defert ueluti folliculos acinis maiores, quibus quadrup-
 des uolucres erumpunt: quod genus animalis in postmeridianum usq; diei
 tempus uiuit & uolat: mox descendēte sole macrescit & languet, donec oc-
 cidente moritur, uita non ultra unū diem peracta: unde hemerobion, id est *Hemerobion,*
 diarium appellatum est. Quatuor pēnis totidēque pedibus mouetur: at- *Diarium.*
 que ita simul & quadrupes & uolucris est. Fit ex quodam uerme grandiore
 qui ueluti cornu gemina protendit, suique generis est, primū toro imitru-
 1 rato eruca: deinde quæ bōbix aut bombilis bombiliusue appellatur: ex quo
 necydalus. Quæ uaria formarum successio in sex mensibus completur. Ex
 hoc animalis genere bōbicina illa mulieres nonnullæ torquendo in filum *Bombix,*
Bombilis, uel
Bombitius.
Necydalus.

Kk

DE DIFFERENTIIS

*Alia, Plinius
Pamphila Pla-
tus filia.
Bombyx.*

deducunt: deinde texunt. Prima texisse in Co insula Pamphila Latoui filia di-
citur. Bombycas & in Co insula nasci tradunt: cupressi, terebinthi, fraxini,
quercus florem imbribus decussum terræ halitu animante. Fieri autem pri-
mo papilionem paruos nudosque: mox frigorumpatientiâ, uillis inhorre-
scere, & aduersus hyemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate
radentes foliorum lanuginē in uellera: hâc ab iis cogi subigique unguium
carminatione: mox trahi inter ramos, tenuari ceu pectine: postea apprehē-
sam corpore inuolui nido uolubili. Tunc ab homine tolli: scilicet uasibusque ua-
sis tepore & furfurum esca nutriri, atque ita subnasci sui generis plumas,
quibus uestitos ad alia pēsa dimitti. Quæ uero cœpta sunt lanificia, humo-
re lentescere, mox in fila tenuari iunceo fuso. Nec puduit has uestes etiam
uiros leuitate usurpare, propter onera æstiuâ: in tantū à lorica gerenda dis-
cessere mores, ut oneri sint etiam uestes. Lucent ignium modo noctu late-
rum & clunium colore lampyrides, id est, cicindelæ, nunc pennarum hiatu
refulgentes: nunc uero compressu obumbratæ (fulgor nanque ille igni simi-
lis alarum compressu tegitur) non ante matura pabula, aut post defecta cō-
spiciunt, pygolampidas uocat Aristoteles. Earum alia pēnatæ sunt, alia im-
pennæ, non aliter atque in formicis. Erucis enim quibusdā corpore piloso
non grandi, primum pygolampides sunt, non tamen uolucres: quibus de-
inde mutatis, pennigera animalia gignuntur, quos *βοτρυχες* uocant, hoc est
cirros. Nascitur uermiculus quidā, cui nomen xilophthoro (ac si ligniper-
dem appelles). Caput suo putamine exerit uarium, pedes in suprema parte
cernuntur: reliquum corpus tunica araneosa integitur, suoque tegumento
hærentes festucas gerit, ita ut forte eas casūque sibi contraxisse dum ambu-
laret uideatur: uerum ipsæ natiuæ hærent tunicæ: & ut limacibus testa, sic
totum id uermiculo huic adhæret: nec decidit unquam, sed euellitur ut na-
tium. Quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat pari modo, atque limax
testa detracta hebetescit: processu utique temporis id quoque in chrysalidē
transit, ut eruca, atque immobile uiuit. Sed quidnā ex eo animalis pennati
oriatur, compertum non adhuc est.

*Lampyrides,
Cicindela.*

*Pygolampides
αἰετὶς, ἡ τρυφὴ
λαμπυρίδης.
Nitedula.
Βοτρυχες.
Cirrus.
Xilophthoros.
Ligniperda.*

1 Papilionem habet Plinius inter morbos apum (uti suprà diximus) ignaum &
inhonoratum, qui luminibus acensis aduoliter, apibus nō uno modo pestiferum: sed
an eundem intelligat cum Nicandri phalæna, considera lector. 2 Aliter. Lucent ue-
spere per arua cicindelæ: ita appellant rustici stellætes uolatus: Græci uero lampyridas. H
3 Erucis enim, &c. Ita legit Theodorus: uerū exemplaria Græca nostra ita habent,
Erucis quibusdam nigris corpore piloso. &c. 4 Nascitur uermiculus, &c. Plinius
hoc animalculum in tinearū genere reponere uidetur, sed absque nomine. 5 Pedes
in postremo habet, uertit Theodorus. (ὁ δ' ἄρα.)

De Bestiolis quibusdam quæ in lignis aut arboribus nascuntur,

Cap. CCXVIII.

*Acari.
Cosses.
Cossis.*

IN ligno gignitur animal candidum, quod omnium animalium esse mi-
nimum existimatur, nomine acari. Sunt & cosses in uermiū genere qui
in ligno nascuntur: hos & cossos quoque uocant nonnulli. Vermiculantur
enim magis minúsue omnes fere arbores: idque aues, caui corporis sono ex-
periuntur.

- A**periuntur. Iam quidem & hoc luxuria esse cepit: prægrandesque roborum
 delicatiorē sunt in cibo, cossos vocant, atque etiā in farina saginati, hi quo-
 que altiles fiunt. Maxime autem arborum hæc sentiunt, pyri, mali, fici: mi-
 nusque quæ amara sunt & odorata. Cosses qui in ligno nascuntur, sanant,
 ulcera omnia: nomas vero combusti, cum pari pōdere anisi & ex oleo illici. *Vermes rubri.*
 Vermes ex arboribus rubri cū oleo tritici, exulceratis, & ruptis auribus præ-
 clare medentur. Eorum autem vermiū qui in ficis existunt, alij ex ipsis na-
 scuntur, arboribus alios parit qui vocatur cerasstes: peculiare enim est quod *Cerasstes.*
 de eo notatur quem cerassten appellant. Cum enim vermium magna pars *legimus.*
 specie formæ inter se differunt, discrimen tamen præcipuum in his est,
 quod in alia arbore fructivæ nati, translati in aliud genus servari nequeūt.
B Cerassten autem & in olea nasci, & in fico parere asseuerant. Habet itaque
 & ficus suos vermes: & illos quoque emitit, quos alienos receperit: omnes
 tamen in cerassten figurantur, sonumque edunt ceu paruuli stridoris. Er sor-
 bus arbor infestatur vermiculis rufis, pilosis, atque ita emoritur. Mespila
 quoque in senecta, obnoxia ei morbo est, uermicationi scilicet. Aliqui
 uoluoce[m] appellant animal prærodens pubescentes uvas. Inuoluulū vo-
 cat Plautus nequam bestiam & damnificam quæ in pampini foliis intorta
 implicat se eaq; erodit. M. Cicero tradit animalia bytueros vocari, qui vites *Bytueros.*
 in Campania rodant. Genus est animalis, inquit Columella, uolucra appel-
 latur: id fere prærodit teneros adhuc pāpino[s] & uvas. Apud erithraeos mi-
 liuntis incolæ (inquit Strabo) Ipoctonus colitur, quod ipas, qui vitibus infe-
Voluocres.
Inuoluulus.
Bytueros.
Volucra.
Ipas.
Cstissimi sint, interficiat: nam ex erithreis omnibus solum inter illos hæc be-
 stiola non gignitur. Olea ubi quercus effossa sit male pōnitur: quoniā ver-
 mes qui ranæ vocantur in radice quercus nascuntur, & transeunt. Anima-
 lia quædam exilia in esculis nascuntur, appellanturque galbæ. Materiā ex *Rana, vermis.*
 sam infestantium quatuor genera. Teredines capite ad portionem grauissi-
 sam, rodunt dentibus, perforantque robora, uel sono teste. Hæc tantum in *Galba,*
 mari sentiuntur, nec aliam putant teredinem proprie dici. Terrestres, tine-
 as vocat: culicibus uero similes, triphas. Quartum est & de uermiculorū ge-
Teredo,
Triphas.
 nere. Hæc Plinius: Theophrastus uero ita habet, Quæ mari putrescere aptæ
 sunt, erodi à teredine solent (teredo enim non nisi in mari nasci potest). *Teredo.*
 quæ autē terra, uermiculis quos *enkelaues* vocant, & iis quos thripas: est autē *Thripas.*
D ipsa teredo corpore parua, capite magno & dētibus. Qui uero thripes dicū-
Thrips.
 tur, uermiculis similes constant, quibus paulatim materies perforatur: sed
 hæc curari facile possunt. Nam si offensa materies trahatur in mare, durare
 nimirum ualeat: quæ uero teredinem senserit, curari hæc minime potest.
 Vermium autem qui nasci in materie solent, alij putrescente ipsa materia
 generantur: alij parientibus aliis uermibus. Pariunt enim uel in cæsa mate-
 rie uermes (quemadmodum in arboribus, qui cerassta uocantur) cum scili-
 cet tam erolerint atque excauerint, ut se circūagere possint. Fugit uer-
 mes ligna odorata, amara, duraque: quoniā hæc erodere nequeant, ceu bu-
 xum & cupressum. Laricem in maritimis nauibus obnoxiam teredini tra-
 dunt: & omnem materiem teredinem sentire affirmant prætetquam olea.

DE DIFFERENTIIS

Tinea, m.

strum atque oleam, quas amaritudinis causa, neque teredo neque uermicu-
lus rodit. Dicunt & pinum plusquam abiete corrodi à teredine posse: hanc
enim esse amaram, pinum uero dulcedinis nonnihil habere. *Tinea*, quæ
græce *τίνη* uocatur, in lanis & quibusuis lanicio confectis, præsertim pul-
uerulentis, oriuntur: atque etiam magis si araneus unâ includatur: si quid
enim humoris inest, hic absorbens exsiccat. Nascitur autè & in tunicis hoc
uermiculi genus: & in cera quoque uetusta. Necnon in chartis librisue gi-
gnuntur bestiolæ perquâ parua, partim similes iis quæ in ueste: partim ue-
ro scorpionis, sed sine cauda. Gignitur enim in libris bestiola scorpionis simi-
lis, quæ & chelas brachiaue forcipibus bifulcis dentata habet.

1 Sunt & colles, &c. *αυλινος* λέγεται *κροσσος*, Theodorus Collos uertit. Pascitur Picus
Martius collos. Et cum collos ueniat, tam uehementer excauare, ut sternere atbores
dicatur. Huius generis uermium meminit & Galenus inter alimenta, lib. 3 De alimēt. **F**

Tinea.
o. e. l.

2 Theophrastus, &c. Tria tantum genera posuit Theophrastus. 3 Quos Theo-
phrastus *αυλινος* καὶ *σπίρας* dixit, Theod. uermiculos & tineas uertit. Plinius: Tineas
& thripas uocauit. & culcibus similes thripas dixit: thripes etiam uermiculos signifi-
care uidentur qui radices siccas erodunt: unde radices *σπίρας* dicuntur apud Theo-
phrastum. 4 Nam si offensa matetis, &c. Græce ita habet *τρίπας* καὶ *αυλινος* καὶ
σπίρας καὶ *αυλινος* καὶ *αυλινος*, &c. 5 Teredinem, &c. In uestibus quaque & in car-
ne sunt teredines. Plinius lib. 8. cap. 48 de Seruij Tullij prætextu, Mirum nec teredinū
iniurias sensisse, &c. lib. uero 18. cap. 11. Carnes nullas teredinē sentire, inquit, luna de-
crefcente induratas sale. 6 In lanis quibusuis, &c. *Tinea lanaria* teste dicitur, ut alte-
ra lignaria, mea certe opinione.

Tinea lanaria

De nonnullis quæ in aliis stirpibus, aut fructibus creantur,
bestiolis. Cap. CCXIX.

κίς.
Curculio.
μίδα.
Curculio.

NON in arboribus solum atque lignis aliisque quæ inanima sunt, ani-
malcula gignuntur specie uaria, sed in fructibus quoque iis qui be-
stiolas creant (nonnulli enim quia sicci sunt, uel quod amaritudinem quā-
dam aut acredinem habent, nulla animalia contrahunt) singula pro suo hu-
more peculiare animal creant: ceu triticum atque ordeum *κίς* uocat, id est
curculionem: fabæ, quod aliqui *μίδα*: & simili modo lens, lenticula, & pi-
sum, & alia. De curculione hæc tradunt. In reponendo tritico curât, inquit
Varro, ne humor aut aer tangere possit, nisi cum promitur ad usum: quod
enim spiritus non peruenit, ibi non oritur curculio. Sic conditum triticum
manet, uel annos quinquaginta: milium uero plus annos centum. Pura fru-
menta, inquit Columella, si in annos reconduntur, repurgari debent: nam
quanto sunt expolitoria, minus à curculionibus exeduntur. Multi tamen
frumenta uentilare quoque uetant, quia magis miscentur animalia totis
aceruis: quæ si non moueantur in summitate intra mensuram palmi, subsi-
stent: neque ultra prædictam mensurâ noxia animalia posse generari aiunt.
Et gurgulionem, inquit Plinius, non descendere infra quatuor digitos tra-
dunt, nec amplius periclitari frumētum. Factis granariis, a murca luto mi-
sta parietes linuntur: Hæc res, inquit Palladius, gurgulionibus & cæteris no-
xiis animalibus inimica est. Est in farre uermiculus teredini similis, quo ca-
uis dentium cera incluso, cadere uiciati dicuntur. Vermiculationem poma
ipfa

G

H

Farris uermi-
culi.
Vermiculario
pomorum.

A ipsa per se quibusdam annis sentiunt. mala, pyra, mespila, punica, oliuæ, sed in oliuæ ancipiti euentu: quando sub cute nati uermes, fructum adimunt: augent si in ipso nucleo fuere erodentes eum: caro enim non tangitur. Gigni illos prohibent flatus & pluuiæ quæ fiunt post arcturum: eadem si austrinæ fuere, generant. In fructicis cuiusdam pomo cui ~~classis~~ nomen est, nascitur bestiola, quæ cum fructus ad maturitatem peruenierit, euolat conopi similis: antea uero quàm matureseat, fructum colligit, & animalculi sanie lanas inficiunt. In ueniunt in gramine uermiculi, qui ad alligati collo continent partum. Detrahuntur autem sub partu, aliis eniti non parituntur: ca uendum etiam ne in terram ponantur: conceptus quoque causâ dantur in potu quini aut septeni. Is uermiculus qui in herba quæ Veneris labrum appellatur, inuenitur, cauis dentium inditus, mire prodest ut facile excidant.

B Sunt uermiculi in spinosis herbis asperi, lanuginosi: hos ad alligatos, protinus mederi tradunt infantibus si quid ex cibo hæreat. Gale dragon uocat Xenocrates leucacantho similem, palustrem herbam & spinosam, caule ferulaceo alto, cui summo capite inhæreat simile ouo. In hoc excrecente ætate, uermiculos nasci tradit, quos pyxide conditos ad alligari cum pane brachio ad eam partem qua dens doleat, mirèque ilico dolore tolli. Valere non diutius anno: & ita si terrâ non attigerit. Sicuti thrips lignarius uermis, & cis triticarius uocatur, & ordearius, uti modo diximus: sic ips cornicularius, sic uestiarius & ixuitarius appellatur, ut Phocion author est.

Cocci uermiculus.
Vermiculi graminis.
Thrips.
Cis.
Ips. Sit. xli.
Ips. ut Strabon placet, mirius est uermiculus.

De curculione. Populârque ingêtem farris âcerum gurgulio, inquit Vergilius: *Gurgulio*.
Cidem opinor qui curculio.

De bestiolis quibusdam, quæ in igne, niue, aut terra ipsa gignuntur.

Cap. C C X X.

IN Cypro insula arariis fornicibus, ubi chalcites lapis ingestus pluribus diebus crematur, bestiolæ in medio igne nascuntur pennatæ paulo minus grandioribus maiores, quæ per ignem saliant atque ambulant. Volat pennatum quadrupes, inquit Plinius, appellaturque pyralis, à quibusdam pyrausta. Quandiu est in igne, uiuit: emoritur autem hoc genus, cum ab igne dimotum est, longioræ paulo uolatu euasit. At uero alijs pyrausta, cum flamma uel maxime uiget, aduolat: atque delapsus uiuus comburitur. In niue uetustiore gignuntur uermes qui & hirti sunt & rubidi: quoniam & ipsa nix uetustate rufescit. In alia etiam niue & candidi & grandiores inueniuntur. Torpent omnes, ac difficulter mouentur. Emoritur & hoc genus si à niue dimoueatur. Apollonides *ουδινιας*, id est uermes. Theophrastus *βερμης*, bestiolas uocauit in niue prognatas, in quibus & aquam puram & potabilem inueniri tradunt. Nec aliter in niue hæc animalcula procreari quam in fornicibus metallicis *κωδωνες*, id est culices, ut uocant, ex flamma & scintillis. In luto, humefcenteque humo sponte proueniunt, quæ *γάργαιες*, id est, intestina terræ uocantur, & uermes terreni atque lumbrici. Vermes hæc habent naturam, corpus uero anguillarum: oculi his nulli. Ita ingrediuntur, ut præcedente parte priore, quod reliquum est corporis ad illam contrahant, atque hoc pacto ex uno loco in alium feruntur. Oriuntur autem

Cocci neri in
cylus.

Vermicelli
ET ALIIS.

Thrips.

City

*Ips. Sin. 166.
Ips, ut Strabo
ni placet, nitia-
rums est nemi-
culna.*

García,

Bestiole igne
penite.

Pyralis

Pyramide.

Pyrisa.

Vermees in ni-
ne.

ဝိဇ္ဇာနည်, စောင့်ရှောက်

Κ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞ
ΙΟΥΝΕ.

Gas 270

Intestinalis terre-

2010

DE DIFFERENTIIS

tum in mari, tum etiam in fluuiis stagnisque, putredinis maxime ratione, E sed in mari qua algæ sunt: in stagnis autem & fluuiis iuxta ripas. Terreni uermes tritici præcisos nervos glutinant impositi: uulnera uero recetia adeo conglutinant, ut nervos quoque abscissos illitis, solidari intra septimū diem Democritus persuaserit: itaque in melle seruandos censet. Cinis eorū margines ulcerum duriores absument cum pice liquida uel simbio melle. Quidam arefactis in sole ad uulnera ex aceto utuntur: nec soluūt nisi biduo intermisso. Igni sacro terreni uermes ex aceto illiti medentur. Capilli ne canescant, eorum cinere præstari, admixto oleo tradunt. Ad aurium uitia uel deplorata, terreni uermes adipe anseris decocti infunduntur. Ad dentium dolores in oleo decocti, infusi que auriculæ cuius è parte doleant, præstant leuamentum: uel si in contrariam aurē instillantur, uti docet Dioscorides. Eorundem cinis exesis dentibus coniectus, ex facili cadere eos cogit: integros dolentes illitus iuuat: comburi autem oportet in testa. Pro sunt & cum mori radice in aceto scyllite decocti, ita ut colluantur dentes: uermes terreni illiti in ceruices & scapulas, ne nerui doleant, præstant. Grauidis secundas pellunt in passo poti. Iidem per se impositi mammarum suppurationes concoquunt & aperiunt extrahuntque, & ad cicatricem perducunt. Lac deuocant poti cum mulso: podagras lenit eorum cinis cum melle, ita ut tertio die soluantur: & pernionibus imponitur eorum fauilla cum oleo. Clauos pedum sanant uermes terreni ex oleo. tritici & ex passo e poti urinā ciunt. Iubent & uermes terrenos bibi ex uino aut passo ad comminuendos calculos. Morbo regio resistūt in aceto mulso cum myrrha: tertianas discutiunt decocti cum anserino adipe & illiti. Multa & alia ex his remedia sunt, propter quæ in melle seruantur.

Julis, ἰούλιος.

1 Pyralis, &c. Pyrigona hunc uocat Aelianus. 2 τῆς ἰσθμῆς, &c. Iulos uocant hos Numenius. 3 Corpus, hoc est corporis formam, opinor.

De bestiolis quibusdam, quæ intra animalia aut eorum partes
gignuntur. Cap. CCXXI.

Lumbricus, ἑλμῖς.

Ascaride, ἀσκαρίδα.

Lumbricus latus, ἑλμῖς πλατύς.

IN excrementis adhuc intra animal contentis oriuntur lūbrici, (ἑλμῖδες Græci uocant) aliorum uermium more, qui ex putredine ortum habet, ex cruda scilicet & crassa pituita. Tria horum genera, latum, teres, & quod ascarida appellatur. Sunt porro ascaridæ paruuli quidā lumbrici, qui parte potissimum inferiore plenioris intestini, quæ podici proxima est, gignuntur, uehementem pruritum loco asferentes: apparentque plurimi in iumentis qui male cibum concoquunt. Sentiunt hoc malum homines præcipue ante pubertatem: uehementioraq; medicamenta ad earum curationē considerant, quàm lumbrici teretes. Ex ascarida nihil aliud procreari potest: latum autem genus solum intestino adhærens, parit simile cucumeris femini: quo indicio medici id genus lumbrici inesse intelligunt. Est uero latū illud genus ueluti pellicula intrinsecus intestina cōtegens, in corpus quoddā uiuum permutata. Longissimus hic lumbricus, & qui sæpe per tota protenditur intestina. Egrediturque nonnunquam integer, tricenum pedum, aliquando

- A** quando & plurium longitudine. Nonnunquam particulatim elicitur. Dicitur & *καρβία* & *μαρία*, quod fasciis institisue similis sit. Rarior hic uisitur. At lumbricus teres frequentior, ac proinde nulli non cognita forma eius est. In superioribus maxime intestinis gignuntur teretes adeo, ut ad uentriculum ipsum nonnunquam ascendant, & per os quandoque aut nares effertur. In pueris multi, & frequentius quam Ascarides procreantur: faciliusq; medicamentis amaris deiciuntur quam alij. In erubus frequenter, nonnunquam uero & in brachiorum musculis, lateribusque ipsis nascuntur uermes qui dracunculi uocantur: specie terre uermibus similes, quadoque magni, nonnunquam uero minores. In *Æthiopia* *Indiâque*, & quæ supra *Ægyptum* sunt locis, frequentius hoc malum contingit. Estque eorum generatio lumbricis uentris quos latos uocant, non dissimilis: sub cute namque mouentur uiui, nihil dum afferentes molestia: procedete deinde tempore, ad alterum eius finem suppuratur locus, cutisque aperitur, & dracunculi caput exeritur: quem si in curando traxeris, dolor uehemens excitatur, præsertim si intra trahendum rumpatur dracunculus: quod enim relinquatur dolores affert molestissimos. Hæc Leonides. At Soranus animal esse dracunculum hunc negat: sed neuosam quandam substantiam esse affirmat, quæ non mouetur, sed motum quandam habere uidetur. Est uermiculus in lingua canû, qui uocatur à Græcis *lytta*: quo exempto infantibus catulis, nec rabidi fiunt, nec fastidium sentiunt. Quem infestat uermiculus, qui in ipso discrimine ungulæ nascitur, cum idem locus tuberculum habet, cuius media fere parte, canino similis extat pilus, eique subest uermiculus. Ferro caustissime tuberculum circumsecari oportet, ne dum amputatur, etiam quod infra est animal uulneremus: id enim cum fauciatur, uenenatam sanie mittit, qua respersum uulnus insanabile facit, ut totus pes amputandus sit. Piscibus (ut supra dictum est) innascuntur quædam minuta animalia quæ partum expellunt. Narrant & bestiolas quasdam uelut lumbricos intra spongas consistere atq; ali, quos & euulsis spongiis pisciculi saxatiles deuorât.

1. Intra animal, &c. Intestinorum animalia uocat hæc Plinius. 2. In iumentis qui male, &c. Solent uuluis, inquit Columella, nocere lumbrici, qui fere eruditatibus nascuntur. 3. Dicitur & *καρβία* & *μαρία*, &c. Plinius: Tineam uocat, nisi codices sint mendosi: pro *καρβία*.

- D** De iis quæ carnis uiuæ humore aluntur, ut pulice, pediculo, ricino, & similibus. Cap. CCXXII.

QUæ ex numero insectorû, non carne uiuunt, sed carnis uiuæ humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices: hæc per coitum generant ea quæ lendes uocantur, ex quibus nihil præterea nasci potest. ex iis enim neque ea quæ generarint, proueniunt, nec aliud ullum animal: sed id quod sunt, fordes tantum persistunt. Vnde maris lendes capiti deducit iniquas, inquit Serenus. Gignuntur pediculi in uiuentium hominum capillo (ueluti in capite) non in superficie ubi furfures consistunt, sed in profunda cute, ex humoribus quibusdam calidioribus quidæ, sed qui minus acres sint. Pediculi etiam ex ipsa carne oriuntur, quibus futuris emergunt ceu pu-

stulæ quædã sine pure exigua, quas si punga pediculi exeunt. Accidit mor-
bus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore: & quidem ali-
quos hac scelerata obiisse proditum est, ut Alcmanem poetam: Pherecidẽ
Syrium, & Scyllam præterea dictatorem. Diodorus pediculos facere ocy-
mi cibum prodidit. Gignuntur & ex uestis genere pediculi: sunt enim ouiu
quas lupo occiderit uellera, & facta ex his uestis, longe quàm cetera aptio-
ra ad pediculos procreandos. In quibusdam item morborum generibus, eo-
pia nascitur pediculorũ. Genus pediculi ferum uocatur est, durius ed quod
in plurimis gignitur, & corpori detrahi difficilior. Pueris pediculi in capite
magis proueniunt, uiris minus: omnino feminæ magis quàm marēs pe-
diculum sentiunt. Quin & ex cæteris animalibus complura pediculo infe-
stantur, ut aues: & phasianæ quidem ex eis intereunt, nisi se pulueret. Pilos
habentium, asinum tantum immunem hoc malo credunt: qui non pedicu-
lo tantum, uerum etiam ricino immunis est. Boues utrumque id habent: ou-
es & capræ ricinos habent, pediculis uacant: suis uero quoddam pediculi ge-
nus grande ac durum familiare est: canibus proprium est ricinus, qui ab eodẽ
animali nomẽ cynorrhæstæ accepit. Est uero ricinus (ῥικίνος Græci uocant) animal, ut inquit Plinius, sceleratissimũ, infixio semper sanguini capite uiuens
atque ita intumescens, unum animalium cui sibi non sit exitus, dehiscitque
nimia facietate, alimento ipso moriens, cum diutius in fame uiuat: septenis
ita diebus durasse tradunt: at in facietate paucioribus dehiscere. Nunquam
in iumentis gignitur: in bubus frequens: in canibus aliquando: in quibus
omnia: in ouibus & capris hoc solum. Genus unumquodque pediculi ex
corpore ipso sui animalis enascitur. Proueniunt largius pediculi mutatio-
ne aquarum, quibus lauare se solent ea quorum natura pediculum patitur.
In mari etiam pisces hoc malum infestat: uerum nõ in piscibus ipsis, sed in
limo gignitur simile asellis multipedibus, nisi quod caudam hoc amplius-
culam habeat. Genus pediculi marinum unum est ubique proueniens: sed
maxime in foraminibus & cauernis. Quibusdam uero piscibus ipsis innas-
cuntur, quo in numero chalcis accipitur. Vocant & in mari pediculos, in-
quit Plinius, eosque tritos instillari ex aceto auribus iubent. Item, rigor cer-
uicis mollitur cum marinis qui pediculi uocantur, drachma una pota. Pi-
sces uel manu caperentur dum dormiunt, nisi pediculis & pulicibus appel-
latis sollicitarentur: nunc uero si somno dati immorentur, noctu ab innu-
mera multitudine illarum bestiolarum occupati absumerentur. Gignun-
tur hæ in profundo maris tanta fecunditate, ut etiam escam de pisce emo-
litam, si diu in imo manserit, totam corrodat atque absumat. Et quidem
sæpenumero piscator escam demissam, glomeratis undique his bestiolis,
perinde ut pilam recipit. Habent thunni & gladij circa canis exortum cir-
ca pinna, seu uermiculũ quem æstrum uocant, effigie scorpionis, magni-
tudine aranei. Infestat hoc tanto dolore, ut interdum gladius e mari exiliat:
unde fit ut sæpenumero in nauigia incidat. Pulices minima quadam putre-
dine gignuntur: sedemque sui ortus, sordes obtinent aridas. Lendes procreant
oui speciem referentes: crura habet posteriora mediis longiora, quibus sa-
liunt.

Pediculus fe-
rus.
Φύλῃ ἄγριος.
Pediculorum
genera.

Cynorrhæstæ.
Cynomya.
Ricinus.
ῥικίνος.

Pediculus ma-
rinus.
Φύλῃ θαλάσσιος.

Pulex mari-
nus.
Ψύλλα θαλάσσιος.

Oestrus.
Οἶστρος.
Asilus.
Pulex, Ψύλλα.

Aliunt. Cimices genus animalis foetidissimum, & dictu quoque fastidiendū, *Cimices.* ut inquit Plinius, ex uapore quodā humidiorē ab animalium corporibus *Kigors.* foris collecto gignūtur. Cimices qui in lectis nascuntur, acri facultate præditi sunt: & cum uino aut aceto e poti, adhærentes hircines abigere dicuntur. Fabarum cavis inclusi profunt, si ante accessionem septeni deuorentur, iis qui febre quartana laborant. Percussis uero ab aspidē, etiam citra fabas sumpti: olfactu, strangulationibus uulua concidentēs reuocant. Triti & urinariz fistulae impositi, urinae angustiam quam disuriam dicunt, leuant. Hæc Dioscorides. De cimicibus, inquit Galenus, prodidere nonnulli, quod si ex aceto bibentur, hircines epotas eiiciant: nobis uero, cum eas perpetuo *Cimices agrestes.* **B**ex alligatu abegerimus, minime opus cimicibus fuit. Quæ de cimicum natura dicuntur (ut Plinius refert) tanta authorum asseueratione cōmendantur, ut quanuis pudenda dictu, ea præterire fas non sit. Hæc contra serpentum morsus & præcipue aspidū ualere dicitur: item contra uenena omnia: argumento quod dicunt gallinas quo die id ederint, nō interfici ab aspidē: carnes quoque earum percussis plurimum prodesse: ex iis quæ tradunt humanissimū est, illinere morsibus cum sanguine testudinis. Item suffitu eorum abigere sanguisugas adhærentes, haustāsque ab animalibus reslinguere in potu datos. Quanquam & oculos quidam his inungunt tritis cum sale *Cimices agrestes.* **7** & lacte mulierum: aurēsque cum melle & rosaceo ammixtis. Eos qui agrestes sint & in malua nascuntur, crematos cinere permisto rosaceo, infundunt auribus. Cætera quæ de his tradunt, uomica & quartanarum remedia, aliorūque morborum: quanquam ouo, aut cera, aut faba inclusos ceciderint deuorandos, falsa nec referenda arbitror. Lethargi tamē medicinæ cū argumento adhibent, quoniam uincatur somnifica uis, septenos in cyatho aquæ dantes, puerilibus annis quaternos. Et stranguriæ fistulae imposituere: adeo nihil illa rerum omnium parens, sine ingentibus causis genuit. Cimicibus aduersatur scolopendra, suffituque necat.

1 Carne oriuntur. Nascuntur quoque, inquit Plinius, in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Pustulæ, *in di.* **2** Cynorrhæstæ, à quibusdam cynomyæ dicuntur, ut notat Hermolaus. **3** *κρόνινα* Theodorus redium uocat, forsitan ex Columellæ autoritate lib. 6. Verum considerandum ne deprauata sint quædam Columellæ exemplaria, rediui pro ricini habentia, uti in aliis legitur. **4** Crotones *Redium.* in gramine oriuntur, inquit Aristoteles. An idem sit animalis genus an corrupta sit littera? **5** Sordes aridas, *in di.* Generantur sordibus aridi soli, inquit Plinius: in quibusdam exemplaribus Plinianis, non aridi soli, sed à radiis solis, legitur. **6** Pulex apud Columellam in horro, pro uermiculo aut eruca quadam accipitur, herbas erodente. **7** In malua, &c. Plinius. E malua cimices infunduntur auribus cū rosaceo. *Pulex. E malua cimices.*

De blattis.

Cap.

CCXXIII.

Hoc quoque animal inter pudenda est: sed propter admirationem naturæ priscorumque curam, totum in hoc loco explicandum. Tenebrarum alumnæ blattæ sunt, lucemque fugiunt: in balneis maxime humidiorum uapore progeneratæ. Est quædam pinguitudo blattæ si caput auellatur: hanc tritam unā cum rosaceo, auribus mire prodesse dicunt: sed lanam qua inclu-

*Blatta.**in di.**Alias, priusquam**in di.*

DE DIFFERENTIIS IN A

ferint, post paulum extrahendam. Céleerrime enim id pingue transire in a- E
nimal, fieri uermiculum: alij binas ternasue in oleo decoctas efficacissi-
me auribus mederi scribunt, & tritas in linteolo imponi confusis. Blatte
quæ in pistrinis inueniuntur (ut scribit Dioscorides) interanea trita cū oleo
aut decocta, aurium dolores instillata mitigant, Galenus totum animal in
oleo coctum hæc efficere nonnullos affirmare prædicat. Plura earum gene-
ra fecerunt: molles, quas in oleo decoctas uerrucis efficaciter illini experti
sunt. Alterū genus, mylæcon appellauere, circa molas fere nascens. Has ca-
pite detracto attritas, lepras sanare Musa & Picton in exēplis reliquerunt.
Tertium genus, & odoris tædio inuisum, ex acuta clune, cum pissileo sana-
re ulcēra tradunt, aliās insanabilia: strumas, pauos, diebus xxi impositas, F
percussa, conuulsa, cacoëthe, scabiem, furunculósque detractis pedibus &
pennis. Nos etiam hæc auditu fastidimus: at Hercule Diodorus & morbo
regio & orthopnoicis restitisse tradit cum resina & melle: humanissimi eo-
rum, cinerem crematarum reseruādum ad hos usus in cornea pyxide cen-
suere: aut tritas clysteribus infundendas orthopnoicis aut rheumaticis. In-
fixa utique corpori illitas extrahere cōstat. Cunilæ tertium genus est quæ à
Græcis mascula, è nostris cunilago uocatur: manipulo eius abiecto, omnes
etiam à tota domo blattas conuenire ad eam tradunt. Est similis uerbasco
herba quæ sæpe fallit pro ea capta. Hæc abiecta, blattas in se cōtrahit: ideó-
que Romæ blattariam uocant: & insectorum quidem ratio talis est.

reg. Græcia 1 Blattæ. *reg. Græciæ* Blattas interpretatus est Theodorus. Verum eo in loco
mendosa esse opinor exemplaria Græca. Neque *reg. Græciæ* eo in loco, neque *reg. Græciæ*
legendum censet Hermolaus, sed *reg. Græciæ*, ut sit sensus *apocryphæ* in brassica gigni
apertum est, quæ & ipsæ pennatæ sunt. Vocantur autem prafocurides (ut ille ait) uer-
miclei porros, brassicam, laetucāsque infestantes, & alia quædam olerum. 2 My-
Mylicris læcon, aliās mylæcin.

A DE ANIMALIVM DIFFERENTIIS LIBER X.

Continet exanguium aquatiliū differentias, scilicet mollium, crustaceorū, testatorum, & quę zoophyta appellantur, quę omnia à nonnullis etiam piscium nomine uocantur.

De his quę mollia dicuntur.

Cap. CCXXIIII.

S Equitur natura molliū, Græci *μαλακία* & *μαλακίαι* *Mollia*: *μαλακίαι*, nos mollia appellamus animalia quę sanguine carent, & toris carne cutēq; ut homines, molli obducta, solidum intus, modo sanguinei generis continent, quale sepiā est. Partes eorum quę mollia nominamus, exteriores, pedes uulgari nomine, siue brachia, barbęque aut cirri: græci *πλακτίας* dicūt: & iis adiunctum caput: tum alueus siue sinus (*χένος*) Græci dicunt: corporis ipsius molē

complectens, quem pinnulę ambiunt in orbem: caput eum nonnulli minus recte appellarunt. Caput uero omnibus contra quā cæterorum animalium inter crura. A polypo differunt cætera mollia, eo quod alueus polyporum paruus breuisque & crura prælonga, cæteris ediuerso, alueus amplius & procerior, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediēdi: sunt itaq; crura omnia in ptiore corporis parte, circum caput, infra oculos, circa os & dentes. Sed cum cætera animalia, quibus pedes, aut parte priore posteriorēque eos habeant, aut latere, ut ea quę multis pedibus innituntur & sanguine carent, hoc unum genus pedes parte, quā priorem in eo capimus, omnes continet. Pedes octoni omnibus, modo tamen dissimili: sepię enim atque lolligines pedes habent supra dentes senos exiguos & breuiore, eorūque nouissimos duos maiores: reliquos autem octonorum duos infra dentes, omnium maximos: polypus longos obtinet, & medios quatuor habet maximos. Promuscides habent binas prælongas & asperas sepię & lolligines, quibus ueluti anchoris innituntur, seque stabiliant, nē astu maris tempestatēque exturbentur saxi: utque de longinquo cibum ori admo-ueant: at iis polypi carent, quoniam pedes ad eundem usum commodos habeant. In cruribus geminum habent acetabulorum ordinem, à capite in extremos usque cirros cætera omnia præter unum polypi genus quod hēledona uocant: quod unum ex mollium numero simplicem acetabulorum ordinem habet. Caput omnibus (ut modo diximus) inter crura continetur. Huius pars os est, in quo dentes duo. Lingua nullis in hoc genere data est: sed pro lingua carnosum quiddam, quō uice linguę utuntur: quo scilicet uoluptatem esculentorum discernant. Supra hæc oculi bini grandiusculi:

DE DIFFERENTIIS

quibus discrimen exigua quædam præstat cartilago continens cetebrium E parvulum. Fistulam ante alveum, supra caput & brachia gerunt, qua mare i transmittunt, quantum suo admiserint alveo quoties ore aliquid capiunt, eamque modo in dextram partem transferunt, modo in sinistram. Et hac eadem fistula polypi suum quoque atramentum fundere assolent. Pinnulam habent hæc omnia circumdantem alveum, ut nascent & se dirigant, (quemadmodum pisces sua cauda pene cartilaginata) sed non omnia eodem modo. Natant mollia tum pedibus ipsis tum pinnis. Quantum vero ad interiora attinet, omnibus mollibus cerebrum datum est: quod tamen minime cerebrum dicitur, nisi per proportionē. os gula excipit angusta & longa, quam sequitur *πελαγος*, id est, ingluviens ampliuscula, non absimilis aui- F bus: cui iungitur ventriculus tanquam abomasum, forma claviculæ buccinorum. Intestinum ab eo tenue (quod crassius tamen quam gula est) paritè repetens superiorem, ad locum fertur ori vicinum, sed paulo infra: sunt namque in hoc mollia turbinatis similia. finis enim ad principia flectitur, contrario quam in omnibus alitis modo, ut in descriptione conspicitur. Viscera mollium nullis, sed habent quam *μύτη*, id est mutem appellant: & præterea atrum quendam humorem habent sibi peculiarem, cui nomen *ἄλος*, id est atramentum, tunica contentum membranæ, quod plurimum in sepi- 2 a est. Et hoc sane præsidij salutisque gratia possident: effundunt enim suū id atramentum omnia metu percussa, sed præcipue sepiæ. hoc enim effuso humore, aquam infuscant, subique nigrorem uestit septū præponunt & turbulentiam, quasi quo se abscondant. Accrescitque hic humor denuo post- G quam emiserunt, ut nunquam copia desit atramenti. Mutis in mollium genere, id est, quod ei parti proportionatur, quæ in sanguineo genere cor appellatur: id membrana continetur humidū, sub ore, & per eam gula in ventrem pertendit, ad mota potius tergo. At vero atramentum infra continetur, tunica etiam contentum membranæ: polypis quidem & lolliginibus 4 prope mutim potius positum, sepiæ vero infra ad alveum & qua intestinū petere incipit superiora: meatumque suum eadem obuolutum habet membrana qua intestinum: atque idem foramen emittendi atramenti excrementique est: ea scilicet parte quæ fistula uocatur, quæ in spinis posita est. Habere sceminas omnes in hoc genere membrum uuluale apertum est: membranas scilicet in quibus oua tanquam in uulua continentur. habent enim ouum primo indiscretum, mox discretum in plura: & pariunt omnia im- H perfecta more ouipatorum piscium. In sepiis & lolliginibus uulua ita articulata est, ut bifida cernatur: at polyporum ouum simplex uidetur, ob uteri formam, quæ specie rotunda conglobatæque est. Differunt scemina à maribus, quod in mare meatus quidam subditus gulæ à cerebro in ima aluci pertendit, idque ipsum ad quod fertur speciem mammæ imitatur: in scemina duplex idem illud supraque positū habetur. utroque tamen in sexu corpuscula quædam subrubra parti eiusmodi subiuncta spectantur. Mollia fere tota carnosæ & tactui cedentia sunt: nihil enim ossis, nihil fere terreni habere discretum uidentur, quod dignum effatu sit: ne tamen corpus eorum facile



Μύτις.
Μυτίς.
Θίλος.
Ατράμεντιον.

Μυτίς.
Μύτις.

Ατράμεντιον.
Θίλος.

pereat, naturam inter carnem & neruum obtinent. mollis enim ut ca
sed intēdi potest ut neruus. Filialis autem caro eorum est, uerum nō per
directum, sed in anfractum: cutēque omnibus intecta est, uti modo dictū
est: quædam etiam ueluti capillamenta in corpore omnium habentur. Sepiæ
quoque & lolligini & lollio partes duræ ac solidæ intus per dorsum &
corporis prona continentur, quas non eodem appellant nomine: sed quod
infertum sepiis est, sepium uocāt, quod lolliginibus & lolliis, *σπίς*, id est, gla
diolum, uti infra explicabitur. At polypis nihil huiusmodi solidū intus,
sed circa caput cartilaginofum quiddam est, quod senescētibus indurefcit.
Mollia omnia eodem modo coeunt: oribus enim inuicem admotis, com
plexūque mutuo brachiorum libidinem explent. sic enim coniungi neces
se est, quoniam natura exitum excrementi prope os insectēdo adduxerit,
ut antea dictum est. Pariunt ea sui corporis parte, quæ fistula dicitur, qua &
coire ea nonnulli arbitrantur. Polypi in terram uerso capite coeūt: reliqua
mollium tergo, inquit Plinius, ut canes. Verno tempore pariunt, & sepiæ
in primis. pariunt autem oua imperfecta: quæ ut tueantur, plurimum len
toris unā cum fetu emittunt. augentur oua omnium, & accrescunt more
uermium. Ouum habent omnia candidum, quod tempore archidum eua
dit, ueluti & illud quod crustata edunt. Sed cum genus omne crustatum si
bi iuncta contineat oua, itaque foueat, polypus & sepiæ & reliqua generis
eiusdem, oua quæ pepererint, absoluta fouent. Huius generis mas sub par
tu oua quæ fœmina ediderit, persequitur suum semen aspergens: reddun
tūque eorum oua tanquam glutino cohærentia, (id quod non nisi in sepiis
uisum adhuc est, uerum in reliquis eiusdē generis id fieri ratio est:) & quæ
uitale id uirus contigerint, ex iis enascuntur animalcula, quemadmodum
de piscibus dictum est. Mollia sensibus prædita esse omnibus constat: iam
enim sepiæ & polypi odore efcarum allecātari capiuntur: neque eisdem sa
poribus omnia delectantur. E genere mollium nullum est, quod uel uocē
uel sonum emittit naturalem. Mollia omnia carniuora sunt, & sola carne
uescuntur. Lolligines nanque atque sepiæ pisces uel maiores euincunt. Po
lypi conchulis maxime uescuntur. Præstant mollia cum grauida sunt, ut
lolligines, sepiæ, polypi. Duræ carnis hoc genus est, concoctū difficile, non
nihil falsedinis particeps. At si probe concoquatur uberius alimētum cor
pori præbet, sed crudi humoris plurimum creat: succūque crassum &
tenacem. Venerem concitare mollia in cibo, prodidit Diocles, maxime
uero polypos.

1. *Fistulam, &c.* Videtur Theodorus in hoc Aristotelis loco, atque etiam Plinius, fistulam hanc polypo tantum tribuere, & sane perobscure pronuntiat hæc Aristoteles: sed longe aptius eadem in lib. de respiratione explicat, ubi aperte mollibus omnibus fistulam ante cerebrum inesse ostendit. 2. Hunc humorem pro sanguine his inesse sentit Plinius. 3. Admoti potius tergo, *πρὸς τὰς πλάγας καὶ μάλιστα*. 4. Continentur tunicæ, &c. Tunicam hanc in polypo *μύκτωρ* uocat Athenæus.

Μύκτωρ.

De polypo.

Cap. CCXXV.

Polypos ē molliū genere animal, ab aliis mollibus hoc præcipue differt, quod eius alueus (quem caput polypi uocāt nonnulli) paruus est & cru

Πολύπους.
εὐλύπηνος.

DE DIFFERENTIIS

ra prælonga: cum cæteris ediuerso, alueus amplus est, crura breuia. Halypo, ut & aliis, octona (sed quatuor quæ in medio sunt maxima) quibus innumum loco pedumque utitur. Nam duobus quæ supra os sita sunt, cibum ori admouet: ultimo uero, quod & acutius & solum albicans est, & parte sui extrema bifurcatum dorsoque adnexam in coitu utitur. Polypus enim mas, ut nonnulli affirmant, in hoc suo brachio, in quo duo amplissima habentur acetabula, id gerit quod genitalis speciem refert: quod quasi neruo constat album, porrectum ad medium usque brachium. Promuscide carent polypi, quoniam pedes ad eundem usum commodos habent. Pinnulam quæ alueum circumdat paruam habent minimèque conspicuam. Fistula his caua, 3 ut & aliis in anteriore aluei parte sita supra brachia geritur. Caput polypo quoadiu uiuit prædurum est, & quasi inflatum. Tangunt ac tenent brachiis supinis: membranamque pedibus interiectam totâ extendunt. Polypis nihil solidum intus, quemadmodum sepiis sepium est, sed circa caput cartilaginofum quoddam est, quod senescentibus direscit. Membranam illam quæ atramentum polypi continet, *мелкая* uocant quidam: quæ in polypo supra uentriculum apud mutim sita est: continet humorem in se non nigrum ut in sepiis, sed subrufum, quo, ut diximus, in metu utitur. Mas à femina discrepat eò quòd capite est productiore: & quod genitale piscatores appellant albidum illud suo in brachio continet. Vescuntur maxime conchyliorum carne polypi, quorum conchas complexu crinium frangunt: quo fit ut eorum cubilia cognoscant qui uenantur, congerie testarum. Trebius quoque Niger prodidit, auidissimos esse concharum polypos: illas ad tactum cõ primi præcidentes brachia eorum. Insidiantur ergo polypi apertis, imposi- G tõi; lapillo extra corpus, ne palpitatu eiiciatur, ita securi grassantur, extrahuntque carnes: illæ se contrahunt, sed frustra discuneatæ. Tanta solertia animalium hebetissimis quoque est. Hyeme tempestuosa in cauernis latitat polypus, & crura sibi ipsi erodit, ut tradit Oppianus. Aristoteles autem falso hoc à nonnullis creditum affirmat. id enim à congris euenit ei: nam cõgri polypos superant & edunt: unde fit ut aliqui capiantur qui brachia à cõ 4 gris corrofa habeant. Polypi odote escarum allectati capiuntur: ita enim quandoque adhærescunt, ut auelli inde non possint, sed truncari potius patiatur: at uero pulicaria herba admota, protinus ab odore eius resiliere dicuntur. Fronde quoque oliuæ capitur polypus: & in terrâ oliuæ desiderio egreditur. Polypis coitus cum alter capite uulgo appellato in terram uerso nitibundoque explicat, porrigitque sua brachia, alter superuenit, passisque brachiis singulis ad singula subiacentis acetabulorum complexu mutuo adhærescit. Marem nonnulli aiunt gerere, quod genitalis speciei referat uno brachiorum, uti modo diximus, in quo duo amplissima acetabula habentur: idque quasi neruo constare, porrectum ad medium usque brachium confirmant: totumque nari feminae adnecti. Hyberno tempore coit polypus, uerno parit. Latet circiter menses duos. Ouum edit uel in cubili suo, uel in figulino, simile labruscæ racemulis, aut fructui atboris populi albæ: quod foris quidem unum, simplexque, incomptum & grande est: intus humorem candicantem

Мелкая.

Aliis, complexu crinium.

H

- A dicantem concolorem totum, atque æquabilem continēs. Perquam fecū-
dum hoc animal est: nam de eo quod ediderit, copia innumera prouenit.
5 Tantæque fecunditate pendunt oua per cubile, ut collectis uas impleatur
longe amplius quàm caput sit quo continebantur. Polypus scemina modo
incubat ouis, modo in ore sui cubilis assidens, brachium super oua expor-
tum tenet: uel ut Plinius refert, modo in cauernis sedet, modo cauernam
cancellato brachiorum implexu claudit. Polyporū itaque ouis diebus post
quingenta maxime ruptis, polypuli modo araneorum perquam multi
exserpunt, quorum natura sigillatim nondum in omnibus membris cōspi-
cua est, quanquam forma satis nota apparet: sed ob exiguitatem imbecilli-
tatemque copia interit. Iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla par-
tium constent distinctione, quanuis ad tactum moueantur. Dum fouet po-
lypi oua, deterrimi efficiuntur: haud enim pastum prodire patiuntur. Bi-
nio, non amplius uiuit polypus magna ex parte: sua enim natura tabi obno-
xius est: indicium autem ne bimatum compleat esse uidetur, quod ab ortu
eorum (qui æstate fit) ad autumnum, non facile grandem polypum uideris,
cum paulo ante id tempus prægrandes spectentur: à partu ita senescere de-
bilitarique tam marem quàm sceminam ferunt, uel ut à pisciculis deuorē-
tur, & facile à suis detrahantur cubilibus: cum antea nihil tale his usu eue-
niat: tum uero paruos nouellōsque quanuis recens natos, tamen nullo eius-
modi malo affici narrant: quinimo ualidiores esse quàm grandes confir-
mant. Polypus fatuus quidem est, cum ad manum hominis demissam acce-
dit: sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio re-
condat: cūque consumpserit quantum utile sit, abigit testas, & cæterorum
crustas, & putamina conchularum, & spinas pisciculorum. Sui etiam mu-
tatione coloris uenatur pisces: trahit enim colorem similem iis quibus ap-
propinquare facis: quod idem etiam cum metuerit facit. Mirum quod de
huius ingenio prodidit Ouidius: polypum hamos appetere, brachiūq; cō-
plecti, non morsu: nec prius dimittere quàm escam circumferat, aut arū-
dine leuatum extra aquam. Trebius niger prodidit, nullum esse atrocius
animal ad conficiendum hominem in aqua: lucatur enim cōplexu, & sor-
bet acetabulis, & numerofo suctu detrahit eum. In naufragos urinantē sue
impetum capitis si inuertatur elanguescit uis: exporrigunt enim sese re-
D supinari. Morsu non lædit polypus, sed sanie quadam noxia quæ è corpore
eius effluit, ut prodidit Oppianus. Mollium unus polypus exit in siccom,
graditur per alperiora, uisat leuia. In cibo darus, uenerem cōcitat omnium
mollium maxime: iurulentus aluum reddit humidam, si uehementer co-
quatur. De polypo & hæc traduntur: muriā ipsum ex sese emittere, & ideo
non debere addi in coquendo: secari arundine: ferro enim insici uiciūque
trahere. Polyporum genera plura sunt: unum cōspectius & maximum: cuius
generis qui prope terram degunt, maiores sunt quàm pelagij: alterum
corporis exiguo uariōque est, cibo ineptum: aliud quod heledonam uocāt, *Heledona*,
crurum prolixitate diuersum (crura enim habet longa) & quod unum ex
mollium numero simplicem in brachijs acetabulorum ordinem habeat.

DE DIFFERENTIIS

Boletena.
Ozolis.
Ozēna.
Osmylia.

Nautilus.
Nauticus.
Onum polypi.

Inter duo pri-
ma brachia.
Plinius, ut in-
fra.

Nautilus.
Pompilus.

Nauplium.

Χελιδὼν.
Hirundo.
Χελιδὼν Πι-
λάστη.

Ad hæc polypi genus est quod alij boletenam, alij ozolim dicūt, Plinius o- E
zetnam dictam à graui capitis odore putat: ob hoc maxime murenis eā cō-
secrantibus, Pollux & ozēnā & osmylian uocari tradit, polypi genus quod
inter caput & cirros brachiaue, fistulam gerit, qua retrum emittit odorem:
quod mænulas sepiolāsque uenatur, ut inquit Aristophanes. Duo item ui-
suntur genera conchis indita, quotum alterum nautilum & nauticum uo-
cant: alij ouum polypi: forma polypo simili. Testa iis ut pectunculis conca-
ua, nec ita tam en destinata ut ei inhæreant. Sæpius hi iuxta terram pascun-
tur: unde euenit ut fluctibus iactati, in aridum elidantur, testa dilapsa nudi
capiantur, aut in terra emoriātur. Constāt exiguo corpore, facie simili bo-
letenis: polypus hic nauticus, natura & uitæ muneribus singularis est: nauig-
gat enim per maris summa elatus de imo gurgite: effert se testa inuersa, ut
ascendere possit facilius, & inani scapha enauiget: ubi uero emetserit, con- F
cham reuertit. Habet inter sua brachia membranulam quādam annexam
similem iis quæ digitis insertæ palmipedum continentur: uerum illæ cras-
siusculæ sunt, hæc prætenuis est, & aranæ speciem imitatur: hac uelificat
cum aura inspirat: cirrōsque pro gubernaculis utroque demittit latere: si
quid metuerit, concham protinus mati replet, atque ita demergit. De gene-
ratione inclementōque eius cōchæ, nihil adhuc exploratum habemus, in-
quit Aristoteles: uidetur tamen non ex coitu gigni, sed ut cæteræ conchæ
prouenire: nec uero an concha solutus uiuere possit, certum adhuc est. Est
& alius polypus, qui cochlearum more siliceo tegmine ita muniatur, ut
nunquam egredi soleat, suāque interdum brachia exerat. Hæc Aristoteles.
Nautilon Plinius ab alijs pompilon uocari tradit. Supinus hic, inquit, in G
summa æquorum peruenit, ita se paulatim subrigēs, ut emissa omni per fi-
stulam aqua, uelut exoneratus sentina, facile nauiget: postea duo prima
brachia retorquens, membranam inter illa miræ tenuitatis extendit: qua
uelificante in auras, cæteris subremigans brachiis, media cauda ut guber-
naculo se regit: ita uadit alto liburnicarum gaudens imagine: si quid pau-
ris interueniat, hausta se mergens aqua. Nauigerā similitudinem & aliam
in Propontide uisam sibi prodit Mucianus: concham esse acatij modo cari-
natam, inflexa puppe, prora rostrata: in hac condi nauplium, animal sepiæ
simile ludendi locietate sola: duobus hoc fieri generibus: tranquillo enim
uextorem demissis palmulis ferire ut remis: si uero flatus inuicent, easdem 6
in usu gubernaculi porrigi, pandique concharum sinus auræ: huius uolu-
ptatem esse ut ferat, illius ut regat: simulque eādem descendere incluso si-
nu, fluctu hausto territam uisu forte tristi. Polypo similis chelidō est, id est, 7
hirundo, inquit Diphilus: humentibus membranis uolant in mari hirundi-
nes, ut siccis inter teētā uespertilio. Volat hirundo sane perquam similis uo-
lucris hirundini, ut inquit Plinius: Sublimis que adeo uolitat cum maiorem
piscem metuerit, ut haudquaquam mare attingat: altiusque in uolatu sese
attollit quā miluus, non tam alte tamen quā loligo. Et pinnis stridere
sentiuntur hirundines in uolatu: sunt enim his pennæ latæ & longæ. Acu-
leum quoque gerit hirundo uenenosum, inquit Oppianus: In cibo humo-
rem

A rem corpori præbet chelidon, qui colorem reddit bonum, sanguinūq; excretionem mouet, ut author est Diphilus. At Xenocrates chelidonas uiroso sapore esse prodidit, malūque procreare succum.

1 Crura breuia, &c. Crura polypi, crines uocat nonnunquam Plinius. 2 Vlti- *Crines.*
mo uero, &c. Hunc polypi pedem, ni fallor, Plinius caudā uocat lib. 9. Cauda, inquit,
uitur, quæ est bifida & acuta in coitu. 3 Fistula his, &c. Est polypo fistula in dor-
so, inquit Plinius. 4 Polypos superant, &c. Oppianus quoque describit pugnam po-
lypi & murenæ: & polypi, & earabi. 5 Pendent oua, &c. Pariunt oua tortiliūbra-
ta pampino, inquit Plinius, tanta fecunditate, ut multitudinem ouorum occisi non
recipiant cauo capitis, quo prægnantes tulerē. 6 Easdem in usu, &c. Si non ex-
dero sint, at certe similiter nauigare uidentur conchæ quæ ueneriæ dicuntur. De qui-
bus Plinius: Nauigant ueneriæ, præbentēque concauam sui partem, & auræ opponē-
tes, per summa æquorum uelificant. In nonnullis codicibus habetur, nauigant ex iis
nerites, &c. 7 Chelidon est, &c. Sunt qui existiment chelidona, hirundinemue Ari-
stoteli & Plinio piscem significare. Athenæi uero chelidona alterius esse generis: id
quod mihi quidem nullius ueteris scriptoris autoritate constat. Præterea quo modo
piscis intelligi potest, si uolucris hirundini perquam similis uoluerit: ut scribit Plinius: Sa-
rius itaque uisum nobis est hirundinē polypis coniungere, quā piscium generibus:
maxime cum Aristoteles ipse hirundinem à piscibus separare nideatur eam, quæ sub
limis uolat, & uolatu stridorem emittit.

De sepia.

Cap. CCXXVI.

E Mollium genere sunt & sepia, loligo, & lollius, quæ à polypo differunt, *Sepia, Iamnia.*
eo quod eorum alueus amplius sit, crura breuia, ita ut potestas nulla sit *Loligo,*
ingrediendi. Ipsa autem inter se discrepant, quatenus loligo longior, *Tridac.*
Cipia latior est: lolligine uero longe grandior, qui lollius nominatur: sed se- *Lollius,*
pias quoque aliquas in bina augeri cubita notum est. Sepiæ, lolligini, & lol- *Tridac.*
lio durum quiddam, ut diximus, ac solidum intus per dorsum & corporis
prona continetur, quod non eodem appellant nomine: sed quod insertum
sepis est, sepium uocatur: quod loliginibus id *sepium,*
est, id est, gladiolum. Discre- *Iunior.*
runt enim qua sepium robustum latumque est, inter spinam & os mediam *Tridac.*
præ se ferens naturam, fungosam intra se complectens & friabilem cor- *Gladiolum.*
pulentiam. Gladiolus arctior & cartilaginiosior est. Forma etiam discrepat,
pro alucorum modo quibus inserta continentur. Sepiæ quoque lolligines
& lollij peculiare binas fortiuntur promuscides, lōgas, asperiusculas, qui-
bus capiunt & ad ora admovent cibos: iis etiam quoties tempestates urget,
D ad faxa aliqua adherentes, se ueluti anchoris iactis stabiliunt. Non simili ut
polypi modo constant, quoniam uim nandi tantummodo habent, cum po-
lypi uel ingredi possint: habent enim pedes exiguos & breues, supra dentes,
senos, eorumque duos nouissimos maiores: reliquos autem octonorum duos
infra, omnium maximos. Pinnula quæ alucum circumdat, sepia angusta,
quæ lolligini latior est. Inter marem & scēminā tam in lolliginum quā
1 sepium genere, hoc interest, quod scēmina intestina continet duo ueluti
mammæ, quæ si aluo dissecta inspectes, facile uideris: mas omnino iis ca-
2 ret. Et præterea sepia mas uarius magis quā scēmina, dorsūq; attriore est;
& partes omnes asperiores habet quā scēmina, & lineis interuenientibus
uarias, & caudam quoque acutiorē. Mas quoque iuuantior & fortior est.

DE DIFFERENTIIS

constantiaque maioris. cum enim sepia icta est tridente, mas foemina adiuuat: foemina mare percusso, fugam arripit. Foemina uulua ita articulata est, ut bifida cernatur, & propterea oua gemina apparent. Oua habet sepia candicantia, grandini similia, multa: atramentum quod uocant, sepia plurimum habet: quod in sepia aliter atque in aliis, infra continetur ad aluum, & qua intestinum petere incipit superiora: meatumque suum eadem obuolutum habet membrana qua intestinum: atque idem foramen emittendi atramenti excrementumque est, ea scilicet parte qua fistula uocatur, qua in supinis posita est, uti antea dictum est. Cocunt sepiæ & lolligines ora applicantes, & brachia inter se complectentes natantesque in aduersum: narem etiam dictam in narem inferunt. Parit foemina ea sui corporis parte qua fistula dicitur: qua & coire eas nonnulli arbitratur. Fert uterum sepia uerno tempore, & cum primis uerno tempore parit. Parit & omnibus anni temporibus, persequaturque in edendo ouorum numero dies quindecim. Quoties autem ediderit oua, mas è uestigio sequens humorem foetificum ouis superinfundit: atque ita efficitur ut solidescant: incedere nanque coniugatum solent. Parit sepia iuxta terram fere inter algas & arundines, & si quid aggestum tale iniectum sit, ut sarmenta aut lapides, aut quaelibet alia materiei congeries. Et quidem piscatores de industria fascies sarmentorum disponunt. Enititur aluum per interualla reprimens, inspergitque atramentum interposita quiete, utpote cum non nisi cum labore emitat. Oua qua sepiæ edunt, magnitudinem myrtorum magnorum, aut acinorum uel minorum mox intra diem decimum capiunt & nigrescunt: emissio enim atramento parentis inficiuntur. Cohærent etiam inter se ad speciem racemi cuncta, nec facile alterum detrahi ab altero potest: mas enim humorem quandam mucosum mittit, cuius lentore tenaciter oua sibi cohærescunt, ac crescunt etiam ex hoc, cum primum edita candida sint atque exigua: mox atramento perfusa, nigra maioraque redduntur. Cum proles iam intus constiterit, tunc rupta oui membranula, sepiolæ excluduntur: quæ si quis prole iam perfecta disciderit oui membranam, sterusculum emittunt, suumque præ metu colorem immutant ex candicante in rubriusculum. Sepiis uiuendi spatium breue: nam, exceptis paucis, biennium non complent. Sepias tamen nonnunquam in bina augeri cubita notum est. Mollium astutissima sepia est. sola hæc suo utitur atramento non modo cum metuit, uerum etiam abscondendi causa: & cum progressa paululum se ostenderit, redit in atramentum: uenatur etiam suis illis prælongis prætenturis, non solum paruos pisciculos, sed mugiles etiam sapius: & maiores quoque nonnunquam euincit. Sūt qui sepiam quoque polyporum more, colorem sibi contrahere similem loco in quo uersatur, confirmant. Morsu non ledit sepia, sed noxia quædam sanies è corpore eius effluit. Sepia, inquit Diphilus, elixa, tenera efficitur, ori grata, concoctu facilis & aluum leuiter mouet. In cibo datur sepiæ, cum oleo & sale & farina decoctæ. Succum gignit sepia, qui sanguine extenuet, & hæmorrhoidum fluxum prouocet. Sepiæ coctæ atramentum, inquit Dioscorides, ægre concoquitur, & aluum emollit. Oua sepiæ urinam mouent,

renumq;

*Fistula,
quæritur,*

A renūmq̃ pituitas extrahunt, ipsōsque renes purgant. Sepium quod in iis durum & testaceum est, uiribus simile est ostrearum testis, sed partium magis tenuium: exsiccat itaque & abstergit. Quocirca collyriis ex eo formatis palpebrarum scabrie quæ sycoses uocantur, perfricatur. Dentes quoque splendidos reddit. In alopeciiis præparant cutim sepiarum crustæ farina medicamentis. Oculorum tumorem ruborēque sepiæ cortex cum lacte mulieris illitus sedat, & per se scabrias emendat: inuertunt itaque genas id agentes, & medicamentum auferunt post paulum, rosaceoque inungunt, & pane imposito mitigant nocte. Eadem cortice & nyctilopes curantur in farina trita, & ex aceto illita. Vtō sepio utimur, inquit Galenus, ad **B** uutiligines & ephelin, furfures & scabiem: sali uero fossili admixtum, ungues oculorum eliquat: uel, ut habet Dioscorides, clotum in medicamenta oculorum additur. Contra albugines, in oculos iumentorum efficaciter insufflatur: pterigia oculorum absumit cum sale fossili tritum & impositum. Medetur lentigini cæterisque uitiiis ex ossibus sepiarum cinis. Idem carnes excrecentes tollit, & humida ulcera.

1 Intestina duo, forsitā, internas partes duas, ἡντῶν, quasi ἡδὲ τῶν. 2 Sepia mas uariis. Sepiarum generis mares, uarij & nigriores, inquit Plinius. 3 Venarum etiam, &c. Quibus artibus capiet pisciculos sepiæ, explicat Oppianus. 4 Vtō sepio, &c. Dioscorid. Vltum in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum.

De lolligine & lollio.

Cap. CCXXXVII.

ET nigrum niueo portans in corpore uirus **L**olligo. E molliū genere, sepiæ fere similis est: sed discrepat, quòd sepiæ latior est, uti modo diximus, lolligo longior, & toto corpore mollior quàm sepiæ. Præterea gladiolus, qui in lolligine est arctior & cartilaginiosior est quàm in sepiæ, quod sepium uocari diximus. Pinnulam habet non angustam adeo, sed latiore quàm polypus aut sepiæ: neque per totum alueum circumactam, sed de medio orsam. Promuscidem habet eam quæ in dextra parte est, longiorem. Bina habet uentris conceptacula, ut & alia, sed alterum minus ingluuiem imitatur. Atramentum illud suum suprā continet apud mutim, cum sepiæ infrā ad aluum habeat: idque non atrum, sed subrufum potius habet. Hoc metus causa emittit ut polypus. Quin & metus causa uolat lolligo, & longius altēque extra aquam sese effert. Lolligines euolare ex aqua traduntur, tanta nonnunquam multitudine, ut nauigia demergant. lolligo uolitans, tempestatem prænūtiat. Inter lolliginem marem & forminam hoc interest, quod formina intestina continet duo ueluti mammas: quæ si aluo dissecta inspectes, facile uideris: mas omnino iis caret. Coeunt lolligines, ut de sepiis dictum est: pariuntque in alto. sola enim ex hoc genere pelagia est lolligo: consertūque ac continuum iis ouū quale sepiis est. Et uiuendi quoque spatium, ut sepiis breue: nam, exceptis paucis, bimatum non complent. Lolligo, ut Diphilo placet, concoctu facilius est quàm sepiæ, atque ori grata. Lolligine uero longe grandior est, qui lollius nominatur: quippe qui uel in cubita quinque excreseat. Facie quo-

Lolligo,
Tab. 39.

Intestina, seu
τῶν, uti supra.

Lolligo,
Tab. 39.

τῶν, inquit A-
theniens.

DE DIFFERENTIIS

que à lolligine diffidet: pars enim lollij quæ exit in acutum, latior est: pin-
nulæ etiam circundantes illæ totum in lollio ambiunt, iunctæ perpetuæq;
cum in lolligine partem aliquam relinquunt. Colore subrufo est: dentem
habet utrunque nigrum, & accipitris rostro figura non dissimilem, maiore
suprà, infra minorem. Disfisso aluco uetriculus suillo similis uidebitur: pe-
lagius est non alio modo quàm lolligo.

1 Hoc in loco πνδῖς habetur, non πνδῖς in exemplaribus Græcis. 2 Lollius
à lolligine an specie differat, an solo sexu, quod scilicet lollius mas sit, lolligo fœmi-
na, considerandum: uidebitur certe eadem species ex Aristorele tā lib. histor. 4, quàm
quarto de part.

De lepore marino.

Cap. CCXXVIII.

F

*Lepus marinus.
λεπὸς θαλάσσιος.*

Lolligini parua similis est lepus marinus, ut Dioscorides author est: ut
L uero alij, specie similis est cochleæ tegmine nudatæ. animal paruum, fe-
re inter lolligines aut lollios, aut certe sepias repertum: sepe etiam unà cum
apuis capitur, odore tetro. In nostro mari, inquit Plinius, ossa infœrmis, co-
lore tantum lepori similis: in Indis & magnitudine, & pilo duriore tantū.
Magni maris lepus (nam alterum qui in alio mari nascitur, antè dixi, in-
quit Ælianus) ex omni parte ad terreni similitudinem accedit, præter pi-
los. Nam terrestris pili & molles sunt, & ad tactum haudquaquam resistē-
tes: contra huius spinosi & erecti, hūc qui tetigerit, læditur. In summa aqua
natate ipsum, non in altitudinem demergi dicunt: celeri autem & cōcitata
natatione uti: ad capiendum eò difficillimum esse, quòd neque in rete inci-
dit, neque ad lineæ escam accedit: cū morbo afficitur, natate nequit, simul
& funditus expellitur atque eiicitur: quisquis tum manum ad eum admo-
uet, nisi medicamen adhibeatur, perit: ac si hunc bacillo tetigerit, hoc idem
periculum ei procreatur, quod basiliscus baculo tactus, affert. Quem lepo-
rem marinum uocant, ut prodidit Apuleius, cum sit cætera exollis, xxi nu-
mero ossa ad similitudinem talorum suillorum in uentre eius connexa &
catenata sunt: quod soli illi, quod sciam, proprium est. Venenum est aliis
in cibo datus lepus marinus, erodendoque interimit: aliis etiā uisus. Siqui-
dem grauidæ si omnino aspexerint fœminam duntaxat, confestim nausea
& reduntatione stomachi uitium fatentur: ac deinde abortum faciūt. Re-
medio est mas ob id induratus sale, ut in brachialibus habeant. Eadem res
in mari & tactu quidem nocet: uestitur eo unum tantum animalium, ut H
non intereat nullus piscis, & tenerescit tantum: & ingrator uiliórque fit.
Homines quibus in palu est, piscem olent: hoc primo argumento uenefi-
cium id deprehenditur. Cætero moriuntur totidem diebus quot uixerit le-
pus: incertique temporis ueneficium id esse author est Licinius Macer. In
India affirmant non capi uiuentem: inuicemque ibi hominem, illi pro ue-
neno esse: ac uel digito omnino in mari tactum mori: esse autem ampliòrē
multo sicut reliqua orbis eius animalia. Oleum in quo incoctus sit mari-
nus lepus, ne pili renascantur efficere nonnulli prodidere. Ita Galenus. Dio-
scorides hoc efficere leporem ipsum marinum, aut per sese tritū atque im-
positum,

*Diphilus pro-
didit, scari pi-
scem nonnu-
quam marino
lepore passū.*

A positum, aut cum urtica marina, prodidit. Lepus marinus, inquit Plinius, ipse quidem uenenatus est: sed cinis eius in palpebris pilos inuitiles euulsos cohibet: & ad hunc usum utilissimi minimi. Enterocelæ lepus illinitur tritus cum melle. In leporis marini sanguine & felle uis psilothri est: uel si in oleo lepus hic necetur. Sed de mollium generibus satis dictum iam est.

De crustatis.

Cap. CCXXIX.

Crustata in genere animantium exagui sunt, quæ cutis loco crustis tenuibus, duriusculis tamen & testæ similibus, operiuntur: intus autem molle carnosumque continent, durumque illud eorum tegmen non tam fragile quam collisile est: quale cancerum genus & locustarum est. Summa eorum genera quatuor numero sunt. Genus unum *καρκίνος*, id est, locusta est: alterum, quem *γάμμος*, id est, gammarum uocant: tertium genus squilla est, *καρίδα* appellant: quartum cancer, *καρκινός*, Græci dicunt. Ita Aristoteles: uerum aliter alij crustatorum genera enumerant. Plinius, Cancerorum genera (hoc etenim nomine, arbitror, pro crustatorum genere abutitur) carabi, astaci, mæxæ, paguri, heracleotici, leones, & alia ignobiliora. xxx nanque eorum species esse tradit. Galenus malacostraca, inquit, id est, crustata, astacus, pagurus, cancer, carabus, squilla, cammarides. Speusippus similes esse dixit, astacum, carabum, cancerum, pagurum, nympham & arcton, id est, ursam. Diphilus ostracoderma uocat astacum, carabum, carida, id est, squillam, cancerum, leonem. Singula hæc crustatorum genera, inquit Aristoteles, in plures species distinguuntur, quæ non modo forma, uerum magnitudine etiam multo inter se differant: alia enim magna, alia parua admodum sunt. Genus igitur cancerarium & locustarium (quod *καρκυβόαις* dicunt) similia inter se sunt, eò quod utrunque brachia forcipibus denticulatis habeat, *χέλη* uocant: sed hæc non ingrediendi causa habentur, sed ut iis quasi manibus capiant & retineant: orisque quod ceperint, admoveant. Quamobrem contra quam pedes ea flectere solent hos enim in cauum, illa in orbem flectunt & circumagunt: sed interest, quod carabi caudam habent, canceri non habent. Squillæ à cancerario genere differunt, eò quod caudam habeant: à locustario uero, quod forcipe careant, & plures habeant pedes. Crustatorum partes supinæ & quæ circa caput sunt, ita se habent, ut ad recipiendam reddendamque aquam branchiarum specie conditæ sint. Fistula etiam his data est, qua humore quoque unâ cum cibo admissum reiiciant. Quæ uero inferiores sunt partes, in locustario præsertim genere, foemina tabellatiora sunt, in quas & oua deponunt cum pariunt, ubi & oua ipsa seruantur: at cancerorum foemina operculum illud applicat (quod *ἐπιπύλαια* uocant) in quod oua deponunt, & quæ egerunt excrementum, amplius & interioribus partibus magis hirtum quam mares habent. Crustata omnia ingredi possunt, itaque pedes complures obtinuerunt: pedes omnibus in obliquum flectuntur, eodem quo insectis modo: at denticulati illi forcipes, quibus saltem adfunt, interne flectuntur. Oculi iis omnibus duri, & apertum intro tum foras, tum etiam in obliquum moueri: pal-

Crustata.
Malacostraca.

Chela, χέλη.

pebram uero ex iis nullum habet. Aquam omnia eius generis ore accipiunt, E
 quam per partes illas asperiusculas, quas brachiarum specie conditas esse
 diximus, rursus egerunt: quæ partes omnibus quidem insunt: sed locusta
 plures habet. Dentes omnibus primores bini, & in ore caruncula quædam
 linguæ effigie constituta est: tum stomachus ori continuo iunctus, exiguus
 pro portione suorum corporum magnitudinis, & in cæcis breuis adeo, ut
 protinus uenter os excipere uideatur. Hunc excipit uenter, in quo locustæ
 & cancrorum nonnulli dentes alios habent: quoniam superiores illi non
 satis secare queant. Mox à uentre, intestinum simplex rectum, quod locu-
 staceis & squillis rectà in caudam finit, qua extremèta emittunt, & oua pa-
 riunt: cancris autem, qui operculum illud applicatum gerunt, in medio ap-
 plicaminis ipsius: uerum iis quoque parte exteriori qua oua pariunt deli-
 nit. Habent in hoc crustaceo genere mares ténues genitales meatus: femi-
 næ uuluas membraneas ad intestinum, bifidas fissasque hinc atque inde, in
 quibus gignitur ouum. Fæminis enim huius generis, locus ouis deputatus,
 iuxta intestinum omnibus est. Et quam *mutis*, id est, mutem appellant ampli-
 us parciusue habent hæc omnia genera. Humida corpulentæque ea pars
 est: tenditque per eam mediam stomachus siue gula: eique parti propor-
 tionatur, quæ in sanguineo genere cor appellatur. Quæ crusta operiuntur,
 etiam olfactum sensus habere constat: odore enim escarum allectata, non-
 nunquam capiuntur: nullum crustatum uel uocem, uel sonum aliquem e-
 mittit naturalem. Coeunt crusta operta, ut locustæ, astaci, & squillæ: & hu-
 iusmodi reliqua, more quadrupedum retro-mingentium: scilicet ut fœmi-
 na caudam supinā exponat: mas suam superponat & applicet. Coire solent
 ineunte uere iuxta terram: iam enim coitus omnium id genus uisus est: in-
 terdum etiam cum ficus maturescunt, coire incipiunt: cancri autem parte
 priore copulantur, sua illa opercula mutua consertione componentēs: mē-
 brum autem quod mas in fœminam inserat, nullū omnino habetur. Cru-
 stata ueluti locustæ cum per coitum conceperint, oua gerunt fere tribus
 mensibus his, Maio, Iunio, & Iulio: tum deinde sub aluo in rugas oua depo-
 nunt, putamine duriusculo intecta: quo in loco more uermium augentur:
 incrementum enim eorum oua foris recipiunt, sicut piscium. Fit igitur lo-
 custarum ouum arenidum in partes octo deductū: totumque quasi species
 uix consistit: sunt autem oua maxima, non quæ iuxta meatū, sed quæ me-
 dia sita sunt: minima quæ nouissima continentur. Magnitudo minimis quæ-
 ra granis ficuum est: nec meatum ipsum ulla contingunt, sed per medium
 hærent cartilagineis quibusdam appendicibus quæ per id tempus augentur,
 atque ouorū capaces redduntur: partus enim in iis quasi in fermentis qui-
 busdam recipitur. Locustæ ad hunc pariunt modū: mox ubi ea sui corporis
 parte intra diem uigessimū maxime oua concoxerint, abigunt uniuersa,
 in idemque glomerata eodem modo quo foris congesta apparent: tum ex
 iis locustæ proueniunt, intra diem maxime decimum quintum, & sæpe mi-
 nores quàm ut digiti magnitudinem expleant, capiuntur. Excludunt igitur
 oua ante arcturum: abigunt iam concocta atque absolunt ab arcturo.

Squillæ

De his plura
 uideat lib. 4.
 histor. anima-
 lium Aristo-
 telis.
 Mutis, Mutis.

ANIMALIVM LIB: X.

104

A Squille gibbæ uterum menses circiter quatuor ferunt. Locustæ asperis saxosisque proveniunt: astaci levioribus. Neutrum genus limosa amat. Litora potius uernis hybernisque temporibus expetunt: conferunt se in altum æstate: uidelicet cum aliàs calorē, aliàs frigus persequuntur. Natant omnia suis caudis, celesterrimæque retrorsum, pinnarum caudæ adiunctarum beneficio. Conduntur hyberno tempore: & locustæ quidem & cancri crusta sua exuuntur per uer, quemadmodum angues membrana uernationis quam senectutem uocāt: cum uero exuunt, mollis admodum crusta subnascitur. Crustacea omniuora sunt: quippe quæ & lapillos & limum, & algam deuorent, atque etiam stercus (ut cancri laxatiles) & carnes etiam nimirum appetunt. Omnia eius generis hyeme leduntur, autūno & uere pinguescunt, & plenilunio magis. Quæ crusta intacta sunt, tunc oprima sunt cum grauida, ut in locustaceis & reliquis eiusmodi patet. Duram omnino carnem habent, ut testacea, & quæ concoctu difficilis sit, multumque nutriat, nec facile corrumpatur. Non parū salis in se continent succi: ut testacea, minus tamen quàm illa: quin & caro eorum non aliter atque testatorum in aqua si coquatur, succum illum salsum exuit, aluūmque sistit: assa tamē, ut Mnesitheo placuit, elixis meliora sunt.

1 Fragile, *σπασθὲν*, collisile, *θλασθὲν*. Plin. uero locustas crusta fragili muniri dixit.

2 Fistula etiam, &c. Locus hic apud Aristotelem mihi quidem suspectus est: tum quod neque in libro De respiratione, ubi hæc apertius traditur, nec usquā alibi (quod equidem meminerim) ullam crustatis attribuat fistulam: tum etiā uetus interpretes hoc in loco nihil habet de fistula. Perpende lector.

C De locusta. Cap. CCXXX.

i Crusta intactorum genus unum locusta est, *καρχήδον* Græci dicūt: cui simile genus alterum est, quem astacum uocant. Differt is à locusta, che- Locusta: *κάρχηδον*.
Carabus.
Astacus.
larum uarietate, atque etiam quibusdam aliis discriminibus, quanquā non multis. Locusta omnis forcipem dextrum grandiorē ualentiorēque habet: astaci uero non certum, sed alterutrum æque (ut fors tulerit) forcipē habent grandiorē, tam mares quàm fœminæ. Pedes locustis utroque ex latere quini, ultimis illis adnumeratis, qui in forcipem exeunt denticulatum. & in his, quæ brachia chelatiue dicuntur longa sunt, pedes uero parui. Corpus totum his longum est, & cauda quoque, & in cauda pinnae. Locusta,
Carabus.
D Quinæ adfunt. Hac natat, & in natando illi quasi remo innititur. Cornua ante oculos bina, longa & aspera, quibus alia minuta & leuora cornicula
3 subiacent: corpus denique totum aculeatū habet, & asperum. Differt mas locusta à fœmina: quod fœminæ primus pes bifidus est, mari simplex. Pinnae etiam quæ in his parte supina geruntur, fœminæ, maiores, & quæ collo proximæ sunt minores habentur: mari omnes æque minores, nec usquam per diminutionē dissimiles. Ad hæc mari in nouissimis cruribus uelut calcaria maiuscula prominēt acuta, quæ fœmina parua habet & leuiora. Partes illas quæ branchiarū species referunt, locustæ plures habent quàm alia. Dētes in ore locustis primores bini, magni & caui, in quibus & humor cōtinetur. Caruncula est inter dentes, linguæ representans effigiem, quæ &

A tenuis, bisulcis. Præterea brachia duo, binis articulis, singulisque forficulis denticularis.

1 Carabus, Astacus dictus est ab Arcestrato, & à Diphilo *καρπαῖος*. 2 In cauda pinna, &c. Carabi, inquit Plinius, à cæteris caneris cauda distat. 3 Corpus denique totum aculeatum, &c. Hinc crudele Tiberij Cæsaris facinus apud Suetonium, qui locusta os piscatori cuidam lacerari iussit. 4 Maiores euincere possunt, &c. Locustæ dimicationem cum iuvenâ depinxit Oppianus, lib. 2 De piscibus.

De astaco siue cammáro.

Cap. CCXXXI.

1 **A**stacus locustæ similis est, uti modo diximus: differt autem à locusta, tum aliis quibusdam discriminibus, quamquam non multis, tum chelarum brachiorumque forma. astaci enim non certum, ut locustæ, sed al-
 B te tutrum æque, (ut sors tulerit) forcipem habent grandiore, tam mares quam fœminæ. Pectus his corpusque totum leue est, nō more locustarum
 2 aculeatum & asperum: in pedibus tamen illis magnis, partes exteriores aculeos habent maiores. Color, quod ex toto dixerim, niter, nigrisque maculis dispersis, cuariat. Pedes inferiores ad grandes usque dispositi octo, quorum pars scissa in extremo bifurcatur, pars definit indiuisa. quatuor enim bifurces sunt, reliqui quatuor simplices ex toto pertendunt. Tum grandes ipsi, longe maiores, extremæque parte latiores quàm locustæ habentur: sed nec hi eadem specie: dexter enim extremum suum latum, oblongum & tenuè habet, sinistè crassum & rotundum: uterque tamen scissus in extremo, perinde ut maxilla tam infra quàm supra dentatus est: uerum dexter pusillus
 C los serratosque dentes continet omnes: leuissimos primos, & qui extimi sunt, serratos: intimos uelut maxillares, parte scilicet inferiore quatuor & continuos, superiore autem tres non continuos: uterque tamen partem mouet superiorem, ad inferioremque deprimit adstringitque. Blesus item uterque situ inferiore, tanquam nati ad capiendū premédūmque. Supra uero grandes illos habentur alij duo hirtiuseculi, paulo ab ore inferiores, quos etiam in os adducit. Mox ueluti branchiæ os circundant frequentes & hirsutæ, quas assidue mouet: sicut etiam appendicæ graciles geruntur à pedibus, qui ori proximi habentur. Dentes huic quoque duo, ut locustæ: supra quos cornua, breuiora tenuioraque quàm locustis. Quatuor item alia ad-
 D supra hæc oculi constituti sunt, parui crassiusculi, non ut locustæ maiusculi. Supra oculos extat deinde quasi frons quædam acuta & aspera, maior quàm locustæ. Denique facies acutior & thorax latior multo quàm locustæ: totumque corpus mollius & carnosius. Quod autem collum appellat, (Græci *σάχλον*) quinque partium foris est, & sextum latius illud situm loco nouissimo habetur, tabellis cōtinuatum quinque. Interiora uero in quæ fœminæ foras pariunt, ouaque deponunt, hirtiusecula quædam quatuor cōtinent. In singulis autem eorum quæ foris esse diximus, spinæ singulæ breues rectæque eminent. Fœminam hoc in genere nullum discrimen à mari distinguit: nam & mari & fœminæ forceps alteruter grandior more incet to est: parem uero utrunque, neuter habere uisus est. Exuunt senectutem &

DE DIFFERENTIIS

astaci, aut uere aut autumnō, & leuioribus locis proueniunt, ut apud Hellespontum & circa Thasum, sicuti locustæ asperis saxosisque: neutrum genus limosa amat. Gignuntur & in fluminibus astaci quidam pusilli.

*Astaci flumina
talu.*

Gammarus.

Gammarus.

1 Astacus, &c. *Γαμμαρ* gammarum interpretatur Theodorus. Athenzus gammarum latine dici genera quædam *καρίδες*, id est, squillarum scribit. Columella quoque & Plinius fere cammarum uocant, non gammarum. 2 *Διμήτρος ἴχθυος ἡ δόμα*, concolor in nostra cammare lance rubes, inquit Marialis. 3 *Τρύχλος*, id est, collum, (ut uidetur) eam partem significat, quam caudam supra in locustis nocaui Aristoteles, nisi forte locus hic sit mendosus. 4 His similes esse tradit Aristoteles, bestiolas quasdam, quæ in cochleis quibusdam reperiuntur, sed quæ præmollem habent carnem.

De cancrorum generibus.

Cap. CCXXXII.

*Cancer,
καρκίνος.*

*Longi, alias
pagni, μακροί.*

*Vetus interpret
Non sunt ap-
plicata sicut
mari opercu-
cula.*

CANCER inter crustacea solis corpus rotundum est, & cauda deest: cum locustis squillisque oblongum corpus sit. Pedes his omnes cum forcipibus deni. Omnibus uero magna ex parte grandior ac ualidior forceps dexter quam laeuus est: & superiorem forcipis partem mouent, non inferiorem. Crura iis breuia, quia parum mouetur. Alueus totius corporis indifcretus est: nec etiam caput distinctum, nec aliud quicquam. Oculi uero omnibus, sed aliis è latere supra, continuo sub prono, amplo distantes discriminat: aliis in medio, breui discrimine, ut heracleoticis & maiis. Os oculis subditum, in quo dentes duo ut locustis: uerum non rotundi, sed longi: & tegmina hos operiunt duo. Inter hæc talia interiacent quædam, qualia locustarum dentibus adnecti diximus. Humorem quem ore accipit, tegminibus illis depellit. Emittit uero meatibus quibusdam superioribus, qui statim sub oculis positi sunt. Quoties ergo aqua acciperit, utroque tegumento os obturat, atque ita respuit humorem. Gula post dentes breuis admodum est, ita ut protinus uenter os accipere uideatur. uenter bifidus gulæ subiungitur: cuius ex medio, intestinum simplex & tenuē procedit, quod sub operculo illo exteriore applicato definit, quod caudæ loco habetur: in quod & femina oua pariunt. Humor intus in alueo pallidus, & minuta quædam oblonga albida continentur: rufa etiam alia, maculis dispersis. Differt à femina mas, magnitudine, crassitudine, & applicatili illo operculo: id enim amplius in femina est & distatius: & interiora habet hirtiora amplioraque, in quæ & oua pariat: aliàs cauda hæc in cancris minimi est usus: quandoquidem prope terram uitam agere cauernasque subire solent, nec plurimum natant. Et qui ex iis pelagij sunt, ij pedes habent longe tardiores ad ambulandum: sunt enim cæteris ipsi nantiores, ut maiæ, & qui heracleotici appellantur. Femina quoque primus pes, inquit Plinius, duplex est, mari simplex. Ex omnibus animalibus cancrorum genus unum, non in priorem mouetur partem, sed in latus. Et cum cætera animalia ducibus binis pedibus incedunt, cancer unus quaternis regi solitus est. Cum cætera crustacea auersa coeant, cancri parte priore copulantur, sua opercula loculosa illa rugosaque mutua conseruione componentes. Latent cancri quinis mensibus, & crusta sua ueris principio exuuntur, quemadmodum locustæ: molliores quidem perspicue, sed etiam duriores exuere aiunt, ut maias: & tunc quidem

A quidem præ ténertate non facis ambulare possunt. Ostrea uenatur cancer,
 i iniectoque inter testas lapillo, exedit. Cancrorum genus multiplex, nec fa-
 cile énumerandum: maximum quas maias appellât. Durior his crusta est, *Mais, μαῖα.*
 & crura exiliora: oculique paruo distant intervallo, sicuti in heracleoticis.
 Secundum magnitudinis locum paguri occupant. Qui heracleotici uocâ- *Paguri.*
 tur, crusta quoque firmiore muniuntur ut maiæ: & oculos habent paruo
 distantes intervallo, sed crura illis breuiora sunt quàm maiis. Aliud genus
 2 est fluuatiilium cancrorum: ceteri minutiores, & nullis pene nominibus
 annotati. Genus cancrorum in litoribus Phœnice fert, tantæ uelocitatis ut *Cancer fluua-*
 3 uix consequi sicunde *ἰκτωρ*, id est, equites illos appellarunt: iis nihil fere in- *ἰκτωρ.*
 tu propter inopiam pabuli. Genus item aliud est, quod magnitudine can- *Equites cæcri.*
 crum non excedit, facie astacis simile. Edulium græue cancer est, & ægra *Cancer.*
 4 concoquitur: contra serpentium ictus medetur. Cancri fluuiatiles triti eru *Cancri fluui-*
 di porique ex asinino lacte remedio sunt contra serpentium phalangiorum- *tiles.*
 que morsus & scorpionum ictus. Elix & cū suo iure in cibo sumpti phthi-
 sicis tabidisque profunt, & iis qui leporem marinum hauserint. Nihil æque
 aduersari serpentibus aiunt q̄ cæcos: suelque percussas, hoc pabulo mederis.
 Rupta cōuulsa cæcri fluuiatiles triti in asinino lacte maxime sanât: triti ue-
 ro cū ocymo atq; admoti, scorpiones necât. In cataplasmatibus modū imposi-
 ti aculeos infixos extrahunt. Cancrorū fluuiatiliū succus cū farina ordeacea
 auriū uulneribus efficacissime prodest. Exustorū cancrorū fluuiatiliū cinis
 C non aliter atque echinorum cochlearūque exsiccandi facultate pollet.
 Substantiæ autem proprietate, mirū quàm canis, rabidi morsibus prodest,
 & solus, & multo magis cum gentiana & thure, ut sit thuris pars una, gen-
 tianæ quinque, cineris cancrorum decem. Bibendum hoc medicamentum
 dant, alij quod diebus quadraginta, cochlearij magni mensura, aut (si
 non statim detur, sed aliquot post dies quàm uulnus acceperint) duorum
 cochleariorum aquæ admistū. Alij cineris duo cochlearia, uno radices gen-
 tianæ adiecto, triduo cum uino exhibent. Cinis hic cum decocto melle, pe-
 dum sedisque rimas, perniones & carcinomata mitigat. Aduersus canis
 morsum minime ualere marinos cæcos alij prodidere: at Dioscorides ma-
 rinos eadem omnia posse, uerum minus efficaces esse prædicat: utuntur &
 cancrorum cinerē ad dētium dolores: & ad lepras cum oleo Andreas usus
 D illo est. Quem cancellum & *καρχίνος* appellant, principio ex terra limoque *Cancellus.*
 consistit: mox conchulas ingreditur uacuas: ubi cum excreuerit, transit in *Καρχίνος.*
 concham ampliorem, uidelicet aut nerites, aut turbinis, aut alicuius simi-
 lis: saepe etiam paruum buccinam subit: ingressūque ampliorem illam, ge-
 rit pari modo, & uiuit in domicilio capaciore: rursusque excrefcens, aliam
 petit ampliorem. Specie similis locustaceis est, nascique seorsum per se so-
 litus: uerum quod testam deinde petit, uitamque in ea traducit, hinc simi-
 lis testa coniectis animalibus est: quapropter is in ancipiti esse, genūq; sibi
 uendicare utrunque uidetur: forma tamen, quod simplicius dixerim, simi-
 lis araneis est, nisi quod partem capiti & pectori subditam, ampliorem quàm
 aranei habet. Cornicula duo rufa tenuia gerit, quibus oculi totidem subia-

DE DIFFERENTIIS

cet: qui nunquam intro recedant, ut cancerorum, neque claudantur, sed semper eminentes appareant. Os sub his est, quod uelut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. His pedes subiuncti duobis furces, quibus cibum ori admovent: bini item utrique adherent lateri, & tertius parvus. Quod sub thorace est, molle totum est: quod dissecto pallidum intus cernitur. Meatus unus ab ore ad uentrem pergit: foramen extremi perspicere nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus quam canceri: nexu nullo adheret testæ purpurarum modo & buccinarum, sed absolutus liberque uagatur. Pinnothera hunc uocat Plinius, Pinnother, inquit, uocatur

Pinnother.

minimus ex omni cancerorum genere, ideo opportunus iniuriæ. Huic solertia est inanium ostrearum testis se condere: & cum accreuerit, migrare in capaciosiores. Genus cancelli diuersum est, quod in nerite degit, ab eo quod in turbine: oblongior enim est qui in turbine uiuit: qui uero in nerite, cætera quidem illi non absimilis: sed dextrum bifurcatum pedem, paruum habet, & laeuum grandiusculum, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solet. Hic nunquam in turbine hospitatur, sed in neritis tantum. Sunt inter cochleas quæ intra se bestiolas habent similes astacis pusillis, qui uel in

Cancelli.

Μικροί καρκίνοι.

Pinnothylax.

Squilla parua.

flumine gignuntur: sed ea differentia, ut præmollem intra suam testam carunculam habeant. Cancelli, qui perquam exigui inter pisciculos reperiuntur, pedes nouissimos latiusculos habet, ut ad nandum utiles sint, quasi pro pinnulis aut remis pedes haberentur. Inter spongiarum cubilia bestiola gignitur aranei similis, quæ pinnothylax dicitur, & squilla parua. hæc concham ingressa, aperiendo claudendoque pisciculos capit: aperit autem antequam ingrediantur, claudit & contrahit cum ingressi sunt. Nascuntur & in nonnullis testa operi generis cancelli, colore albedo, corpore admodum parui: & plurimi quidem in mitulis, qui in alto gurgite degunt: mox in pinnis, quos pinnotheras uocant: quinetiam in pectunculis atque ostreis: uerum nullum conspicuum capiunt incrementum. Piscatores cancores eius modi nasci confirmant unà cum illis quorum testam inhabitant, & ex eodem quasi seminio gigni. Et in pinna quidem carni eius ita adnascitur, ut ueluti carneam quandam radicem in eam demittere uideatur.

Pinnother.

Πιννοθήρα.

Πιννοθήρα.

Πιννοθήρα.

Pinnother.

1 Ostrea uenatur. Canceri astutia in ostreis excedendis describitur ab Opplano.

2 Fluiuatilium cancerorum. Viuant canceri, inquit Galenus, in utroque humore, marino scilicet & dulci. 3 Hippoc, &c. Hippoc uocantur, inquit Plinius. Cursores cæcri, uti alij referunt, quod longe lateque uagantur, modo circum litora errant, modo longius proficiscuntur. 4 Eundem hunc pinnothylacem Aristoteles, σκυλλήθρα quoque uel σκυλλήθρα uocauit, & ὑπερίθρα. Theodorus pro utroque squillam paruam reddidit, Plinium secutus. Hæc apertius infra explicantur in pinna.

Hippoc.

Κυρσορες αἰκρί.

Σκυλλήθρα, uel

σκυλλήθρα, uel

ὑπερίθρα.

De squillarum generibus, & cammaro, leone & arcto.

Cap. CCXXXIII.

Squilla, ὑπερίθρα.

Squillas (quas ὑπερίθρα Græci uocant) à cæcario genere differre modo diximus, eo quod corpus his longum sit, & caudam habeant: à locustario uero, quod forcipe careant, & plures habeant pedes. Quæ tam ex mari ueniunt,

A niunt in Gangem squille, forcipes maximas & tangētibus asperas habent: quæ uero in Indum ascendunt, leues aiunt habere spinas, & forcipibus tangerere. Squillas ouum clauiculâsque intra se similem in modum habere tum locustis certum est: intestinumque his sicuti & locustis & astacis recta in caudam finit, quâ excrementa emittunt, & oua pariunt. Squillæ colorem mutant: uere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt: Indicæ squillæ locustis maiores sunt. Squillarû plura sunt genera: gibbæ, quas Græci

2 ci λέγουσιν uocant, crangones. Et paruum genus earum quæ maiores nunquam effici possunt. Gibbæ parte prona similes sunt locustarum: supina uero parte, tabellæ (πλάκες uocat) his nullæ. Quinos utrinque pedes capiti proximos habent acutiores, & ad uentrem utrinque alios, quorum extrema latiuscunt.

B la sunt. Squillis etiam gibbis cauda & pinnæ quaternæ: quarû quod in medio est, spinosum est, & acutius quàm quod in crangone reperitur. est enim latius in crangone. Squillæ gibbæ uterum circiter menses quatuor ferunt. Crangones contrâ quàm gibbæ, primos habent utrinque quaternos: tum deinde ternos habent utrinque paruos. Reliqua corporis pars (quæ maior est) pedibus caret. Crangonis quoque lateri caudæ utrinque pinnæ adnexæ sunt: quarum quod medium est, sicuti & in gibbis, spinosum est: uerum in crangone latius, in gibbis acutius est. Caridon quoque, hoc est, squillarum

4 generis est câmarus (ut author est Athenæus) eoque nomine uocatur à Latinis. E crustatorum genere & leo est, astaco minor: cuius brachia cæcis similia sunt, reliqua pars locustæ. Leonem marinum Ælianus scribit locustæ

C speciem similitudinemque gerere: sed corporis tenuitate & gracilitate habitus maiori esse: brachiâque habere tum maxima, tum cancris similia: cetero colore esse: & subnigris maculis distinguui. Iis quas nomine uisæ arctos appellant, idem pariendi tempus natura statuit, quod locustis: quocirca per hyemem & uere priusquam oua excludant, cibo laudatur. Cum excluderint deterrimæ fiunt. Quæ crusta operiuntur, ita se habent. Reliquum iam est, ut de testatis differamus.

1 Squillas, &c. Scyllam Plinius, ni fallor, hanc uocauit, lib. 32. 2 κρηίνης Theophrastus. Scylla.

dorus crangines uocat. 3 Gibbæ, &c. Vetus interpres. Genus quod dicitur gibbo- Crangines.

sum, habet x i r. pedes, in utraque parte sex pedes: & pedes qui sunt uersus caput, sunt acuti ualde: & extrema aliorum pedum qui sunt in uentre, sunt lata: & uentres eorum

D assimilantur uentri carabi. 4 Cammarum marinum dixit Plinius. Columella in- Câmarus ma-
rimus.
cant. (ut Theodorus pro astaco gammarum reddit) Luuenalis: Gammarus.

Si tibi dimidio constriktus gammarus ouo
Ponitur.

Martialis lib. 12 in Candidum:

Immodici tibi flaua regunt chrysendeta nulli.

Concolor in nostra gammare lances rubes.

Hic uero apparet ignobile esse gâmarum, siue cammarum, & uulgicibum. 5 Leo est astaco minor. In Athenæi exemplaribus habetur λέων ὁ μικρὸς ἢ λίον τὸ ἀστέρον: quo in loco equidem conicio legendum esse λέων pro μικρὸς: itaque (minor) reddidi: atq; hæc meam opinionem confirmat, & quod nobis tradidit ex Æliano Gillius. Plinius leo- Leo.

DE DIFFERENTIIS

De testaceis.

Cap. CCXXXIII. E

Testatum.
Testaceum.
ὄστρεον ὄστρεον.
ὄστρεον.
ὄστρεον.
ὄστρεον.
Ostreum.
Concha.
Conchulium.
Turbinatum.
ἰστρεοειδές.

Bivalue.
Διδύμοι.
Univalue.
Μονόδυμοι.

Ditellam.
Tumida.

Turbinata.

Testata ea sunt quibus pars carnea intus est, nihil durum intra se habes, solida foris, testæ aut lapidi similis, quale genus concharum & ostrearum est. Huius generis aut nullum in terra gignitur, aut omnino pauca, ut limacum genus, & si quid eiusmodi aliud sit, sed rarum: at in mari similique humore multa & varia gignuntur. Hæc inter se numerosa discrepant differentia tum teste, tum carnis ratione: aliis enim in hoc genere nulla est caro, ut echinis: aliis est, sed quæ penitus inclusa nec ulla ex parte conspecta est, excepto capite, ut limacibus, purpuris, buccinis, & reliquis turbinatis. Sunt uero turbinati generis (quod ἰστρεοειδές dicunt) alia quidem in anfractum intorta, ut buccina: alia in globum tantum circumacta, ut echinorum genera: nerites quoque testam habet rotundam. Cæterorum quædã duplici constant ualuula, quædam simplici: ut genus alterum διδυμοι aut bivalue: alterum univalue uel μονόδυμοι possit nuncupari. Bivalue appello, quod gemina testa clauditur: univalue quod testa singulari continetur: cuius altera pars detecta carnem ostendit, ut lepas. Bivaluis generis pars clusilis est & resecretilis, ut pectunculi & mitili: eiusmodi nanque omnia, parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possint & aperiri. Alia binis quidem conclusa ualuulis sunt, uerum utroque latere connexa, ut unguis siue digiti. Sūt & quæ testa tota occultentur, ita ut nulla ex parte carnem detectā habeant, ut quæ tethya siue uertibula appellamus. Ipsarum etiam testarum magna uarietas: nam alia leues habent testas, ut unguis, mitili & concharum quædam, quas alij galadas appellant: alia scabras, ut ostrea pinnæ, & conchæ nonnullæ & buccina. Atque horum quædam etiam pectinatim diuisas striatæ sunt: ut pectunculi & conchæ quædam: alia non ita striatas, ut pinna, & concharum nonnullæ. Crassitudine quoque differunt & tenuitate tum totius, tum partitis, uelut labrorum: aliis enim labra tenuia, ut mitilis: aliis crassa, ut ostreis. Item alia modo quodam se mouent, ut omne quidem turbinatorum genus mouetur & serpit: & pectines, quos & uolare nonnulli aiunt: alia ita naturaliter immobili sunt, ut nunquam sedem in qua hærent sponte ipsa mutare ualeant, ut pinna. Et quæ ex testaceis loco mouentur, eo tantum modo mouentur quo pedestria aliqua pedibus mutilata moueri dicimus, & parum admodum progrediuntur: sed uelut stabilia & hærentia mobilia sunt: ut progredientia uero, stare uidentur atque adherere: sunt enim animalia ueluti macta deprauataque. Commune testacei generis omnibus est, ut testa intus equalis læuisque sit. Et caro bivaluis & univaluis generis ita testæ adheret, ut nisi per uim nequeat detrahi: at turbinati laxior continetur & absolutior. Cui generi peculiare est, ut testæ ea pars quæ a capite remotissima habetur in anfractum clauiculæ torqueatur. Mouentur eadem omnia parte dextra, non ad clauiculam, sed in aduersum. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturæ omnia fere gerunt. Est autem hoc crusta quædam prætenuis, qua tanquam operculo quodam congenito, carni patulæ appposito, sese quasi concludendo tumentur, ne facile offendantur ab his quæ extrinsecus incidunt. Testatorum corpus quam paucissimis constat ex partibus: sunt enim

- A** enim omnia aut immobilia, aut parum omnino motus adepta, ut modo diximus: quæ autē mobilia sunt, hæc plures habeant partes, necesse est. partes exteriores huius animalium generis differentiis iis uariantur. Interiorū natura similis quodammodo in omnibus est, maximèque turbinatis. Differunt enim inter se magnitudine, & quæ excessu constant affectibus: nec uero multum dissident uniualue & biualue generis, quāquam longe ab immobilibus discrepent, quod latius postea patebit. Natura ergo turbinatorū *Turbinata.* fere similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi: aliis enim partes maiores atque euidentiores, aliis minores obscurioresque sunt. Quo enim maiora sunt quæcunque testatorum genera, eo partium conspectum præbent euidentiore. Ad hæc discrimen illud duritiæ, mollicitiæ, cæterarūque generis eiusdem affectionum. Turbinatorum omnium caro penitus testē inclusa est, nec ulla fere ex parte conspecta, excepto capite. Hanc primo extimōque in ore testæ, maxima quidem ex parte, omnia torosiusculam habent, alia magis, alia minus. Caput eius ex medio partis prominulum extat & cornicula duo, quæ pro magnitudine animantis plus minus capiunt incrementi: in maioribus enim magna, in minutis uero animalibus admodum parua conspiciuntur. Exerunt caput more omnia eodem, idēque per metum retrahunt intro. Est illis & os: nonnullis etiam dentes, ut cochleis, breues, acuti, duri & tenues. Promuscidas item gerunt modo muscarum: quod quidem mēbrum partim linguæ effigiem præ se fert, & partim aculei. Venter os protinus excipit, similis auium ingluuici, habentque infra uentrem duo quædam albida firma, & torosa, mammis similia, cuiusmodi uel in septis esse aduertimus, sed hæc torosiora sunt. Meatus *Рарает. Микит.* à uentre duplicatus longus porrigit se usque ad id, quod papauer appellatur, quod *μικητε* Græci uocant, quod fundo cōmissum est. Hæc ergo in purpuris & buccinis & *κόχλεις*, id est, umbilicis sunt conspicua, & in clauicula testæ continentur, sicuti & in reliquis turbinatis omnibus. Est autem *μικητε*, id est papauer, quasi excrementitium quoddam membrana contentū magna sui parte in omnibus testaceis generibus, quod uel esculētum esse præcipue sentitur, quāquam in quibusdam echinis cibo minime idoneum est. Meatum illum excipit intestinum illi continuum simplēque ex toto usque ad exitum: estque eius initium circa anfractum papaueris, quo etiam latius
- D** est: hinc sursum uersus replicans, carnosam illam partem repetit, finitque ad caput, unde eiicitur excrementum ex meatu quodam ori uicino, quod in omnibus perspicitur turbinatis tam aquaticis quàm terrestribus. Mēbrana in grandiusculis umbilicis sub uentre, gulæ illi siue meatus attexitur continua, per quem meatus prolixior albicans, colore similis superioribus illas mammillariis carunculis tendit. habet etiam incisuras, quales in ouo locustarum habentur: uerum hoc albidum, illud rubidum est: nullus exitus huic, nec foramen ullum patet, sed prætenui membrana cōtinetur, cauum quoddam angustum in se habens. Tendunt ab intestino ad imum nigricantia quædam aspera atque cōtinua, qualia uel in testudine uisuntur, sed minus nigra. Cæteræ quoque cochleæ umbilicæ hæc habent eadem: sed quo

*Uniuersalia.
Bimalia.*

Orum.

*Cordis propor-
tionale.*

minores, & minutiora: & in iis ipsis alia explanatius, alia obscurius, ut dictum est. Uniuersale autem & bialue genus, partim iis simile est, partim diuersum. caput enim & cornicula & os obtinent, atque etiam quod linguæ speciem gerat: uerum hæc in minutioribus sensum præ sua exiguitate effugiunt: nonnulla etiã in exanimatis, aut non mouentibus percipi nequeunt. Papauer illud omnia habent, sed non loco eodem, nec par, nec ex æquo manifestum: sed uniuersalia suo fundo, ut patellæ: bialuia quæ mutuo testarum complexu nodoue ligantur. Quibusdam etiam quasi capillamentis, in extremis oris, hæc omnia circundantur. Quod autem ouum uocatur tempore quo gigni solet, altero tantum latere, dextro scilicet, bialuia habent: altero latere ostium excrementi continent. Sed errore ouum hoc uocatur, quippe quod nihil ad generationem conferat, sed tale sit quale est pingue in sanguineo genere cum uiget, & quod bona animalis nutritione alimoniaque proueniat: quamobrem sapore per id tempus præstant, ciboque laudantur, scilicet uere & autumno. Laborant enim testata omnia per frigus & æstum, atque exuperantiam temporis ferre nequeunt. Est autem ouum hoc in testatis, quibus datum id à natura est, carni ipsi intumescens, nullum habens ad eius exitum foramen, sicuti albidum illud in umbilicis: id enim illis simile intelligimus. Sed huiusmodi partes (ut dixi) cum conspicuæ in magnis habeantur, in paruis tamen aut nullo pacto aut uix sentiuntur. Quamobrem in magnis pectunculis præcipue patent. Ostium excrementi cæteris quidem à latere est: at uero patellæ feræ parte ima testæ excernitur, quæ foramen in testa habetur. Et uniuersalia quidē atque bialuia ita se habere cernuntur. In uniuersum autē, nullum ex testaceis est, quod capite careat: cæteræ corporis partes nomine uacant, præter linguam, quæ omnibus etiam inest. Caput omnia testata infra habent plantarum modis: quæ cibum de imo capiunt, ut plantæ radicibus suis hauriunt. In testatis omnibus id etiam est quod cordi proportionetur, eodem modo quo & in crustatis & mollibus, quod mutis uocatur, sed minus patet: attamen in medio querendum hoc est, aut scilicet inter partes quæ cibum recipiunt, & quæ excrementum emittunt, si fixa degunt: aut inter dexteram partem & sinistram, si incessalia sunt. Quæ siliceo tegmine operiuntur omnia, quibus saltem ingrediendi facultas est, olfactum gustumque habere constat argumento cæcarum: accedunt enim ad escam à longe, utpote odorantes. Sensus item saporum iis inesse hac eadem ratione patet. sapore enim rerum carundem Hæc Aristoteles. In marinis ostreis, inquit Plinius, auditum esse non est uersimile: sed ad sonum mergere solent: ideo & silentium

- A** silentium in mari piscantibus. Vniuersum autem testatorum genus, plantæ simile respectu gradientium animalium est. Sexus discrimen in iis quæ testa integuntur nullum omnino perspicuum est. Et plurima quidem non coire aptum est: sed an ulla coeant & per coitum generent, incertum est: sed quemadmodum in genere stirpium, aliæ fructum ferunt, aliæ sterilem sortiuntur naturam: ita etiam in his quod quidē pariat & generet, est: quod autem maris fungatur officio, deest. Vnum saltem ex his genus cochlearū coire perspectum est: sed an ortus earum per coitum sit necne, nōdum exploratum satis habetur. Est sane totum hoc animalium genus modo quodam inter animalia & plantas ambiguum, & uelut in ambobus constitutū
- B** generibus: munere neutrius fungitur. Nam ut planta, sexu maris & feminae ceter, nec in altero generat: & ut animal, nullum ex se fructū affert modo plantæ: sed consistunt & generantur ex terrena & humida quadam concretionē. E limo namque & materia putrescente, sponte naturæ oriuntur prope dixerim omnia: diuersa tamen pro limi differentia: nam in cænoso, ostreis origo consistit, conchæ, chamæ: ungues & pectines locis arenosis sui ortus initia capiunt. Rimis cauernisque saxorum tethya generantur & glandes, & quæ per summa adherent, ut patellæ & narices. locis enim nascuntur hæc uariis, ut alia uadis, alia gurgite, alia duris locis atque asperis, alia arenosis. Omnia uero id genus celeri incremento augentur. Quæ ex iis fauificare solent (qualia sunt, inquit Plinius, quæ durioris testæ sunt, ut murices, purpuræ) non alio modo quàm cætera testis inclusa generantur: uerum melius atque uberius quoties præexistit aliqua quæ eiusdem sunt
- C** generis. Condunt enim aliqua, ut purpuræ uerno tempore eundem in locum sese colligentes, quam *μυλινὰς* aut fauaginem uocant, quæ uelut fauus est apum: uerum non ita elegans, sed quasi è putaminibus cicerum alborum multa inter se composita, struem unam sua cohæsiōe coagmentant. Nullum iis patet foramen, neque ex his purpuræ ceteræ uel testacea enascuntur: sed coagmentatio illa fauo similis tanquam purgamentum iis est. emittunt enim, cum suos ordiuntur fauos, mucorem quendam (saluariūm lentorem uocat Plinius) ex quo puramina illa coagmentata consistunt. Hæc ergo rupta diffusæque omnia, humorem quem cōtinebant, in terram demittunt: mox eo quo effuderint, loco gignuntur animalcula testacea, ut
- D** purpurulæ, exordio admodum exiguo. Buccina quoque & mituli fauificare solent. Itaque ne hæc quidem quæ inter testacea fauos saluiant, alio modo quàm cætera generantur: sed sponte naturæ omnia è limo materiæque putrescente. Quod ad generationem pertinet, res ita habet. Aluntur autē quæ ex iis immota manent humore dulci & potulento, qui per spissā tñāsmittitur. Quæ autem mobilia eadēque carne uescētia sunt, iis uictus ex pisciculis est, ut purpuris: alia uero iis quæ in mari pullulant, uescuntur. Larent testata omnia, ut in mari purpura, buccinum, omnēque id genus, uerum non eodem modo, sed absolutorum latibulum euidentius est: conduntur enim secessu: aliqua uero leuiore quodam tegmine superimposito delitescunt, ut limaces. At earum quæ adherent, non est tam manifesta latita-

In cænoso, in
*τῷ βορραιοῦ
 δει.*

*μυλινὰς
 Fauago.*

DE DIFFERENTIIS

tio: Quæ uero latent, non eodem tempore omnia latent; sed limaces hyeme, purpura & buccinæ canis exortu dies circiter triginta conduntur. Pectines etiam tempore eodem: sed eorum plurima sane latent, & algore urgente & æstu. Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquam purpuræ: cæteris squalor incommodus est. nam & minora redduntur & deteriora. Conducunt autem iis imbres, propterea quod mare dilutius redditur: sed frigus facit profecto, ne uel in Pôro uel in fluuiis gigni possint, exceptis biforibus paucis. Genus nâque uniuersale potissimum rigore induratur & interit. Iam uero & lunari potestate ostrearum conchiliorumque & concharum omnium corpora augeri & rursus minui constat. In mari rubro testata omnia mira quadam magnitudine augentur. Quæ testa intacta sunt omnia, ut pectines, tunc optima sunt cum grauida: sed quanquam testa intacta grauida dicimus, tamen nullum eorum, uel coitum uel partum uidemus. uerno tamen tempore & autumno, ut dictum est, habere cernuntur ea quæ oua appellant, exceptis echinis qui cibo idonei sunt. Caro non æque omnium esculenta est: & excrementum quod papauer uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est. Modice collui debent omnia testacea in cibis, quia saporis gratia perit. Testaceis omnibus commune hoc est, ut salsum quendam in sua carne succum habeant, quo aluum citare nata sunt: id quod unicuique magis minusue datum est. Quæ enim dura carne constant, minus hoc habent quam ostrea, quæ sane omnium mollissimam habent carnem: parua uero chamæ, sphondili, solenes, purpurae buccinæque & alia id genus, duram. Itaque ostrea minus quidem nutrit, & aluum facilius mouent: quæ autem duriora sunt, uberius alunt, & difficilius concoquuntur. Purpurae buccinæque duriores sunt carne, succumque efficiunt crassiores: sed caro in aliis, præsertim in ostreis humidior tenaciorque est. Præterea quæ duram habent carnem, ut concoctu difficilia, ita corruptioni minus obnoxia sunt. Qua quidem ratione sæpius ea exhibere solemus iis, quibus ex malorum succorum copia cibus in uentre corrumpitur: siue eò ex iecinore adfluant, seu in ipsius uentriculi tunicis contineatur. Dantur autem, inquit Galenus, iis quibus cibus in uentre corrumpitur, in optima aqua bis tertie decocta, ita ut cum salsa prior iam sentiat, in aliam quæ pura sit transferatur: ex iis quæ duram carnem habet, succus procreatur quem crudum uocant, sicuti quæ mollem pituitosum. Quemadmodum uero ea quæ succum illum salsum exuerunt, carnem habent corruptioris repugnantem, & quæ aluum sistat, ita si (cum sale & garo condita fuerint) eorum ebiberis iusculum, uenter quidem abunde mouebitur, corpus uero nihil fere sentiet alimenti. at caro ipsa solidior, & difficilius concoquitur, & crudum crassumque ac frigidum gignit succum: maximæque ex parte lentum ac pituitosum: quamobrem senibus maxime incommoda est ostrearum, & testatorum omnium caro. Mnesitheus Atheniensis de testatis hæc prodidit, Ostrea, chamæ & mituli cæteraque id genus, carnem habent, quæ ob salsum quem in se continent succum, ægre concoquitur: & si cruda edantur, aluum cient. Quod si concoquantur, uel in quouis humore, magnam.

A gnam falluginis partem in eò relinquunt: quo fit ut eorum iufcula aluum turbent: cato uero ipfa, falſi ſilius ſucci iam expers, minime uentrè perturbet. Quòd ſi probe aſſentur conche, maxime tum falſa euadèt, ut quæ ſuccum iam habeant ab igne ueluti ſuccoſum, & prope dixerim abſumptum. Ad aluum uriniã uie ciendam cæteris præſtant mituli, oſtreæ, peſtunculi & chamæ, ut author eſt Diocles Cariliſius.

1 Sed errore oòum hic uocatur, &c. Xenocrates humorem album uocat & lacteum: Plinius etiã lac, ut de oſtreis, quòd circa initia æſtatis ſint multo lacte prægnantia. 2 Emittunt enim, &c. Et nò per, inquit Plinius, còpertum in oſtrecariis humorem ius forficum lactis modo effluere.

Lactem humorem.
Lac.

B De turbinatis. Cap. CCXXXV.

S Vnt teſtacei generis, ut nuper diximus, alia turbinata, alia bialoia, alia uniueralia. Turbinato generi hoc fere peculiare eſt, ut teſtæ ea pars quæ à capite remotiſſima habetur in anfractum torquæatur. Mouentur eadem omnia parte dextra, nò ad clauiculam, ſed in aduerſum. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturæ omnia fere gerunt: naturæque omniũ, maxima quidem ex parte, in eorum partibus ſimilis conſtat: nec niſi magnitudine uariatur, ut modo diximus. Turbinati generis alia in anfractũ intorta, ut cochlearum genera: alia in globum circumacta, ut echinorum genera.

Turbinatum.
xφαυρονός.
xφαυρότης.

De cochleis. Cap. CCXXXVI.

T Vrbinati generis cochlea eſt, & in anfractum intorta cochlearum omnium caro teſtis penitus incluſa continetur, nec ulla ex parte conſpicua eſt, excepto capite. Quòd ſi teſtam detraxeris hebetefcit cochlea atque expirat. Exerunt ſe domicilio, binæque eeu cornua prætendũt contrahuntque: oculis carent, ideo corniculis prætendant iter. Caput in iis modo quodam equinam ſpecie præ ſe fert. Os habent & dentes acutos, duros, breues: indicio eſt à minimis earum deſoſas uites. Ex teſtatis, unũ cochlearũ genus coire perſpectum eſt: ſed an ortus earum per coitum ſit necne, nõdum ſatis exploratum habemus: cochleæ pariter omnes, autumno & uere ſua oua habere uiſuntur. Varia ſunt cochlearum genera: ſunt oblongæ quibus 2 tubẽ loco utuntur tibicines: (echinophoros uocāt aliqui, aut eclinophoros)

Cochlea.
xφαίος.
κίχρος.

3 Sunt & rotundæ in oleario uſu, quibus ſcilicet oleum effunditur, & quibus 4 clauicula in acutiſſimum acumen intorquetur: iterum D ſunt aquatiles, ſunt & terreſtres. Aquatiliũ alia marinæ ſunt, ſtomacho utiliores: alia fluuiatiles, quæ uirus habent. In terra gignitur cochlea terreſtris, in teſtaceo genere pene ſola, quæ & limax dicitur. Sũt ex cochlearum generibus quæ aceratæ uocantur, latæ, multifariãque nãſcentes: ſunt enim & è terreſtribus quedã, quæ latæ & minutę paſſim inueniuntur. Sunt etiam cochleæ quedam nudæ, in Africa maxime: & paſſim quoque ober- 4 rantes minutæ quedam longęque & candidæ. Sunt & quos ſeſilos uocant, aut ſeſelitas, genus ſylueſtre uepribus fructetis que cohærens, & quaſi agglutinatum. Præterea ſunt in Liguria alpibus que 5 παυλάκι ab operculo illo ſuo appellantur, quo ueluti tegmine ſuperimpoſito latent (quanquã omnes etiã limaces leuiore quodã tegmine ſibi ſuperimpoſito, hyme latent.) Genus

Echinophori, uel
Echinophori.
Cochlea rotunda
πυλάκιον.
Cochlea terreſtris.
Limax.
Κοχλίας χάρ-
ει.
Κοχλίας.
Acerata.
Cochlea lata.
Cochlea nuda.
Cochlea candida.
Longa.
Seſeli, ſeſelita.
μυρία.

DE DIFFERENTIIS

*Cauaticæ co-
chleæ.*

*Quo pacto co-
chleas prepa-
rare oporteat,
docet Plinius
lib. 30.*

hoc minus uulgare est. Adhærēt operculo eiusmodi testē se operiētēs, obru-
tē terra semper. Hæ circa maritimas tantum alpes quondā effossæ, cæpere
iæcui & in Veliterno. In Balnearibus insulis cauaticæ appellatæ (quoniā
in speluncis nascuntur) non prorrepunt è cauis terræ, neque herba uiuunt,
sed uiuæ modo inter se coherent. Cochlearum aliæ aliis præstant: marinæ
stomacho utiles sunt, & facile aluo excernuntur. Fluiuatiles & albæ uirus
habent: terrestres uero stomacho utiles sunt. In his autē laudatissimæ sunt
Sardonicæ. Aphricanæ, & in his Solitanæ, Astipaleicæ, & quæ in Chio gi-
gnūtur: & Siculæ, modicæ, quoniā magnitudo duras facit & sine succo. Ba-
learicæ quoque quas cauaticas uocari diximus: & quæ in Liguriæ alpi-
bus pomariæ. Laudatæ & ex insulis Caprearum. Syluestres autem, quas sesilos
appellauimus, & uentrē & stomachum turbant: uomitiones excitant, & al-
uum soluunt. Illyricis magnitudo præcipua est, Aphricanis fercūditas, So-
litanis nobilitas, albæ in Reatino agro nascuntur. Strabo cochleas prædicat
Linusias. Cochleæ quoque altiles ganeam implueri: quæ in eam magnitu-
dinem perductæ sunt, ut octoginta quadrantibus caperent singularum cali-
ces: auctor est M. Varro. Cochleæ crassum procreant succum: suntque duræ
& concoctu difficiles. Quæ rotundæ sunt, earum grandiores, carnosæ sunt,
uirusque habent, & choleam gignunt: at minores nonnullis in usu cibario
sunt cum aceto mulso cōditæ rutæque uiridi & pipere. At uero qui eclino-
phori aut echinophori dicuntur, pēta dactylisque, & quibus in acumen cla-
uicula intorquetur, graciliore quidem sunt carne, sed saturitatem citius
aliæ pariunt, stomachoq; innatant. In cochleis marinis omnibus, quod col-
lum uocatur suauius est: suntque, si cum terrestribus conferantur, leues, fra-
giles, bonique succi, nec facile corrumpuntur. Terrestres uero cochleæ (quas
limaces appellauimus) sicuti & aliæ, duram habent carnem, cōcoctioni re-
nidentem: quæ tamen si recte concoquantur, uberrime alit, & meatus exi-
guos obstruit: quæ de causa cum aceto & lasere ad esum cōdiri solent. Suc-
cus etiam ipsis inest, ut & alijs testatis, qui uentrem citet: qui si coquendo
eximatur, reliqua caro aluum sistet, egregieq; alit, & stomacho idonea est.
Et cochlearū cibus, inquit Plinius, stomacho medetur: in aqua eas subfer-
uesceri intacto corpore earum oportet: mox in pruna torreri nihilo addito,
atque ita è uino garoque sumi, præcipue Africanas. Nuper hoc cōpertum
plurimis prodesse. Id quoque obseruant, ut numero impari sumant: uirus
tamen earum grauitatem halitus facit. profunt & sanguinem excreatibus
dempta testa tritæ, in aqua potu: asperitatem faucium & distillationes le-
niant cochleæ. Coqui debent in lacte: demptoque tantum terreno cōteri,
& in passio dari potui. Cochleæ crudæ tritæ cum aqua tepidæ cyathis tri-
bus si sorbeantur, tussim sedāt. Et cochleæ in cibis iis quos linquit animus,
aut quorum alienatur mens: aut quibus uertigines sunt, ex passio cyathis tri-
bus singulæ contritæ cum sua testa & calefactæ in potu datæ diebus pluri-
mum nouem. Aliqui singulas primo die dedere: sequenti binas, tertio ter-
nas, quarto duas, quinto unā: sic & suspiria emendant & uomicas. Cochleæ
uiuæ corpus & præsertim Africanæ, cum aceto deuoratum stomachi dolo-

A res mitigat: trita unà cum testa uino & myrrha, si exiguū inde bibatur, colli uesicæque cruciatus sanat. Et cochleæ nudæ (de quibus diximus) in Africa maxime inueniuntur, utilissimæ dysentericis. quinæ combustæ cum denarij pondere dimidij acatiæ, & exque eo cinere dantur cochlearia bina in uino myrtite aut quolibet austeto, cū pari modo calidæ. Cochleas bibi iubent exemptas testis tritasque treis in uini cyathis: sequenti die duas, tertia die unam, ut stillicidia urinæ emendent: testarum uero inanium cinerem, ad calculos pellendos. Cochleæ in cibo sumptæ accelerant partum: item conceptum impositæ cum croco. Eadem ex amilo & tragacantho illitæ profluuiâ sistunt. Profunt & purgationibus sumptæ in cibo: & uulvam auersam corrigunt cum medulla ceruina, ita ut uni cochleæ denarij pondus addatur & cyperi. Inflationes quoque uuluarum discutiunt exemptæ testis, tritæque cum rosaceo: ad hoc Asipaleicæ maxime eliguntur: alio modo Africanæ binæ cū sœno Græco, quod tribus digitis capiatur, additis mellis cochlearibus quatuor illinuntur, aluo prius irino succo perunctæ. Sūt & minutæ longæque candidæ cochleæ pallim oberrantes: ex arefactæ sole in tegulis, tulaq; in farina, miscetur lomento æquis portionibus: candorēq; & leuiorem corpori afferunt. Scabendi desideria tollunt minutæ & latæ cū polenta. Præcipiunt & cochleæ crudæ carnē tritam bibere ex aqua calida in tussu cruenta. Quartanis cochleæ fluuiatiles mederi dicuntur in cibo recentes. Quidam ob id adseruant sale, ut dent tritas in potu. Ictibus scorpionū carnes fluuiatilium cochlearum resistunt crudæ uel coctæ: quidam ob id salsas quoque adseruant imponunt & ipsis plagis. Cochlearum terrestrium triū caro quamopime trita adiectis uini migri cyathis tribus, hepaticis bibenda datur calida: quam uim à totius substantiæ proprietate habere eas docet Galenus: in febribus tamen cū aqua calida. Capitis doloribus remedio sunt cochlearum, quæ nudæ inueniuntur nondum peractæ, ablata capita, ex his duritia lapidea exempta (est autem ea calculi latitudine): quæ alligantur & minutæ illinuntur fronti tritæ. Item limacis inter duas orbitas inuentæ officulum per aurem cum ebore traiectum, uel in pellicula agnina adalligatum, idem præstat: quod remedium pluribus semperque prodest. Inueniuntur in corniculis cochlearum harenacæ duritiæ: ex dentitione facile præstant adalligatæ. Limacis quoque lapillum siue officulum quod inuenitur

D in dorso adalligatum dentitioni prodesse confirmât. Cochleæ quæ sunt in usu cibi cum myrrha aut turris polline auriū dolores sanant. Item minutæ & latæ fracturis aurium illinuntur cum melle: è naribus fluentem sanguinem sistunt cochleæ contritæ fronti illitæ. Et recentia uulnera conglutinât tussæ & impositæ, & nomas sistūt. Arûdines & tela, quæque alia extrahenda sunt corpori, cochleæ ex iis quæ gregatim folia sectantur contusæ impositæq; cū testis: & ex quæ manduntur exemptæ testis. Cochleæ unà cum restis tritæ aqua intercute laborantibus, toti uentri, in arthriticis autem, articulis ipsis imponuntur, quousque sponte decident: agre nanque diuelli poterunt. Desiccant admodum, etiam si in alto crassus lentusque infederit humor. Quapropter idem agendum quoque in iis quæ ex ictu orti sunt tu-

Trita ex aceto, inquit Dioscorides.

DE DIFFERENTIIS

moribus, etiam si ægre dissolui patiantur, & aurium cōtusionibus. Carnes E earum aut sole aut cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia, tum maxi me quæ in neruis, etiam si cum contusione euenerint, conglutinant. Cochlearum humor qui *μύκη*, id est, mucus uocatur, uel sola absque carne unà cum thure, aloë, & myrrha, uel horum uno quopiã, uel omnibus simul usq; ad cerati consistentiam, medicamentum fit, quod tenaciter adhæret, auriumque tumores quibus mucosus humor inest, efficaciter exsiccat: frontiq; impositus oculorum fluxiones sistit. ubi uero mucī copiã colligere uoles, cochlearum carnem stilo pungito: ita nanque humoris plurimū emittunt, præsertim si nuper capta fuerint. Idem humor palpebrarum pilos agglutinat. Testem si descenderit cochlearum spuma illini uolunt. Cochleæ usq; F uehementer exsiccantis, & modice calfacientis sunt facultatis. Dysenteria mirifice profunt, ubi locus nondum putredinem senserit: quatuor scilicet partibus cineris, adiecta piperis albi parte una, & duabus gallarum. Tollit ex facie uitia cochlearum quæ lata & minutæ passim inueniuntur, cū melle cinis. Et omnium quidem cochlearum cinis, inquit Plinius, spissat, calfacit sinectica ui: & ideo causticis commiscetur, psorisque & lepris & lenti gini illinitur. Testæ cochlearū omnium, ut author est Dioscorides, crematæ ex calfaciendi & urendi facultatem habent: purgant lepras, uirilignes, dentēsque, oculorum cicatrices emendant, & uitia cutis in facie (*ισχλῆς* uo cant) albugines, ac uisus hebetudines, si unā cum carne sua usq; tritaque il linantur. Strombos turbinēsue sunt, qui modo aquatiles cochleas, modo 7 marinas uocent. Strombi, inquit Oribasius, duri sunt, concoctūque diffi ciles: & quo maiores, eò duriores euadunt. Cū sinapi eduntur, & ex aceto: at G uero strombi in aceto putrefacti, lethargicos excitāt odore. Profunt & car diacis: strombi quoque carnes trita & in mulsi tribus heminis, pari modo aquæ, aut si febres sunt ex aqua multa datæ proficiunt. 8

Κόχλη
Umbilicum.

Πενταστήλες.
Melicebales.
uel Melitem bales.

Κόχλη
Κόχλη
Umbilicum.

Κοκκαλιον.
κίκαλον.
Abrotone.
Limax.

1 *κόχλη* & *κόχλη*, Theodorus nōnunquam umbilicos uertit: quasi sit umbilicus genus quoddam testaceum aliud à cochleis: uti sentit etiã Massarius. uerum quodd um bilicus, quem Theodorus pro *κόχλη* dixit lib. 5 histor. animalīū, idē sit quod cochlea, uidetur ex Athenæo. lib. 2. Sed de *κόχλη* & *κόχλη* infra pluribus agetur. 2 Cochleæ, &c. Theodorus *κόχλη* hoc in loco umbilicos uertit. 3 *Πενταστήλες*, uel pentada styles. His adduntur à Plinio melicembales, uel melitembales. 4 Sunt & quos fe silos. &c. Hæ forsitan sunt de quibus Plinius lib. 30. Cochleæ ex his quæ gregatim so lia sectantur. 5 Linusæ, ab agro cui nomen Lino est iuxta Pityuntem. Hæc Hermo laus. 6 Quis coquendo, &c. Quoniam modo coqui debeat cochlea conditūque, do cent Galenus & Oribasius. 7 Strombos turbinēsue, &c. Cancellus qui turbinem subit, inquit Aristoteles, oblongior est: τὰ δὲ πρὸς τῷ στήθει. Strombum alium esse à co chleā, uel ex Plinio manifestum est lib. 31. Theodorus turbinem interpretatur. 8 Confunduntur apud Græcos, uel ipsum Aristotelem, *κόχλη* & *κόχλη*: fere tamē Ari stoteli *κόχλη* umbilicum, id est, cochleam marinam significat: *κόχλη* uero terrestrem cochleam. *κόχλη* nonnunquam etiam generale est, ut Pausanias in Laconicis: *κόχλη* ad purpuræ tincturam maxime idoneos ferunt Laconicæ maritima. Est apud Aristotelem & *κοκκαλιον*: & Athenæum *κίκαλον* (nisi in alterutro codicum insit menda) co chleæ genus, & ut uidetur terrestre genus testaceum, à limace diuersum. Abrotone, ut Hermolao placet, limacis genus est: quanquā sunt qui locustam putent: item qui ἀπέ, alij qui piratā in eo uocabulo intelligant. Limacem Hesiodus *φάρμακον* uocauit, quasi domiportā

H

A domiportam dixeris. In symposiis etiam proponi solitam quæstionem ludicram (χεῖ-
 ρας uocant) de limace scribit Athenæus, ὡς γὰρ, καὶ καὶ δεξιῇ, καὶ αὐτῇ τοῦ ὑποκρίθης. Ad
 cuius exemplum, ut uult Hermolaus, Cicero limacē ita finit, Terrigenā, herbigradā,
 domiportam, sanguine cassam. Teueer uero ita, Animal sine pedibus, sine spinis, sine
 ossibus, crustatum

De muricum generibus, ut purpura, buccino, & reliquis.

Cap. CCXXXVII.

- C Oncha turbinati generis putpura est, canaliculatum è testa procurrit il
 li rostrum, & canaliculi latus introrsus tabulatū seu leue est, quā pro-
 2 feratur lingua: præterea clauata est ad turbinem usque, aculeis in orbem se-
 ptenis fere. Totidem autem in testa clauiculæ reperiuntur orbes quot ha-
 bet purpura annos. Lingua purpuræ (quam promuscidem uocant) digito
 B longior, firma & torosa est, duritia tanta ut tum conchulas, tum etiam sui
 generis testas perforare possit, quæ & pascitur. Florem illum suum tingen-
 dis expetitur uestibus, inter papauer dictum & collū in candida uena con-
 tinet, supra eam partem quam uentrem appellant, in quibusdam nigrum,
 in nonnullis rubidum: tingit hic pressus cum extrahitur, & inficit manum.
 Quod ouum uocatur, semper habet purpura. Genera earum plura, pabu-
 lo & solo discreta. Lutenise putri limo, & algense enutritum alga, uilissimū:
 utrisque melius Teniense in Tenei maris ora collectum. Est & quod cal-
 culosum uocatur, & dialutense aliud. Et nonnullæ magnitudine augentur
 insigni, ut quæ ad Sigeum & Lectron Idæ promōtoria gignuntur. Ad Car-
 3 eciā inueniri traduntur & purpuræ & buccinæ ἀκακτυλαί, id est, quarum
 testæ decem cotularum sunt capaces: aliæ paruæ sunt, ut quas Euripus scit
 & Caria. Pelagiæ magnæ scabraeque sunt, paruæ ad litora & oras reperiun-
 tur. Partes item aquiloniæ nigras, austrinæ rubras magna ex parte ferunt.
 Capiuntur, inquit Aristoteles, tempore uerno cum fauos extruunt: canicu-
 læ tempore fere nullæ capiuntur: non enim tantisper pascuntur, sed se abs-
 condunt & latent circiter triginta dies. Plinius capi eas post canis ortum,
 aut ante uernum tempus utilissimum censuit: quoniam cum scetificauere
 fluxos habent succos. Fauificant uerno tempore generant hyeme abeunte,
 eo quo diximus modo. celeri deinde incremento augentur, quippe quæ
 anno perfici possunt: uiuunt purpuræ annos circiter sex, uel cum plurimū
 D septem: incrementum earum patet per orbes. Totidem enim, ut modo di-
 ximus, in testa clauiculæ reperiuntur orbes, quot habent purpuræ annos.
 Purpurarum caro, sicuti & cæterorum testatorum, dura est: ac proinde iis
 exhiberi solet, quibus ex malorum succorum copia cibis in uentriculo cor-
 rumpitur. Et harum quidem & buccinarum caro durior est quàm aliorū,
 succūque gignit crassiorem, minus tamen glutinosum tenacemque: sed
 in earum partibus discrimen est. Quod collum nanque appellatur, præ du-
 ritie dentibus ægre conficitur, concoquiturque difficulter, nec facile corrū-
 pitur: parciorēque succum generat & stomacho gratum est. Partes uero
 inferiores, & quæ μείωτες, id est, papauera uocantur, molles sunt ac facilius
 4 quàm colla conficiuntur: aliū mouent, & urinam sudorēque ac saliuam

Purpura.

Ρομφύος.

Alis, canicu-

latim, & cuni-

culi.

Alis, rubula-

tum.

Purpurarum

genera.

Pelagia, αἱ μὲν

ἐν τοῖς ὕδα-

σιν.

Purpura maio-

res durae sunt,

inquit Xenos-

trates.

DE DIFFERENTIIS

cient. Harum frequentior usus choleram gignit. Proprium his atque solenibus hoc contingit, ut eorum iusculum cum coquuntur, crassius reddatur. Purpuræ testa cremata exsiccandi uim possidet, dentes abstergit, carnem excrecentem reprimat, ulceribus malignis conuenit: & ulceribus quoque putridis si cum aceto aut posca aut uino mulso aut oxymelite imponatur. Purpurarum opercula in oleo cocta capillorum defluuium sistit: cum aceto epota lienis tumorem comprimit: suffocationes quæ ab utero oriuntur, suffitu prohibet, secundasque eiicit. Buccinum concha etiam turbinata & in anfractum intorta est, sed quàm purpura minor (unde & à quibusdā filius purpuræ dicitur) ad similitudinem eius buccini quo sonus editur: unde & causa nomini, rotunditate oris in margine incisa. Testa illi non est aculeis clauata quemadmodum purpuræ, sed scabra tamen. Et totidem etiā in clauiculæ testa reperiuntur orbes, quot habet buccinum annos. Promuscidem siue linguam habet, ut purpura, firmam & torosam, qua pascitur, qua etiam testas perforare potest. Quod in eo ouum uocatur, semper continet, sed aliàs maius, aliàs minus. Ad muricatum purpureūque colorem etiam ut purpura exquiruntur, sed buccinum per se damnatur, quoniā phucum, id est, rubidi coloris splendorem, remittit. Buccinis etiam idem modus gignendi qui purpuris, tempusque idem est: iis namque & fauificare in more est, & uere generantur hyeme abeunte. Latitant etiam canis exortu circiter triginta dies: non nisi petris adhæret buccinum, circaque scopulos legitur. Buccina lunæ incremento sunt pleniora: ætate uero gracilescunt. alendi facultate purpuræ simile buccinum est, uerum durius est. Quod in his collum uocatur, aluum mouet, difficilius concoquitur: stomacho idoneum est, nec facile corrumpitur & mediocriter alit. Ex sinapi conditur in cibum, aut aceto, succo cyrenaico, aut pipere. Totum uero buccinum si unā cum papauere excoquitur, sistit potius aluum & sitim facit. Quod papauer appellatur ac parte inferiore reperitur, mollius est, & facile corrumpitur. Oleum in quo decoctum fuerit uiuum buccinum, dolores sedat auribus infusum. Buccinorum testa cremata non aliter atque purpurarum, exsiccat egregie, & ut mordacitatis omnis expertus, ulceribus malignis prodest, & putridis quoque cum aceto aut uino mulso, aut oxymelite. Eadem purpuris præstant concremata buccina (inquit Dioscorides) sed uehementius urunt. Si quis testam sale plenam fictili crudo comburat, dentifricio conuenit, ambustis utiliter illinitur, ubi solui medicamentum minime oportet: nam postea quàm ulcus cicatricem duxerit, sponte sua decidet. Muricum etiam generis sunt, quæ uocant Græci colycia: alij corychia uel coryphia, turbinata æque, sed minora multo, & oris halitum custodientia. Con generum omnium, quæcūque scilicet turbinati sunt generis suauissima iudicatur coryphia. Suntque & ori & stomacho grata, aluumque & urinam cient, atque oris bonum reddunt odorem. Copiosius alunt iurulenta, assa uero dura sentiuntur. Horum papauer buccinorum more aluum stringit potius.

Buccinum.

κνέψ.

Murex.

Purpura filius.

Suspecta hoc in loco uidetur Orbisij exemplaria.

Colycia.

Corychia.

Coryphia.

Murex.

1 De muricum. Murex & si unam speciem significet, scilicet buccinum, generale tamen

ANIMALIVM LIB. X.

203

A tamen est, ut recte admonet Hermolaus, sicuti & conchylium: purpuram enim comprehendit murex & alia, ut infra videbitur. Muricum cinis, inquit Plinius, dentificiū est. Muricum uel conchyliorum testæ cinis maculas in facie mulierū purgat eū melle illitus, cutemque erugat, extenditque septenis diebus illitus, ita ut ostiū, candido uorum foueantur. 2 Est & apud Athenienses ἡ περὶ φύγα, sed alia à purpura, uel saltem genus quoddam à purpura diuersum. 3 Buccinum & buccina etiam dicitur ἡ περὶ φύγα. instrumentum illud quo sonus editur: cuius formam prælare descripsit Ouidius, -Caua buccina sumitur illi Tortilis, in latum quæ turbine crescit ab imo.

De strabelo & nerite.

Cap. CCXXXVII.

1 Strabelus concha est purpure & buccino similis, cuius testa idonea non statur, ut ex ea sonus edatur. E turbinatorum genere nerites siue narex est magnitudine exigua: testam habet læuem, amplam, rotundam: forma illi buccinis proxima est, papauere tamen non nigro, ut illa, sed rubro. Testæ adnexum corpus medium eius firmiter est. Pascuntur natices mari tranquillo, absolutæ saxis: at quoties flatus urgent, saxis adhærescunt more lepadum & aporrhaidum, ac cæterorum generis eiusdem: nec sine tegmine dimoto adhærent, quod uelut operimentum sibi possident. Et modus hic idem est purpuris, buccinis & omnibus generis eiusdem. In saxis ad imam maris sædem adhærescens nascitur nerites: & eò maris ubi sordium uacuitas est & tranquillitas, uiget. Olfaciunt natices & audiunt, adeo ut fieri nō posse aiunt, quin subterfugiant piscatores si uox proferatur. Concha est, quam Mutianus muricem esse arbitratur, latiore purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice, concha utroque latere sese colligente: quibus inhærentibus plenam uētis stetit naui portantem nuntios à Perandro, ut castrarentur nobiles pueri, conchasque: quæ id præstiterunt, apud Gnidiōrum Venerem coli. Porro de conchis quæ ueneriæ dicuntur, ita refert Plinius, Nauigant ueneriæ, præbentēque concanum sui partem & auræ opposcentes, per summa æquorum uellicant.

1 An idem sit strabelus cum echinophoro, uel echinophoro cochlea? de quo supra inter cochleas. 2 Nerites siue narex. ἡ περὶ φύγα, καὶ ἡ νηρίτις, καὶ ἡ νηρίτις apud Athenienses, ut optior. 3 Rotundam. Rotundiorē esse nerites testam quā sit turbinis, hinc apparer: oblongiorē enim formam recipit cancellus ille cochlearum: hos per à turbinis testæ forma, qui turbinem subit quā qui neritem. 4 Perandri historia quonam modo nobiles Corcyrensiū pueros Sardas miserit exsecandos, habetur apud Herodorum lib. 3. 5 Nauigant ueneriæ, &c. In nonnullis codicibus habetur nauigant nerites, &c.

De echinis.

Cap. CCXXXIX.

Echinus testaceorum omnium maxime à natura munitus est: quippe cuius testa (quam habet in globum circumactam) undique spinis frequentibus circumuallata cecetur: id quod soli inter testata peculiare est: atque hoc item peculiare echinis est, ut nullam intus carnem contineant: sed uice carnis nigra quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata. Quod caput echini appellant & os, uersum in terram est: quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habetur. Dentes quini

Nn iij

- A** De balano. **Cap. CCXL.** *Balanus. Balanus. Glans.*
- B** Alanus aut glans nomē habet à similitudine glandium quercinarum. E genere est testatorum immobilium: testa leui. olfactū nullum habere cernitur. Nascuntur balani circa rimas cauernasque saxorum. Carnem habent duram: in cibo laudantur præcipue qui iis nascuntur locis ubi marinæ admiscetur fluuiatilis aqua, saxis adhærentes: sunt nanque ij dulces & habitiores plenioresque: copiosum præbent succū, quo & abunde nutriunt aluūque mouent: ori stomachoque grati: teneriorem habent carnem, & urinam ciunt. Decoctum quoque eorum aluum ciet epotum: quæ uero saxis non adhærescunt, acres sunt & medicamentosi, magisque aluum perturbant, sed urinam minus citāt. Hæc Xenocrates: Athenæus uero, Alocis, inquit, discrimina fortici sunt balani: quandoquidem in Ægypto optimi gignuntur & suauissimi: tenelli, orique ac uentriculo grati: qui & succum & alimentum præstant copiosum, urinam atque aluum mouent: in aliis uero locis sapore inueniuntur magis fælo.

1 Balanus, &c. Sphōdylus apud Galeum & Columellam: Plinius uero tāquam diuerfa animalia enumerat. Est apud Paulū eōdylus concharum genus, forsità idem. *Sphondylus. Condylus.*

De uniualueibus, ut de lepade & aure marina. **Cap. CCXLI.**

- E** uniualueium genere lepas siue patella est, eorum scilicet quæ simplici *Λιπαία.*
- C** ualueula constant: singulari enim testa cōtinetur lepas, & ea quidē læui: altera uero eius pars superficiē detecta carnem ostentat. Saxis testa in dorsum data adhæret: sitque alieno septo quodammodo bivaluis, ut eo modo se concludendo tueatur. Os habet, & post os uentrem esse in hoc etiam genere patet: & illa præterea quæ oua uocantur: quod etiam papauer appellatur, in imo continetur. Excrementum quoque eius parte ima testæ excernitur, quā foramē in testa habetur. Gignitur lepas circa cauernas rimasque saxorum. Et quāuis saxis adhærendo uiuat, saxis tamen quandoque etiam absolui, in pastūque ferri solet, alióque transire. Magna quidem ex parte, paruulæ gignuntur lepadæ: quæ tamen nonnunquam ostrearum magnitudinem æquant: maxime autem in Indico mari: ut & alia omnia inueniuntur. Carnem habet lepas duram, concoctu difficilem, paucisque succi: elix, condimento redduntur gratiores. Eiusdē generis cum lepade & aporrhais *Ἀπὸρρησις.*
- 3** est: & more lepadum saxis adhæret. Quæ *ὠπτα*, id est, auriculæ dicuntur, saxis adhærent. Hæc neque palato neque stomacho grata sunt: frixa tamen eduntur: neque enim aliter placebunt: nutrimenti plurimum exhibēt, nec facile excernūtur. Circa Pharum insulam Alexandriæ uicinam multa proueniunt: in Illyrico uero & sinu Ionico gignuntur magna. Sūt & pholades *Φολάδες.*
- apud Athenæum, quæ & nutriunt plurimum: sed uirus olent, prauisque succi sunt.

1 Aristoteles *Λιπαία* & *Λιπαία ἁγρία* appellat, & *ἡ Παλαγγίον*. Theodorus patellam, patellam feram & aurem marinam. **2** Concoctu difficile, &c. *Ἐναιτὶς ἁσος*, in Athenæo, id est, concoctu faciles, sed forsitan menda est in exemplaribus. **3** Aporrhais, &c. Theodorus muricem interpretatur. **4** Quæ *ὠπτα*, &c. Vt Antigonus Caristius *Murex.*

DE DIFFERENTIIS

ὄστρεον ἡ ὄστρεα tradidit, & ὄστρεον uocatur *Æolice*. 5 Videntur & φιλῶντες apud Athenzum ex E
eodem esse genere cum his.

De biualuius, & primo de ostreis.

Cap. CCXLII.

ὄστρεον.
Αὐμὸς ὄστρεον.
ὄστρεον.
ὄστρεον.
ὄστρεον.

E Biualuium genere ostrea est, testa illi aspera scabrâque crassioribus la-
bris. Quod ouum uocatur, non semper, sed uere habent ostrea: mox e-
nim tempore procedente, minuitur: demumque totum prope aboletur: in
cœnofo maxime limo gignuntur. Gaudent dulcibus aquis, & ubi plurimi
influunt amnes: ideo pelagia parua & rara sunt: gignuntur tamen in petro-
sis carentibusque dulcium aquarum aduentu. Gignuntur etiam quandoq;
& in fluuijs & paludibus stagnantibusque locis. uerum optima sunt ostrea
marina, quæ prope paludem aut fluuium nascuntur: maiora enim fiunt &
dulciora, meliorisque succi. Quæ uero ad litus aut inter saxa gignuntur ubi F
deest limi aut aquæ dulcis copia, parua sunt, dura, & gustu amara atq; mor-
dacia, ideoque neque in cibo grata. Grandescunt syderis quidem ratione
maxime, ut diximus: sed priuatim circa initia æstatis, inquit Plinius, multo
lacte prægnantia, atque ubi sol penetrat in uada. Hæc uidetur causa quare
minora in quibusdam locis reperiuntur: opacitas enim prohibet incremē-
tum: & in tristitia minus appetunt cibos. Vere, inquit Athenæus, & circa
æstatis initia optima sunt plenæque & tumentia: atque unâ cum dulcedine
quadam marinū referūt sapore: stomacho quoq; grata sunt. Variant colo-
ribus: rufa in Hispania, fulca in Illyrico, nigra & carne & testa in Circeiis.
Præcipua uero habentur in quacunque gente, spissa & salua sua lubrica:
crassitudine potius spectanda quàm latitudine: neque in luto capta neque G
in arenosis, sed solido uado: spondylo breui atque non carnosio, nec fibris
lacinioso, ac tota in aluo. Addūt peritiores notam, ambiente purpureo cri-
ne fibras: eoque argumento generosa interpretantur *Calliblephara* appel-
lantes. Gaudent & peregrinatione, transferrique in ignotas aquas: sic Brū-
dusina in Auerno compasta, & suum retinere succū, & à Lucrino adoptare
creduntur. Hæc sint dicta de corpore. Discrimen etiam ostreorum fecere
nationes & litora, sicuti & in aliorum aquatiliū generibus: ut & ostrea ali-
ubi atque aliubi meliora inuenirentur. Sergius orata Lucrina nobilitabat
ostrea, qui eorum uiuaria primus omnium inuenit, cum nondum Britan-
nica seruebāt litora. At Mutianus Cyzicena, maiora Lucrinis: dulciora Bri-
tannicis: pleniora Lucensibus, teneriora Istrictis: candidiora Circeiensibus:
sed his neque dulciora neque teneriora esse ulla, author est. In Indico mari H
Alexandri rerum authores, pedalia inueniri prodidere. Necnon inter nos
quidam tridacna appellauit: tantæ magnitudinis intelligi cupiens, ut ter
mordenda essent. Est ostrei quoddam genus, quod pictoribus usui est: cras-
situdine plurimum excedit, & florem illum, non intra testam, sed foris ha-
bet: comperiri id genus locis Cariæ potissimum solet. Ostreorū dos in me-
dicina in hoc loco tota dicetur: nec potest uideri satis dictum de his, cum
palma mensurum diu iam tribuatur illis. Ostrea testatorum omnium mol-
lissimam habent carnem, sed glutinosam, stomacho idonea sunt, minus nu-
triunt, magisque aluum cient. Et cum cætera omnia elixa dantur aut assa,
ostrea

Calliblephara.

Tridacna.

- A** ostrea uel cruda mandi solent: quidam in sartagine frixis utuntur. Contra leporis marini uenena ostrea aduersantur. Ostrearum testæ crematæ uires habent buccinarum similes, nisi quodd minus crassatum sunt partium. Faciei sordes abstergunt, splendidos reddunt dentes. Elotæ, humida ulcera cauâque replent, atque ad cicatricem ducunt: excrecentem in ulceribus carnem reprimunt. Stomachum, inquit Plinius, unice resciant ostrea, fastidiis medetur, molliunt aluum leniter. Eadem cocta cum mulso, tenasmo qui sine ulceratione sit, liberant: uesciarum ulcera quoque repurgant: *Alias, urina distillationib.* in conchis suis cocta, uti clausa uenerint, mire distillationibus profunt. Testæ ostrorum cinis uiam sedat, & tonsillas admixto melle. Eodem modo
- B** do parotidas, pauos, mammarumque duritias, capitum ulcera ex aqua, cutemque mulierum extendit. Inspergitur & ambustis: & dentifricio placet. Pruritibus quoque & eruptionibus pituitæ ex aceto medetur. Crude si tundantur strumas sanant, & pernioles pedum.

1. Ostrea, &c. ὀστρεῖς etiam quandoque dicitur: quanquam ὀστρεῖς fere generale est omnia complectens quæ testa integuntur, ut satis explicat Galenus 11. lib. de simplic. medic. Et ὀστρεῖς quoque nonnunquam & quæ generale est ad omnia testata. Aliquando uero ea sola comprehendit, quæ sua natura immobilia sunt.

De chamis seu conchis.

Cap. CCXLIII.

- 1** Onchatum siue chamarum genera, chame trachæa, id est aspera: *Χαμί.* chameleios, id est leuis. Glycymerides, uel, ut alij uolunt, glycymerides, *Κίσρη.* & pelorides, bivalues sunt, & generis uarietate inter se distantes, & figuræ *Κόρυς.* rotunditate. Chame trachæa (quæ & à nonnullis glycymerides dicitur) ab *Chame.* aliis generibus differt, quod non solum aspera scabrâque sit eius testa, sed *Concha.* striata & quasi uirgulas quasdam prominentes habens per testæ longitudinem extensas. Caro illi intus maris salsuginem sapore refert, & duriuscula est: & ut Icesius tradit, mali succi, parumque nutrit, & facile excernitur: ut *Χάμη Τραχέα.*
- 3** uero Diphilus, stomacho grata est. Ab hac differt chameleios, quod testam *Κόρυς Τραχέα.* habet leuiorem, latiore & pellucidam: carnemque intus suauiore, quæ concoctu facilis est, bonique succi, uberius alit, stomachoque grata est. Huic suauitate præfertur glycymerides: uerum à peloride uincitur. Pelorides reliquas magnitudine superant, sed glycymerides maiores sunt quam pelorides. Glycymerides carnem habent duram, quæ non parumimenti præstat: & trachæas succi bonitate superant, sed peloridibus inferiores sunt: *Χαμίδιος.* urinam magis cient glycymerides quam pelorides. Emolliunt aluum pelorides. Discrimen his etiam ex loco est, (quanquam chamæ omnes locis arenosis sui ortus iniria capiunt:) quæ enim in Dicearchia siue Putæolis, aut Lucrino lacu, aut circa Alexandriam nascuntur in paludibus, oprimæ sunt. Quæ uero supra Diolcum & Pharon atque Pontem, quo Pharos Alexandriæ iungitur, oblongæ sunt glandium quercinarum instar, & hirtæ similiter atque fagorum glandes quos echinos uocant, & candidiores, carnemque *Χαμί.* intus duriore pariter & acriore. Chemas, sunt qui ita diuiduntur, ut alia cha- *Χαμὶ βραχέα.* *Πελορίδες.* *Χαμὶ βραχέα.* *Πελορίδες.* *Πελορία.*
- 4** me trachæa dicatur, alia basilica regiâue, quæ & pelorides dicitur. Quæ basilicæ à nonnullis dicuntur, ab aliis pelorix, inquit Diphilus, copiosum cre-

DE DIFFERENTIIS

Chame.

ant alimentum, (præcipue quæ grandiores sunt) bonumque gignunt succum, & stomacho gratæ sunt, nec facile excernuntur. Chamæ cum coquuntur, duriores euadunt, & suaves si rite condiantur. Chamarum, inquit Dioscorides, in exigua aqua coctarum ius aluum ciet, id cum uino assumitur.

*Κάμηρα
κρήνη.
Γαλήνη.
Concha.*

1 Chame, &c. κάμη, forsitan dicta ἀπὸ τοῦ καλῶναι. 2 Chame trachæa. Macedones hanc κρήνην, Attici nero κρήνην dixere. 3 Ab hac differt chameleios, &c. Has, ni fallor, Aristoteles galadas uocauit, concham scilicet læui testa, an nero sui generis concha sit? 4 γαλήνη ἀπὸ τοῦ γαλᾶναι. 5 Conchæ nomen unam speciem significat, nempe chamen, ut apud Aristotelem lib. 4. histor. animalium: sed & prænatum chamen trachæam, ut lib. 5. & apud Oribasium lib. 2. Plinius conchas appellauit, non quæ testa adeo fragili clauduntur atque cochleæ, pedines, digiti: sed quæ firmiore, ut purpuræ, buccina, pinna. Concha & quibusdam non minus generale est quam ostreum: continet enim omnia quæcunque testa intesta sunt. Nonnunquam etiam pro F testa ipsa accipitur, ut Columella in horto, Implicitis conchæ limax: & Cicero libro secundo de natura deor. de pinna, Duabus patula conchis: &, comprimit conchas.

De mitulis siue musculis & tellinis. Cap. CCXLIII.

*Mitulus.
Musculus.
Μύτις,
μύναξ.*

Mitulus qui & musculus è testaceorum bivaluium genere est testas habens clusiles & referatiles, leuésque, labris tenuibus. Connectuntur 1 inter se mituli, fauiscant & acervantur muricum modo: nascuntur enim more ceparum, ut minores subinde oriantur iuxta principium. Viuunt in algosis, gratissimi autumno, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari: ob id Ephesij, & qui in Ægypto inueniuntur, laudatissimi. Procedente hyeme, amaritudinem trahunt, colorémque rubrum. Iuba in iis uoluminibus quæ G scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit mitulos marinos ternas heminas capere. Musculorum duæ sunt species: maiores qui salem 2 uirumque respiciunt: ideòque gustui ingrati. Duri item sunt & concoctioni 3 resistentes, sanguinem procreant crassum, & pituitæ multum: & succum denique non adeo probum. Copiose alunt, uentrémque & urinam cient. Hi si assentur sitim uehementem excitant: si uero elixentur, & acrioribus quibusdam, ut sinapi nasturtiòque condiantur, nõ adeo uirus respiciunt. Minores, rotundi magis sunt, & externis testarum partibus hirti, tenuiori- 4 busque testis, carne & molliore & dulciore, bonique succi: uerum minus al- 5 lunt & urinam cient magis. Ora mandentium atque fauces acri mordacitate uexant, gulam arteriamque exasperant: rursus quoque siccam & raucedinem efficiunt, uocémque obtundunt. Deteriores sunt qui in locis arenosis, aut inter testas figlinas gignuntur, iis qui in algosis proueniunt. Myaces, inquit Dioscorides, id est, mituli laudatissimi in Ponto: caro eorum ad 6 canis morsus utilissime imponitur. Crematis eundem buccinis effectum præbent: priuatimque plumbi in morem cloti, oculorum medicamentis cum melle utiles sunt: palpebrarum nanque crassitudinem & albugines, cæteraque quæ oculorum claritati offiunt, exterunt. Atque in aliis partibus fordida ulcera capitisque pustulas sanant. Qui circa Ephesum gignuntur μύτις, id est mituli, inquit Athenæus, pectunculis meliores sunt: chamis tamé inferiores: urinam magis quam aluum citant. Myacum ius, inquit Plinius, traditur

Hæc Plinius non unius speciei, sed myacum, id est, musculorum generi tribuit.

- A** traditur aluum & uestigas exinanire, interanea distringere, omnia adaperire, renes purgare, sanguinem adipemque minuere: itaque utilissimi sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus: item prodesse felli, pituitæque pulmonis iocineris splenisque uitiiis, rheumatismis. Fauces tantum uexant, uocæque obtundunt. ulcera quæ serpant aut sint purganda sanant: item carcinomata. Cremati autem ut murices, & morsus canum hominûmque cû melle, lentigines: cinis eorum potus emendat caligines. Gingiuarum & dentium uitia, eruptiones
- 7** pituitæ, & contra doricnium aut opocarpathon antidoti uicem obtinent. Tellinem à Romanis mitulum etiam uocari existimauere nonnulli. Τέλλιν, Μίτυλος, Τροχίθυρος, Βασίλικα tellina.
- B** ne circa Canopum insulam in Canopico ostio sitam frequentes sunt: & locis arenosis gignuntur, & in litoribus quæ sæpe fluctibus agitantur. Quarum quæ tenuiores exilioræque sunt, basilicas, hoc est, regias appellant. Quæ uero fluuiatiles, ut quæ in Ægypto & Nili superioribus partibus gignuntur, maiores sunt & succi pleniores dulcioreque. In uere optimæ sunt tellinæ.
- 8** Recentes bonam faciunt aluum, sed præcipue ius earum: falsas uero tellinas uistas, adeo urentem efficere cinerem ferunt, ut si cum cedria mixtus instilletur, auulsos palpebrarum pilos renasci non patiatur.

1 Conneantur inter se mituli, &c. Mituli, inquit Plinius, sponte naturæ in arenosis proueniunt. 2 Musculorum species. Plinius ita: Degenerant myaces in duas species. 3 Hos Plinius mitulos, Oribasius myacas, Athenæus *μύακας* uocat, *μύακας* enim in genere masculino, 4 Miores, &c. Hos Plinius myriscas, Oribasius & Athenæus, *μύακας* in genere feminino appellant. 5 Molliore, ita Oribasius, & Athenæus. Plinius uero durior carne esse scribit. 6 Hæc Plinius alteri myacum generi tribuit, necpe prior & quod maius diximus, mitulos uocat Plinius. 7 Tellinæ, &c. Romæ circumferri narrat Hermolaus pusillas quasdam côchulas: quas qui uendunt, tellinas prædicant, uulgaribus côchis minores & leuiore, caodidasque oestriatas: quas Veneti piscatores à capparibus similitudine capparoculas appellant. 8 Quæ Dioscotides tellinis, eadem Plinius pectunculis attribuit: nec quicquam *πύακας*, id est, de pectunculis apud Dioscoridem habetur.

De pinna.

Cap. CCXLV.

- P**inna concharum generis est, duabus grandibus patula conchis, scabris, Pinna, Pinn.
nec tamen striatis, labris tenuibus: nunquam sine comite est, sed custodem intra se continet, aut squillam parua, aut cancellum, pinnotherem
- D**uocant & pinnophylacem: quo quidem custode priuata, perit breui tempore: neque enim absque mutua opera uiuere possunt. Pandit se pinna, luminibus orbem corpus intus minutis piscibus præbens. Assultant illi protinus: & ubi licentia audacia creuit, implent eam: hoc tempus speculatus index, morsu leui significat: tum admonita squilla morsu pinna, comprimit conchas, & quicquid inclusit, exanimat, partemque socio tribuit. Nascitur pinna in limosis arenosisque locis ex bysso, id est, uillo siue lana quadam pinnali, subreeta, semper radice innititur, neque sedem unquam mutare solet, neque euulsa uiuere potest. Quod ouum uocatur, semper habet, sed aliàs maius, aliàs minus. Pinna copiosum præbent alimentum: uerum ægre & concoquuntur & digeruntur: urinam cient. Pinna optimæ sunt te-

*Limosis herbo-
sisq; πικτω-
δω.*

*Concha mar-
garitifera.*

*Berberi,
B ὁ ἄσπι.*

nellæ, plenæ carnosæ, uer, quæ in limosis herbosisque uadis gignuntur: & u-
bi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis ac uento carentibus: te-
neriores enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus
paruæ: & quæ uere & æstate capiuntur, aliis præstant: sunt enim & suauior-
es & pleniores. Quæ magnitudine media sunt, carnem quidem habent
mollem, candidam ac dulcem: collum autem durum concoctu difficilem,
corruptionique renitentem: collo nanque corpus reliquum facilius cor-
rumpitur. Elixis assæ duriores euadunt, præsertim si uino fuerint aspersæ.
Earum autem caro quæ in uino & aceto macerata sunt, mollior est, sed fla-
tus generat. Pinnam esse concham illam celebrem in qua gignuntur mar-
garitæ nonnulli prodidere. Theophrastus in eo libro qui de lapidibus in-
scribitur, non pinnam, sed pinnæ similem esse prodidit. Androsthenes ue-
ro, prorsus aliam, quæ apud Indos berberi dicitur. Hæc pectunculo forma
similis est, sed neque striata ut pectunculus, neque ita aspera: neque duas ue-
luti auriculas habet, quemadmodum pectunculus, sed unicam. Chares Mi-
tyleneus, ostreo similem concham esse prodit, sed oblongâ & crassam, car-
ne intus ampla, candida & odorata. In nostro mari, inquit Plinius, reperiri
solebant margaritæ: crebrius circa Bosporum Thracium, rusæ ac paruæ in
conchis quas myas appellant. at in Acarnania quæ uocatur, pinna gignit.
Quo apparet nō uno genere conchæ nasci: nam & Iuba tradit Arabicis cō-
cham esse similem pectini insecto, hirsutâ echinorum modo: ipsum unio-
nem in carne ipsa esse grandini similem. Indicus maxime has mittit ocea-
nus. In Britaniâ quoque paruas atque decolores nasci certum est. Præcipue
autem laudantur circa Arabiam in Persico sinu maris rubri.

1 Ex bisso, ita legit Theodorus apud Aristotelem, sicuti etiam nostra habet exem-
plaria Græca. uerum Athenæus, *ἢ ὅτι ἔστι* habet, id est, ex profundo. 2 Quo pa-
tio in concha & generetur, & incrementum capiat margarita, uariæ sunt authorū sen-
tentia, ut uidere est apud Plinium & Athenæum & Solinum.

De pectunculo.

Cap. C C X L V I.

*Pectunculus.
Pecten.
πτερίς*

Pectunculus testacei generis bivaluis est, testas habens fragiliores, sca-
bras, & quasi uirgulis quibusdam striatas. & referatiles, ut quæ altero
latere nodo ligantur. Binas in testis ueluti auriculas habet. Id quod ouum
uocatur, non semper, sed uere continet: mox tempore procedente minui-
tur: demumque totum aboletur. Pectunculī inueniuntur & nigricantes, & H
albi, & rufi. Nigricantes alij præferunt, ut cādidos alij: sed squalore trahunt
rufum colorem: & locis quibusdam etiam defecerunt propter siccitates. lo-
cis arenosis sui ortus initia capiunt: celeri incremento augentur: quippe qui 6
anno perfici possint. Latent aliquandiu in arena. Latent fere & circa canis
ortum, & magnis frigoribus: pectines admoto digito dehiscunt, mox com-
primunt ut cementes. De ferramento quo capiuntur sæpe exiliunt, ita ut
uolare uideantur. Plinius, extra aquam, inquit, uolitant sagittæ modo. Qui
candidi sunt atque lati, dulciores habentur: sed candidi: duri: rufi, uirosi: ua-
rij, mediocres sunt. Hæc Xenocrates: Sed candidi molliores sunt Diphilo
autore: neque uirosum quippiam habent, & aluum citant. Ex nigris autē
& rufis

A & rufis maiores, atque uerni sapore sunt iucundo. Pectunculi omnes facile concoquuntur, stomachoq; & uentri grati sunt, si cimino & pipere condiuntur. Pectunculi eò præstantiores sunt quo maiores, testæque magis cōcaua, & colore nigriores. Vere optimi sunt & æstate: atque his potissimum temporibus augentur plenioresque fiunt: sed pro lunari potestate maxime. Cæteris præstant & magnitudine & succi probitate, quæ Mitylenæ capiuntur. Numerosos fert Pontus, sed exiles, & qui non temere in magnitudine crescunt. Pectunculi alimentum uberius corpori exhibent quàm chama: sed succum & deteriorem procreant, & qui non tam faciliè aluum faciat. Concoctionem facilius admittunt quàm ostrea. Sapore sunt dulciore: at nimis illam dulcedinem per cocturam exuunt. Aluum magis mouent iurulenti assis: & quo magis assentur, eò minus succi cōgeniti erit reliquum, minufque aluum tentabunt: si in suis testis assentur, magis nutriunt. Pectunculi in cibo urinam cient: & ea quæ circa uescicam sunt, ulcera uel sordida iuuant, etiam si escaram contraxerint. Purgatur uescica, inquit Plinius, pectinum cibo. Pectunculi falsi triti cum cedria pilos in palpebris inutiles euulfos cohibent.

De dactylis siue unguibus, & pernis.

Cap. CCXLVII.

Concharum è genere sunt dactyli unguisue ab humanorum unguum similitudine appellati. binis clauditur unguis ualuib; leuibus, fragilibusque, uerum utroque latere connexis. Exigua corporis parte extat: reliquum autem toto corpore, perinde ac in cubili occultitur. Ad strepitū se subtrahit, inferiusque subsidit, quoties ferramētum sentiat. Permanet immobilis in locis arenosis, nulla innixus radice: qui si è testa euellatur, uiuere nequit. Ex his mares alij donacas, alij aulos uocant: sceminas onychas, mares liuidas quasdam ceu uirgas in testa cōtinent, colorēmque habent caelestē. Dulciores sceminae sunt, & unicolores: urinam mares mouēt, calculosos iuuant, & quicumque aliàs difficulter urinā reddunt. Dactylis natura, inquit Plinius, in tenebris remoto lumine alio fulgore clarere: & quāto magis humorem habeant, lucere etiam in ore mandentium: lucere in manibus, atque etiam in solo atque ueste deciditibus guttis. proprium hoc solenibus atque purpuris est, quod cū in iusculo coquuntur, id crassius reddant. Copiosum, sed malum succum procreant solenes & glutinosum. Innocui maxime si cum sale edantur & aceto: nam cum oleo & sale deteriores sunt. Quo grādiore eò præstantiores sunt, uigent æstate maxime. Conchæ longæ carnes, inquit Plinius, ex mulso potæ cū aquæ pari modo iocineris doloribus profunt: aut si febres sint, ex aqua mulsa. Perna concharum generis circa Pontias insulas frequentissimæ. Stant uelut i suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque quā limpitudo est, pedali non minus spatio uenantur. Dentes in circuitu marginum habet pectinatum spissatos, intus pro spondylo grādis caro est. Testatorum genera hæc traduntur.

1 Conchæ longæ carnes, &c. Digitos, ut ego sane arbitror, conchas longas uocauit Plinius.

DE DIFFERENTIIS

De zoophytis, & primo de tethyis uertibulisue.

E

Cap. CCXLVIII.

Zoophyta.

Tē. Dvor.

Tē. Des.

Tethos.

Tethyos.

Tethed.

Sunt animalia quædā exclusa omnino iis quæ in genera diuissimus: quæ scilicet ancipiti natura sunt: neque enim in iis perfectū animal est, neque planta. Quæ enim holothuria uocantur atque pulmones & plura eiusmodi, alia in mari, parum à plantis differunt sua ipsa absolutione: uiuunt enim sine ullo manifesto sensu perinde ac plantæ absolutæ. In his tethya parum sua natura à plantis differunt, ut uideantur plantæ quæpiam marinæ, aut fungi. propius tamen ad animalium naturam accedunt quàm spongia. In hoc certe cum plantis conuenit: quia non nisi adhærendo uiuit. sed cum aliquid habeat carnis, sensum aliquem habere uideri potest: sed olfactum tamen minime habere cernitur. Inter testata, tethya peculiarem sortita sunt naturam: his enim solis corpus totum tegumento includitur, nequaquam striato, sed leui: cuius durities inter testam & coriū est, adeo ut modo præduri bubuli tergoris secetur. Adhæret id genus saxi sua testa: duoque seposita inter se foramina exigua admodum habet, & uisum uix patientia, quibus humorem cibo accommodatum accipit: & quantum humoris remaneat, reddit: alterum scilicet & quasi os sit, altetum uero ueluti excrementi ostium: excrementum enim in eo nullum spectatur manifestum, quale in cæteris ostreis uel echineum, uel quod appellant papauer continetur: sed neque quod ouum appellatur, in eo ullo tempore minuitur aperte aut augetur. Dissecto, primum membrana carnosum ambiens partem ostenditur, qua uertibuli caro ipsa continetur, nulli è cæteris similis, in omnibus tamē sui generis eadem. Adhæret caro hæc utroque ex latete membranæ circumdanti & corio: & qua adhæret, arctius utranque in partem est tethyon, uidelicet ad meatus illos duos, quorū alter crassior, alter tenuior est. Cauum intus utrinque exiguo quodam interueniente continuo, in quo uitæ principium continetur: humorque in altero cauo consistere solitus est. Tota corporis eorum natura carnosissima est. nam pars alia quæ uel instrumentalis uel sensuualis sit, nulla omnino percipitur: color tethyis aut pallidus aut rubidus est. Tangentium manus qualitate quadam ita afficiuntur, ut uix elui possit. Generantur in rimis aut cauernis saxorum, maxime uero in cæno, & litoribus quæ phyco algæque marina abundant. Inueniuntur & in musco marino, aut aliis in herbis foliisque marinis. Præstantissima in Smyrnâ Asiæ: in Ægypto nulla inueniuntur. plurimum dant alimentum, renibus profunt & stomachicis, tenasimumque patientibus atque ischiadicis. Lateris dolores leniunt tethya similia ostrea in cibo sumpta: torminibus & inflationibus succurrunt: cachecticis quorum corpus macie conficitur, tethya utilia sunt cum ruta ac melle.

Vertibulum.
Callus.

1 In his tethya, &c. Theodorus modo uertibulum uertit, modo callus. 2 Hæc (ut zoophyta alia) inter testacea numerat Aristoteles, non quod testa includuntur siliacea: sed (ut equidem arbitror) quia minimum habent & sensus & motus, quemadmodum testata. Præterea nihil duri intra se continent, quod aut osseum aut cartilagineum sit, sed mollia penitus sunt: ortusque sui initia à limo solo habent ut testacea: ideoque testatis natura similima. Et quidem Plinius tethya ostrea similia dicit. 3 Inueniuntur

Aueniuntur & in museo marino, &c. Inueniuntur tethya, inquit Plinius, in foliis marinis fugentia, fungorum uerius generis quàm piscium. 4 Tenaſmumque patien-
tibus, &c. Eadem & tenaſmum diſſoluunt, renũque uitia, inquit Plinius.

De holothurio, ſtella, & pulmone marino. Cap. CCXLIX.

QUæ holothuria uocantur, non ut tethya adhærendo, ſed abſoluta ui-
uunt: mouere tamen ſe nequeunt, ſicuti nec oſtrea. uiuunt quidẽ ſine
ullo ſenſu, perinde ut plantæ abſolutæ (ut epipetron): ut eadem
fere ſit natura quæ fruticibus, à quibus parum diſſerunt, ſua ſcilicet abſolu-
tione. Quæ ſtella uocatur, neque animal perfectum, neque planta, ſed am-
bigit atque ancipiti eſt natura, quemadmodum & urtica. Forma eius ſtel-
lis quæ pinguntur, ſimilis eſt. Parua admodum caro eſt illi intus, extra du-
riore callo. Conchas aggreſſa eas exugit, omnẽque cibum ſtatim peragit:
adeoque natura calida eſt, inquit Ariſtoteles, ut omnia in mari cõtacta de-
coquat & adurat. Draconis marini ſcorpionũque iectus carnibus earum
impoſitis: item araneorum morſus ſanantur. In ſumma, contra omnia ue-
nena uel potu uel ictu uel morſu noxia, ſuccus earum ex iure decoctarum
efficaciſſimus habetur. Inter hæc & pulmo naturam habet pene fruticis:
ſponte enim prouenit, uiuitque abſque ullo ſenſu: non tamen adhærendo,
ſed abſolutus, perinde ac planta abſoluta. Pulmo marinus recens, tritus at-
que illitus, podagris pernionibꝯque auxiliatur: aiũtque pulmonem ma-
rinum decoctum in aqua calculolis prodeſſe epotum. Pulmonis marini ci-
nis adalligatus egregie mulierum profluuia purgat.

Holothuria.

Stella, & ſig.

*Pulmo:
Γιθιμαυ.
Γιθιμαυ & α.
λαθη. Ο.
Pulmo mari-
nus.*

C 1 Quæ holothuria, &c. Tubaera uocat Theodorus. 2 Conchas aggreſſa eas ex-
xugit. Quãnã uratur aſtutia in exugendis oſtreis, legas apud Oppianum. 3 Inter
hæc, &c. Halipleumon, ni fallor, eſt apud Plinium lib. 32.

Tubaera.

Halipleumon.

De urtica.

Cap. CCL.

URTICA item ancipiti natura eſt, ambigens & plantæ & animali. Nulla
huic teſta, ſed corpus omni ex parte carnem præ ſe fert: urtica etenim
ipſa quaſi interna oſtearum caro eſſe uidetur. Sentit & manum admotam
corripit adhæreſcitque, perinde ac polypus ſuis brachiis. Atque dum admo-
ueri ſibi manum ſentit, colorem mutat, inquit Plinius, & contrahitur. Os
medio in corpore cõtinet: hoc in maioribus urticis euidentius eſt: & de ſaxo
quasi de teſta uiuit: & ſi forte in eam inciderint piſciculi, eos excipit, reti-
nẽtque: atque in hunc modũ deuorat quæcunque naſta eſt eſculenta. Hæc
Ariſtoteles. Plinius, Contrahit urtica ſe, inquit, quammaximè rigens, ac
prænatante piſciculo frondẽ ſuam ſpargit: (carnofæ nanque frondis his na-
tura) complectẽsque deuorat: aliàs marcenti ſimilis, & iactari ſe paſſa algæ
uice, cõtactos pilceſ attritũque petræ ſcalpentes prurium inuadit. Ex-
crementum nullum in urtica eſſe conſpicitur: ſed in hac ſe ſimilis ſtirpibus
eſt. Maiores tamen meatum, ut oſtreæ, quo excrementum ſecedat, tenuem
ſcilicet fiſtulam habet parte ſuperiore. urtica enim ipſa, uti modo diximus,
quasi interna oſtearum caro eſſe uidetur: ſaxo uero utitur perinde ut teſta:
ſaxo enim adhærere more nõnnullorum teſta interiorum ſolet urtica: & ta-
men.

*Urtica,
Ακανθισ.
urtica.*

*Locus hic A-
riſtotelis mihi
quidem ſuſpe-
ctus eſt: neque
ſane uetus in-
terpres cũ ex-
plaribus no-
ſtris Græci cũ
uenit.*

Oo ij

DE DIFFERENTIIS

men quoties libeat absolui, absolutumque uagari quoddam urticarum genus notatum est, quod & echinos & pectunculos in quos offenderit, corrodit. Quæ enim in cauis sinuosisque adhærent, nunquam à saxis absoluuntur: quæ uero in saxorum planis marginibus uiuunt, absolute sedibus uagantur. Duplex genus percipitur urticarum: alterum corpore paruo, quod cibo aptum est: alterum maiusculo duroque, quale circa Euboicæ Chalcidem gigni scimus. Sunt omnes hybernis mensibus carne constante atque rigidiuscula: quamobrem per id tempus capiuntur, ciboque idoneæ sunt. At æstate deteriores fiunt: præmadent enim & marcent, ut si tetigeris, facile discerpantur atque dispareant. Denique nulla tantisper euelli integra potest: ac æstus impatientia, saxa subire interius solent. Vrticis idem gignendi modus est, atque iis quæ testa includuntur. Mordent urticæ non ore, sed tactu totius corporis: uis enim in his pruritu mordax, eademque quæ terrestris urticæ. Vrtica (ut author est Diphilus) & uentri & stomacho grata est, aluum atque urinam ciet, parciusque nutrit: ut uero Xenocrates tradit, urticæ gustui suauis, sed stomacho admodum ingratae sunt. Assæ elixis ad aluum mouendam magis idoneæ: quæ lapillis adhærent, urinam magis ciet: quæ passo aut uino mulso condiuntur, facile concoquuntur, aluumque mouet: quæ autem coquuntur in passo unâ cum oleo, lubricum quidem illud retinent, aluumque ciet: sed uentrem replent, & difficulter in uentriculo conficiuntur. Vrticam marinam in uino potam calculosis prodesse aiunt. In oleo coquuntur urticæ: quo ne pili renascuntur, nonnulli sunt uisi.

De spongia.

Cap. CCLI.

G

*Spongia.
w: nos.*

Spongia nullam habet carnem, sed similis omnino plantis est: præsertim cum adhærendo tantum uiuere possit, absoluta uero minime. At paruū aliquod discrimen est. Spongia nanque sensum aliquem habere creditur, argumento quod multo difficilius abstrahuntur, nisi clanculum agatur, ut aiunt. Præterea ad auulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit: quod idem etiam faciunt quoties status tempestasque urget. Plinius, Spongiam, inquit, animal esse docuimus, cruore petris inhærente. Aliqui narrat & auditu regi eas, contrahique ad sonum, exprimentes abundantiam humoris, nec auelli petris posse, ideo abscindi & saniem emittere. Quin & eas quæ ab aquilone sint genitæ præferunt cæteris: nec usquam diutius durare spiritum medici affirmant: sic & prodesse corporibus, quia nostrum suo misceant: & idem magis recetes magisque humidæ, sed minus in calida aqua, minusque unctas, aut unctis corporibus impositas: & spissas minus adhærescere. Oppianus quoque tradit, à spongiis euulsis distillare saniem, quæ si spongiatoris forte naribus adhæreat, sepi sume hominem suffocat. In saxorum rimis & cauernis oriuntur spongiæ, non aliter atque ea quæ testis intactæ sunt. Aluntur conchis, pisce, limo. Et uiuere spongiæ esca manifesto conchæ in his reperta ostendunt: & aperiendo claudendoque pisciculos capit spongia. aperit autem antequam ingrediantur: claudit & contrahit cum ingressi sunt. Adhærēt nec parte una nec toto: (inter sunt enim fistulæ quædam

- A** dam inanes) sed pluribus passim particulis hæsitât, & quasi membrana extenta subesse radicibus earum uidetur. Superne autem ceteri meatus concreti propemodum latent. At uero infusæ quaterni aut quini patent, per quas pasci existimantur. Color illotis uiuisque nigricans est: candidæ autē cura hunt. Spongiarum tria genera accipimus: sunt nanque aliæ raræ, aliæ spissæ, aliæ quas nominant achilleas. In genere illo spisso quæ præduræ sunt atque asperæ, hitci nomine tragi nuncupantur: minus spissum & mollius manos. Tertium quod achilleum uocatur tenuissimum & spississimum & ualidissimum est. Genus hoc inuentu perquam rarum est. Ex hoc penicilli. *Quoniam modo candidi sunt docent Plinius & Dioscorides.*
- 2** Mollissimum uero genus spongiarum penicilli. Trogus author est penicillos mollissimos circa Lyciam nasci in alto, unde ablatae sunt spongiæ. Si enim euenierit forte ut spongia cum euellitur, abrumpatur: residuo item nascitur & completur. Magnitudine amplissima sunt solutæ illæ & raræ spongiæ: sed mollissimæ spissæ & tenuissimæ, quæ scilicet altis tranquillisque nascuntur gurgitibus: status enim ac tempestates, spongiæ quoque ut cetera altitia, reddunt duriores, & incrementum impediunt. Genus item aliud est, quod nomē aplysiæ inde accepit, quod elui non possit: habet hoc ampliores illos meatus, sed reliquo corpore densum est: nihil tamē densius quam quæ ante numerauimus genera, quanquam lentius est, & ex toto pulmoni similis: pessimum omnium hoc genus est. Sensum id genus habere diuque uiuere inter omnes præcipue conuenit: cognosci præ ceteris spongiis eo facile potest documento, quod cum illæ albicent, limo inter lauandum subscendente, id semper nigrorem ostendit. Quidam spongiæ ita distinguunt, alias ex his mares existimauere tenui fistula spissiorēque: quatum quæ duriores sunt, tragos appellant: alias fœminas, maioribus fistulis ac perpetuis. Medici inscitia quadam ad duo nomina eas redeget: Africanas, quarum firmitus sit robur: Rhodiacasque, ad fouendum molliores. Nunc autē mollissimæ circa muros Antiphelli urbis reperiuntur. Spongia noua non sicut lana aut linamentum materia duntaxat est, qua applicantur medicamenta ad irrigationes idonea, sed & manifeste deficcet, uulneraque enema conglutinat: si noua sit, & maris odorem adhuc referat: si eam cum aqua aut uino aut posca pro corporis ratione imponas. Quod si uetus sit, & maris odorem amiserit, non æque deficcet: immo inutile esse sentit Dioscorides. *Tragum.*
- D** Mollissimum genus earum penicilli oculorum tumores leuant ex mulso impositi: item abstergenda lippitudini utilissimi. Imponuntur spongiæ ipsæ epiphoris ex posca: ex aceto calido ad capitis dolores. De cetero recetes discutiant, molliunt, mitigant ueteres conglutinant uulnera, inquit Plinius. Vfus earum ad abstergenda, fouenda, operienda à fotu dum aliud imponatur: ulcera quoque humida & senilia impositæ siccant. Fracturæ & uulnera spongiis utilissime fouentur: sanguis rapitur in secando, ut curatio perspicui possit. Et ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur, nunc siccæ, nunc ex aceto insperstæ, nunc è uino, nunc ex aqua frigida: ex aqua uero cælesti impositæ, secta recentia non patiuntur intumescere. Imponuntur & integris partibus, sed fluxione occulta laborantibus quæ discutienda sit: &

DE DIFFERENTIIS

iis, quæ apostemata uocât, melle decocto perûctis. Item articulis aliàs aceto falso madidæ, aliàs è poscæ, in uulnerû curatione & succidæ lanæ uicem implent. Differentia hæc, quòd lanæ emolliunt, spongiæ coercent, rapiuntq; uitia ulcerum. Circumligantur & hydropicis siccæ, uel ex aqua tepida poscæ. Imponuntur & iis morbis quos uaporari oporteat, feruenti ex aqua perfusæ expressæque inter duas tabulas. Sic & impositæ stomacho profunt, & in febris contra nimios ardores. Sed spleneticis è poscæ, ignibus sacris ex aceto: imponi oportet sic, ut sanas quoque partes spatiosè operiât. Liuorem ab ictu recentem ex aqua salsa calida sæpius mutata tollunt: testium tumorem dolorémq; ex poscæ. Sorgia uisita acris est, uimq; habet digerédi. Cum bitumine aut pice cremata, sanguinis eruptiones in uulneribus cohibet, præsertim si feruens apponatur. Aliqui raras tantû ad hoc cum pice urunt: & oculorum causa comburuntur in cruda olla figulini operis, plurimum proficiente eo cinere contra scabrias genarum excresecetesque carnes, & quicquid opus sit ibi desstringere, spissare, explere: utilius in eo usu lauare cinerem.

1 Quod multo difficilius, &c. Quanta cum difficultate, quantôque periculo col-
liguntur spongiæ: & quibus modis auelluntur, ostendit Oppianus lib. 7 de piscibus. 2
Tenuissimum, *λεπτότατον*: fortasse (minimum) uerti poruisset: quanquam Plinius te-
nue etiam dixit, uel intelligitur tenuissimû, id est, tenuibus fistulis, ut legitur apud Dio-
scoridem *λεπτοσπινθη*. 3 Ex hoc penicilli. Ex hoc spongiarum genere fiebant pe-
nicilli uulnerarij, quibus scilicet uulnera ulceræue stipabant abstergebântque, ut cla-
rissime explicat Plautus in Rudente, Ego iam te hic inidem, quasi penicillus nouus exu-
gere solet, ni hunc amittis, exugebo quicquid humoris tibi est.

Epilogus seu caput CCLII.

Phryganion.

Herpes.

Protegeus.

Τρυγών.

Sirulugus.

Neades.

PRæter hæc quæ diximus animalia, sunt purgamenta aliqua relatu indi-
gna, & algis potius annumeranda quàm animalibus. Chrysippus quo-
que philosophus tradidit phryganion ad alligatum remedio esse quartan-
is: quod esset animal, nec ipse descripsit, nec nos inuenimus qui nouisset.
Herpes quoque animal à Græcis uocatur quo præcipue sanantur quæcûq;
serpunt. Protegeus animalia sunt Indica, quæ gustû habet acutissimum.
Τρυγών animalculum quod setas uillôsue concutiat. Hæc duntaxat no-
minauere authores sicuti & sirulugû, quod nec quale esset animal, nec ubi
nasceretur, tradiderunt. Et Euphron in commentariis scriptum reliquit, **H**
in Samo bestias olim fuisse feras maxima magnitudine nomine neades,
quarum sola uoce terra discederet: earum ossa maxima, uel sua ætate exti-
tisse. Sunt etiam in mari nonnulla animalia effigie insolenti & sui generis:
quæ quoniam inuentu rara sint, constitui in genus non possunt. Iam enim
piscatores uidisse se retulerunt quædam trabunculis proxima, pullo colo-
re, tereti figura, pari ex toto crassamento. Item alia scutorum effigie, colore
rubeo, pinnulis crebris. Ad hæc alia quæ genitale uiri imitarentur, tum spe
et magnitudine, sed pinnis subnexis binis loco testium. In magnis et-
iam imbribus multa apparent animalium genera, quæ ante uel nunquam
uel raro uisa fuerint. His igitur mihi satis admonuisse saltè uideor, quæ de
animalium

A nimalium differentiis ab Aristotele, Dioscoride, Plinio, Galeno, aliisque veterum multis sunt dicta. neque enim omnia in hunc librum transferenda censui, quæ ab illis accuratissime sunt scripta. Tantum uero de singulis solum dixi, quantum legentis ad antiquorum euoluenda scripta, nisi sint omnino rudes aut auerti, excitet: ac quo facilius cum his uersentur, auxiliū præstet

1 Ad hæc alia quæ genitale. Est pisceis nomē, inquit Hermolaus, xdocon, quod & nos genitale nuncupamus marinum, à nonnullis halefursion græce dictum. Quamquam halefursion sunt qui pro callyonimo pisce capiunt. *Αιδύιον* quoque *Θαλασσίον*, *καλιόδαινα* uocauit Epicharmus, ut Nicander tradidit.

ΑΕδοcon.

Αιδύιον Θαλασσίον.

Genitale marinum.

Halefursion.

καλιόδαινα.

τίλος πω δῆ.

IMPRIMEBAT MICHAEL

Vascofanus Lutetiæ Parisiorum,

Ann. M. D. LI.



THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON, ESQ. OF BOSTON.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, in Pall-mall.

MDCCLXXXIII.

THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON, ESQ. OF BOSTON.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, in Pall-mall.

MDCCLXXXIII.

THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON, ESQ. OF BOSTON.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, in Pall-mall.

MDCCLXXXIII.

ANIMALIVM, QVAE IN HOC OPERE CON-
TINENTVR NOMENCLATVRAE ET INDEX.

A ελιεύς	148. b	Αλενορος	68. c	Altinzuaccæ	72. b
Αβρομίς	162. c	Αιμύς	92. c	Aluco	122. f
Abrothone	111. h	Ανίθε	151. c	Αμα	12. f
Αβρολίφα	118. c	Αίψα quadrupes	79. d	Αμίη	167. b
Ακάνθιος	146. d	Αίψα avis	118. d	Ammoatis	100. b
Acanthis	126. f	Αιολία	157. h	Αμμοθύνος	100. d
Ακροθάλις	126. b	Αϊόλος	151. h	Αμπελός	122. a
Ακαρ-θεφύρα	106. h	Αϊσώπος	122. g	Αμπελίδος	ibidem
Acari	193. h	Αϊθες	1. d	Αμπελός	122. a
Acarna	160. c	Αϊθουα	129. h	Αμφοτερά	102. d. & c
Acaine	ibidem	Αιθια	ibidem	Amphibarna	ibidem
Accipenser	120. f. 121. d. 151. d.	Αιθναυς piscis	191. g	Anas	133. f
c. 154. h. 155. b. c		Αιτίς avis	118. h. 119. h	Anatum genera	ibidem
Accipiter	120. f. g. 121. a. b.	Αιτίς piscis	45. h	Anates Ponticæ	ibidem
d. c. f		Αιδύς	127. f	Anatoria aquila	119. c
Accipiter Ægyptius	120. g	Αγαξεύς	61. a	Ανταμάς	12. a. b. 34. c. 173. h
Accipiter Æthiopicus	122. c	Αγώς	154. c	Ανέστης	213. c
Acerata cochleæ	79. h	Agnus	ibidem	Ανάλυρα	175. c
Achainæ ceruæ	79. h	Agnus quadrupes	77. g	Ανέστης	213. c
Acharnas	160. d	Αγροθία	165. h	Anguis	95. h. 103. a
Αχέρης	ibidem	Agriophaga	183. c	Anguis Thebanus	96. a
Αχέρης	159. h	Agrippa	40. a	Anguis Esculapius	101. h
Acharnus	ibidem	Αγροθία	187. d	Anguilla	148. b
Acheta	190. c	Alabes	170. b	Anguilla Macdonicæ	148. f
Αχίτης	ibidem	Αλάβος	ibidem	Animal	1. b. c
Achillæa spongia	219. a	Alauda	117. c	Anser	132. c
Acie	193. c	Albardcola	130. h	Antracæus	169. b
Αέμιος	62. d	Alba Ardcola	ibidem	Ανταμάς	168. h
Ακέρης	101. b. 102. h	Albicilla	119. d	Anthias	154. c
Ακέρης	190. g	Albicula	129. b	Anthiarum species	ibidem
Aculeatus	148. h	Alburnus	169. g	Anthracides	163. c
Acus	148. h	Alecs	86. h. 87. a	Anthrædon	183. a. 144. g
Addax	99. b	Αλάβος	128. d	Ανθράκων	184. c
Αλάβος	6. c	Alec	162. g	Ανθράκων	125. f
Αδύς	158. c	Alecula	163. c	Anthus	123. b
Adūcæ aucs γαυφύρα	107. b	Alex	163. c. 166. d	Ανθράκων	141. c
Ædocon piscis	220. a	Αλέκτωρ	111. h	Aperi quadrupes	84. g
Ægythus	126. g	Αλετωρ	109. g. 112. a	Aperi piscis	163. f
Ægoliος	121. f	Αλετωρ	111. h	Αφείτης	161. d. g
Αεσώπος	122. g	Αλετωρ	ibidem	Αφείτης	ibidem
Æmys	91. d. 92. c	Αλετωρ	218. c	Αφείτης	161. a
Æfalo	110. h	Alopecides canes	59. h	Αφείτης	161. f
Æfalon	ibidem	Αλωπεκίς	146. d. g	Αφείτης	162. a
Αιδύς θαλάσσιος	220. a	Αλώπεξ quadrupes	66. h	Απιαστρο	117. c
Αιδύς	136. g	Αλώπεξ piscis	146. g. 148. d	Απικα οvis	76. f
Αιγυφίλος	118. d	Αλώπεξ volucris	71. g	Apis	177. g
Αιγυφίλος	118. d. g	Alofa	162. d. e. f	Apina	162. a
Αιγυφίλος	120. b	Αλφειός	155. a	Aplysia	219. b
Αιγυφίλος	127. d	Αλφειός	ibidem	Apodes	213. h

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

Apolectus	165.a	Afcalopax	ibidem	Aues volaces	108.a
Apolectum	ibidem	Afcalaphus	122.e	Aues graues	ibidem
απειρίαις	214.d	Afellus minor	87.h	Aues nocturnæ	122.b
Aprica ouis	76.f	Afellus dofluarius	88.g	Aues Seleucides	134.c
Apterus	191.a	Afellus piscis	155.g.h.156.a	Aues Diomedæ	133.c
Apua	161.d.h.162.a	Afellus multipes	128.h	Aues Herciniæ	134.d
Apua Phalerica	162.d	Afellus locusta	190.h	Aues Mennonides	ibidem.c
Aquarilia	25.g.h.26.a	Afilus auis	117.h	Aues Caspiæ	135.a
Aquila auis	118.h	Afilus insectum	189.c.196.h	Aues nouæ	118.b
Aquila piscis	145.h	Afilus in thynno	164.c.196.h	Aues fidipedes	109.a
Aquila luuis	120.a	Afilus marinus	ibidem	Aues digiratz	ibidem
Aquila pulla	119.h	Afinus vulgaris	88.g	Auis ægæ	103.c
Aquila fulua	119.f	Afinus degener	ibidem	Auis tarda	105.e
ἀεγχαίης	186.d	Afinus admiffarius	87.h	Auis Scythica	139.e
ἀεγχαίης λευκίνος	186.h	Afinus syluestris	88.c.e	Aulos	217.c
Araneus	186.d.187.a	Afinus Indicus	ibidem.d.e	Aulopios	135.a
Aaranea	ibidem	Afini marini	173.c	Aulopos	154.h
Araneus pratensis	188.a	Afio	115.g.122.d.123.a	ibidem	ibidem
Araneus laurus	186.e	Afiorion	188.c	Aurata	156.f
Araneus marinus	187.b	Afiracus	191.c	Aurelia	176.h.193.a
Araneus muscarius	177.e	αυαυαυ	71.d	Aureus lupus	62.a
Araneus lanuginosus	187.d	Afpargus	170.c	Auris marina	214.d
Arbor belua marina	173.a	Aspis	98.g	Auriuinctus	226.g
Arburarius picus	125.e	Aspis Chelidonia	99.a	αυφίτης	163.h
Arborum cauator	ibidem	Aspis Chersæa	ibidem	Auxuuiz	164.h
Archaeus	159.h.160.d	Aspis ptyas	ibidem	Auxiracæus	191.e
ἀρκτος quadrupes	83.pcr tot.	Astacus	205.a	Axis	71.g
ἀρκτος crustarus	233.h	Astacus fluuiarilis	ibidem.e	B	
ἀρκτουός	69.f.g.h	ἀστέρ	118.a	Bæchus	155.g.156.a
ἀρκτουός	69.h	Aster	ibidem	βαίχης	155.h.159.c
Ardea	190.f.g	Asterias stellaris	121.a	βαδίζοντα	96.f
Ardeola	ibidem	Asterias ardea	130.h	βαίης	118.d
Ardeola candida	130.h	Asterius piscis	146.h	Bæus	ibidem
Ardeola alba	ibidem	ἀστέρια βαίης	144.c	βαίος	161.e
Ardeola pigra	ibidem	Asterion	187.e	βαίχης	150.c
Argarhulis	123.g	Astomi homines	50.c	Balagri	169.h
Arguta cicada	190.g	Astortion	188.c	Balanus	214.a
Artes quadrupes	77.g	Astrabelus	213.a	βαλάνος	ibidem
Artes marinus	173.b	ἀστράβαλος	ibidem	Balearicæ grues	131.d
Arista	164.f	Asturcones	86.e	Balena	172.f.g.h
ἀρίστη	77.g	Atherine	162.f	Balerus	169.h
ἀρίστη	165.c	ἀθέρην	161.g	Banchus	150.c
ἀριστεύωνός	68.g	Atrapilla	127.d	Barbata auis	110.e
ἀρίστη lupus	62.c	Attaces	191.e	Barbus	169.f
ἀρίστη	23.a	Attagena	117.b	Bardones	89.c
Arrhredo	184.g	Attagen	ibidem	βαρδόνος	169.h
Afcaridæ intestinorū uermes	195.h	ἀττάγεν	ibidem	βαρδόνος auis	127.h.128.d
ἀσκαρίδης	ibidem	ἀττάγας	ibidem	βαρδόνος auis	127.b
Afcaridæ uermiculi	189.f	ἀττάγας	ibidem	Basileus auis	ibidem
ἀσκαρίδης	ibidem	Attagenus piscis	170.d	Basileus piscis	170.c
Afcalabus	94.g	Atrelabos	191.c	Basileus terpens	101.c
Afcalabores	95.a	Attilus	169.c	Batiltæ tellinæ	216.b
Afcalopas	117.c	Aues carniuoræ	106.h	βατίτης auis	127.h
				βατίτης piscis	145.h

ET INDEX.

<i>Βάτις piscis</i>	145.h	<i>Bos unicornis</i>	72.d	C	
<i>Βαίβαρις</i>	92.f.145.c	<i>Bos tricornis</i>	ibidem	<i>Cacabis</i>	106.e
<i>Βαίβαρις λιμναίης</i>	92.h	<i>Bos Ægyptius</i>	ibidem.e	<i>Cæci serpentes</i>	103.b
<i>Βαίβαρις ἑλίας</i>	93.b	<i>Bos Æonius</i>	ibidem.d	<i>Cæcilix serpentes</i>	ibidem
<i>Βαίβαρις πολυματαιῆς</i>	92.h	<i>Bos Aonius</i>	88.g	<i>Calamitæ ranæ</i>	93.f
<i>Βαίβαρις ἁλίας</i>	145.c	<i>Bos Appennineus</i>	72.h	<i>Calidris</i>	129.b
<i>Βάλλα</i>	149.d	<i>Bos Campanus</i>	ibidem	<i>Callarias</i>	155.g
<i>Βιβραῖος</i>	162.b	<i>Bos Caricus</i>	ibidem	<i>Callibios</i>	167.c
<i>Βιβραδώνης</i>	ibidem	<i>Bos Epiroticus</i>	72.g	<i>Calliblephara</i>	214.g
<i>Βιλλίτης</i>	161.c	<i>Bos Erythæus</i>	75.c	<i>Callichthys</i>	154.e
<i>Βιλλόνι</i>	148.h	<i>Bos Herciniæ syluz</i>	72.d	<i>Gallionymos</i>	ibidem
<i>Belone</i>	ibidem	<i>Bos Indicus</i>	88.g	<i>καλλιόνυμος</i>	ibidem
<i>Βιμερῖος</i>	162.b	<i>Bos Lybicus</i>	72.d	<i>Callitriches</i>	58.f
<i>Βιμνίς</i>	184.h	<i>Bos Mæoticus</i>	ibidem	<i>Callus</i>	217.h
<i>Bembyx</i>	ibidem	<i>Bos imitatorius</i>	ibidem.f	<i>Camelus</i>	81.h
<i>Bzon</i>	161.c	<i>Bos pelleus</i>	72.c	<i>καμήλος</i>	ibidem
<i>Βιρρίδις</i>	216.f	<i>Bos Phrygius</i>	ibidem	<i>Camelopardalis</i>	82.c
<i>Bestiolæ in igne genitæ</i>	195.c	<i>Bos Phœnicus</i>	ibidem.g	<i>Cammarus marinus</i>	205.c
<i>Bæus</i>	118.d	<i>Bos Pæonius</i>	72.f	<i>Cammarus</i>	205.c.206.b.
<i>Bisontes</i>	74.h	<i>Bos Scythicus</i>	72.e		207.b.c.d.
<i>Bistones</i>	75.c	<i>Bos Syriacus</i>	ibidem	<i>καμμάρος</i>	207.b
<i>Bisulca animalia</i>	53.e	<i>Bos Trogloditicus</i>	75.c	<i>καίμητις</i>	7.d.193.a
<i>Bivalvia</i>	207.f	<i>Boscas</i>	133.g	<i>Cancer</i>	203.b.205.f.206.a
<i>Blarta</i>	197.d	<i>Boschides</i>	ibidem.h	<i>Cancer fluviatilis</i>	206.a.b
<i>Blatta mollis</i>	ibidem.c	<i>Βόστρογγος</i>	193.f	<i>Canceri cutfores</i>	206.h
<i>Blemmyes</i>	50.d	<i>Βότις</i>	145.h	<i>Cancellus</i>	ibidem.d
<i>Βλίτης</i>	161.c	<i>Βοϊκόλος</i>	80.g	<i>κατάλοιρος</i>	193.c
<i>Βλίτης</i>	ibidem	<i>Βοϊκόλος</i>	ibidem	<i>Canicæps</i>	58.f
<i>Βλιψίς</i>	160.d	<i>Βιούλαστος</i>	50.d	<i>Canicula piscis</i>	146.d
<i>Boa</i>	102.c	<i>Βουτοί</i>	69.d	<i>Canicula Galeus</i>	ibidem
<i>Βόνξ</i>	163.b.g	<i>Βουπράσις</i>	192.f	<i>Canis pinguis</i>	146.h
<i>Boca</i>	ibidem.b	<i>Βούς</i>	72.c	<i>Canis marinus</i>	ibidem.h
<i>Bocas</i>	ibidem	<i>Βουφάγος</i>	130.d	<i>Canis Carcharias</i>	146.e
<i>Bœtus</i>	170.a	<i>Βόξ</i>	163.b	<i>Canis quadrupes</i>	60.a
<i>Βοῖπις</i>	ibidem	<i>Box</i>	ibidem	<i>Canis uillaticus</i>	ibidem
<i>Bogpyrus</i>	170.c	<i>Brenthus</i>	129.e	<i>Canis pastoralis</i>	ibidem.a.c
<i>Boletena</i>	200.e	<i>Βερίγμος</i>	170.c	<i>Canis pecuarius</i>	60.a.e
<i>Βομβύκος</i>	184.h	<i>Brinthus</i>	134.b	<i>Canis domesticus</i>	59.h
<i>Bombylis</i>	185.a	<i>Βερίσις</i>	113.f.173.f	<i>Canis uenaticus</i>	59.h.60.d.e
<i>Bombyllus</i>	184.g	<i>Brucus</i>	191.c	<i>Canis alopecis</i>	59.g
<i>Βομβύλιος</i>	ibidem	<i>Bubo</i>	122.d.e.f	<i>Canis acarian.</i>	60.f
<i>Bombyx</i>	184.h.185.a	<i>Bubalus</i>	80.g.h	<i>Canis acaryus</i>	60.g
<i>Bombyx altera</i>	193.c	<i>Bubalis</i>	95.d	<i>Canis Ætolicus</i>	ibidem
<i>Bombilius</i>	184.g	<i>Buccina</i>	213.a	<i>Canis Achamanicus</i>	ibidem
<i>Bombilis</i>	ibidem	<i>Buccinum</i>	ibidem	<i>Canis Arcadicus</i>	59.g
<i>Bombyx</i>	ibidem	<i>Bufo</i>	93.g	<i>Canis Britannicus</i>	ibidem
<i>Bonnafus</i>	52.e.74.c	<i>Buglossus</i>	150.d.151.b	<i>Canis castorius</i>	ibidem
<i>Βόντασος</i>	ibidem	<i>Bunga</i>	130.d	<i>Canis fluviatilis</i>	70.g
<i>Βόνις</i>	163.b	<i>Buprestis</i>	192.f	<i>Canis gelonus</i>	60.f
<i>Βοριδίη</i>	161.h	<i>Buteo</i>	120.h	<i>Canis Hircanus</i>	60.g
<i>Bospiscis</i>	145.g	<i>Byas</i>	130.d	<i>Canis Indicus</i>	ibidem
<i>Bos quadrupes</i>	72.c	<i>Byturus</i>	194.b	<i>Canis Laconicus</i>	59.g
<i>Bos sylvestris</i>	74.f			<i>Canis leucarius</i>	61.h
<i>Boues lucæ</i>	57.g			<i>Canis Lycaon</i>	60.f

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Canis Medus	60..f	Castorides marinæ	173.c	καρυδοι	190.f
Canis Melitenfis	61.e	Caspix aues	135.a	Cercerias	100.d
Canis Meliteus	ibidem	Catarastra	133.c	Cercuros	147.c
Canis Menelais	59.f	Catarastra	130.c	Cercytos	ibidem
Canis Molossicus	19.f.61.c	καταράστρα	ibidem	καρδο	67.a
Canis Petronius	59.f.60.g.h	Caroblepa	72.a	Ceris	155.a
Canis Perses	60.f	Catreus	135.b	κερς	ibidem
Canis Phereus	ibidem	Catus syluestris	68.c	κερς	112.e
Canis Salenninus	59.f	Cauaticæ cochleæ	210.e	Cerrhns	163.c
Canis Seres	60.f	Causos serpens	100.b	Certhia	126.d
Canis Sicamber	60.h	κευλιν	160.h	Certhius	ibidem
Canis Tuscus	61.a	Cebus	58.g	καρθίος	ibidem
Canis Vmber	60.g	κεβς	ibidem	Ceruus	79.c
Canterii	85.g	Cæci serpentes	102.g	Ceruus palmatus	81.a
Cantharis	192.b	Cæcilix serpentes	ibidem	Ceruz Achainæ	79.h
Cantharus piscis	154.a	καερίν	196.a	Cerylus	128.f
Cantharus insectum	192.b	Cela	135.c	κερύλος	ibidem
καὶ θηρος	154.a.191.h	Celphus	59.d	κερύλος	ibidem
Capella quadrupes	78.c	κελφς	126.c	Cestra	149.a
Capella auis	118.d	Cemas	81.a.b	κεστρς	159.b.c
Caper	78.c	κεμας	ibidem	Cetacei pisces	142.d
Capito	160.c.d.169.f	κεμας	ibidem	κετωας κετις	ibidem
Capra	77.h	Cenchitis serpens	101.a	Cete	171.b
Capræ syluestres	79.a	κενχίς	ibidem	Cetus	ibidem
Capræ feræ	ibidem	Cenchrias	100.d	κετς	ibidem
Capræ	ibidem.b	Cenchris auis	121.c	Ceuz	72.h
Capreoli	79.d	Cenchrine	101.a	Ceyx	128.g
Capriceps	118.d	Cenchrites	ibidem.b	Chalceus	162.f.g.170.h
Caprimulgus	ibidem	Cenchtramus	116.d	Chalcis quadrupes	94.e
Caprificus	157.b	Centipes	188.e	Chalcis auis	121.a
καπερς quadrupes	84.g	Centipeda	188.d.g	Chalcis piscis	162.e.f
καπερς quadrupes	83.h	Centrine serpents	100.b	Chame	215.b
καπερς piscis	163.f	Centrine piscis	146.c	Chame leios	ibidem
Capus	109.g.110.e	Centris	100.b	Chame glycymerides	215.c
Carabus scarabeus	192.a	Cephalus	159.b.f.g.h.160.d	Chame pelorides	ibidem.d
Carabus crustatus	204.c	Cephalus fluuiantilis	160.c	Chameleo	95.c
καρχαρόδοντα	51.b	Cephalus trāsitoranus	159.h	χαμελεών	ibidem.a
Carcharias	146.e	Cephalus περσικός	ibidem	χαμψς	90.d
καρχίνος	205.f	Cephalus φεγγίς	ibidem	χαμψς	157.c
καρχινίον	206.d	Cephalinus	160.d	χαμψς	ibidem
καρχινίον μικρόν	205.f	κεφαλοκρούς	188.c	Chaonides canes	63.a
Carduelis	126.g	κεφλς	178.c	Charax	153.g
Carduelus	ibidem	Cephus	58.d.g	Charadrius	129.f
καρδίδος	206.h	Cepphns	129.f	χαράδριος	ibidem
Carinus	169.h	κέφης	ibidem	Charitlaginea	143.d
καρίνς	203.b.206.h	Cepus	58.g	Charitlaginata	ibidem
Carniuora	106.h.28.b	κεπς	ibidem	Charitlaginei pisces plani	144.d
καρπιφάγα	107.a	Ceramides	133.a	Chaus	62.h
καρπιφάγοντα	ibidem	Ceraftis serpens	100.b	χαυν	157.c
Cartafonos	71.h	κεραστς	ibidem	χαυνίδοντα	52.h
Carulus	129.d	Ceraftes vermiculus	194.a	χαυνομίλος	69.g
Castor	70.a	Cerebnes	126.e	χαυνίδος auis	123.b
Castorides canes	59.g	Cercio	135.c	χαυνίδος piscis	152.g
Castorii	ibidem	Cercopithecus	58.d		

χελιδὼν polytypo similis	200.h	Cicada frumentaria	ibidē.e	κὲκελος	ibidem
χελιδὼν θαλάσσια	ibidem	Cicada Aucnaria	ibidem.f	Cochlea	152.f
Chelidonia lepus	67.h	Cicada marina	ibidem	κοχλίας	211.g.h
Chelidonia piscis	165.b	κὲκελος	117.h	κὲκελος	ibidem
χελιδὼν	91.d	κὲκελος piscis	157.a	Cochlea terrestris	210.d
χελιδὼν πτωμαία	92.d	κὲκελος	117.h	κοχλίας χερσαίος	ibidem
χελιδὼν θαλάσσια	91.c	Cicindela	193.f	Cochlea lata	ibidem
χελιδὼν χερσαία	ibidem.h	Ciconia	131.g	Cochlex cauarica	ibidem.c
χελιδὼν ἑρπύς	92.f	Ciconia montana	119.g	Cochlex πτωμαία	ibidem.d
Chelonophagi	50.d	Cicumia	123.b	Cochlea nuda	ibidem
χελιδὼν	159.b	Cimices	197.a	Cochlea candida	ibidem
Chelydrus	98.d	Cimices agrestes	ibidem.b	Cochlea longa	ibidem
χέλις	215.d	Cimices malua	ibidem.d	Cæruleus avis	118.f
χέλις τρεχέλια	ibidem.c	Cinclus	129.c	Cæruleus uermis	149.g
χέλις λαπα	ibidem	Cinereus Terragnatus	187.c	Cæruleus phalangij genus	
χέλις βασιλική	215.d	Cinnamomus	134.h		187.f
χεμίουμακρὸς	ibidem.c	Cinnamolgus	ibidem	Colaris	122.f
χεμίου	117.f	Cinnamulgus	ibidem	Coleos	126.c
χελὶς	132.c	κὲκελος	62.c.120.h	καλὶος	ibidem
χελιδὼν	132.h	Circus quadrupes	62.c	Colias	166.h.167.a
Chenalopecx	ibidem	Circus avis	120.h	καλὶος	ibidem
Chenarotes	133.c	Cirrus	193.f	καλὶος	126.c
Cherfinc	91.h	Cis	195.b	κὲκελος	161.h
Cherfydrus	97.g	κὲς	ibidem	κελὶος	124.h.125.b
χέμιος	79.c	κὲκελος	150.g	Collostrati infantes	51.a
χέμιος	ibidem.d	κὲκελος	ibidem	κὲκελος	94.g.95.a
Chitrogryllus	69.g	κὲκελος	ibidem	Colora	ibidem
χλορεὺς	128.a	κὲκελος	ibidem	Colos	81.d
Chloreus	115.c	Citharus	ibidem	κὲκελος	ibidem
χλορεὺς	127.g	κὲκελος	125.g	Coluber	98.d
Chlorion	118.f	Ciuiles animantes	26.h	Colubra	ibidem
χλορεογαύρος	94.b	Claderinchus	128.c	Columbus	113.b
χλορεογαύρος	58.c.g	Clamaroria avis	135.c	Columba	ibidem
χλορεὺς	84.f	Clangus	119.c	Columbarum genera	114.b
χλορεογαύρος	163.f	Claria	170.c	Columba agrestis	113.c
Chordus	75.g	Clerus	181.b	Columba saxatilis	ibidem
Chremes	154.b	κὲκελος	ibidem	Columba domestica	ibidem
χέμιος	ibidem	Cluina avis	135.c	Collurio	118.c
χέμιος	ibidem	Clupea	162.d	κὲκελος	ibidem
Chremys	ibidem	Clypea	ibidem	κελὶος	220.a
Chromys	133.h	κὲκελος	218.c	Colycia	212.h
Chrysaetos	119.h	κεκρυφία	107.a	Colymbis	133.g
χρυσέλιος	176.g	κεκρυφία	126.d.185.c	Colymbus	ibidem
Chryseos lupus	62.c	κὲκελος	189.h	Concha	215.b.c
Chryseos piscis	156.h	Cobio	160.h	κὲκελος	ibidem.b
χρυσέλιος	126.g	Cobius	ibidem	κὲκελος	ibidem.c
χρυσέλιος	156.f	κὲκελος	ibidem	κὲκελος	ibidem.b
κὲκελος	139.f	Cobio fluuiatilis	ibidem	Concha longa	217.d
Cibotis	161.h	κὲκελος	160.d	Concha ueneriz	201.a
κὲκελος	ibidem	κὲκελος	ibidem		213.c
Cicada	190.a	κὲκελος	ibidem	Concha margaritifera	216.f
Cicadastra	ibidem.d	Coccyx avis	121.f	Conchylum	207.c.213.a
Cicadamuta	ibidem.e	Coccyx piscis	151.f	Condylos	214.b
Cicada furcularia	190.d	κὲκελος	211.h	Conger	148.f

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

κνίς	196.d	Crangines	ibidem	Cynorhais	196.f
κνίς	189.g	αεγρονελάτης	187.g	Cynodexia	170.c
κνίς exiguæ	195.d	αεγρος testaceus	215.c	κνίς αλμα	163.a.b
Cophias	103.b	Cremys	154.b	κνίς δία	ibidem
Cophion	192.h	Crex	130.c	κνίς quadrupes	58.g
κνίς	122.g	κνίς aries marinus	173.f	κνίς piscis	146.d
κνίς	124.h	κνίς quadrupes	77.g	κνίς παραχρυσίς	ibidem.e
Coracinus	157.b.158.b	Crocodilus	90.d	κνίς γαλλίς	ibidem.f
κνίς κνίς	161.h	κνίς κνίς	ibidem	Cyperinus	169.g
κνίς f.avis	124.c	Crocodilus terrestris	ibide.h	κνίς piscis	153.c
κνίς f. piscis	158.b	Crocota	63.f	κνίς squilla	207.a
κνίς	ibidem	κνίς	ibidem	Cyprianus	169.g
Cordus	75.g	κνίς	196.f	Cyprinus	ibidem
Cordulus	158.e	Crustata	203.a	Cypseli	123.h
Cordula	163.h	Crustacea	ibidem	Cyrogryllus	69.h
Cordyla	ibidem	κνίς	216.g	Cytheria	151.a
κνίς κνίς	158.e	Cuculus avis	105.c.121.		
κνίς	ibidem	κνίς	f.g.122.a	D	
κνίς cimices	197.a	Cuculus piscis	152.f	Dacnades	134.h
κνίς piscis	151.a	Cucumis	170.h	Dactylus	217.b
Cornix	124.f	Culex	189.d	δακτύλος	217.b
Cornix fusca	ibidem.g	Culex palustris	ibidem.h	Dama	79.b
Cornix marina	130.a.134.a	Culex Mulio	186.g.189.h	δαμάριον	75.b
Cornops	191.f	Culex uariatus	190.a	δαμάρις	ibidem
Cornuta	173.c	Culex ficarius	189.h	δαμάρις	160.c
κνίς	124.f	Culicilega	126.d	Dasyllus	ibidem
κνίς θαλάσσιος	124.a.134.f	Cuniculus	67.c	Dasyllus	67.b
Coruus	124.c	Curculio	194.g	δακτύλιος	ibidem.a
Corvus aquaticus	134.a	Curfones	140.f.173.f	δακτύλιος	127.b
Corvus marinus	ibidem	Curfones	ibidem	Delcanus	167.c
Corvus piscis	158.c	Curfones caneri	206.h	Delichnus	170.c
κνίς	215.c	Curuea	127.g	Delici	84.f
κνίς κνίς	117.c	κνίς	188.h	Delphin	171.f
κνίς κνίς	ibidem	κνίς avis	118.f	Delphinus	ibidem
κνίς	ibidem	κνίς phalangium	187.c	Delphis	ibidem
κνίς κνίς	165.c	κνίς	ibidem	Diarium	193.d
Coryphia	212.h	κνίς	165.c	Dicetus	135.c
Corythia	ibidem	Cychramus	116.d	Dicetus	ibidem
Cosfies	193.h	Cycpia aquila	120.d	διεχνηλός	159.c
Cosfi	ibidem	Cygnus	133.b	Dilichnus	170.c
κνίς avis	118.b.c	κνίς	ibidem	Diomedes aues	133.c
κνίς piscis	157.a	Cygnus	ibidem	Dipfas	100.a
κνίς	160.h.161.c.170.b	κνίς	22.f	διχνηλός	53.c
κνίς	161.c	Cymindis	121.a	Dyldeti	187.f
κνίς	170.b	Cynchramus	116.d	κνίς	ibidem
Cottus	ibidem	Cynedus	155.a	κνίς	207.f
κνίς avis	118.b.c	κνίς lupi	62.b	Donax	217.c
κνίς piscis	157.a	Cynocephalus homo	50.d	Dorcadus Lybicæ	81.b
Corurnix	161.b.c	κνίς	58.c	Dorealis	80.h
κνίς κνίς	175.c.191.g	Cynoglossus	150.c	Dorcas	ibidem
κνίς κνίς	67.c	Cynomya	196.f	Darcus	ibidem
κνίς κνίς	158.f	Cynopteropos	50.d	Dorx	ibidem
Crabrones	183.c	Cynops	170.c	Draco serpens	101.g
αεγρότης	207.b	Cynopus	ibidem	κνίς	ibidem

ET INDEX.

Dracæna	101.g	Eleginus	170.d	Equus marinus	173.e
Draco marinus	ibidem	Ελας	69.d	Erica	162.g
Draco uerus	ibidem	Ελας Ελας	93.b	Erinaceus	66.e
Draco Epidaurius	ibidem	Eleos	ibidem	Erinaceus terrestris	ibidem
Dracunculus piscis	158.g	Elephas	56.f	Ερις	79.d
Dracunculus uermis	196.a	Elephantus	ibidem	Erichroton	115.e
Dracunculus	ibidem	Elephantus marinus mon-	173.b	Etrismus	162.d
Drepanis	123.g	strum	173.b	Ερδης	130.g
Dromades quadrupes	82.f	Elephantus ciustatus	204.h	Ερδης Αδης	ibidem
Dromadary	ibidem	Eleotris	170.c	Ερδης	97.f
Drumadary	140.c.173.c	Ellops piscis	154.g	Ερδης	ibidem
Dromades	ibidem	Ελμς	195.g	Ερδης	ibidem
Dromones	173.a.c	Ελμς Αλκην	ibidem.h	Eruca	193.a.b.c
Dryinus	98.d	Ελμς Ερδης	196.a	Erucæ olerum	ibidem.c
Dryinus Αλκην	125.c.	Elops serpens	102.f	Erucæ Tichymali	ibidem
Dryinus	126.b	Elops piscis	154.g	Erythacus	127.g
Dryinus Αλκην	93.f	Ελμς Αλκην	ibidem.c	Erythacus	152.g
Dryophytes	ibidem	Ελμς Αλκην	158.b	Erythacus	ibidem
Dryophytes Αλκην	ibidem	Ελμς Αλκην	88.g	Erythacus fluminalis	ibide
Duces apum	177.g	Ελμς Αλκην	189.f	Ερδης oues	76.c
E		Ελμς Αλκην	92.c.f	Ερδης	120.h
Eale	82.g	Eucrafilochus	161.f	Ερδης	ibidem
Echeneis	149.b	Encraulus	162.b	Ερδης	151.a
Echeneis	ibidem	Engraulis	161.h	Elos	169.c
Echeineæ ceruæ	81.a	Enhydrys serpens	98.a	Eloz	ibidem
Echeineis mus	69.c	Enhydrys quadrupes	70.g	Estis	170.d
Εχην	59.d	Ενυδρης quadrupes	ibidem.f	Æthya	129.h
Εχην	99.d	Ενυδρης Αλκην	25.g	Exanguia animalia	173.h.
Εχην	69.d	Ενυδρης Αλκην	173.a		
Εχην quadrupes	54.b	Ενυδρης Αλκην	25.g	Exocærus	158.c
Εχην Αλκην	66.c	Ενυδρης Αλκην	153.b	Ενυδρης	ibidem
Εχην testaceus	213.d	Ephemerum	193.d	Ενυδρης	154.e
Echini ouarij	ibidem.h	Επιδης	127.h	Ενυδρης	80.g
Echini candidi	ibidem.f	Επιδης	193.d		
Echinometra	ibidem	Epitragæ	138.f	F	
Εχην Αλκην	ibidem	Epodes	151.a	Faba	188.h
Echinophori	210.c.d	Epops	134.b	Faber	160.g
Echinophori	ibidem	Epserus	161.g	Facula	123.g
Εχην Αλκην	213.a	Επιδης	ibidem	Fario	170.b
Εχην Αλκην	148.b	Equicernus	81.h	Farris vermiculi	194.h
Εχην Αλκην	ibidem	Equifelis musca	165.c.	Feces	68.c
Εχην Αλκην	161.f	Equifelis musca	189.c	Fiber	70.a
Εχην Αλκην	ibidem.h	Equites cancri	206.a	Ficedula	127.e
Ægoliis	122.f	Equus	84.h	Fidipedes	109.g
Ελκην	2.c	Equus sylvestris	81.f	Florus	128.b
Elacatena	167.f.g	Equi feri	87.g	Flutz	148.a
Elacatenæ	ibidem	Equi Celtiberiz	ibidem.c	Formina	23.a.25.d.e
Ελκην Αλκην	ibidem	Equi Lybici	86.e	Forda	72.d
Ελκην Αλκην	79.c	Equi Mzotici	ibidem	Formica	185.a
Elaps serpens	102.f	Equus Indicus	ibidem	Formicæ quadrupedes	64.a
Elaps piscis	155.b	Equus generosus	86.a	Formicæ Indicæ	ibidem
Ελκην	127.c	Equus vulgaris	ibidem	Formicæ Herculanæ	185.c
Elca	128.d	Equus Mularis	ibidem	Formicæ equites	ibidem
Ελκην	ibidem	Equus fluuiatilis	81.f	Fringilla	127.c

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Fringillago	127.d	Gallioz fecundæ	110.f	Gracculus auis	124.h
Fringillarius	121.c	Gallinz Hadriaoz	ibidem	Gracculus piscis	158.c.g
Frugilega	125.a	Gallinago	117.g	Græcum pecus	76.d
Fuca	157.c	Gammarus	205.c	regiæ	98.f
Fucus	178.c	γαμ-λαίνυχε	104.b	regiæ	205.a
Fucus vesparum	183.g	Ganze	132.f	Griphes	155.e
Fulica	129.f	Gantzæ	ibidem	regiæ	ibidem
Fulix	ibidem.f	Garus	166.c	Gromphæna	131.f
Fullo piscis	170.a	Gauia	129.f	Grus	ibidem.f
Fullo scarabeus	192.b	γαλαρία	155.h.156.c	Grus marinus	168.a
Fulua aquila	119.f	γαλαρία	152.b	Gryllus piscis	148.f
Fur	178.f	γαλαρία	151.h	Gryllus insectum	191.d
Fuscæ piscis	139.f	Geotale marium	220.a	Gurgulio	195.b
Fusca cornix	124.g	Geotale	131.c	γυργυλίου	119.g
G		Gerres	163.d	ibidem	ibidem
γαλάς	155.h	Gerini	93.g	Gyrini	92.g
γαλαρία	215.c	Γερ-λαγ	195.d		
Galba	194.c	Gibbz squillæ	207.a	H	
γαλ-quadupes	68.a	Gibbz piscis	206.a	Hadrianæ gallinæ	110.f
γαλά piscis	146.a	Gionus	89.a	Hæmatopus	131.b
γαλά-αγρία	68.c	Gladius piscis	169.a	Hæmorhæus	100.f
γαλά-αγρια-θός	ibidem.a	Glanis	168.d	Hemorrhæus	ibidem
γαλάς	146.b.167.h	Glanus	169.b	Halecdo	128.d
γαλάς-λαγ	146.h	Glaos	63.a	Halcyon	ibidem
Galeus levis	ibidem	Glaos	214.a.219.a	Halcyonæ	ibidem
γαλάς-λαγ	ibidem.f	Glauciscus	156.c	Halecula	162.f.g
Galeus canicula	ibidem	Glaucium	133.g	Halecula rivalis	ibidem.g
Galeorum geocera	146.c.d	γαλακτίος	ibidem	Halefurius	155.b.220.a
γαλάς	167.h	Glaucus	156.c	Halitæus	119.g
Galcres	94.g.95.a	γαλακτίος	122.a	Halitæus	ibidem
γαλάς-θός	146.b	γαλακτίος	ibidem.b	Halpleumon	218.c
γαλάς-θός	ibidem	Glis	69.d	Hamia	167.b
Galerita	117.c	Glottis	130.f	Hæmodytes	100.d
Galeruca	192.a	ibidem	ibidem	Harpa	129.f
γαλακτίος	147.a	Glycyamarides	215.c	Halacænes	167.g
Galexias	ibidem	Glycyamarides	ibidem	Heladoa	200.d
Galgulus	126.g	γαλακτίος	ibidem	Helops	154.g
γαλακτίος	155.h	Glympicus	61.a	Hellips	ibidem
Gallinaceus	109.g	γαλακτίος	170.b	Hemerobioo	193.d
Gallus	ibidem	Gnapalus	135.d	Hemicroætos	154.f
Gallus gallinaceus	ibidem	γαλακτίος	119.h	Heminceros	158.b
Galli Tanagrici	110.f	γαλακτίος	165.h	Hepatus	133.a
Gallinacei Indici	113.a	Gobio	160.g.h	Hepiolus	181.b.193.c
Gallinacei Rhodii	110.f	Gobius	ibidem	Hercinæ aues	134.d
Galli Chalcidici	ibidem	Gobio fluviatilis	ibidem.h	Herculææ formicæ	185.c
Galli Medici	ibidem	Gobio saxatilis	161.c	Hercinæus	66.c
Galli Melici	ibidem	Gobius spinosus	ibidem.a	Herodius	130.g
Gallina	109.g	Gobiooaria	162.a	Herper	219.g
Gallinarum geocera	ibidem	γαλακτίος	148.f	Hiaticola	129.f
Gallina cothortalis	ibidem	Gonger	ibidem	Hiatula	157.c
Gallina uillatica	ibidem	Gorgon	77.f	Himantopus	131.c
Gallina rustica	112.c	γαλακτίος	ibidem	Hioous	89.b.c
Gallina Africana	ibidem	Gortineofis ouis	72.e	Hinnolus	ibidem.b
Gallina Numidica	ibidem	Gouyus	160.h	Hinus	89.c

ET INDEX.

Hinnularia	119.d	ἰννυλάρια	168.a	λαγυρίδις	67.h
Hippagros	81.f	ἰπποαγρός	ibidem.c	λαγυρίδις χαλκήρεξ	ibidem
Hippardium	ibidem.c	ἰπποαρδίον	62.d	λαγυρίδις	115.f
Hippilaphus	ibidem	ἰππολάφης	121.c	Lagopus	116.d.e.f
Hippidium	165.d	ἰπποιδίον	153.b	Lagopus altera	ibidem
Hippocampus	192.g	ἰπποκάμπος	159.c	λαγυρίδις ἀquila	119.f
Hippoë	206.h	ἰπποῖς	110.f	λαγυρίδις	67.b
Hippopotamus	85.h	ἰπποπόταμος	152.g	λαγυρίδις	ibidem
Hippurus	165.c	ἰπποῦρος	155.h	λαγυρίδις ἀπλάστως	202.f
Hippus	ibidem.d	ἰππός	115.c	Lalifioncs	88.d
Hircus quadrupes	78.e	ἰρικός	118.a	Lamia	145.h.146.e
Hircus piscis	123.b	ἰρικός	ibidem	λαμία	146.b
Hirudo	149.d	ἰλιός	ibidem	Lampyridcs	193.f
Hirudines rufæ	ibidem.f	ἰλιός	2.c	Lamyrys	170.d
Hirundo auis	123.c	ἰμμοσσίλος	120.d	Langa	62.h
Hirundo rustica	ibidem.f	ἰνκένδρια	135.d	Languria	ibidem
Hirundo agrestis	ibidem	ἰνκένδρια	88.d	Larus	129.e
Hirundo sylvestris	ibidem	ἰνκένδρια	175.a	λαρὺς	ibidem
Hirundo riparia	ibidem	ἰνκένδρια	195.b	Latax	70.f
Hirundo marina	200.h	ἰνκένδρια	195.g.h	λατάξ	131.c
Hirundo piscis	152.g	ἰνκένδρια	188.d.195.c	λατάξ	168.g
Hirundo polyo similis	201.b	ἰνκένδρια	157.a	Latus	ibidem
Histrix	66.d	ἰνκένδρια	ibidem	Laurices	76.f
Holothuria	218.a	ἰνκένδρια	156.h	Lezna	64.b
Homo	34.a.44.f.45.d.f.	ἰνκένδρια	170.d	λαζνα	153.b
48.a		ἰνκένδρια	81.a	λαζνα	167.g
Homo marinus	173.e	ἰνκένδρια	120.a	Lædus	126.g
Horda	72.d	ἰνκένδρια	206.a	λαϊδός	144.c
Hotion	131.e	ἰνκένδρια	165.d	λαϊδός	121.a
Hyæna quadrupes	63.a	ἰνκένδρια	84.h	λαϊδός	146.h
Hyæna piscis	163.g	ἰνκένδρια	185.c	Leudes	196.d
Hyæna monstrum marinum	173.c	ἰνκένδρια	194.b.195.b	Leo	63.g.101.a.172.e
Hybris	121.f	ἰνκένδρια	189.a.195.g	λεὼν	ibidem
Hycca	153.d	ἰνκένδρια	ibidem	Leo quadrupes	64.e
Hydra	98.a.f	ἰνκένδρια	129.b	Leo serpens	102.a
Hydrus marinus	97.g	ἰνκένδρια	72.e	Leo crustatus	207.b
Hydrus	98.c	ἰνκένδρια	ibidem	Leo belua marina	206.c.
Hypnale	99.c	ἰνκένδρια	195.b		207.e
Hyltix	66.d	ἰνκένδρια	127.e	Leantophoni	64.h
I				λεάντης	214.b
Iaculus	101.b	ἰνκένδρια	160.c	λεάντης ἀγρία	ibidem
Ibis	132.a	ἰνκένδρια	155.c	Lepidion	170.d
Ibyces	79.a	ἰνκένδρια	167.b	Lepidotus	ibidem.b
Ichneumo quadrupes	70.f.g	ἰνκένδρια	93.h	Leporaria aquila	119.f
Ichneumo uelra	184.b	ἰνκένδρια	94.a	λεπιδίτις	167.e
Ichne	136.e	ἰνκένδρια	94.a	Lepus	55.c.67.b.c.g
ἰχνηφόρος	139.f	ἰνκένδρια	94.a	Lepus marinus	202.f.g
ἰχνηλάτης	142.d	ἰνκένδρια	94.a	λεπιδίτις	130.h
ἰχνηλάτης	ibidem.e	ἰνκένδρια	94.f	λεπιδίτις	160.b
ἰχνηλάτης	ibidem	ἰνκένδρια	78.b	Leuciscus	ibidem
ἰχνηλάτης	ibidem	ἰνκένδρια	126.e	Leucomenides	163.e
ἰχνηλάτης	163.e	ἰνκένδρια	185.d	Leuconocula	81.d
				Leuconocula	ibidem
				Leuis accipiter	122.a

ANIMALIYM NOMENCLATURAE

Levis mustelus, uel Galeus	146.	Lytra	70.h	Mendefius	170.d
Leuriraia	144.e	Machlis	86.a	Mergus	130.a
Libella	149.b	Maia	206.a	Mergus marinus	ibidem
Liberides	67.h	μαῖα	ibidem	Merops	117.e
libēs	162.e	Maiales	83.f	Merula auis	118.b.c
Lignipetdis	193.f	Mæna	162.h	Merula altera	ibidem
Ligurinus	126.h	μαῖνῆς	ibidem	Merula piscis	157.a
Limax	210 d.211.h	Mæzotes	170.e	μέρυξ	151.g
Limosa	163.h	μαλάκια	189.b	Metachocerus	157.a
λίμας	214.e	μαλακίαι	ibidem	μετὰχορος	ibidem
Lingulaca	151.f	μαλακίαι	203.a	Metagon	61.c
Liparis	170.d	μαλακίαι	142.2.c	μετὰρις	177.d
Livia	114.c	μαλακίαι	118.f	Metys	170.d
Locusta insectum	190.g	Malleolus	150.c	μίαια	194.g
Locusta marina	204.c	Malthe	146.a	Miliaria auis	106.c
Loligo	201.b	μαλθε	ibidem	Millepeda	188.d
Lollius	201.b.202.d	μαλθῆ	ibidem	Millipes	ibidem.e
Lucanus	192.b.h	μαλθῆς	219.a	Miluzo	152.g
Lucerna	152.g	Manos spongia	ibidem	Milvus	121.c
Lucius	169.f	Mantichorus	71.g	Milvus auis	ibidem
Lumbrici terrestres	195.g	Margaritifera concha	216.g	Milvus piscis	152.g
Lumbrici intestinorū	ibide	Marinus piscis	170.d	Mitulus	215.f.216.c
Lumbricus teres	196.a	Mario	169.a	μίτυλος	216.b
Lumbricus latus	195.h	Mars	68.e	Mollia	198.b
Luna piscis	170.e	Martes	ibidem	Molliceps	118.f
Lupus auis	125.a	Mastace	191.e	Moluris	191.c
Lupus araneus	186.e	Matres apum	177.h	Molurus	102.a
Lupus phalagij genus	187.b	Matrix uesparum	183.g	Monapos	74.f
Lupus piscis	155.c.d	Matrix auis	ibidem	Monedula auis	124.a
Lupus lanatus	155.c.156.b	μάρις	155.h	Monedula piscis	167.f
Lupus varius	155.f.156.b	Mæa	206.a	Monoceros	71.h
Lupus maculosus	ibidem	μάκας piscis	199.d.f	μονόκερας	2.a
Lupus lyncis	ibidem	μακάντης	119.f	μονόκερας lupi	62.b
Lupus forotulienfis	155.f	Melantoryphus	127.d.e	μονόκερας	207.f
Lupus quadrupes	62.a	Melandrinus	157.h	Monticola	127.d
Lupus ceruarius	ibidem.f	Melandrys	165.2.d	Montisfringila	ibidem.c
Lupus canarius	ibidem.h	Melanthini	133.a	μόνιχα	84.h
Lupi piscatores	ibidem.b	Melanurus serpens	100.d	Mordella	193.c
Luscinia	127.f	Melanurus piscis	152.e	Mormur	156.b
Lucaria pelamis	163.h	157.g		Mormylos	ibidem
Lutca	128.a	Melcagrides	112.d.e	Mormyros	ibidem
Luteola	127.g	Meles	68.c	Mormyres	ibidem
Luteus auis	115.c.128.a	Melænaetos	119.f	Morphnos	119.f
Lutra	70.b.f	Melicambales	211.g	Morphnus	ibidem
Lutris	ibidem.f	Melichloron	185.h	Morphna	ibidem
Lycaon lupus	62.f	Melissa	177.g	μίρως	72.c.73.b
Lycaon canis	60.f	μελίσα	ibidem	Muco piscis	160.d
λύκος	62.a.125.a.186.c	Melolontha	211.g	Mugil	159.b
187.h		μολονθη	192.a	Mugilis	ibidem
λύξ	62.f	μολονθη	ibidem	Mugilicijunus	ibidem.c
Lynx	ibidem	μολονθη	161.f.162.a	Mugil sponiailis	ibidem.d
lynx	163.d	Membrades	ibidem	Mula	88.g.89.c
Lytra	196.b	Memnonides	134.a	Mula Syriaca	89.b
		Memnonides auct	ibidem	Mulæ Africanæ	ibidem.a

ET INDEX.

Mulx Cappadoces	ibidem	μύρξ	151.g	O	
Mulio culcx	189.d	Myrinus	150.a	ὄμυς	130.h
Mullus	151.h.152.d	μυρείνος	189.a	Oculata	158.b
Mullus lutarius	152.b	Myrma	156.b	Odynolion	149.c
Multifida	53.c	μύρμηξ insectum	185.b	Oenanthe	127.d
Multipeda	188.d.g	μύρμηξ quadrupedes	64.a	Oenas	114.b
Mulus	88.g	μυρμάνχορ	188.c	ὄινος	ibidem.h
Mulus Indicus	89.c	Myrmecion	ibidem	ὄις	75.d
Muræna	147.c	Myro piscis	98.c	ὄιστρος	189.c.h
Muræna fluviatilis	148.b	μύρς	147.f	Oestrus musca	ibidem
Murex	212.c.h.213.b.214.d	μύς quadrupes	68.f	Oestrus inter apes	181.a
Muripus	150.a	μύς piscis	157.b	189.c	
Murus	147.f	μύς testatus	215.f	ὄιστρος in Thinnis	164.c.
Mus piscis	157.b	μύς testata	216.c	196.h	
Mus marinus	92.c	μύς ακαλλώδης	ibidem.b	ὄιστρος marinus	ibidem
Mus aquaticus	ibidem	μυσταίτης	149.d	ὄλας	186.c
Mus quadrupes	68.c	Mythus	170.d	ὄλσθον	2.b
Mus sylvestris	ibidem.g	Mythus	ibidem	ὄλσθων	124.a
Mus agrestis	ibidem	μύθης	159.c	ὄλσθων	175.h
Mus Niloticus	68.h	μύθς	ibidem.d	Olor	133.a
Mus Alpinus	69.c			Onager	88.c
Mus Aegyptius	ibidem	Nabis	82.c	ὄνητρος	ibidem
Mus Ponticus	ibidem	ναβίδης	46.c	ὄνητρος ἄχρως	ibidem
Mus Africanus	ibidem.d	Νάβη	145.a	ὄνις	151.f
Mus Indicus	70.h	Narica	162.b	ὄνισκος piscis	155.g.h
Mus Araneus	69.c	Narex	213.b	ὄνισκος multiples	188.g.h
Musca	189.a	Natrix	97.g	Onocentaurus	72.a
Musculus marinus	149.d	Nauplium	200.g	ὄνις multiples	188.h
Musculus piscis	149.d.172.f	Nauticus	ibidem.c.f	ὄνις πλόπιδες	ibidem
Musculus testatus	215.f	Nautilus	ibidem	ὄνις quadrupes	87.d
Musculus quadrupes	68.h	Neades	209.h	ὄνις ἰσθμίου	88.d
Musimone	77.f	νήδες	81.a	ὄνις piscis	155.g.h
Musimon	ibidem	νήροφίρος	119.d	ὄνις locusta	191.c
Mustela piscis	147.b	Nechdalus	185.a	Onocrotalus	133.b.c
Mustela marina	ibidem.c	Nereides	173.d	ὄνις	217.b.c
Mustela quadrupes	68.a	Neritica	201.b.213.a.d	ὄνις	98.e
Mustela domestica	ibidem	νηρίτις	213.b	ὄνις	ibidem.f
Mustela vulgaris	ibidem	Νήρις	133.f	ὄνις	188.d
Mustela sylvestris	ibidem	νήρις ἄχρως	133.h	Ophiogenes	50.g
Mustela rustica	68.c	νήρις	159.c	Ophiomachus	191.c
Mustelus	147.c	νήρις	133.f	Ophion	81.d
Mustelus levis	146.h	νήρις φίρος	119.c	ὄνις	95.h.97.f.103.a
Mux	189.a	νήρις	146.f	ὄνις θαλάσσιος	98.c
μύχρος	103.a	Nifus	120.c	Orisophagi pisces	170.d
μύχς	215.f	Nitedula	193.f	Orata	156.h
μύχλις	69.f	Noctua zuis	122.b	Orca	172.g
Myrica	216.c	Noctua piscis	155.b	Orchys	176.h
μύλακρος	197.g	νομός περὶ περὶ	114.c	Orcynus	165.c
Myloccos	197.c	Nouacula	150.a	Orcynus	163.h.165.a
Myllus	166.g	νοκτίς poluctis	71.c	ὄρβις	88.g.89.a
Mylus	ibidem	νοκτίς piscis	154.f	ὄρβις	127.d
μύλος	189.c	Nycticorax	115.g.122.g	ὄρβις ἄχρως	119.g
μύλορος	69.d			ὄρβις χάλυψ	92.f
μύλορος	147.c			Oripe	195.d

ANIMALIUM NOMENCLATURA

οἰκτι	195.d	οἰκτι	133.h	Pedicularum genera	196.f
οἰκτι	503.c.104.d	οἰκτι ἀφροδισ	214.c	Pedicular piscis	152.f
Oropizces	227.c	οἰκτι θαλάσσιος	ibidem.d	Pedicular marinus	196.g
οἰκτι	ibidem	οἰκτι	115.g	Pedicular terrae	192.b
οἰκτι	153.h	Ozenna	200.c	Pelagii pisces	168.2
Orphas	154.b	Ozolis	ibidem	Pelamis	164.c.165.b
Orphus	153.h		P	πέλαμις	163.h
οἰκτι	ibidem	Pagrus	153.a	Pelamis lutosa	ibidem
οἰκτι	ibidem	Pagrus fluviatilis	ibidem	Pelamis limatia	ibidem
οἰκτι	ibidem	Pagus	ibidem	Pelargus	131.g
Orfodacne	193.c	Pagurus	209.a	πέλαργος	ibidem
Orthroriscus	163.e	Palmipedes	132.e	πέλαγιος	ibidem.f
οἰκτι	117.f	Palumbarius accipiter	121.a	πέλαγος	114.c.115.a
οἰκτι	130.c.f	Palumbus	114.b.d	Pelias auis	ibidem
Ortygometra	ibidem	Palumbus	ibidem	Pelias serpens	102.f
οἰκτι	116.a	Palumbus torquatus	ibidem.h	Pella	130.h
Oryx quadrupes	79.b	πελαγία	1.h.107.a	Pellos	ibidem
Oryx marinus animal	172.h	Panthera	65.c	πέλος	ibidem
Ossifraga	120.a	Panthera marina	173.c	Peloridae	115.b.c
Ossifragus	ibidem	πανθήρ	63.h	πέλοριδες	ibidem
Ofmilia	200.c	Papauer piscis	170.d	πέλαγος	157.h
Ostophagi	170.d	Papilio	176.h.593.b	πέλαγος	184.g
οἰκτι	207.c	Para	127.d	Penelops	133.c
οἰκτι	ibidem	Parcus	117.h	πέλωλος	ibidem
Ostrea	214.c	Parnus	119.c	πέλωλος	593.c
οἰκτι	207.c.214.c	πέλαγος quadrupes	65.d	Penicillus	219.b
οἰκτι	ibidem	πέλαγος marina	573.c	πενιδικάπυλος	211.g
Ostreum	ibidem	Pardalus auis	118.g	Pentada styles	ibidem
οἰκτι	214.d	Pardus	65.f	Perca	157.c
οἰκτι	ibidem	Pareas	102.f	πέρας	ibidem
οἰκτι	115.c.f	Pareus	ibidem	πέρας	ibidem
οἰκτι	ibidem.c.g	Paras	ibidem	Percis	ibidem
οἰκτι	ibidem.f	Parnops	191.f	Perca fluviatilis	ibidem.d
Orus	ibidem	Parous	508.f	Percnopterus	119.f
Ovipera animalia	89.c	παρόνος	102.f	πέρας	121.a
Ovis	75.d	Parias	ibidem	Perdix	116.a.b.c.g
Ovis erythri	82.f	Parus auis	127.d	Perdix altera	ibidem.g
Ovis erythri	ibidem	Parus piscis	170.d	Perdix rustica	117.a
Ovis testis	76.d	Passer auis	126.h	Percus	113.c
Ovis Colonica	ibidem	Passer piscis	150.d	πέρας	ibidem
Ovis villatica	ibidem	Pastinaca	144.g	πέρας θαλάσσιος	ibidem
Ovis Tarentina	ibidem	Patange	213.h	πέρας θαλάσσιος	ibidem
Ovis mollis	ibidem	Patella	214.d	Perna	217.d
Ovis hirta uel hirsuta	ibidem	Patella fera	ibidem	Pernes	211.a
Ovis aprica	ibidem.f	πατέλλα	79.e	Perseus piscis	555.g
Ovis aprica	ibidem	Pauo auis	512.f	Petrei pisces	141.h
Ovis fera	77.c.82.f	Pauo auis	ibidem	πέρας	21.g
Ovis fera	82.f	Pauo piscis	170.g	πέρας	511.a
Ovis borinensis	77.c	Pecten	216.g	πέρας	513.a
Ovis Arabica	ibidem.f	Pectunculus	ibidem	Phagrus	ibidem
Ovis marina	173.f	Pecus Graecum	76.d	Phagrus fluviatilis	ibidem
Ovis marina	173.f	Pecus marinum	173.c	πέρας	82.170.c
Ovis Polypi	206.e	Pedicular	556.d	Phagorior	ibidem
Oxyrinchus	168.b.170.b	Pedicular ferus	ibidem.c	Phalacrocorax	134.a

ET INDEX.

φάλακx belua mazina	172.f	Phycus	ibidem	Platiurus	186.f
φάλακx papilio	193.c	Phyca	170.d	Plaryccos	80.g
Phalangium	186.d	Phyfa piscis	ibidem.c.f	Plesti	162.b
φάλαγγις	ibidem	Phyfetet	172.h	Plotæ	148.a
Phalangius	ibidem	φυστήρ	ibidem	πλάττης	160.c
Phalanx	ibidem	Phyffulus piscis	171.a	πλάττης	218.b
Phalangiorū genera	187.d.g	φύσκαλος cete	173.a	πλάττης	ibidem
Phalangia leguminū	ibidē.f	Phytharus	170.d	Pæphagus	86.h
Phalatis	133.h	Pica	125.g	πικίλα ζῷα	2.a
φάλακx	121.c	Pici, id est Gryphes	136.b	πικίλα piscēs	163.c
Phaleris	133.h	Picus martius	125.b.126.b	πικίλα auis	126.f
Phalerica	161.f	Picus arborarites	125.c	πικίλος piscis	146.h
φάλακx αφύς	ibidem	Pinna	216.c	πικίλα ζῷα	27.h
Phanger	153.a	πίττα	ibidem	πικίλα ζῷα	2.b
φάλακx	114.d	πιννοφύλαξ	ibidem.d.f	Polypus	199.d
Phascades	133.g	Pinnoter	206.g	πλύπυς	ibidem
Phasiana	115.d	πινότηρ	ibidem	Polypi ouum	20.c
Phasianus	ibidem	Pinoter Plinij	206.e.g.216.d	πλυνχέλι ζῷα	53.c
Phasianicus	ibidem	πινότηρ Aristotelis	ibidem.g	πικίλα cochleæ	210.d
φασκοφίτος	121.a	πινότηρ	ibidem	Pomilio	46.c
φάσκι	114.d	Piphex	121.d	Pompiliæ	164.c.200.g
Phattage	91.d	Pipo	126.d	Porca	83.b
φάλακx	120.a	πίσκα	ibidem	Porcus quadrupes	84.f
Philomela	127.f	Piscis	136.c	Porcus piscis	163.e
φίλις	120.a	Piscis sacæ	155.a	Porcus marinus	ibidem
Phocæna	172.d	Piscēs pelagij	168.a	Porcus fluuiatilis	ibidem.g
Phœnicopterus	129.b	Piscēs laxatiles	141.h	πέρδελος	65.d
Phœnix	134.f	Piscēs παρταί	ibidem	πέρδελος ζῷα	1.b
φόνις	ibidem	Piscēs fufanei	139.f	Pornops	191.f
Phœnix piscis	166.b	Piscēs cufiores	140.f	πορφύρε	212.a
φασκοφίτος	127.g	Piscēs cufiones	ibidem	Porphyrio	132.a
Phoix	129.c	Piscēs molles	142.a	πορφύρεος	ibidem
φάλακx	214.d	Piscēs μαλακὰ ζῷα	ibidem	πορφύρεος	ibidem.c
φάλακx τῆ	161.h	Piscēs duri	ibidem	Porphyrus	101.f
Pholis	160.d	Piscēs σκληρὰ ζῷα	ibidem	πέρδελος	75.b
φάλακx	ibidem	Piscēs cetacci	ibidem.d	πέρδελος χείρες	163.g
φάλακx	178.f	Piscēs longi	147.d.e	πορφυροειδής	197.g
Phoxinus	169.h	Piscēs plani	150.d	πορφυροειδής	163.c
Phryganion	219.g	Piscēs kofiles	170.c	πορφυροειδής	ibidem
φρυγανίτης	121.a	Piscēs uocales	163.e	πορφυροειδής	ibidem.c
φρυγανίτης	93.g	Piscēs lethales	171.a	πορφυροειδής	101.f
φρυγανίτης	ibidem.c.d	Piscis candidus	155.a	πέρδελος	75.b
φρυγανίτης	ibidem.c	Piscis lachry	ibidem	πέρδελος	163.g
φρυγανίτης	ibidem.h	Pistrix	172.h	πέρδελος	197.g
φρυγανίτης	ibidem	πίστρις	57.h	πέρδελος	163.c
φάλακx	196.d	Pityocampe	192.f	πέρδελος	100.a
φάλακx	ibidem	Plancus	119.c	πέρδελος	ibidem.b
φάλακx	ibidem.g	Plangus	ibidem	πέρδελος	172.h
Phuca	157.g	Plaralea	131.f	πέρδελος	164.b
Phycen	ibidem	Platanista	169.d	πέρδελος	172.h
φάλακx	ibidem	πλάτανος	157.h	πέρδελος	ibidem
Phycis	ibidem	Plarea	131.f	πέρδελος	172.h
φύσις	ibidem	Plaristacos	155.h.166.g	πέρδελος	163.f

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Ααμμήτις	163.f	Raia stellata	ibidem.e	Rubeta muta	ibidem.a
Ααίετος	118.c	Rana	92.f	Rubetarius accipiter	121.e
Ααίετος	ibidem.	ῥάνα	103.c	Rubeira	127.h
Ααίετος	189.h	Rana fluuiatilis	ibidem.g	Rubicilla	128.a
Ααίετος	150.d.f	Rana aquatica	ibidem.	Ruminalis	151.h
Ααίετος	150.d	Rana lutaria	ibidem.h	Rupex	129.f
Ρίτις	125.f	Rana palustris	93.c	Rupicupra	79.h
Ααίετος	ibidem.	Rana rubeta	ibidem.d	Rustica perdix	117.a
Ρίτις	ibidem.	Rana mura	ibidem.f	Rusticula	ibidem.
Ααίετος	ibidem.	Rana uiridis	ibidem.	Ruticilla	128.a
Ααίετος	150.e.d	Rana levis	ibidem.g	S	
Ααίετος	193.c	Rana Dryphytes	93.f	Sacer serpens	102.g
Ααίετος	158.c	Rana Diopetes	ibidem.	σακεῖται κέρως	77.g
Ααίετος	195.b	Rana Calamiae	ibidem.	Sacer piscis	155.a
Ααίετος	158.b	Rana ex arbore uociferans		Sacres	84.g
Ααίετος	196.h	ibidem.		Sagittarius piscis	159.a
Ααίετος	186.d	Rana piscatrix	145.e	Salamandra	97.a
Ααίετος	196.h	Rana marina	ibidem.	Salar	169.c
Ααίετος	170.a	Rana uermis	194.c	Salmo	ibidem.d
Ααίετος	175.a	Redinius	127.c	Salpa	160.c
Ααίετος	67.b	Reges apum	177.h	Salpe	ibidem.
Ααίετος	ibidem.a	Regulus	127.h	σαλπίς	ibidem.
Ρεγας	99.a	Remora	149.b.c	σαλπίς	ibidem.
Ρεγνις	121.b	Rex auium	128.c	Salpyga	186.g
Pulex	197.d	Rex	ibidem.d	Salpuga	185.d
Pulex araneus	186.d	Rhacinus	170.d	Salus auis	126.g
Pulex uermiculus	197.d	Rhagion	187.e.g	Sanguisuga	149.d
Pulex marinus	196.g	Rhamphos	103.d	Sangualis	120.c
Pulla aquila	119.f	Rhaphis	148.h	Saperdes	158.a
Pulmo	128.b	Rhaphius	62.h	ῥαπεδία	77.h.126.c
Pulmo marinus	ibidem.	Rhodo	169.c	Sarda	162.b.163.h.164.e
Purpura	212.a	Rhiades	150.b	Sardena	162.g
Purpuræ filius	ibidem.e	Rhina	144.e.f	σαρδηνία	ibidem.
Pygargus quadrupes	79.b	ῥίνα	ibidem.f	Sardinæ	ibidem.b.g
Pygargus auis	119.d	Rhyntaces	134.f	Sardinia	162.e
πυλακίτης	193.f	Rhinobatos	144.g	Sardinus	ibidem.g
Pyralis	195.c	Rhinoceros	75.a	Sargiacus	153.c
Pyrausta	ibidem.	Rhizes	ibidem.b	Sarginus	152.f
Pyrauta	181.b	ῥίζη	ibidem.	ῥαργίς	159.b
πυραυτὶς	ibidem.	Rhombus	250.d.e	Sargo	160.d
πυραυτὶς passer	127.h	Ricinus	196.f	Sargus	152.d.e
πυραυτὶς columbus	124.c	Riparia	123.g	Sario	169.g
πυραυτὶς	127.c	Riparia altera	ibidem.	Satherium	70.a
πυραυτὶς	193.f	Rostrum	103.c	Satheron	ibidem.
Pyrrhocorax	125.b	Rota capra	79.a	Satyrism	ibidem.
πυρρὸς	128.a	Rota marinum	monstrum.	Satyr ex hominum genere	
Q			173.a		50.c
Quadrupedes uiuipetæ	23.h	ῥάβδος	188.c	Satyrus simia	58.e
Quadrupedes ouipetæ	90.c.d	Rubecula	127.g	Saxatiles pisces	141.h
		Rubellio	152.h	σαυτὶς	93.h
Querquædulæ	133.h	Rubeo	ibidem.	σαυτὶς χαλκιδίς	94.c
R		Ruber	ibidem.	σαυτὶς	167.g
Raia	144.d	Rubeta	93.d	σαυτὶς quadrupes	93.h

ET INDEX.

σκῆρος piscis	157. a. 166. f. 167. f	Scorpio	185. f	Silurus	168. c. g
σκῆρος	163. g	σκορπίος	ibidem	Simia	57. h. 118. c
Scarabeus piscis	154. b	Scorpius	ibidem	Simiarum vulgus	57. h
Scarabeus insectum	191. h	Scorpius terrestris	ibidem	Simia porcaria	58. g
Scarabeorum insectorum genera	ibidem	σκορπίος χερταίος	ibidem	Simia Cynocephalo similis	ibidem. e
Scarabeus viridis	192. a	Scorpio piscis	158. h	Simia marioa	58. f
Scarabeus pilularius	ibidem. h	Scorpius piscis	ibidem	Simus	170. c
Scarabeus rutilus	ibidem. b	Scorpius marinus	ibidem	σίμα	126. c
Scarabeus longipes	ibidem. f	σκορπίος θαλάσσιος	ibidem	Siren	184. g
Scarabeus in Eriphia herba	ibidem. b	Scrofa	84. g	Sirenis	ibidem
Scarus	151. d	σκύλας	146. d. f	Sirenes	135. h
Scaurus	ibidem. g	Scylla auis	134. f	Sirulugus	219. g
Scepanus	170. d	Sylla piscis	146. e	Sis	195. b
Scepinus	ibidem	Scylla crustata	207. c	Sitrace	125. f
σχεστία	109. g	σκύμτος	146. f	σίτη	126. c
Schœniclos	129. b	σκύμτος	ibidem. d. f	Smartydes	63. a
σκιμλὺς	156. d	Scytale serpens	102. c. e	Smyrus	150. a
σκιμλίος	ibidem	Scytale Chalcidica	ibidem. d	Solea	151. b
σκιμλίος	ibidem	Scytale piscis	147. c	Solen	217. c
Scixoa	ibidem	Scythica auis	134. e	σολῆς	ibidem
σκιλας	91. b	Scyurus	66. h	Solidipedes	84. h
σκιμλίος	206. h	συσταγός	126. a	Solfuga	185. d
σκιμλίος	ibidem	σκιμλὺς	184. g	Solfuga in leguminibus	ibidem. c
Scincus	91. a. b	σολῆς	143. c	Solipedes	84. h
Scirris	170. d	σολῆς	ibidem	Solipuga	186. g
Sclerocephalon	187. h	Seleucides aues	134. c	Solpuga	ibidem
σκληροκεφαλόν	ibidem	Sempaliones	123. a	Solus	79. c
σκιμλίος	185. e	σενπάλιος	128. c	Sorex	68. g
σκιμλίος	107. a	Sepia	201. b	σῶξ	77. e
σκιμλίος	185. e	Seps quadrupes	94. c. g	Spargus	150. b
Scolecium	187. h	σῆς	ibidem	Sparus	156. f
σκολεκίος	ibidem	Seps serpens	100. h	Sparulus	ibidem
σκολεκίος	106. h	Seps multipes	188. d. e	σπαρῦλος	213. f
σκόλις	24. a	Serpens	95. g. 97. f	Sparangi	ibidem
σκόλιος uermiculorum genus quoddam	194. d	Serpens biceps	98. f	Spatiarus	102. c
Scolopax	117. c. g	Serpeos marinus	ibidem. c	Spermatologos	125. a
Scolopendra	188. d. e	Serpens sacer	102. g	Spermologos	ibidem
Scolopendra marina	ibidem. f	Serpens alatus	ibidem. h	σφῆνξ	183. e
σκολοπίδης	169. d	Serpens in sulphio	ibidem	σφῆνξ	187. f
Scombrus	166. h	Serpentes Indici	101. e	Spheneus	159. c
Scomber	166. h. 167. a	Serpentes cæci	103. b	σφῆνξ	ibidem
Scops	122. f	Serphus	185. e	σφῆνξ	184. f
σκόψ	ibidem	Serra marina	ibidem	Sphingium	58. c
Scopes perennes	ibidem. g	σῆς	173. a	Sphinx	ibidem
Scarodyla	163. g	Seseli	210. d	Sphondylus	214. b
Scordyla	ibidem. h	Sesclitæ	ibidem	σφῆνξ	ibidem
σκόρδυλος	ibidem	Seserinus	160. g	Sphondyle	102. h
Scordula	ibidem	Sicna	156. d	Sphyræoa	149. a
Scorpæna	159. a	Sileus	50. c	Spinax	146. d. h
Scorpides	ibidem	σίλας	197. d	σπινάξ	126. h
		Silua	127. g	σπινάξ	ibidem

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Spietutoix	135.d	Sudis	149.a	Terracola	117.h
Spius	126.h	Superz	193.c	Terrestria aimalia	35.g
Spiza	127.c	Sus	82.g.84.f	Testacea	207.e
Spizias	ibidem.d	Sus feta	83.h	Testata	ibidem
Spizites	ibidem	Sus piscis	167.f.g	Testudo	91.d
Spondylus	214.b	Sus marious	163.f	Testudo marina	ibidem.e
Spondyle	202.h	Synagris	83.h.84.g	Testudo lutaria	92.b
Spongia	118.g	Synodon	127.c	Testudo fluviatilis	ibidem.c
Spongia Achillea	219.a	Syluia	ibidem.g	Testudo terrestis	91.f
Sputia	129.g	Synagris	153.g	Testudines albæ	92.f
Spuma piscis	161.d	Synodon	ibidem.f	Testudines autæ	ibidem
Spuria	162.g	Synodotis	165.e	Testudines motanz	ibidem
Squalus	146.a.147.c	Synodus	153.f	Testudines igitur	ibidem
Squatina	144.e	Synodus	ibidem	Testudines Indicæ	91.f
Squatrinotaia	ibidem.g	Sytoia	136.b	Testudines corioigeræ	ibide
Squaraia	ibidem	Syrophodix	116.h	Tetartos	115.d
Squilla	203.b.206.g			Tetha	217.e
Squilla parua	206.a.f			Tethos	ibidem
Stella	133.e	Tabanus	189.e	Tethys	ibidem
Stella	118.a	Tamapiscis	150.g	Tethys	ibidem
Stellaris ardea	130.h	Tamia uermis	196.a	Tethyon	ibidem
Stellaris aquila	119.h	Tamias	117.c	Tetracon	115.h
Stellaris accipiter	121.a	Talpa	70.h	Terragon	ibidem
Stellaris piscis	146.h	Tamias	112.f	Tetragoathus	187.e
Stellio	94.f	Tamias	ibidem	Tetragathus	ibidem
Stellio transmarina	95.a	Tamias	ibidem	Tetrahoo	ibidem
Stimphalides	135.f	Tarandus	81.e	Tetraplyrides	191.f
Stimphalides	113.a	Tarda auis	115.e	Tetrax	115.d
Stimphalides	170.c	Tardus	147.f	Tetrax altera	ibidem
Strepticerotes	79.b	Tardus	ibidem	Tetrix	ibidem
Strix	135.g	Tardus	115.d	Tetrix	190.d
Strix	ibidem	Taura	72.d	Tettigonia	ibidem
Strix	160.g	Taurus quadrupes	72.d	Tettigonia	ibidem.d.e
Strix	211.f	Taurus	73.h	Tettigoniz	ibidem.d
Strix	17.c.210.b	Taurus Æthiopicus	74.c	Tettigoniz	ibidem.d
Strix	210.b	Taurus	75.a	Tettigoniz	ibidem.d
Strix	127.h	Taurus Indicos	75.c	Tettigoniz	101.b.202.e
Strix	126.h.136.c	Taurus auis	128.b	Tettigoniz	101.c.202.d
Strix	151.b	Taurus marinus	173.c	Tharis	170.d
Strix	136.c	Taurus scarabeus	192.a.b	Thassa	162.f
Struthio Africus	ibidem	Taurus	170.d	Thetta	ibidem
Struthio camelus	ibidem.b	Taurus	72.d	Thieldones	68.d
Struthio camelus	ibidem	Telline	216.a	Thos	62.d
Struthio	ibidem.c	Tentredo	184.e	Thos	ibidem
Struthius	ibidem	Tentredo	ibidem	Thranis	167.h
Struthopodes	50.e	Teragus auis	158.	Thranis	ibidem
Struthus	118.e	Teragus piscis	158.f.170.d	Thrastra	162.f
Subaquila	118.e	Tetredo uenmiculus	194.c.d	Thrastra	ibidem
Subis	135.e	Tetredo	ibidem	Traupis	122.g
Subin	ibidem	Tetredo	181.b.c	Thressa	162.c
Subulones	79.c	Teredines	ibidem	Thrips	ibidem
Subus	77.e	Teredo crabrooi similis	184.g	Thrips	194.c.195.b
Subutio	121.a			Thrips	194.f

TA RVTA ET INDEX MVLIANA

<i>Spiraea</i>	162.c	<i>Triton piscis</i>	ibidem.b	<i>Verricillus</i>	103.b
<i>Thynnus</i>	163.g.h.164.e	<i>Triton monstrum marinum</i>		<i>Verticillum</i>	ibidem
<i>Thyn</i>	213.a		173.c	<i>Vertraha</i>	60.h
<i>Thyni</i>	216.f	<i>Trochylus auis</i>	128.e	<i>Veruex</i>	77.g
<i>Thymalus</i>	170.a	<i>Trochus</i>	63.g	<i>Vespa</i>	183.f
<i>Thymus</i>	ibidem	<i>Trocta</i>	156.c.167.d	<i>Vespa fera</i>	ibidem
<i>Thynnus</i>	163.h.170.a	<i>Troglodytes</i>	127.d	<i>Vespa minor</i>	ibidem
<i>Thynnus</i>	ibidem	<i>Φαλῶται</i>	ibidem	<i>Vespa annua</i>	184.f
<i>Thyn</i>	163.g	<i>Trogon</i>	122.c	<i>Vesparum dux</i>	113.g
<i>Tigris</i>	64.h	<i>Troxallis</i>	191.d	<i>Vesparum fuci</i>	ibidem
<i>Tillo</i>	169.h	<i>Truones</i>	133.e	<i>Vespertilio</i>	71.e.f
<i>Tilos</i>	188.e.g	<i>Φυλῶν auis</i>	115.a	<i>Vespertilioes Arabice</i>	
<i>πλες</i>	ibidem	<i>Φυλῶν piscis</i>	144.g	<i>ibidem</i>	
<i>Tinea</i>	169.f	<i>Trixalis</i>	191.d	<i>Vinago</i>	114.h
<i>Tinea</i>	194.c.e	<i>Tubera</i>	218.c	<i>Vipera</i>	99.d
<i>Tinea lanaria</i>	ibidem.f	<i>Turbinata</i>	210.b	<i>Vipiones</i>	131.f
<i>Tinea lignaria</i>	ibidem.c	<i>Turbo auis</i>	125.c.126.a	<i>Vireo</i>	118.f
<i>Tinea alueorum</i>	181.c	<i>Turbo testatus</i>	211.g.213.c	<i>Virio</i>	ibidem
<i>Tinea agrestis</i>	193.b	<i>Turdus piscis</i>	142.a.157.a	<i>Vitiflora</i>	127.d
<i>Tinea uermis</i>	196.a	<i>Turdus auis</i>	117.h	<i>Vitra</i>	151.c
<i>Tinea taurina</i>	196.a	<i>Turdus pilaris</i>	118.a	<i>Virula</i>	72.c.75.b
<i>Tinnunculus</i>	121.b	<i>Turdus Iliacus</i>	ibidem	<i>Virulus</i>	ibidem
<i>Tiphle</i>	170.c	<i>Turpæna</i>	170.d	<i>Virulus marinus</i>	70.h.71.a
<i>Tirio</i>	172.e	<i>Turho</i>	172.e	<i>Viuerra</i>	67.h.68.e
<i>πιδωας</i>	114.d	<i>Turnus</i>	114.c.115.a	<i>Viuipera</i>	23.h
<i>τυναδίσχους</i>	168.a		118.a	<i>Vlula</i>	122.f
<i>Tomus Thurianus</i>	167.h	<i>Tympanus</i>	124.g	<i>Vmbilicus</i>	211.g.h
<i>Torpedo</i>	145.a	<i>Typhle</i>	170.c	<i>Vmbra</i>	156.c
<i>Torquilla</i>	125.c.126.a	<i>Typhline</i>	102.g	<i>Vmbra fluuiatilis</i>	ibidem.d
<i>Torrio</i>	172.e	<i>Typhlopes</i>	ibidem	<i>Vmbra marina</i>	ibidem.e
<i>πφλῶν</i>	62.b	<i>Tyrannus</i>	127.c	<i>Vmbri</i>	77.f
<i>Trachurus</i>	166.f		V	<i>Vncungues</i>	104.b
<i>Tragelaphus</i>	81.c	<i>Vacca</i>	72.d.73.d	<i>Vnguis</i>	217.c
<i>Φάσγ quadrupes</i>	78.e	<i>Vacca Altina</i>	ibidem.h	<i>Vuualuia</i>	207.f.208.e
<i>Φάγες</i>	219.a.c.g	<i>Vaginipennia</i>	175.c.191.g	<i>Voca</i>	163.b
<i>Tragus spongia</i>	ibidem	<i>Valeria</i>	119.f	<i>Volucra</i>	194.b
<i>Tragus piscis</i>	158.d.e.162.h	<i>Varia auicula</i>	126.f	<i>Vopiscus</i>	48.d
<i>Tragopa</i>	135.e	<i>Varix picæ</i>	125.h	<i>Vpupa</i>	134.b
<i>Tragopanades</i>	ibidem	<i>Varix quadrupedes</i>	65.f	<i>Vrax</i>	115.d
<i>Φίγες</i>	117.h	<i>Velta</i>	128.d	<i>Vranoscopus</i>	154.e
<i>Trichæus</i>	161.f	<i>Venatica auis</i>	118.d	<i>Vrena</i>	170.d
<i>Thrichias</i>	ibidem	<i>Venatrix</i>	ibidem	<i>Vri</i>	74.h
<i>Trichides</i>	165.c	<i>Veneriæ conchæ</i>	201.a.213.c	<i>Vria</i>	133.h
<i>Trichides</i>	161.f.162.a	<i>Vermis</i>	24.a	<i>Vrinatrix</i>	ibidem.g
<i>Φιγέφῶν</i>	77.h	<i>Vermes rubri</i>	194.a	<i>Vrfa quadrupes</i>	65.h
<i>Tridacna</i>	214.h	<i>Vermiculi farris</i>	ibidem.h	<i>Vrfa crustata</i>	207.c
<i>Φιλα</i>	151.h	<i>Vermiculi pomorū</i>	ibidem	<i>Vrfus</i>	65.h
<i>Φιλάς</i>	151.h.153.c	<i>Vermiculus cocci</i>	195.a	<i>Vrtica</i>	218.c
<i>Triglites</i>	161.g	<i>Vermiculi graminis</i>	ibidem	<i>Vua piscis</i>	170.d
<i>Φιγῆλα</i>	152.f	<i>Vermes in niue</i>	ibidem.c	<i>Vulpanfer</i>	132.h
<i>Tringa</i>	129.c	<i>Vermes terreni</i>	ibidem.d	<i>Vulpecula uolucris</i>	71.g
<i>Triorchis</i>	120.g	<i>Verres</i>	83.f.84.g	<i>Vulpecula piscis</i>	146.g
<i>Tritomum</i>	165.d	<i>Vetribulum</i>	217.h	<i>Vulpecula marina</i>	ibidem

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

Vulpes quadrupes	66.h	ὑαυκα piscis	163.g	Z	
Vultur	120.a.b	ὑαυλῆς	ibidem	Zegeries	2. 69.d
		ὑαυλῆς	121.c.f	Zeus	160.g
X		ὑαυλῆς	153.d	Zigmis	94.c
Xanthias	165.b	ὑαυλῆς	120.c	Ζεῖς καὶ γῆρας	2. 26.c
Xilophthoros	193.f	ὑαυλῆς	193.c	Zoophyta	2. 117.c
Xiphias	167.g	ὑαυλῆς	127.h	Ζεῖς καὶ γῆρας	21. 23.h
ἡ φῆλας	ibidem	ὑαυλῆς	121.a	Zorx	2. 80.g
ἡ φῆλας	216.b	ὑαυλῆς quadrupes	82.g. 84.g	Zygza	149.b
		ὑαυλῆς	83.h		
Y		ὑαυλῆς piscis	163.f	FINIS.	
ὑαυκα quadrupes	63.a	ὑαυλῆς piscis	157.f		
		ὑαυλῆς	ibidem		

PARTIVM ANIMALIVM, NECNON

aliorum quorundam, ex quibus constituuntur co-
rum animalium differentia, Index.

A

A	Edomen	5.f.6.	Alcyonium	128.b	ἄγγιν	23.a
	b.c.84.c		Alex	163.c.166.d	Arteria	5.c.d
	Abomasum	19.h	ἀλματωδὴς membrana	18.b	Arteria aspera	ibidem
	ἀκακὶς οφθαλμὸς	14.c	ἀλμα	166.e	ἀρτηρία βραχὴ	ibidem
	ἀκακὶς ῥιγίτις		ἀλδοτικὴς	6.e	ἀρτηρία δ' ἡγ' ὁμοῦ	14.e
	138.d		ἀλας	4.f	Articulus digiti	7.a
	ἀκροῖος	ibidem	Aluus	11.g.46.f	Aranus	78.a
	Acetabulum	5.h.6.d.15.d	ἀμμορυαί	4.f	Aspera arteria	5.c.d.9.b
	Acetabula in matrice	38.f	ἀμυγδαλῆς	79.f	ἀσπὴς	4.g
	Acetabulorum gemina in animan- tibus mollibus usus	198.d	ἀμυγδαλῆς membrana	18.b	ἀσπὴς αἵματος	7.d.15.f.16.c.33.f
	ἀκιστὴς	6.e	ἀμυγδαλῆς	4.f	ἀσπὴς	164.a
	ἀκὴ	4.g	ἀμυγδαλῆς	8.d.h	Atlantion	16.a
	ἀκὴ	ibidem	ἀμυγδαλῆς	47.a	Atlas vertebra	14.b
	ἀκὴ	ibidem	ἀμυγδαλῆς	27.c	Atra bilis	20.f
	ἀκὴ	ibidem	ἀμυγδαλῆς	74.f	Atramentum in mollibus	198.g
	ἀκὴ	4.g.8.e	ἀμυγδαλῆς	7.b	Auricula	3.h.4.g
	ἀκὴ	8.e	Anguinum	97.b	Auricule cordis	10.a
	ἀκὴ	7.a	Anguinum	ibidem	Auricule	11.a
	ἀκὴ	14.e	Antenna	175.d	Axungia	84.d
	ἀκὴ	5.h	ἀνδρὶς	4.h	ἀξὸς	ibidem
	ἀκὴ	6.b	ἀνδρὶς	4.b.5.a	ἀξὸς	5.d
	ἀκὴ	6.c	ἀνδρὶς	5.a	ἀξὸς ὑπὸ	11.f
	ἀκὴ	ibidem	ἀνδρὶς	6.b	ἀξὸς ὑπὸ	ibidem.b
	Aculus	175.e.177.h.185.b.	ἀνδρὶς	7.a	ἀξὸς ὑπὸ	109.f
	191.g.100.h		ἀνδρὶς	ibidem.d	ἀξὸς ὑπὸ	171.b
	ἀδελὸς αἰσθητικὸς	20.f	ἀνδρὶς	4.g		
	Aden	18.f	ἀνδρὶς	ibidem		
	ἀδελὸς	ibidem	ἀνδρὶς	11.g		
	ἀδελὸς	18.h	ἀνδρὶς	10.c.12.b		
	Aders	18.h.19.a.38.d.40.	ἀνδρὶς	342.c		
	e.74.b		ἀνδρὶς	31.e		
	ἀδελὸς	7.h.15.h	ἀνδρὶς	32.d		
	ἀδελὸς	7.d	ἀνδρὶς	11.g		
	ἀδελὸς	14.e	ἀνδρὶς	164.a		
	ἀδελὸς	36.h	ἀνδρὶς	ibidem		
	ἀδελὸς	6.f	ἀνδρὶς	42.f.44.b		
	ἀδελὸς	137.d	ἀνδρὶς	30.h		
	ἀδελὸς	ibidem.c	ἀνδρὶς	13.a.b		
	ἀδελὸς	12.f	ἀνδρὶς	36.g		
	ἀδελὸς	152.a	ἀνδρὶς	16.a		
	ἀδελὸς	187.h	ἀνδρὶς	5.f.6.c		
	Ala	5.f.6.b	ἀνδρὶς	9.f		
	Ala alium	103.h	ἀνδρὶς	8.h		
	Ala serpentum	102.h	ἀνδρὶς	186.d		
	Albugo	4.f	ἀνδρὶς	6.d.11.g		
	Albugineus humor	9.f	ἀνδρὶς	5.b		

PARTIV M ANIMALIVM

βελίον	ibidem	καρχύαι	175.d	κίχρη	4.h.7.d
βελίον	5.d	καρχύαι matrixia	11.f.36.f	κίχρη	3.h
βελίον κα φιλία	ibidem	καρχύαι matrixia	36.f	κίχρη	4.f
Butyrum	43.a.f.19.f.20.a	καρχύαι tunicia	9.d	κίχρη	4.e.7.d
	C	καρχύαι	15.a.16.c	κίχρη ἐμμοίον	4.a
καρχύαι	30.e	Cerebellum	8.c	κίχρη χαρὸς	7.b
καρχύαι	ibidem.g	Cerebrum	ibidem.b	κίχρη πύθης	ibidem.d
Cacum foramen	8.e	κίχρη	170.g	κίχρη	6.b.11.g
Cacum intestinum	11.c	Cervicinus	ibidem	κίχρη πύθης	11.g
καρχύαι	11.e	κίχρη	179.c	κίχρη κίχρη	ibidem
Calua	3.f.4.e.13.e.16.a	κίχρη	183.b	κίχρη cerebri	8.f
Calvaria	4.e.13.e.16.a	Cervix	5.c.d.34.e	Cornu	23.b.c
Calvarium	47.a	Cervix extima	5.d	κίχρη	37.d
Calx	7.c.d	Cervix uteri	11.f	Coles	5.h.6.d
καρχύαι	4.b	κίχρη	165.d	Colis	ibidem
καρχύαι	7.d	κίχρη	54.e.77.f	Colluquamentum	20.e
Canini dentes	4.c.33.a.85.a	κίχρη in omo	105.e	Collum	5.b.d.h.33.d
Canities	47.a	Chartilago	16.c	κίχρη	6.h.7.b
καρχύαι	4.f	Chartilago nasi	4.h	κίχρη intestinum	11.d
Caput	3.f.4.e.32.e.45.a	κίχρη	52.h	Coloftra	73.d
Caput fixum	16.b	κίχρη	4.b	Colostrum	19.g.87.g
καρχύαι	11.a	κίχρη	16.a.53.e.203.c	κίχρη	36.a
καρχύαι κα φιλία	10.c	Chela	16.e.203.c	Columella	4.e.5.d
Cavo	18.c	κίχρη	5.a	Columellares dentes	85.a
καρχύαι	6.f.5.g.7.a.15.c	Chelidonium lapis	113.d	Columbarium	113.d
Cafeni	19.f.20.a.42.h	κίχρη	5.h	κίχρη	6.h
Cafeni Bauphicus	43.e	κίχρη	4.c	Cornu agnatum	132.h
Cafeni Bauphicus	ibidem	κίχρη	17.e	Cornu agnatum	179.d.180.d
Cafeni Bauphicus	43.d.44.e	κίχρη	6.c	κίχρη	7.a
Cafeni Bithynius	43.e	Cholago	5.f.6.c	κίχρη	196.d
Cafeni mollis	44.c	κίχρη	11.a.20.f	Cornu agnatum	151.e
Cafeni mollis	43.e	κίχρη	20.f	κίχρη	179.c
Cafeni mollis	43.e.44.c	κίχρη	138.d	κίχρη	ibidem
Castoreum	70.b	κίχρη	4.h	Cornu agnatum	10.f
Castorium	ibidem	κίχρη	ibidem	κίχρη	14.b
καρχύαι	ibidem	κίχρη	8.b.9.a	κίχρη	20.f
καρχύαι	6.a	κίχρη	18.a.c	Cornu	10.b.11.a.36.g
κίχρη	14.e	κίχρη	17.d	κίχρη	14.f
κίχρη	11.g	κίχρη	3.g.4.f	κίχρη	4.f
κίχρη	6.c	κίχρη	4.h.5.b	Cornu tunicia	9.d
κίχρη	11.h	κίχρη	5.b	Cornu tunicia	145.d
κίχρη	32.a	Cornu	36.f.198.h	Cornu	16.e.32.d.52.d
κίχρη	54.b	κίχρη	179.d	Corona capitis	3.f
Celle famorum	179.d	κίχρη	6.d	Corona oculi	9.c
Celum oris	5.a	κίχρη	5.h.6.a	κίχρη	6.h.14.b.15.b
κίχρη	10.b	κίχρη	165.d	κίχρη	4.b
κίχρη	6.c	κίχρη	6.e	κίχρη	20.d
κίχρη	175.e	κίχρη	6.a.d.e	κίχρη	4.h
κίχρη	19.h.20.a.43.h	κίχρη	19.h.20.a.43.h	Cortex	16.h
κίχρη	16.b	Coccyx os	14.c	κίχρη	3.g.4.e.14.c
κίχρη	4.c	Cochlea muscor	211.e	κίχρη	15.b
κίχρη	16.a	κίχρη	ibidem	κίχρη	6.b.16.b
Cera	183.b	κίχρη	4.e	κίχρη	165.d
κίχρη	16.c.36.f	Celum oris	5.a	κίχρη	6.b

INDEX.

κατάλα manus pars	7.b	Dentes canini	33.a.85.a	ἰφικακ'αρχίς	31.a
κατάλα cruris pars	15.d	Dentes exerti	33.a	ἰφισθῶνα	6.d.e
κατάλαδωτ	6.d.16.b.c	Dentium acies	4.d	ἰπικανθίς	4.f
Κοχα	5.h.6.d.16.b	ἔρμα	16.h.17.c	ἰπικαίς	6.d
Cochlearium os	15.d	ἔρμα κατ'ὀδὸς μιλῶν	8.c.17.d	ἰπικαμίς	17.c
Cochlear dices	16.b	Destillatio	20.d	ἰπικαρχίος	6.b
κοχλίας	4.a.16.a	Dextrum	70.g	ἰπικαρχίς	5.a.g.h.33.c
κοχλίας	5.b.46.c	ἀλγίλικτες	27.c	ἰπικαίς	7.d
κοχλίας	7.b	ἀλγικαρχίς	31.h	ἰπικαίς	ibidem
Crea	7.c.d	ἀλγικαρχίς	11.a	ἰπικαίς	7.d.16.c
Crines polytronus	201.a	ἀλγικαρχίς	4.h	ἰπικαίς	7.d
κρίος	14.d	ἀλγικαρχίς κατ'ὀδὸς μιλῶν		ἰπικαίς	16.d
Crocodylea	90.h	17.f		ἰπικαίς	6.f
κροκόδει	4.f.h	ἀλγικαίς ἄλλος τῷ αἰσθητῇ		ἰπικαίς	11.d
κροκόδει	13.g	20.f		ἰπικαίς	17.h
Crus	7.b.c	ἀλγικαίς vertebra	14.b	ἰπικαίς	18.b
κρύβος	78.a	ἀλγικαίς	5.b	ἰπικαίς	6.c
κρυμνός	6.d	ἀλγικαίς	3.g	ἰπικαίς	ibidem
CrySTALLINE humor	8.h	ἀλγικαίς	6.c	ἰπικαίς	5.d.6.a
κρυμνός	ibidem	Digiti	7.a.16.c	ἰπικαίς	6.b
κρύβος	6.d	Digiti pedis	7.c	ἰπικαίς	16.h.77.a
κρύβος dentes	5.b	Dorsum	5.h.6.d.14.a	E	
κρύβος manus pars	7.b			E	
Cubitus	6.f.7.a.15.a.16.b			E	
Cunus	6.d	ἡδύ	6.c	Excessus osium	14.c
Cuticula	17.c	ἡδύ	16.b	Excrementum	20.b.f
Cutis	16.g.17.a	Ebur	56.g	ἡδύ	30.d
κύαρ	4.g	Echinus	54.b	ἡδύ	ibidem.g
Cyrtum	164.g.165.h	ἡδύ	ibidem	ἡδύ	31.a
κύριος	ibidem	ἡδύ	4.g	ἡδύ	30.f
Cyrtum genera	164.g	Echion	100.a	F	
κύριος in aure	3.h	ἡδύ	36.g		
κύριος os	15.g	ἡδύ	4.f		
κύριος	14.a.16.a	ἡδύ	8.b		
κύριος	5.g	ἡδύ	167.e.g		
κύριος	4.c.33.a	ἡδύ	ibidem		
κύριος	106.g	ἡδύ	163.f		
Cyrtum	146.e	ἡδύ	ibidem		
κύριος	4.g	ἡδύ	11.b		
κύριος excrementum	20.f	ἡδύ	4.h		
κύριος	ibidem	ἡδύ	ibidem.f		
κύριος	8.a	ἡδύ	175.d		
κύριος in aure	3.h	ἡδύ	54.d		
κύριος in eorum	11.a	ἡδύ	5.b		
κύριος	11.g.18.c	ἡδύ	11.g		
D		ἡδύ	ibidem		
δακτύλιος	7.d.11.g	ἡδύ	10.b		
δακτύλιος	7.a	ἡδύ	4.f		
δακτύλιος	ibidem.e	ἡδύ	4.f		
δακτύλιος	5.d	ἡδύ	11.a		
δακτύλιος	6.c.11.h	ἡδύ	12.b		
Dentes	4.c.5.b.52.a	ἡδύ	6.c		

PARTIV M ANIMALIVM

G		Humeri	5.h.6.e.f.h.14.	λαιμαίς	5.d
Γαλμαῖος	6.b	f.16.f		Lana	16.b.77.a
Γάλακ	20.a	Humeri articulus	14.e	Larynxium	62.b
Γαμφύλιον	4.h	Humerus	ibidem	Lapis Chelidonium	123.d
Γαστριχόν	5.b	Hypochondrium	5.f	Larynx	5.c.d.9.b
Gatus	166.c.e			λαγυλῆ	5.d.9.b
Gatum	ibidem	I		λαχρῶς	8.f
Gatum sociorum	ibidem.c			Lendes	196.d
Γαστρί	6.b	Ichthyocolia	168.c	Λαυός	4.b
Γαστροκνημία	7.d	ἰχθῆρ	12.f.148.c	Λαυός	8.f
Γλαστίνες dentes	5.b	ισθός	12.f.20.f	Λαυλώστρα	31.b
Gnae	4.b.f	Iecur	10.e.11.4.35.b	Λάουαρία	5.a.d
Genitura	20.a	Iecur bipartitum	10.f	Λιχέρης	7.a
Genitale	7.h.11.e.53.b	Iecur intestinum	11.c	Lien	10.e.11.a
Genu	7.b.d	ἰεχθῆρ	14.d	Ligamenta	12.h.13.a
Genuini dentes	5.b.47.d	ἰεχθῆρ	ibidem.b	Ligula	4.c.5.a
Γένος	4.h	ἰχθῆρ	7.d	Lingua	4.c.5.a.8.a
Γένος	22.c	Iliis	55.6.c	Lingua minor	5.a.9.b
Γένος	4.c.5.a	Ilium ossa	15.d	Lingua laringis	9.h
Gibber	6.f.h	Index digitum	6.g.7.a	Lingula	ibidem
Gibbum iecoris	10.f	ἰνῆ	12.f.13.b	Νόσος auriculae pers	4.g
Gingiva	4.c.5.b	ἰνῆ	4.e	Νόσος ἰνῆς	10.g
Glabulus in lolligine	201.c	Ineluvies	104.f	Locci	5.g.6.c.11.f.b
Glabulum in xiphia	167 h.169.a	Ingenit	5.h.6.d	Loculamenta sanorum	179.d
Glanis	5.f.6.c	Internodium	7.a.15.c	Loculi	ibidem
Γλῶσσιν	4.g	Interseptum narium	4.a	Locutio	27.a.c
Γλωσσίδης finus	14.b	Intestina	11.g	Λογίς	4.f
Γλωσσῶν	31.b	Intestinum tenuius	ibidem	Λόγιστος	5.a
Glocientes gallinae	110.b	Intestinum plenum	ibidem	Λογιστῶν	14.b
Γλωσσῶν	5.a	Intestinum rectum	ibidem	Λόγιστος	14.b.45.e
Γλωσσῶν λαβῆς	9.h	ἰεχθῆρ	4.f	Lumbi	6.a.e
Γλωσσῶν	5.a	ἰεχθῆρ oculi	9.b	Lungrosi	45.c
Γλωσσῶν	9.h	ἰεχθῆρ oculi	ibidem	Luteum oui	105.e
Γλωσσῶν	6.d.e.15.e	ἰχθῆρ	6.d.16.b.45.h	Lyncurium	62.g
Glutinum	17.b	ἰχθῆρ os	15.d		
Γυνάμιν	4.h	ἰδῆρ	5.a		
Γυνάμιν costae	16.b	Iuba	54.e.77.f	Μαλακνῆρ	142.c
Γυνάμιν dentes	5.b	Inguale os	16.a	Μαλακνῆρ	31.b
Γυνάμιν	36.d	Inguis	5.e	Male	4.b.b
Γυνάμιν	7.d	Inguis	5.e.h.6.a.14.e	Malloolus	7.d.15.f.16.c
Γυνάμιν	6.b	ἰφῆρ	6.e	Μαλακνῆρ costae	16.b
Gula	5.c.d.9.b.10.a			Mamma	5.e.6.b.33.e
Guttur	4.b.5.a	I		Mammarium glandula	18.g
Gutturelio	9.h			Mandibula	4.b.b
Γυνάμιν	6.a.14.a	λαβῆρ ἰδῆρ finura	13.g	Μαῖν	6.f.7.a
Γυνάμιν κελῆρ	11.h	Labra	4.b.b	Mas	23.a.27.h
		Lac	20.a.51.a.56.c	Μαλακνῆρ	14.b
		Lac in testis	210.a	Μαλακνῆρ	14.b
		Lacertus	6.f.h	Μαῖν	5.a
		Lactem humor in testis	210.a	Μαῖν	6.b
		Lactes	11.d.g.18.a.b.25.h	Matrix	5.g.6.c.d
		λαυός	6.c	Maxilla	4.b.h
		λαυός ἰνῆ	16.b	Maxillares dentes	4.d

INDEX.

Maxilla superior ossa	13. h	Mola	7. c	libum	22. e. g
Maxilla inferior ossa	ibidem	Molares dentes	4. d. 5. b	νοτιαίος μυελός	19. d
Mecatus auditorius	4. g	μοιόντων calvaria	13. f	νίτος	6. d
μήκων in polyris	199. d. f	μυία	3. c	Nympha	180. p
μήκων in egstatia	208. e	Macro cordis	10. e	νύμφη	6. d
Medius digitus	6. g. 7. a	Mancus	20. d		
Medius intestinum	11. g.	Mancus cochlearum	211. e		
18. c		Maria	166. e. g	O	
Medula	19. d. 40. b	Maries	ibidem	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	13. g
μήζας δάκτυλος	7. a	Muscerda	69. b	Occhipitum	4. e
Mel	181. d	Musculi	18. d	Occhipus	3. f. 4. e
Mel candidum	179. a	Muslax	4. b	ὀχρὸνύματι	4. h
Mel anthinum	181. h	Mutis in exantheibis	174. h	ὀχρὸς	6. c
Mel horaeum	ibidem	Mutis in crustatis	103. f	Oculus	3. d. 8. a
Mel sylvestre	182. a	μυκτῆρες	4. a. h	ὀδόντες	5. b
Mel eticium	ibidem	μυελός	19. d	ὀδοντοφάγος οἶσμον processus	
Mel menomenon	181. g	μύς	18. d	14. b	
Melin optimi nota	181. c	μυλακίς	7. d	ὀδὸνς uertebra	ibidem
μῆλα	4. h. 5. b	μύλας	5. b	ὀισφάγος	5. d
Melanotrya	165. d	μύλα	7. d. 16. c	Oesophus	77. c
μυλάσθονα	ibidem	μύωντες	45. b	Oesophus	ibidem
μυλάσθονα	ibidem	μύωντες	6. d	ὀισντες	ibidem
Melica	44. b. c	μυρτοχελίδας	ibidem	ὀλιγογύτοι	6. h. 15. b
μῆλα	181. d	μύσφι	4. b. 5. a	ὀλίγιν	7. a. 16. b
μυλαπῆξ	209. c	μύτις in exantheibis	174. b	ὀλίγος	6. a
Melligo	180. d	μύτις in mollibus	198. f	Olisigo	92. f
μῆλας	3. c	μύτις in crustatis	203. f	ὀλιγίον	ibidem
Membrana	17. c	μύττα	4. h	Omasum	19. h. 54. b
Membrana costas succingens	ibidem. f	μύττα cochlearum	211. e	Omentum	11. d. 17. g. 18. b
Membrana cerebrum continen-				ὀμμάτι	4. f
tes	ibidem. d			ὀμμάτιον	3. b
Membrum	3. e	Nares	4. a. h. 45. c. 52. a	ὀμμάτιον	5. h. 6. e. 16. b
μῆτις σκληρῆς	8. b. 17. d	Nasus	4. a. h	ὀμμάτιον	6. d. e. h
μῆτις cerebri	8. b. 17. d	Nasi spina	ibidem. h	ὀμμάτιον	164. h
Mentum	4. b. h	Nates	5. h. 6. a. d. e	ὀνυχος	16. e
μήρος	3. c	νηρία	11. g	ὀνυξ	24. a
μήρος	16. b	νηρία uertebra	14. b	ὀνυξ	23. h. 89. e
μήρος	7. d	νηρία	11. a	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	4. f
μήρος	11. g. 18. c	Nervus	13. a	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	3. g
μήρος	ibidem	Nervorum paria septem	8. c	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	ibidem
μήρος	4. e	Nervorum octidua	ibidem	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	4. f
μήρος	7. d	Nervi optici	8. d	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	16. e
μήρος	6. b	Nervi molles	8. d. 12. h	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	5. d. 5. b. 46. c
μήρος	3. g	Nervi duri	ibidem	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	165. h
μήρος	6. g. 7. a	Nervus auditorius	8. e	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	4. f
μήρος	5. b	νήστις	159. c	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	14. c. 104. b
μήρος	4. e	νήστις	13. a	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	6. c. 20. d
μήρος	ibidem	νήστις	8. e	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	7. e
μήρος	6. e. d. 11. f	νήστις	16. c	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	4. b. 5. a
Milesum hadsonium	128. h	νήστις	3. h	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	13. c. 52. a
Minimus digitus	6. g	Nodus	6. g. 7. a	ὀφθαλμικὴ σάτυρα	10. d
μῆτις	179. e	Note per quas fit motus in anima		ὀφθαλμικὴ σάτυρα	6. a. 14. a. b
				ὀφθαλμικὴ σάτυρα	14. d

PARTIV M ANIMALIVM

ὀφθαλμὸς	6.c	περιτοναίος	16.b	Peritonaei principium	ibidem
ὀφθαλμοειδής	ibidem	περιτοναίος	6.b	peritonaei	20.f
ὀφθαλμοειδής	ibidem	περιτοναίος	16.c	peritonaei	31.d
ὀφθαλμοειδής	6.a.14.a	περιτοναίος	36.d	peritonaei	16.c
ὀφθαλμοειδής	11.f	περιτοναίος	16.b	Perforatio sensum latens	20.e.f
ὀφθαλμοειδής	13.c	περιτοναίος	5.a	Pes	7.c.d
ὀφθαλμοειδής	14.b	περιτοναίος	4.f	perit	4.f
ὀφθαλμοειδής	24.a	Pars pedis suprema	7.e	perit	7.a
ὀφθαλμοειδής	105.g	Pars pedis infima	ibidem	perit	47.a
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Pars prior	ibidem	perit	20.f
ὀφθαλμοειδής	106.g	Partes	3.b.c	perit	12.f
ὀφθαλμοειδής	105.g	Particula	ibidem	perit	16.b
ὀφθαλμοειδής	106.g	Pars tota	ibidem	perit	27.c
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Pars interra	ibidem	perit	5.e
ὀφθαλμοειδής	105.h	Partes simplices	ibidem.b	perit	4.d
ὀφθαλμοειδής	109.f	Partes prima	ibidem	perit	11.e
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes incompofita	ibidem	perit	201.a
ὀφθαλμοειδής	108.g	Partes similes	ibidem	perit	30.h
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes similes molles	11.h	Picatus cereus	179.d
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes similes solide	12.a	Pilare malum	49.c
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes dissimiles	3.c	Pilorum generatio	20.f
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes organicae	ibidem.b	Pilorum differentia	37.g
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes instrumentales	ibidem	Pilus	16.h.51.h
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Partes officiales	ibidem	perit	179.d
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Patella	7.c.d.15.e.16.c	Pisocerus	ibidem.e
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Pisces	7.a.16.b	Pipita	20.d
ὀφθαλμοειδής	105.e	Pecten	15.d.16.b	Piscine gallinarum	111.b
ὀφθαλμοειδής	105.e.109.c	Pectus	5.e.6.b	placatus	35.f
ὀφθαλμοειδής	105.e	Pedunculum	5.e	Planta	7.e.e
ὀφθαλμοειδής	108.e	perit	7.d.f.15.h	placatus	16.b
ὀφθαλμοειδής	10.h	perit ossa	15.h	placatus	11.f.36.f.198.b
ὀφθαλμοειδής	5.a	Pedis digiti	7.c.15.h	placatus	11.e
ὀφθαλμοειδής	ibidem	Pedis concavum	7.d	placatus	6.b.16.b
ὀφθαλμοειδής	10.b.11.e	Pedis partes, Supra in Pars pedis	ibidem	placatus	14.b
ὀφθαλμοειδής	5.g	perit	4.f	perit	11.e
ὀφθαλμοειδής	20.f	perit	5.f.6.c	perit	5.h.6.d
ὀφθαλμοειδής	4.g	Pennis	16.b.104.c	perit	112.e
ὀφθαλμοειδής	42.e	Penna	20.e.f	perit	47.a
ὀφθαλμοειδής	4.h	Perforatio sensum latens	17.g	perit	6.g.7.a
		perit	ibidem	perit	15.c
		perit	ibidem	perit	13.g
		perit	4.e	perit	7.c.d
		perit	5.g.6.c	perit	8.d.20.e
		perit	6.d	perit	36.h
		perit	113.d	perit	7.e
		perit	ibidem	perit	7.d.e
		perit	17.e	perit	5.f.10.e.11.a.61.f
		perit	ibidem	perit	5.g.6.c
		perit	ibidem	perit	56.f
		perit	ibidem	perit	5.e.6.b
		perit	18.b	perit	7.a.b
		Peritonaei nertex	17.g.18.b	Processus osium	14.e

INDEX.

σπλῆν	6.d.11.g	Scapula	5.h.6.f.h.38.b	Spina/corporalorum	14.e.f
σπλῆνις	74.f	Scapularum ossa lata	14.d	Spinalis medulla	19.d
σπλῆνις	6.b	σπλῆν	7.d	Spinula poscium	138.d
σπλῆνις	104.f	σπλῆν	4.f	Spiratio	27.e
Prothysis	56.f	Schadon	180.f	σπλῆν	11.a
σπλῆνις	16.b	Schiston	42.f	σπλῆν	ibidem
Propolis	179.e.183.d	χρυσόγαλα	ibidem	σπλῆν	14.a
σπλῆνις	7.e	σπλῆνις	15.e	Squama	16.h
σπλῆν	6.e	σπλῆνις	17.d	σπλῆν	5.b
Pubes	5.f.6.c	σπλῆνις	142.b	σπλῆν	19.a
Pudenda	ibidem	Scorpula	5.h.14.d.16.a	σπλῆν	6.c
Pulmo	10.e.11.a	Scorpula aperta	6.e	σπλῆν	4.b.11.g
πυλῆ	6.d	Scorpula cernix	ibidem	σπλῆν	13.g
πυλῆ	11.b	Scorium	5.g.6.c	Stercus	20.c.f.51.h
πυλῆ	31.h	Scroscum	ibidem	σπλῆν	16.b
πυλῆ	14.b	σπλῆνις	15.e	σπλῆν	ibidem
πυλῆ	42.f	Sebum	18.h.19.a	σπλῆν	6.b.14.f.g
πυλῆ	ibidem	Secunda membrana	18.a	σπλῆν	3.e
πυλῆ	10.c	σπλῆν	21.g	σπλῆν	6.b
πυλῆ	20.a	Senectus	ibidem.c	σπλῆν	7.b
πυλῆ	6.e.14.a.c	Sepium	201.b.c	σπλῆν	ibidem.e
πυλῆ	4.h	Sepium	ibidem	σπλῆν	3.g
πυλῆ	14.e.f	Sepium	10.c	σπλῆν	5.a
πυλῆ	9.e	Septum transversum	10.b.e.35.b	σπλῆν	11.h
πυλῆ	4.f	Septum marium	4.h	σπλῆν	5.a
πυλῆ	4.e.16.e.32.f.103.e	Serotini dentes	ibidem.d	σπλῆν	ibidem
πυλῆ	16.a	Serum	19.f.20.a.42.h	σπλῆν	49.c
πυλῆ	ibidem	σπλῆν	16.a	σπλῆν	16.a
Retiformis membrana	8.d	Sewum	18.h	σπλῆν	4.h
Renes	10.g.11.a	Sextana salsamenta	165.g.h	σπλῆν	15.b
σπλῆν	4.h	σπλῆν	4.h	σπλῆν	12.f.20.e.f.41.a
σπλῆν	4.h.32.f	σπλῆν	20.f	σπλῆν	6.c.84.c.g
σπλῆν	179.g	σπλῆν	27.c	σπλῆν	3.g.4.f
Rostrum	16.f.103.e	σπλῆν	20.f	σπλῆν	7.c.d
Ruge	3.g	σπλῆν	11.a	σπλῆν	15.e.16.c
σπλῆν	4.e.16.f.32.f.34.e	σπλῆν	3.f.4.c.13.f	σπλῆν	16.a
σπλῆν	32.a	σπλῆν	10.d	σπλῆν	56.b
σπλῆν	32.a	σπλῆν	36.f	σπλῆν	31.h
σπλῆν	20.e.f.51.a	σπλῆν	14.d	σπλῆν	13.a
Salsamentum	165.f	σπλῆν	27.c	σπλῆν	20.f
Salsamenta horæ	ibidem.h	σπλῆν	4.d	σπλῆν	27.d
Salsura	ibidem.f	σπλῆν	20.b	σπλῆν	10.d
σπλῆν	179.f	σπλῆν	4.h	σπλῆν	7.d.15.f.16.c.53.f
Sanguis	12.d.f.36.h.37.a.b	σπλῆν	184.a	σπλῆν	165.f
Sanus	12.e.f	σπλῆν	13.h	σπλῆν	ibidem
Sarde	169.h	σπλῆν	11.d.g	σπλῆν	3.h.4.f
Sardica salsamenta	ibidem	σπλῆν	16.c	σπλῆν	7.b
σπλῆν	18.c	σπλῆν	6.e.14.a.16.a	σπλῆν	ibidem.d.e
σπλῆν	4.g	σπλῆν	13.c	σπλῆν	4.f
σπλῆν	4.e	σπλῆν	138.d	σπλῆν	74.d
σπλῆν	15.g.h	σπλῆν		σπλῆν	

PARTIV M ANIMALIVM

Taurocolla	<i>ibidem</i>	Tubercula ofium	16.a	Vina	6.b
τῆρας	6.c	Tunica	17.e	Vmbilicus	ς. f. 6. b. 38.e
τῆμα	7.e	τῆλοι	3.g	Vmbilicus in p̄cōbus	139.h
Tempora	4.a.e.h	τῆλοι	7.e	Vnguis	6.g
Tendines	12.h.13.a.b	τῆφλεις πῆρες	8.e	Vngula	16.e
Tendones	13.b	τῆφλεις ὑπεροι	11.g	Vox	27.c
τίβας	ς. d. 13. b	τῆρες	42.b	Vrina oua	106.
Tefles	ς. g. 6. c. 11. f. 25. d.	V		Vrorygium	104. b
36.a. 53. c		Vasfeminarium	36.h	Vterus	ς. f. g. 6. c. d. 11. f. h. 36. d
τῆφας	15.g	Vellera	77.g	Vna	4.e. 5.b
Θῆλυ	6.b	Volumina	<i>ibidem</i>	Vulna	ς. f. 6. c. h. 11. f
Θῆλυ	23.a	Vena	12.b. f	Vulna eieftitia	84. b
Θῆλυ	7. a. b	Vena cana	12. b	Vulna porcaria	<i>ibidem</i>
Θῆλυ in mollibus	198. f. g	Vena ὑπεύλητος	<i>ibidem</i>	Xylocolla	74. d
Thorax	ς. e. 6. a	Vena icoraria	<i>ibidem</i>	ξυφός in lolligine	167. h. 199. c
Θῆρος	20. b. 138. b	Venarum ortus	12. b	ξυφός in lolligine	167. h. 199. c
Spis	16. h	Venarum nomine etiam arterias	<i>ibidem</i>	ξυφός in xypbia	6. b. 14. g
Thurianum falfamentum	165. h	appellari	<i>ibidem</i>	ξυφός	3. b
Θῆμος	6. a	Venenum animum	67. a	Y	
Θῆμος	18. h	Venter	ς. f. 6. b. 35. e. 53. c	Υαλοῦς oculi humor	9. a
Thynnam falfamentum	165. h	Venter imus	6. c	ὕμης	18. b
Thynnium falfamentum	<i>ibidem</i>	Ventriculus	11. b. g	ὕμης τοῦ σώματος	17. d
Θυελλῆς in fanis apum	179. d	Ventriculi os	<i>ibidem</i>	ὕμης os	16. c
Tibia	7. c. d. 15. e. 16. c	Ventriculi cerebri	8. g	ὕμης πῆρας	31. a
τιτθῖος	6. b	Ventriculi cordis	11. a	ὕμης	4. b
τιτθῖος	<i>ibidem</i>	Vetebra	14. a	ὕμης τοῦ σώματος	17. e
τιμῖος dentes	4. c. 5. b	Vetebra colli	16. a	ὕμης τοῦ σώματος	6. b
Tomus Thurius	167. h	Vefica	11. b. g. 18. c	ὕμης τοῦ σώματος	ς. d
Tonfilla	4. c. 5. a. b	Vefica cervix	11. h	ὕμης τοῦ σώματος	4. c
Torcular	8. f	Vefica maior	18. a	ὕμης τοῦ σώματος	6. d
τῆμα ἀρπεία	ς. d	Vefica minor	<i>ibidem</i>	ὕμης τοῦ σώματος	ς. g. 6. c
τῆμα	<i>ibidem</i>	Vefica bilem continens	<i>ibidem</i>	ὕμης τοῦ σώματος	7. a
τῆμα ὑπεροι	11. h	Veficem	18. a. 4	ὕμης τοῦ σώματος	6. e. 11. b
τῆμα τοῦ σώματος	16. a	Vefigium	7. e	Z	
τῆμα	6. c	Vetula	6. b	Ζῆλος	16. a
Transpiratio fenfum latens	20. f	Vifcera	10. b. 11. a	Ζῆλος	<i>ibidem</i>
τῆμα	49. c	Vitellus oui	105. e		
τῆμα	15. e	Vitreum humor oculi	9. a		

FINE





